

COMPENDIO
DE
ANATOMIA DESCRIPTIVA

L. TESTUT y A. LATARJET

COMPENDIO
DE
ANATOMIA DESCRIPTIVA

FOR

L. TESTUT

Profesor de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lyon

Vigesimosegunda edición española,
traducida de la decimoquinta edición francesa, revisada y corregida

FOR

A. LATARJET

Profesor de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lyon
Miembro correspondiente de la Academia de Medicina



SALVAT EDITORES, S. A.

BARCELONA - MADRID - BUENOS AIRES

MEXICO - CARACAS - BOGOTA - RIO DE JANEIRO - QUITO - SANTIAGO DE CHILE
SAN JUAN DE PUERTO RICO

PREFACIO

No es este libro un tratado didáctico, sino, como indica su título, un *simple resumen*, lo más sucinto posible, de las nociones de anatomía descriptiva que constituyen la materia del primer examen del doctorado en Francia.

He prescindido de la histología por el doble motivo de que no forma parte del examen precitado y porque en esta colección se le destina un volumen especial. Lo mismo he de decir de la embriología y de la anatomía topográfica.

Tampoco consignaré lo referente a las anomalías y a las variaciones anatómicas, pues, aun siendo muy interesantes en morfología general, tienen un valor secundario para el estudiante que se prepara para sufrir un examen.

Reducido a estos límites, escrito por otra parte en el estilo sumamente conciso que conviene a los compendios, sin ilustración ninguna, ni siquiera figuras esquemáticas, este COMPENDIO DE ANATOMÍA DESCRIPTIVA, digámoslo desde luego, va destinado, no a los que necesitan aprender la anatomía, sino a los que necesitan refrescar la memoria de lo que aprendieron ya.

Así, pues, no quisiera verlo en manos de un principiante: para éste será siempre un libro obscuro, a veces absolutamente ilegible; al contrario, los que conozcan ya la anatomía lo comprenderán fácilmente y confío que lo leerán con provecho, puesto que ya en los cursos de disección se habrán familiarizado con los mil detalles descritos de nuestros diferentes sistemas anatómicos; sobre un punto concreto encontrarán rápidamente los datos necesarios, y por otra parte, sin recurrir constantemente a las grandes obras, podrán repasar en pocas semanas y hasta en algunos días las materias que necesitan para una conferencia, un examen o unas oposiciones.

Para la redacción de este COMPENDIO, dos de mis mejores discípulos, MM. PATEL, ayudante, y PELLANDA, preparador anatómico, el primero para la miología, la angiología y el sistema nervioso, y el se-

gundo para los órganos digestivos y los respiratorios, me han servido de inteligentes cuanto activos colaboradores, por lo cual me creo en el deber de significarles mi más profundo agradecimiento.

L. TESTOT

He conservado para este COMPENDIO su carácter de «Resumen». Sólo he introducido en él las correcciones y adiciones indispensables. El papel de esta modesta obra tiene hoy más importancia: los estudiantes obligados a aprender en algunos meses la anatomía descriptiva encontrarán en él el resumen indispensable de las nociones extensamente expuestas en los tratados didácticos.

A. LATARJET

En esta nueva edición se han hecho numerosas modificaciones concernientes a la Angiología, el Sistema nervioso y la Esplacnología.

A. LATARJET

INDICE DE MATERIAS

PREFACIO

Págs
vii

LIBRO I

OSTEOLOGIA

CAPITULO PRIMERO. — Columna vertebral	1
ARTÍCULO PRIMERO. — <i>Vértebras libres (cervicales, dorsales y lumbares).</i>	2
1. Caracteres comunes a todas las vértebras	3
2. Caracteres peculiares de las vértebras de cada región	4
3. Caracteres propios de ciertas vértebras	5
ARTÍCULO II. — <i>Vértebras sacras y cóccigeas</i>	8
1. Sacro	8
2. Cóccix	10
ARTÍCULO III. — <i>Columna vertebral considerada en su conjunto</i>	11
CAPITULO II. — Esternón y costillas, tórax	13
1. Esternón	13
2. Costillas y cartílagos costales	14
3. Tórax en general	15
CAPITULO III. — Cabeza ósea	19
ARTÍCULO PRIMERO. — <i>Huesos del cráneo.</i>	19
1. Descripción de los huesos del cráneo	19
1.º Frontal	19
2.º Etmoides	21
3.º Esfenoides	23
4.º Occipital	25
5.º Parietal	26
6.º Temporal	30
7.º Huesos wormianos	34
2. Cráneo en general	34
1.º Configuración interior del cráneo	34
2.º Configuración exterior del cráneo	36

	Págs.
ARTÍCULO II. — <i>Huesos de la cara</i>	39
1. Descripción de los huesos de la cara	39
1.º Maxilar superior	39
2.º Hueso malar	41
3.º Hueso propio de la nariz	42
4.º Unguis	42
5.º Hueso palatino	43
6.º Cornete inferior	45
7.º Vómer	45
8.º Maxilar inferior	46
2. Cara en general	48
ARTÍCULO III. — <i>Regiones comunes al cráneo y a la cara</i>	49
ARTÍCULO IV. — <i>Hueso hioides</i>	52
CAPÍTULO IV. — <i>Miembros</i>	54
ARTÍCULO PRIMERO. — <i>Miembro superior o torácico</i>	54
1. Huesos del hombro	54
1.º Clavícula	54
2.º Omóplato	55
2. Hueso del brazo o húmero	57
3. Huesos del antebrazo	58
1.º Cúbito	59
2.º Radio	60
4. Huesos de la mano	62
ARTÍCULO II. — <i>Miembro inferior o pelviano</i>	66
1. Hueso de la cadera, pelvis	66
1.º Hueso coxal	66
2.º Pelvis en general	69
2. Hueso del muslo o fémur	72
3. Huesos de la pierna	75
1.º Rótula	75
2.º Tibia	76
3.º Peroné	79
4. Huesos del pie	80
ARTÍCULO III. — <i>Huesos sesamoides</i>	86

LIBRO II

ARTROLOGIA

CAPÍTULO PRIMERO. — <i>Articulaciones de la columna vertebral</i>	89
ARTÍCULO PRIMERO. — <i>Articulaciones comunes a la mayoría de las vértebras</i>	89

	PÁGS.
ARTÍCULO II. — <i>Articulaciones propias de algunas vértebras</i>	93
1. Articulaciones del sacro con los huesos próximos	93
2. Articulaciones intercocígeas	94
3. Articulaciones del atlas con el axis	94
ARTÍCULO III. — <i>Articulaciones de la columna vertebral con la cabeza</i>	95
CAPÍTULO II. — <i>Articulaciones de la cabeza</i>	98
1. Articulaciones de los huesos del cráneo entre sí	98
2. Articulaciones de los huesos de la mandíbula superior entre sí y con el cráneo	98
3. Articulación temporomaxilar	98
CAPÍTULO III. — <i>Articulaciones del tórax</i>	103
1. Articulación de las costillas con la columna vertebral	109
2. Articulación de las costillas con los cartílagos costales	104
3. Articulación de los cartílagos costales con el esternón	104
4. Articulación de los cartílagos costales entre sí	105
5. Articulación de las distintas piezas del esternón entre sí	105
CAPÍTULO IV. — <i>Articulaciones de los miembros</i>	107
ARTÍCULO PRIMERO. — <i>Articulaciones del miembro superior</i>	107
1. Articulaciones de los huesos del hombro	107
2. Articulación escapulohumeral	110
3. Articulación del codo	113
4. Articulaciones de los huesos del antebrazo entre sí	116
5. Articulación de la muñeca	119
6. Articulaciones intrínsecas de la mano	121
A. Articulaciones del carpo	121
B. Articulaciones carpometacarpianas	123
C. Articulaciones intermetacarpianas	124
D. Articulaciones metacarpofalángicas	125
E. Articulaciones interfalángicas de los dedos	126
ARTÍCULO II. — <i>Articulaciones del miembro inferior</i>	127
1. Articulaciones de los huesos coxales o huesos de la pelvis	127
A. Articulación sacroilíaca	128
B. Sínfisis pubiana	130
C. Membrana obturatriz	131
2. Articulación coxofemoral	132
3. Articulación de la rodilla	135
4. Articulaciones de los huesos de la pierna entre sí	140
5. Articulación de la garganta del pie	142
6. Articulaciones intrínsecas del pie	144
A. Articulaciones tarsianas	144
B. Articulación tarsometatarsiana	148
C. Articulaciones intermetatarsianas	149
D. Articulaciones metatarsofalángicas	149
E. Articulaciones interfalángicas de los dedos	150

LIBRO III

MIÓLOGIA

	Página
CAPÍTULO PRIMERO. — Músculos de la cabeza	153
1. Músculos masticadores	153
2. Músculos cutáneos de la cabeza	156
A. Músculos cutáneos del cráneo	156
B. Músculos de los párpados	157
C. Músculos de la nariz	158
D. Músculos de la boca	159
CAPÍTULO II. — Músculos del cuello	162
1. Región lateral del cuello	162
2. Región del hueso hioides	164
A. Músculos infrahioides	164
B. Músculos suprahioides	166
3. Región prevertebral	167
4. Aponeurosis del cuello	168
CAPÍTULO III. — Músculos de la región posterior del tronco y del cuello	171
1. Músculos superficiales de la región	171
2. Músculos de la nuca	174
3. Músculos de los canales vertebrales	176
4. Intertransversos	178
5. Interespinosos y espinosos	179
6. Músculos occípteos	179
CAPÍTULO IV. — Músculos del tórax	180
1. Región anterolateral	180
2. Región costal	182
CAPÍTULO V. — Músculos del abdomen	184
1. Región anterolateral	184
A. Músculos largos	184
B. Músculos anchos	184
C. Aponeurosis de los músculos de la región anterolateral del abdomen	187
2. Región posterior o lumboilíaca	191
3. Región diafragmática; diafragma	193
CAPÍTULO VI. — Músculos del miembro superior	196
1. Músculos del hombro	196
2. Músculos del brazo	199

	Págs.
A. Región anterior del brazo	199
B. Región posterior del brazo: tríceps braquial	200
C. Aponeurosis del brazo	201
3. Músculos del antebrazo	201
A. Región anterior del antebrazo	202
B. Región externa del antebrazo	205
C. Región posterior del antebrazo	207
D. Correderas y sinoviales de los tendones de los músculos del antebrazo	209
E. Aponeurosis del antebrazo	210
4. Músculos de la mano	210
A. Región palmar externa: eminencia tenar	211
B. Región palmar interna: eminencia hipotenar	212
C. Región palmar media	213
D. Aponeurosis de la mano	215
CAPÍTULO VII. — Músculos del miembro inferior	217
1. Músculos de la pelvis	217
2. Músculos del muslo	220
A. Región anteroexterna	220
B. Región postero-interna	222
C. Aponeurosis del muslo	225
3. Músculos de la pierna	225
A. Región anterior	225
B. Región externa	227
C. Región posterior	228
D. Correderas y sinoviales de los tendones de los músculos de la pierna	231
E. Aponeurosis de la pierna	231
4. Músculos del pie	232
A. Región dorsal	232
B. Región plantar interna	232
C. Región plantar externa	233
D. Región plantar media	234
E. Aponeurosis del pie	236

LIBRO IV

ANGIOLOGIA

PRIMERA SECCIÓN. — Corazón

ARTÍCULO PRIMERO. — Corazón o miocardio	240
1. Consideraciones generales	240
2. Configuración exterior y relaciones	240
3. Configuración interior	242

	Págs.
A. Ventrículos	242
B. Aurículas	247
4. Constitución anatómica	249
5. Sistema de mando del corazón	250
6. Vasos y nervios	252
A. Arterias coronarias	252
B. Venas cardíacas	253
C. Linfáticos	254
D. Nervios	255
7. Endocardio	255
ARTÍCULO II. — <i>Pericardio</i>	256
A. Pericardio fibroso	256
B. Pericardio seroso	257
C. Medios de fijación del pericardio	258
D. Vasos y nervios	259

SEGUNDA SECCIÓN. — **Arterias**

CAPÍTULO PRIMERO. — Sistema de la arteria pulmonar	263
--	-----

CAPÍTULO II. — Sistema de la arteria aorta	265
--	-----

ARTÍCULO PRIMERO. — <i>Ramas que nacen del cayado de la aorta</i>	266
1. Tronco braquiocéfálico	266
2. Arterias carótidas primitivas	267
3. Arteria carótida externa	268
A. Ramas colaterales	268
B. Ramas terminales	270
4. Arteria carótida interna	272
5. Arteria subclavia	274
A. Ramas colaterales ascendentes	275
B. Ramas descendentes	276
C. Ramas externas	277
6. Arteria axilar	278
7. Arteria humeral	279
8. Arterias radial y cubital	280

ARTÍCULO II. — <i>Ramas que nacen de la porción torácica de la aorta</i>	284
--	-----

ARTÍCULO III. — <i>Ramas que nacen de la porción abdominal de la aorta</i>	285
--	-----

1. Arterias diafragmáticas inferiores	285
2. Arterias lumbares	285
3. Tronco celíaco	285
4. Arteria mesentérica superior	287
5. Arterias capsulares medias	287
6. Arterias renales	288
7. Arterias genitales	288
8. Arteria mesentérica inferior	288

	Págs.
ARTÍCULO IV — Ramas terminales de la aorta	289
1. Arteria sacra media .	289
2. Arteria iliaca primitiva	289
3. Arteria iliaca interna o hipogástrica	290
4. Arteria iliaca externa	293
5. Arteria femoral	294
6. Arteria poplitea . .	295
7. Arteria tibial anterior	297
8. Arteria pedis . .	298
9. Tronco tibio-peroneo	298

TERCERA SECCIÓN — Venas

CAPÍTULO PRIMERO — Venas pulmonares	303
--	-----

CAPÍTULO II. Venas aórticas	304
------------------------------------	-----

ARTÍCULO PRIMERO — Vena cava superior	304
1. Troncos venosos braquiocefálicos	305
2. Venas de miembro superior	306
3. Venas de la cabeza	308
A. Venas del encéfalo	308
B. Senos de la duramadre	308
C. Venas meningeas	310
D. Venas del diploe	311
E. Venas tegumentarias del cráneo	311
F. Anastomosis entre los senos y la red venosa extracraneal.	311
4. Venas de la cara	312
5. Venas del cuello	314
6. Venas del tórax	315
7. Venas del raquis.	317
ARTÍCULO II. — Vena cava inferior	318
1. Venas iliacas	319
2. Venas del miembro inferior	320
3. Venas de la pelvis	321
4. Venas del abdomen	323

CUARTA SECCIÓN Linfáticos

ARTÍCULO PRIMERO. — Conductos colaterales linfáticos	330
---	-----

ARTÍCULO II. — Grupos ganglionares linfáticos	331
1. Ganglio tibial	331
2. Ganglios poplíteos	331
3. Ganglios inguinales.	332

	<u>Pág.</u>
4. Ganglios de los espermios o testiculares	333
5. Ganglios de la pevis	334
6. Ganglios lumbosacrales	334
7. Ganglios del tórax	335
8. Ganglios de la cabeza	335
9. Ganglios del cuello	336
10. Ganglios supraepitrocleares	37
11. Ganglios de la axila	497

LIBRO V

NEUROLOGIA

PRIMERA SECCIÓN Sistema nervioso central

CAPITULO PRIMERO — Médula espinal	340
1. Consideraciones generales	340
2. Conformación exterior	341
3. Conformación interior	342
4. Constitución anatómica	344
A. Elementos nerviosos de la sustancia gris	344
B. Elementos nerviosos de la sustancia blanca	347
5. Fium terminal	353
6. Vasos	353
CAPITULO II — Bulbo raquídeo	355
1. Consideraciones generales	355
2. Conformación exterior	356
3. Conformación interior	358
4. Constitución anatómica y conexiones	358
5. Vasos	362
CAPITULO III. Protuberancia anular	364
CAPITULO IV. — Cerebelo	368
1. Consideraciones generales	368
2. Conformación exterior y relaciones	369
3. Modo de segmentación periférica	370
4. Conformación interior	371
5. Constitución anatómica	372
6. Conexiones del cerebelo. Pedúnculos cerebelosos	373
A. Estudio macroscópico	373
B. Estudio microscópico. Vías cerebelosas	374
7. Vasos	375
CAPITULO V. — Cuarto ventrículo	377

CAPITULO VI	Pedúnculos cerebrales, tubérculos cuadrigéminos y acueducto de Silvio	380
1	Pedúnculos cerebrales .	380
2	Tubérculos cuadrigéminos	383
3	Acueducto de Silvio	384
4	Vascularización de los pedúnculos cerebrales y de los tubérculos cuadrigéminos	385
CAPITULO VII	Cerebro	386
1	Consideraciones generales	386
2	Conformación exterior	386
	A. Hemisferios	387
	B. Formaciones interhemisféricas.	388
	C. Hendidura cerebral de Bichat	390
3	Cisuras y circunvoluciones cerebrales	390
	A. Circunvoluciones de la cara externa	390
	B. Circunvoluciones de la cara interna	396
	C. Circunvoluciones de la cara inferior	397
4	Córtex cerebral Localizaciones . . .	398
5	Conformación interior del cerebro	400
	A. Cuerpo calloso	400
	B. Trigono cerebral o bóveda de cuatro pilares	403
	C. Séptum lácidum . . .	403
	D. Ventriculos laterales	404
	E. Ventrículo medio	407
	F. Formaciones coroideas . .	408
	G. Glándula pineal o epífisis	409
	H. Núcleos centrales de los hemisferios o núcleos opo-	
	estrados	410
	I. Cápsula interna	414
	J. Centro oval	416
6	Circulación del cerebro	418
	A. Arterias	418
	B. Venas	422
	C. Vías linfáticas	425
CAPITULO VIII	Meninges	426
1.	Duramadre	426
2	Piamadre.	430
3	Araconoides	432
4	Líquido cefalorraquídeo.	433
5	Granulaciones meníngeas de Pacchioni	434

SEGUNDA SECCIÓN. — Sistema nervioso periférico

	PÁG.
CAPÍTULO PRIMERO Orígenes y terminaciones reales de los nervios	438
CAPÍTULO II Nervios craneales	440
1. Primer par: nervio olfatorio	440
2. Segundo par: nervio óptico	443
3. Tercer par: nervio motor ocular común	446
4. Cuarto par: nervio patético	448
5. Quinto par: nervio trigémino	450
A. Nervio oftálmico y ganglio oftálmico	452
B. Nervio maxilar superior y ganglio esfenopalatino	454
C. Nervio maxilar inferior y ganglio ótico	455
6. Sexto par: nervio motor ocular externo	457
7. Séptimo par: nervio facial	458
8. Octavo par: nervio auditivo	462
9. Noveno par: nervio glosofaríngeo	465
10. Décimo par: nervio neumogástrico	467
11. Undécimo par: nervio espinal	470
12. Duodécimo par: nervio hipogloso mayor	471
CAPÍTULO III Nervios raquídeos	474
SECCIÓN PRIMERA <i>Ramas posteriores de los nervios raquídeos</i>	476
SECCIÓN SEGUNDA — <i>Ramas anteriores de los nervios raquídeos</i>	478
ARTÍCULO PRIMERO <i>Plexo cervical</i>	478
ARTÍCULO II <i>Plexo braquial</i>	480
1. Ramas colaterales	481
2. Ramas terminales	482
ARTÍCULO III <i>Nervios intercostales</i>	488
ARTÍCULO IV. — <i>Plexo lumbar</i>	488
1. Ramas colaterales	489
2. Ramas terminales	490
ARTÍCULO V. <i>Plexo sacro</i>	492
1. Ramas colaterales	493
2. Rama terminal: nervio cóccigeo mayor	494
ARTÍCULO VI — <i>Plexo sacrococcigeo</i>	498
CAPÍTULO IV Sistema nervioso vegetativo	499
1. Constitución general	499
2. Territorios del simpático y del parasimpático	500
3. Simpático propiamente dicho	500

SECCIÓN PRIMERA — <i>Sistema organovegetativo cervical</i>	501
1. Tronco y ganglios	501
2. Ramas colaterales	502
SECCIÓN SEGUNDA. — <i>Sistema organovegetativo torácico</i>	504
SECCIÓN TERCERA. — <i>Sistema organovegetativo lumbar</i>	505
SECCIÓN CUARTA. — <i>Sistema organovegetativo sacro</i>	506

LIBRO VI

ORGANOS DE LOS SENTIDOS

CAPITULO PRIMERO — <i>Sentido del tacto (Piel y sus anexos)</i>	507
1. Conformación exterior	507
2. Anexos de la piel	509
3. Vasos y nervios de la piel	513
CAPITULO II — <i>Sentido del gusto (Lengua)</i>	515
1. Conformación exterior	515
2. Constitución anatómica	516
A. Esqueleto osteofibroso	516
B. Músculos de la lengua	517
C. Mucosa lingual	520
3. Vasos y nervios	522
CAPITULO III — <i>Sentido del olfato (Fosas nasales y pituitaria).</i>	524
1. Nariz	524
2. Fosas nasales y pituitaria	526
A. Aberturas nasales. . . .	526
B. Fosas nasales propiamente dichas, pituitaria	527
C. Cavidad posterior de las fosas nasales	530
CAPITULO IV — <i>Sentido de la vista (Ojo y sus anexos)</i>	531
ARTICULO PRIMERO. — <i>Ojo o globo ocular.</i>	531
Túnica fibrosa del ojo	532
A. Esclerótica	532
B. Córnea	534
2. Túnica vascular del ojo	536
A. Coroides propiamente dicha	536
B. Zona ciliar	537
C. Iris	538

	Págs.
3. Túnica nerviosa del ojo	540
A. Retina propiamente dicha	540
B. Porción ciliar de la retina	541
C. Porción iridiana de la retina	542
4. Cristalino	542
5. Cuerpo vítreo	543
6. Cámaras del ojo, humor acuoso	546
ARTÍCULO II. — <i>Anexos del ojo</i>	547
1. Músculos de la órbita	547
2. Cejas	551
3. Párpados	552
4. Conjuntiva	554
5. Aparato lagrimal	558
A. Glándula lagrimal	558
B. Vías lagrimales	559
CAPÍTULO V — Sentido del oído (Oído)	562
ARTÍCULO PRIMERO — <i>Oído externo</i>	562
1. Pabellón del oído	562
2. Conducto auditivo externo	565
ARTÍCULO II — <i>Oído medio</i>	567
1. Caja del timpano o del tambor	568
2. Cadena de los huesillos del oído	571
3. Revestimiento mucoso de la caja	574
4. Vasos y nervios de la caja	575
5. Cavidades mastoideas	575
6. Trompa de Eustaquio	576
ARTÍCULO III — <i>Oído interno</i>	579
1. Laberinto óseo	579
2. Laberinto membranoso	584
3. Líquidos del oído interno	587
4. Vasos y nervios del oído interno	587

LIBRO VII

APARATO DE LA DIGESTION

CAPÍTULO PRIMERO — <i>Tubo digestivo</i>	592
ARTÍCULO PRIMERO. — <i>Boca y sus dependencias</i>	592
1. Paredes de la boca	593
2. Encías	596
3. Dientes	598
ARTÍCULO II. — <i>Faringe</i>	602

	Página
ARTÍCULO III — <i>Esófago</i>	606
ARTÍCULO IV — <i>Peritoneo</i>	606
1. Definiciones	609
2. Topografía del peritoneo	610
ARTÍCULO V — <i>Estómago</i>	612
ARTÍCULO VI — <i>Intestino delgado</i>	617
ARTÍCULO VII — <i>Intestino grueso</i>	622
1. Intestino grueso en general	622
2. Ciego	625
3. Colon	626
4. Recto	628
ARTÍCULO VIII — <i>Ano</i>	632
CAPÍTULO II — <i>Anexos del tubo digestivo</i>	634
ARTÍCULO PRIMERO — <i>Glándulas salivales</i>	634
1. Glándula parótida	634
2. Glándula submaxilar	637
3. Glándula sublingual	639
ARTÍCULO II — <i>Hígado</i>	640
ARTÍCULO III — <i>Páncreas</i>	650

LIBRO VIII

APARATO DE LA RESPIRACION Y DE LA FONACION

ARTÍCULO PRIMERO — <i>Laringe</i>	655
ARTÍCULO II — <i>Conducto traqueobronquial</i>	662
1. Traquearteria	662
2. Bronquios	665
ARTÍCULO III — <i>Pulmones</i>	666
ARTÍCULO IV — <i>Pleuras</i>	672

LIBRO IX

APARATO UROGENITAL

CAPÍTULO PRIMERO — <i>Organos urinarios</i>	677
ARTÍCULO PRIMERO — <i>Riñones</i>	677
ARTÍCULO II — <i>Conducto excretorio del riñón</i>	683

	Págs.
ARTÍCULO III — <i>Vejiga</i>	691
ARTÍCULO IV — <i>Uretra</i>	691
1. La uretra en el hombre	691
2. La uretra en la mujer	697
CAPITULO II — Organos genitales del hombre	699
ARTÍCULO PRIMERO. — <i>Testículos</i>	699
ARTÍCULO II — <i>Cubiertas del testículo o bolsas</i>	704
ARTÍCULO III — <i>Vías espermáticas</i>	706
1. Conducto deferente	706
2. Vesículas seminales	708
3. Conducto eyaculador	709
ARTÍCULO IV. — <i>Pene</i>	710
ARTÍCULO V — <i>Glándulas anexas al aparato genital del hombre</i>	714
1. Próstata	714
2. Glándulas de Cowper	716
ARTÍCULO VI — <i>Músculos y aponeurosis del perineo en el hombre</i>	717
1. <i>Músculos del perineo</i>	717
2. <i>Aponeurosis del perineo</i>	720
CAPITULO III — Organos genitales de la mujer	723
ARTÍCULO PRIMERO. — <i>Ovarios</i>	723
ARTÍCULO II — <i>Trompas uterinas u oviductos</i>	726
ARTÍCULO III — <i>Utero</i>	728
ARTÍCULO IV — <i>Vagina</i>	735
ARTÍCULO V — <i>Vulva</i>	738
1. Formaciones labiales o labios de la vulva	738
2. Espacio interlabial	741
3. Organos eréctiles	742
ARTÍCULO VI — <i>Glándulas anexas al aparato genital de la mujer</i>	744
1. Glándulas uretrales y periuretrales	744
2. Glándulas vulvovaginales	744
ARTÍCULO VII — <i>Músculos y aponeurosis del perineo en la mujer</i>	745
1. <i>Músculos del perineo</i>	745
2. <i>Aponeurosis del perineo</i>	745
CAPITULO IV — Mamas	747
1. La mama en la mujer	747
2. La mama en el hombre	752

LIBRO V

GLANDULAS DE SECRECION INTERNA

	<u>Págs.</u>
1. Cuerpo tiroides	753
2. Paratiroides	756
3. Timo	757
4. Hipófisis	758
A. Hipófisis cerebral	758
B. Hipófisis faringea	760
5. Bazo	760
6. Cápsulas suprarrenales	763
7. Organos paraganglionares	765
8. Otras glándulas de secrecion interna	766

LIBRO I

OSTEOLOGIA

La osteología se ocupa del estudio de los huesos, órganos blancucinos, duros y resistentes, cuyo conjunto constituye el *esqueleto*. Situados en medio de las partes blandas, sirven a éstas de apoyo y aun a veces presentan cavidades mas o menos profundas, para alojarlas y protegerlas.

El esqueleto humano se compone esencialmente de una larga columna, la *columna vertebral*, colocada verticalmente en la línea media. Esta columna en su extremidad superior, sostiene el *cráneo*. Su extremidad inferior se atenúa y se afila para formar el *sacro* y el *cóccix*, rudimento de la cola de los animales. De a parte media de la columna precitada se desprenden lateralmente una serie regular de arcos óseos, las *costillas*, que vienen a articularse en la parte anterior en otra columna, la *columna esternebral* o *esternon*. Las costillas, junto con las dos columnas vertebral y esternebral, circunscriben un vasto espacio abierto por ambos extremos, el *tórax*. Por ultimo, en la parte superior del tórax, de una parte, y en la parte inferior de la columna vertebral, de otra, se hallan implantados simétricamente a cada lado los dos pares de *miembros*: los miembros superiores o *torácicos* y los miembros inferiores o *pélvicos*.

En cuatro capítulos distintos estudiaremos sucesivamente: 1.º, la *columna vertebral*; 2.º, el *cráneo*; 3.º, el *tórax*, 4.º, los *miembros*.

CAPITULO PRIMERO

COLUMNA VERTEBRAL

La columna vertebral (columna raquídea, raquis) se divide en cuatro porciones, que son, de arriba abajo, la *porción cervical*, la *porción dorsal*, la *porción lumbar* y la *porción pélvica*. Está esencialmente constituida por elementos óseos, discoideos y regularmente superpuestos, las *vértebras*. En el hombre se cuentan 33 ó 34 vértebras distribuidas del modo siguiente: 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 9 ó 10 pélvicas. Mientras que las vértebras cervicales, dorsales y lumbares son independientes, las pélvicas se sueldan a no tardar, formando tan sólo dos piezas distintas, el *sacro* y el *cóccix*. Ante todo describiremos las *vertebras libres*, es decir, las vértebras de las tres primeras porciones; estudiaremos luego el *sacrocóccix* y, por último, examinaremos la *columna vertebral en conjunto*.

ARTÍCULO PRIMERO

VERTEBRAS LIBRES

(CERVICALES, DORSALES Y LUMBARES)

En estas vértebras descubrimos tres especies de caracteres: 1.º, *caracteres generales*, que permiten distinguirlas de las diferentes piezas del esqueleto; 2.º, *caracteres particulares*, que permiten distinguirlas de las vértebras de las regiones próximas; 3.º, *caracteres individuales*, que en una misma región sirven para distinguir algunas de ellas de las demás.

I. CARACTERES COMUNES A TODAS LAS VÉRTEBRAS

Todas las vértebras tienen. 1.º, un *cuerpo*, 2.º, un *agujero*; 3.º, una *apófisis espinosa*; 4.º, dos *apófisis transversas*; 5.º, cuatro *apófisis articulares*; 6.º, dos *láminas*, 7.º, dos *pedículos*.

1.º **Cuerpo.** — El cuerpo ocupa la parte anterior y tiene la forma de un cilindro con dos caras y una circunferencia. De las dos caras, una es superior y la otra inferior. Son planas y horizontales. Una y otra presentan en su centro una superficie acribillada de agujeritos circunscrita por una zona anular ligeramente prominente y formada de tejido compacto. La *circunferencia*, cóncava en sentido vertical por delante y por los lados, presenta un canal horizontal, dirigido de uno al otro lado. Por detrás es plana o hasta excavada en sentido transversal, para constituir la pared anterior del agujero vertebral. En su parte media se ven numerosos orificios destinados a conductos venosos, que proceden del cuerpo vertebral.

2.º **Agujero vertebral.** — Está comprendido entre la cara posterior del cuerpo vertebral y la apófisis espinosa. Tiene la forma de un triángulo de ángulos más o menos redondeados.

3.º **Apófisis espinosa.** — Impar y media, se dirige hacia atrás bajo la forma de una larga espina, de la cual recibe el nombre. Se distinguen en ella la *base*, que la une a la vértebra; el *vértice*, a veces ligeramente desviado a derecha o a izquierda; dos *caras laterales*, izquierda y derecha, en relación con los músculos espinales; un *borde superior*, más o menos cortante; un *borde inferior*, generalmente más grueso que el precedente y también mucho más corto.

4.º **Apófisis transversas.** — En número de dos, una derecha y otra izquierda, se dirigen transversalmente hacia fuera, y de ahí el nombre que llevan. En cada una de ellas hemos de considerar: la *base* que la une a la vértebra; el *vértice*, que es libre; dos *caras*, anterior y posterior, y dos *bordes*, superior e inferior.

5.º **Apófisis articulares.** — Son dos eminencias destinadas a la articulación de las vértebras entre sí. Son en número de cuatro, dos *ascendentes* y dos *descendentes*. Colocadas simétricamente a cada lado del agujero vertebral, unas y otras sobresalen hacia arriba o hacia abajo del nivel del arco óseo que limita este orificio.

6° Láminas vertebrales. — En número de dos: derecha e izquierda. Aplanadas y cuadriláteras, forman la mayor parte de la pared posterolateral del agujero raquídeo. Hemos de distinguir en cada una de ellas, la *cara anterior*, que mira a la médula; la *cara posterior*, cubierta por los músculos espinales; dos *bordes*, superior e inferior, la *extremidad interna*, que se confunde con la base de la apófisis espinosa, y la *extremidad externa*, que se suelda, ya con la apófisis transversa, ya con las apófisis articulares. Anotemos que las láminas vertebrales no son verticales, sino ligeramente oblicuas hacia abajo y atrás.

7° Pedículos. — Han recibido este nombre las dos porciones óseas, delgadas y estrechas que, a uno y a otro lado, unen la base de la apófisis transversa y las dos apófisis articulares correspondientes a la parte posterior y lateral del cuerpo vertebral. Es de notar que los pedículos son menos altos en su parte media que en sus dos extremidades, resultando de ello que sus bordes superior e inferior no son rectilíneos, sino curvos. Cada pedículo presenta, por lo tanto, dos *escotaduras*, una superior y otra inferior. Estas escotaduras, superponiéndose regularmente con las de las vértebras vecinas, forman a cada lado de la columna vertebral una serie de agujeros, llamados *agujeros de conjunción*, por los que salen los nervios raquídeos.

2. CARACTERES PECULIARES DE LAS VÉRTEBRAS DE CADA REGIÓN

Las vértebras cervicales, las dorsales y las lumbares se distinguen, respectivamente, por los caracteres siguientes:

1° Vértebras cervicales. — El *cuerpo*, alargado transversalmente, presenta como caracteres distintivos: 1.º, por delante, en la línea media, una pequeña prominencia vertical. 2.º, en las dos extremidades laterales de su cara superior, dos pequeñas eminencias, *ganchos* o *apófisis semilunares*; 3.º, en los dos extremos laterales de su cara inferior, dos pequeñas escotaduras que, en el esqueleto armado, están en relación con los ganchos de la vértebra subyacente. El *agujero* es triangular, de base anterior. La *apófisis espinosa* es corta, poco inclinada, tiene un canal en su borde inferior y está bifurcada en su vértice (*bituberculosa*). Las *apófisis transversas* están implantadas a cada lado del cuerpo. Tienen labrado un canal en su cara superior, son

bituberculosas en su vértice y en su base existe un agujero, llamado *agujero transverso*. Las *apófisis articulares* están en cada lado colocadas exactamente una encima de la otra. Sus carillas miran hacia atrás y arriba en las apófisis superiores, hacia delante y abajo en las apófisis inferiores. Las *laminas* son cuadriláteras, más anchas que altas y dirigidas oblicuamente hacia abajo y atrás. Los *pedículos* se implantan en el cuerpo vertebral en un punto algo menos distante de su cara superior que de la inferior. Las dos *escotaduras* no son exactamente iguales: la inferior es algo más profunda que la superior.

2.º **Vértebras dorsales.**—El *cuerpo vertebral* presenta en cada lado y cerca de la extremidad anterior del pedículo dos semicarillas articulares, superior e inferior, para la cabeza de las costillas. El *agujero raquídeo* es relativamente pequeño e irregularmente circular. La *apófisis espinosa* es muy larga, prismática, triangular y fuertemente inclinada hacia atrás. Las *apófisis transversas* nacen por detrás del pedículo. Su vértice es más o menos redondeado, y en su cara anterior se ve una pequeña *carilla articular* para la tuberosidad de la costilla correspondiente. Las *apófisis articulares superiores*, muy marcadas, se dirigen verticalmente por encima de la base de las apófisis transversas; sus carillas miran hacia atrás y un poco hacia fuera. Las *inferiores*, por decirlo así, no existen, puesto que quedan reducidas a simples carillas articulares situadas en la cara anterior de las láminas; miran hacia delante y un poco hacia dentro. Las *laminas* son cuadriláteras, tan altas como anchas. Los *pedículos* unen el cuerpo vertebral a las apófisis transversas y a las articulares. De las dos *escotaduras*, la inferior es mucho más profunda que la superior.

3.º **Vértebras lumbares.**—El *cuerpo* es bastante voluminoso. El diámetro transverso es mayor que el diámetro anteroposterior. El *agujero* es triangular: los tres lados son, a corta diferencia, iguales. La *apófisis espinosa*, de forma cuadrilátera, está muy desarrollada y es horizontal. Las *apófisis transversas*, mejor llamadas *apófisis costiformes*, están relativamente poco desarrolladas. Se desprenden de la parte media del pedículo. Las *apófisis articulares* tienen una dirección vertical. Las carillas articulares tienen: 1.º, las superiores, la forma de canales verticales, mirando hacia atrás y adentro; 2.º, las inferiores, la forma de eminencias verticales, representando porciones de un cuerpo cilindroide y mirando hacia delante y afuera. En la

parte posteroexterna de las apófisis articulares superiores se ve un tubérculo más o menos desarrollado, el *tubérculo mamilar*. Las *láminas* son cuadriláteras, más altas que anchas. Los *pedículos* tienen una dirección anteroposterior. Las *escotaduras* son muy desiguales: las inferiores son tres o cuatro veces más considerables que las superiores.

4.º Resumen.—Como se ve, cada elemento de la vértebra trae consigo un carácter morfológico que permite reconocer a región a que pertenece la vértebra. En la práctica ordinaria se clasifica una vértebra del modo siguiente: se examina la base de sus apófisis transversas: *si tiene agujero*, la vértebra es cervical; *si no lo tiene*, la vértebra es dorsal o lumbar. Examínese entonces la parte lateral del cuerpo: *si existen carillas articulares*, la vértebra es dorsal; *si no hay tales carillas*, es una vértebra lumbar.

3 CARACTERES PROPIOS DE CIERTAS VÉRTEBRAS

Algunas vértebras presentan una configuración especial, individual, y merecen descripción aparte.

1.º Primera cervical o atlas.—El atlas está sencillamente constituido por dos *masas laterales*, unidas entre sí por un *arco anterior* y otro *posterior*.

a) *Masas laterales.*—Tienen la forma de un segmento de cilindro colocado verticalmente. La *cara superior* presenta una carilla articular de forma elipsoide: es la *cavidad glenoidea* del atlas. Su eje mayor, oblicuo hacia delante y adentro, es dos veces más largo que su diámetro transversal. Se articula con el cóndilo del occipital. La *cara inferior* tiene una segunda carilla articular para el axis. Esta es plana o muy ligeramente cóncava, mirando oblicuamente hacia abajo y adentro. De la *cara externa* nacen las apófisis transversas. La *cara anterior* y la *cara posterior* se continúan cada una con la extremidad del arco correspondiente. La *cara interna* es muy rugosa. Presta inserción al ligamento transversal.

b) *Arco anterior.*—Aplanado de delante atrás, presenta: 1.º, en la parte anterior, una pequeña eminencia central, el *tubérculo anterior del atlas*; 2.º, en la parte posterior, y siempre en la línea media, una carilla articular, oval, de eje mayor transversal, destinada a articularse con la apófisis odontoides del axis.

c) *Arco posterior*. — Presenta, como el arco anterior, en la línea media y parte posterior, una eminencia mamelonada llamada *tubérculo posterior del atlas*. En la cara superior de su extremidad externa se ve un canal, en el que se aloja la arteria vertebral.

d) *Significación morfológica del atlas*. — El atlas es una vértebra incompleta, en efecto, no tiene verdadero *cuerpo vertebral* (está representado por la apófisis odontoides del axis). Los elementos restantes están más o menos reducidos o más o menos transformados: la *apófisis espinosa* está representada por el tubérculo posterior; las *apófisis articulares*, por las cavidades glenoides, por una parte, y por otra, por las carillas planas situadas en la cara inferior de las masas laterales; las *laminas*, por el arco posterior; los *pedículos*, por las partes laterales de este arco, en donde se ve el canal de la arteria vertebral.

2.º *Segunda cervical o axis*. — Lo que esencialmente caracteriza al axis es la presencia en la cara superior de su cuerpo, de una eminencia vertical, la *apófisis odontoides* o *diente del axis*. En esta apófisis hemos de distinguir, examinándola de abajo arriba: la *base*, el *cuello*, el *cuerpo* y el *vértice*. En sus caras anterior y posterior se ven dos *carillas articulares*: la anterior, para el arco anterior del atlas; la posterior, para el ligamento transversal. La apófisis espinosa es muy ancha: las apófisis transversas son cortas y su vértice no está bifurcado.

3.º *Sexta cervical*. Se caracteriza por el especial desarrollo del tubérculo anterior de su apófisis transversa que, por razón de su importancia en medicina operatoria ha recibido el nombre de *tubérculo carotideo* o *tubérculo de Chassaignac*.

4.º *Séptima cervical*. — Vértebra de transición, recuerda todavía las vertebrae precedentes, aunque aproximándose ya a las que la siguen. Dos caracteres particulares. 1.º *apófisis espinosa unituberculosa*, es de notable longitud (por esto se ha dado el nombre de *prominente* a la séptima vértebra cervical). 2.º, *apófisis transversas*, igualmente unituberculosas, con un agujero transversal relativamente pequeño (nunca pasa por él la arteria vertebral).

5.º *Primera dorsal*. Es también una vértebra de transición. Se distinguirá fácilmente por la presencia, en cada cara lateral del cuerpo, de los siguientes caracteres: 1.º, por arriba, una *carilla completa*, para la primera costilla; 2.º, por abajo, un *cuarto de carilla únicamente*, para la segunda costilla.

6° **Décima dorsal.**—Su carácter distintivo es la existencia de una *sola semicarilla*, situada en la parte superior del cuerpo, para la décima costilla.

7° **Undécima y duodécima dorsales.**—Se aproximan a las vértebras lumbares. Están caracterizadas: 1°, por la ausencia de carillas articulares en las apófisis transversas; 2°, por la presencia de una carilla única a cada lado del cuerpo, para las costillas undécima y duodécima. Por otra parte, se distingue la duodécima de la undécima en que las apófisis articulares inferiores de esta última, conformadas en este punto como las de las vértebras lumbares, son convexas y miran hacia fuera al paso que las de las vértebras dorsales son planas y miran hacia delante.

8° **Quinta lumbar.**—Dos caracteres distintivos: 1°, la *altura del cuerpo vertebral*, por efecto de la oblicuidad de su cara inferior, es mayor en la parte anterior que en la posterior; 2°, las *apófisis articulares inferiores* vuelven a ser planas, y además están más separadas la una de la otra que las apófisis articulares inferiores de las vértebras situadas encima.

ARTÍCULO II

VERTEBRAS SACRAS Y COCCIGEAS

En número de nueve o diez, se sueldan más o menos entre sí, en el adulto, para formar sólo dos huesos: 1°, el *sacro*, que comprende las cinco primeras; 2°, el *cóccix*, que comprende las cuatro o cinco últimas.

1. SACRO

Aplanado de delante atrás, mucho más voluminoso por arriba que por abajo, más ancho en la mujer que en el hombre, el sacro reviste la forma de una pirámide cuadrangular. Se dirige oblicuamente de arriba abajo y de delante atrás, formando con la última vértebra lumbar el *ángulo sacrovertebral* o *promontorio*. Su eje longitudinal no es rectilíneo, sino fuertemente curvo, de concavidad dirigida hacia delante. Se consideran en él: 1°, la *base*; 2°, el *vértice*; 3°, cuatro *caras* (anterior, posterior y laterales). Comencemos por las caras.

1.º **Cara anterior.** Cóncava a la vez en sentido vertical y en sentido transversal. Presenta, en la línea media, una columna ósea formada por la superposición de los cuerpos de las *cinco vértebras sacras*. En intervalos regulares está segmentada por líneas transversales, indicios de la soldadura de estas diferentes vértebras. En la extremidad de estas líneas transversales se ven unos agujeros denominados *agujeros sacros anteriores* (cuatro a cada lado), por fuera de estos agujeros se observan unos canales de dirección transversal.

2.º **Cara posterior.** Es fuertemente convexa y erizada de asperezas en toda su extensión. En la línea media se ve una cresta saliente, la *cresta sacra*. A cada lado de esta cresta encontramos sucesivamente 1.º un canal longitudinal, *canal sacro*, 2.º, una primera serie de tubérculos, en número de cinco, *tubérculos sacros posterointernos* (homólogos de las apófisis articulares); 3.º, una serie de agujeros (cuatro a cada lado), los *agujeros sacros posteriores*; 4.º, una nueva serie de tubérculos, los *tubérculos sacros posterexternos* (homólogos de las apófisis transversas)

3.º **Caras laterales.** — Anchas en su parte superior, se adelgazan a medida que descienden y acaban por degenerar en simples bordes. En su parte más superior presentan la *carilla auricular del sacro*, que se articula con una carilla análoga del hueso ilíaco; tiene forma de escuadra de concavidad dirigida arriba y atrás. Por detrás de esta carilla se halla una depresión circular, la *fosa cribosa del sacro*, en cuyo fondo se encuentran numerosos agujeros vasculares. Por delante, la carilla está a menudo limitada por un surco, el *surco preauricular del sacro* (sirve para la inserción del ligamento sacroilíaco anterior)

4.º **Base.** — Mira hacia delante y arriba.

a) *En la línea media*, y procediendo de delante atrás, se ven: 1.º, una carilla articular plana, oval, cuyo eje mayor es transversal, destinado a a quinta lumbar; 2.º, el orificio superior del conducto sacro; 3.º, el principio de la cresta sacra.

b) *A cada lado de la línea media* encontramos sucesivamente: 1.º, una superficie triangular, de base externa, que forma parte de la pelvis, es la *aleta del sacro*, 2.º, dos eminencias verticales, *apófisis articulares del sacro*, que se articulan con las apófisis articulares

inferiores de la última lumbar; 3.º, por delante de estas últimas, dos escotaduras, las *escotaduras del sacro* que contribuyen a formar el vigesimoquinto agujero de conjunción.

5.º **Vértice.** — Por delante tiene una pequeña cara elíptica cuyo diámetro mayor es transversal, para la base del cóccix, por detrás, el orificio inferior del conducto sacro. Este tiene la forma de una V invertida (Λ) y se halla limitado lateralmente por dos pequeñas eminencias descendentes. Llamadas *astas o cuernos del sacro*.

6.º **Conducto sacro.** — Recorre el sacro en toda su longitud un conducto llamado *conducto sacro*. Es continuación del *conducto raquídeo* y hacia arriba es triangular; luego se aplanan de delante atrás y se transforma, finalmente, en un simple canal. De cada lado parten cuatro conductos transversales (homólogos de los agujeros de conjunción), simples en su origen, pero pronto bifurcados para desembocar a la vez en los agujeros sacros anteriores y en los agujeros sacros posteriores.

El conducto sacro tiene la forma de un triángulo de base inferior, cuya altura es de 15 milímetros y su anchura de 11 milímetros. Presenta numerosas variaciones que dependen de los procesos de soldadura de las vértebras sacras. Su orificio inferior se designa con el nombre de *hiato sacro*.

2. Cóccix

El cóccix es un hueso impar que ocupa la línea media y está formado por cuatro o cinco vértebras rudimentarias. Aplanado de delante atrás, de forma triangular, presenta dos *caras*, una *base*, un *vértice* y dos *bordes*.

1.º **Caras.** — La anterior es cóncava; la posterior, convexa. En una y otra se ven tres o cuatro líneas transversales, vestigios de soldadura de las vértebras cóccigeas.

2.º **Base.** — La base, situada en la parte superior, presenta una carilla elíptica, cuyo diámetro mayor es transversal, destinada al sacro. Por detrás de esta carilla se levantan dos pequeñas columnas de dirección vertical, las *astas del cóccix*.

3.º **Vértice.** El vértice está formado por un tubérculo óseo que la mayoría de las veces se halla desviado hacia la derecha o hacia a izquierda.

4.º **Bordes.**— Los dos bordes, oblicuos y sinuosos, prestan inserción al ligamento sacroiliaco mayor y al músculo isquiococcigeo.

ARTÍCULO III

COLUMNA VERTEBRAL, CONSIDERADA EN SU CONJUNTO

1.º **Dimensiones.**— Su *longitud* es de 73 a 75 centímetros, de los cuales 13 ó 14 corresponden a la porción cervical, de 27 a 29, a la porción dorsal, 17 ó 18, a la lumbar, y de 12 a 15, a la sacrococcigea. Su *anchura* es de 10 a 12 centímetros a nivel de la base del sacro (es el punto más ancho), 7 u 8 centímetros en la última lumbar; de 5 a 9 centímetros en la última dorsal y 5 ó 6 centímetros a nivel del atlas. Su *grosor* es de 4 centímetros en la región cervical, 6 centímetros en la dorsal y 7 centímetros a nivel del sacro o de la última lumbar.

2.º **Dirección.**— La columna vertebral presenta numerosas inflexiones o curvaturas. Distinguimos *dos órdenes*: anteroposteriores y laterales.

a) Las *curvaturas anteroposteriores* son en número de cuatro: una curvatura cervical cóncava hacia atrás; una curvatura dorsal, cóncava hacia delante; una curvatura lumbar, cóncava hacia atrás; una curvatura sacrococcigea, cóncava hacia delante. De estas cuatro curvaturas, la dorsal es la original; las otras tres son secundarias o de compensación.

β) Las *curvaturas laterales*, mucho menos pronunciadas y aun con frecuencia poco visibles, son en extremo variables. El tipo más frecuente es éste: una *curvatura cervical* de convexidad izquierda, una *curvatura dorsal* de convexidad derecha y una *curvatura lumbar* de convexidad izquierda. Estas curvaturas son debidas a la acción muscular que, por predominar en la derecha, lleva a la columna dorsal hacia este lado; las demás (cervical y lumbar) son de compensación.

3.º **Configuración exterior e interior.**— Considerada en su conjunto, la columna vertebral parece constituida por dos pirámides

unidas por sus bases a nivel de la articulación sacrolumbar. Hemos de considerar en ella *cuatro caras y un conducto central*.

α) La *cara anterior* tiene la forma de un tronco cilíndrico (aplanado, sin embargo, a nivel del sacrocóccix), que constituye el conjunto de los cuerpos vertebrales.

β) La *cara posterior* presenta, en la línea media, la *cresta espinosa* (*cresta sacra*, a nivel del sacro), y a cada lado de ésta, los *canales vertebrales* (*canales sacros*, a nivel del sacro), formados: por dentro, por las caras laterales de las apófisis espinosas; por fuera, por las apófisis articulares y la cara posterior de las apófisis transversas, y en su parte media, por las láminas vertebrales imbricadas de arriba abajo.

γ) En las *caras laterales* vemos sucesivamente: los vértices de las apófisis transversas; la cara lateral de los cuerpos vertebrales; la serie de los pedículos y, entre ellos, la serie de los agujeros de conjunción (representados a nivel del sacro por los agujeros sacros anteriores y posteriores). En el flanco izquierdo, entre la 3.^a y la 6.^a dorsales se observa la *huella aórtica*, correspondiente a la aorta descendente.

δ) El *conducto vertebral*, formado por la suma de todos los agujeros vertebrales, ocupa toda la altura de la columna. Prismático triangular en la región cervical, es cilíndrico en la región dorsal y otra vez prismático triangular en las demás regiones. Sus dimensiones están en relación, no con su contenido, sino con el grado de movilidad de la región en que se estudia: muy considerable en el cuello y región lumbar (donde la columna vertebral es *muy movable*), se estrecha en la región dorsal (donde las vértebras *casi no se mueven*) y su estrechez resulta aún mayor en la región pelviana (donde las vértebras sacras son *absolutamente inmóviles*).

La arquitectura de la columna vertebral demuestra que cada vértebra comprende dos partes: una *pasiva*, el *cuerpo*; la otra *activa*, las *apófisis*.

Al cuerpo le corresponde el papel de sostén. Las apófisis representan palancas de mando accionadas por los músculos: la *apófisis espinosa*, para los *movimientos de descenso*; las *apófisis transversas*, para los *movimientos horizontales de rotación e inclinación*. En cuanto a las apófisis articulares, son los puntos de apoyo alrededor de los cuales se efectúan los movimientos; de aquí que sean muy robustas.

CAPITULO II

ESTERNON Y COSTILLAS, TORAX

Las vértebras dorsales están prolongadas lateralmente por unos arcos óseos, llamados *costillas*, los cuales por delante se implantan en las partes laterales de una segunda columna ósea, el *esternón*. Las costillas y el esternón, de concierto con las vértebras dorsales, constituyen el *tórax*.

1. ESTERNÓN

Impar y medio, el esternón es un hueso plano situado en la parte anterior del tórax. Se le compara con una espada, y de ahí su división en *puño*, *cuerpo* y *punta* (o *apéndice xifoides*). Mide de 15 a 20 centímetros de longitud, por 5 ó 6 de anchura. Presenta dos caras (anterior y posterior), dos extremidades (superior e inferior) y dos bordes laterales.

1.º Cara anterior.—Casi plana transversalmente, es más o menos convexa en sentido vertical. Nótese en ella una serie de líneas transversales que van del uno al otro borde, vestigios de la soldadura de las diferentes piezas (*esternobras*) que entran en la constitución primitiva del esternón. Presta inserción al manojero esternal del esternocleidomastoideo y a los fascículos medios del pectoral mayor. En la parte inferior correspondiente a esta cara, inmediatamente por encima del apéndice xifoides, existe una depresión más o menos marcada, la *fosa supraxifoides*.

2.º Cara posterior.—Más o menos cóncava, presenta, como la precedente, una serie de líneas transversales que tienen la misma significación. Está en relación con las vísceras torácicas (pulmones, pericardio, corazón).

3.º **Extremidad superior.** — Es la parte más gruesa del hueso. Se distinguen en ella: 1.º, en la línea media, una escotadura conocida con el nombre de *horquilla del esternón*; 2.º, a cada lado de la horquilla, dos carillas articulares, para la clavícula; son cóncavas en sentido transversa, y ligeramente convexas en sentido anteroposterior.

4.º **Extremidad inferior.** — Está constituida por el *apéndice xifoides*. Este apéndice, muy variable, es, según los casos, triangular, oval rectangular, bifido, incurvado hacia delante o hacia atrás, más o menos desviado a la izquierda o a la derecha, etc. Frecuentemente tiene un agujero, el *agujero xifoideo*.

5.º **Bordes laterales.** — Se distinguen en derecho e izquierdo. Torcidos en *S idálica*, presentan en toda su altura dos series de escotaduras que alternan con regularidad: 1.º, escotaduras articulares (en número de siete), destinadas a las siete primeras costillas, y se llaman *escotaduras costales*; 2.º, escotaduras no articulares (en número de seis), situadas entre las precedentes, que corresponden a la extremidad anterior de los espacios intercostales y se llaman *escotaduras intercostales*.

2. COSTILLAS Y CARTÍLAGOS COSTALES

Las costillas son huesos planos, dispuestos en forma de arco entre la columna vertebral y el esternón. Son veinticuatro, doce por cada lado. Se designan por *primera, segunda, tercera, etc.*, contadas de arriba abajo. Las siete primeras se articulan con el esternón y se llaman *externales* o *costillas verdaderas*. Las cinco últimas, sin relación directa con el esternón, se llaman *costillas asternales* o *falsas*; las dos últimas falsas, libres en toda su extensión, llámase *costillas flotantes*. Cada costilla se compone de dos porciones: 1.ª, porción posterior u ósea, que es la *costilla ósea* o *costilla propiamente dicha*; 2.ª, porción anterior, cartilaginosa, que es la *costilla cartilaginosa* o *cartílago costal*.

1.º **Costilla ósea (costilla propiamente dicha).** — Las costillas ofrecen *caracteres generales* comunes a todas ellas, y algunas tienen *caracteres particulares* que les son propios.

A. **CARACTERES GENERALES DE LAS COSTILLAS.** — Las costillas se implantan oblicuamente en la columna vertebral, formando con este

tronco óseo un ángulo abierto hacia abajo. Consideradas desde el punto de vista de su dirección, describen en su conjunto una curva irregular, cuya concavidad mira hacia dentro: presentan dos ángulos (un ángulo posterior y otro anterior) y dos curvaturas (*curvatura de enrollamiento* o *curvatura sobre el plano*, y *curvatura de torsión* o *curvatura sobre los bordes*). Para su descripción, en cada costilla hemos de considerar las tres partes siguientes: cuerpo, extremidad posterior y extremidad anterior.

a) *Cuerpo* — Presenta: una *cara externa*, convexa, en la cual se ven los dos ángulos (anterior y posterior); una *cara interna*, cóncava, que corresponde a la pleura; un *borde superior*, obtuso; un *borde inferior*, que tiene en sus dos tercios posteriores un canal, el *canal costal*, para los nervios y vasos intercostales.

b) *Extremidad posterior*. — Comprende toda la porción del arco costal colocado por delante de la apófisis transversa. Se distinguen en ella tres partes: 1.º, la *cabeza* (es la parte más interna), que tiene dos pequeñas carillas articulares para las dos vértebras vecinas; 2.º, una *tuberosidad* (es la parte más externa), que tiene una pequeña carilla articular para la extremidad externa de la apófisis transversa correspondiente; 3.º, el *cuello* (es la parte media), fuertemente rugosa en su parte posterior y en la superior para las inserciones ligamentosas.

c) *Extremidad anterior*. — Ligeramente abultada, presenta una carilla elíptica, más o menos cóncava, en la cual se aloja el cartílago costal.

B. CARACTERES PROPIOS DE ALGUNAS COSTILLAS. — Hay cuatro costillas que presentan caracteres que permiten distinguirlas de todas las demás: son la 1.ª, la 2.ª, la 11.ª y la 12.ª.

a) *Primera costilla* — Los caracteres propios de esta costilla son: 1.º, su orientación de modo que sus dos caras miran una hacia arriba y otra hacia abajo; 2.º, la presencia en su cara superior de dos canales vasculares (uno posterior para la arteria subclavia y otro anterior para la vena homónima), separados por una eminencia rugosa, el *tubérculo de Lisfranc* (para el escaleno anterior). También pueden señalarse como caracteres distintos: 1.º, la ausencia del canal costal, 2.º, la presencia en la cabeza de una carilla única; 3.º, el aplanamiento vertical del cuello, y 4.º, la presencia, en la parte superior de la extremidad anterior, de una superficie rugosa para el ligamento costoclavicular.

b) *Segunda costilla*. Esta presenta dos caracteres distintos principales. 1.º, la ausencia del canal costal, 2.º, la presencia, en su

cara superoexterna, de una superficie rugosa más o menos saliente para uno de los fascículos del serrato mayor.

c) *Undécima y duodécima costillas.*— Tres caracteres permiten distinguir estas costillas: 1.º, *una carilla única en la cabeza* (se articulan con una sola vértebra); 2.º, *ausencia de carilas en la tuberosidad* (no se articulan con la apófisis transversa), 3.º, *ningún indicio de torsión*. La duodécima se distinguirá de la undécima por ser más corta y no tener ángulo posterior.

2.º **Cartílagos costales.** Los cartílagos costales presentan una configuración análoga a la de las costillas, de las que son continuación. Cada uno de ellos presenta: 1.º, *dos caras*, una anterior y otra posterior, 2.º, *una extremidad externa*, prominente, que continúa con la cúpula elíptica que representa la extremidad anterior de la costilla, 3.º, *una extremidad interna*, igualmente prominente, que presenta una disposición variable según el cartílago costal a que pertenece; es redondeada y casi plana en el primer cartílago; configurada en ángulo diedro en los seis cartílagos siguientes (cartílagos de inserción esternal), muy delgada y con una carilla en su borde superior en los 8.º, 9.º y 10.º; muy delgada, puntiaguda y como vermiforme en los dos últimos.

3. TÓRAX EN GENERAL

El tórax es una cavidad a la vez ósea y cartilaginosa en la que están alojados los pulmones y el corazón. Tiene la figura de un tronco de cono de base inferior. Su altura es de 15 centímetros por delante, 27 centímetros por detrás y 32 centímetros por los lados. Para su descripción podemos considerar en él, la superficie exterior, la superficie interior, base y vértice.

1.º **Superficie exterior.**— La superficie exterior presenta cuatro caras. La *cara anterior* tiene por límites laterales una línea oblicua hacia abajo y afuera, que pasa por el ángulo anterior de las costillas. Está formada por las partes siguientes: esternón, articulaciones condroesternales, cartílagos costales, articulaciones condrocostales y extremidad anterior de las costillas hasta el ángulo anterior. La *cara posterior* está limitada asimismo por dos líneas oblicuas que pasan por el ángulo posterior de las costillas. Está formada: 1.º, por el plano posterior de la columna dorsal desde la apófisis espinosa hasta el vértice de la apófisis transversa; 2.º, por fuera de las apófisis transversas, por

la cara externa de las costillas, desde la tuberosidad hasta el ángulo posterior. Las *caras laterales*, en número de dos, una derecha y otra izquierda, ocupan todo el espacio comprendido entre las dos caras precedentes. Convexas a la vez en sentido vertical y en sentido transversal, están constituidas por las doce costillas y los once *espacios intercostales*, que se interceptan entre sí.

2.º **Superficie interior.** — Se distinguen también en ésta cuatro caras. La *cara anterior*, cóncava, tiene exactamente los mismos límites y la misma construcción anatómica que en la superficie exterior. La *cara posterior*, muy saliente hacia delante, presenta: 1.º en la línea media, la columna dorsal, más ancha por abajo que por arriba, la cual parece proyectarse al encuentro del esternón, y 2.º, a cada lado de la columna, dos canales verticales destinados a alojar el borde posterior de los pulmones, que se llaman *canales pulmonares*. Las *caras laterales*, muy cóncavas, están formadas, como en la superficie exterior, por las costillas y los espacios intercostales.

3.º **Vértice.** — Representa un orificio elíptico cuyo diámetro mayor es transversal, constituido, por delante, por la horquilla del esternón, por detrás, por el cuerpo de la primera vértebra dorsal, y por los lados, por el borde interno de la primera costilla. Mide 4 ó 5 centímetros en sentido anteroposterior y de 10 a 12 centímetros en sentido transversal. En su orientación es inclinado de arriba abajo y de atrás a delante, una línea horizontal a nivel de la horquilla esternal encontraría, por detrás, no la primera dorsal, sino la segunda.

4.º **Base.** — Es también un orificio, pero mucho más ancho que el precedente, mide por término medio, 12 centímetros en sentido anteroposterior y 26 centímetros en sentido transversal. Está formado, en la parte posterior, por el cuerpo de la duodécima dorsal, en la parte anterior, por la base del apéndice xifoideo; a cada lado, por los cartílagos costales, que suben oblicuamente de abajo arriba, desde la duodécima costilla hacia el esternón. La doble serie de los cartílagos costales, los de la izquierda y los de la derecha limitan un ángulo, cuyo vértice corresponde a la base del apéndice xifoideo, al que se da el nombre de *ángulo xifoideo*. Por término medio mide 70º en el hombre y 75º en la mujer.

5.º **Índice torácico.** — Se llama *índice torácico* la relación vertical entre el diámetro transversal y el diámetro anteroposterior

$$\text{Índice} = \frac{\text{Diámetro transversal} \times 100}{\text{Diámetro anteroposterior}}$$

Mide por término medio 127 en el esqueleto y 140 en el sujeto revestido de sus partes blandas.

6.º Perímetro torácico.— Indica la circunferencia exterior del tórax revestido de sus partes blandas. Se mide a nivel de la axila o a la altura del apéndice xifoideo en inspiración y en espiración.

CAPITULO III

CABEZA ÓSEA

La cabeza ósea se divide en dos porciones: una tiene la forma de caja ósea y contiene el encéfalo, es el *cráneo*, la otra destinada a alojar la mayor parte de los órganos de los sentidos y a sostener los de la masticación, es la *cara*. Estudiaremos sucesivamente 1.^a, el *cráneo*, 2.^a, la *cara*; 3.^a, cierto número de *regiones comunes al cráneo y a la cara*.

ARTÍCULO PRIMERO

HUESOS DEL CRÁNEO

El cráneo es una caja ósea destinada a alojar y proteger la parte más voluminosa y más noble del neuroeje: el encéfalo. Ante todo describiremos los diferentes huesos que lo constituyen y luego lo estudiaremos en su conjunto.

1 DESCRIPCIÓN DE LOS HUESOS DEL CRÁNEO

El cráneo está esencialmente constituido por ocho huesos, cuatro pares y cuatro impares. Los cuatro impares son: el *frontal*, el *etmoides*, el *esfenoides* y el *occipital*. Los cuatro pares son los dos *parietales* y los dos *temporales*.

1.^a Frontal

El frontal o coronal ocupa la parte más anterior del cráneo. Se consideran en él *tres caras* (anterior, posterior e inferior), perfectamente limitadas por *tres bordes*.

1.^a *Cara anterior*. — Convexa y lisa en toda su extensión.

a) En la *línea media* se ve, en los sujetos jóvenes, la sutura *mediofrontal* o *metópica*, con la edad se atenúa y en el adulto ha

desaparecido totalmente, excepto en caso de anomalía. Inmediatamente por encima de la raíz de la nariz existe una ligera prominencia llamada *eminencia o elevación frontal o glabella*.

β) *A cada lado de la línea media encontramos sucesivamente* 1.º, la *eminencia frontal lateral*; 2.º, por debajo de ella, los *arcos superciliares*; 3.º, en su parte más externa, una cresta siempre muy marcada, la *cresta lateral del frontal*, y por fuera de ella, una pequeña superficie triangular, la *carilla lateral del frontal*, que forma parte de la fosa temporal.

2.º **Cara inferior.** — Es menos extensa, pero ofrece muchos más accidentes que la precedente.

α) *En la línea media se ve una ancha escotadura rectangular, la escotadura etmoidal.* Por delante de esta escotadura se levanta una larga apófisis, la *espinas nasal del frontal*, que se articula con los huesos propios de la nariz. En los bordes laterales de la escotadura se ven sucesivamente: 1.º, los orificios de los *senos frontales*; 2.º, muchas *semiceldillas*, completadas por las del etmoides; 3.º, dos canales transversales, uno anterior y otro posterior, que uniéndose con canales análogos labrados en la cara superior de las masas laterales del etmoides, constituyen dos conductos: los *conductos etmoidales u orbitarios internos*.

β) *A cada lado de la escotadura etmoidal, la cara inferior está formada por dos superficies triangulares, cóncavas y lisas, llamadas fosas orbitarias.* En estas fosas son de notar la *fosa lagrimal* y la *fosa troclear*, destinadas la primera a alojar la glándula del mismo nombre y la segunda a prestar inserción a la peca del oblicuo mayor.

3.º **Cara posterior.** — Cóncava y dirigida hacia atrás en sus tres cuartas partes superiores, es cóncava y se halla dirigida hacia arriba en su cuarta parte inferior.

α) *En la línea media se hallan sucesivamente, de arriba abajo: un canal vertical (para el seno longitudinal), la cresta frontal (para la hoz del cerebro), el agujero ciego y la escotadura etmoidal ya descrita.*

β) *A cada lado de la línea media: 1.º, por arriba, dos excavaciones, las fosas frontales, 2.º, por abajo, dos superficies convexas, las eminencias orbitarias.* Las fosas frontales y las eminencias orbitarias están sembradas de depresiones y prominencias (*impresiones digitales y eminencias mamilares*) en relación con la superficie cerebral (circunvoluciones y surcos)

4.° Bordes.—Se distinguen en anterior, superior y posterior

a) El *borde anterior* separa la cara anterior, de la cara inferior. Vemos en él: 1.°, en su parte media, una superficie irregular, la *escotadura nasal*, que sirve de base de implantación a la espina nasal (la cual se articula a la vez con los huesos propios de la nariz y la apófisis ascendente del maxilar superior); 2.°, a cada lado, los *arcos orbitarios*, interrumpidos en su tercio interno por una escotadura a menudo convertida en agujero, la *escotadura o agujero supraorbitario*; cada uno de ellos termina en sus dos extremidades por dos apófisis dirigidas hacia abajo, la *apófisis orbitaria interna* (para el unguis y la apófisis ascendente del maxilar) y la *apófisis orbitaria externa* (para el pómulo).

β) El *borde superior*, semicircular, dentellado, cortado a bisel (por arriba a expensas de la lámina interna y por abajo a expensas de la lámina externa), se articula con los dos parietales.

γ) El *borde posterior* separa la cara posterior de la cara inferior: rectilíneo, delgado, cortante, interrumpido en su parte media por la escotadura etmoidal. En la parte lateral, del hueso, en el punto de convergencia de los tres bordes del frontal, es de notar la existencia de una pequeña carilla rugosa, triangular destinada a articularse con el ala mayor del esfenoides.

5.° Conformación exterior, senos frontales.—El frontal, relativamente grueso y resistente en su porción vertical, es, por el contrario, muy delgado en su porción horizontal. Por encima y a los lados de la escotadura nasal se ven, labradas en el espesor del hueso, dos cavidades, una derecha y la otra izquierda, llamadas *senos frontales*. Están ordinariamente separadas una de otra por un tabique medio

2.° Etmoides

Hueso impar, medio y simétrico, situado por delante del esfenoides, en la escotadura etmoidal del frontal. Su configuración es extremadamente irregular. Hemos de distinguir en él tres partes: 1.°, una *lámina vertical*, que ocupa la línea media; 2.°, una *lámina horizontal*, que corta perpendicularmente a la primera cerca de su extremidad superior; 3.°, dos *masas laterales*, de forma cuboidea, que penden de la cara inferior de la lámina horizontal.

1.° **Lámina vertical.**—La lámina vertical, cortada transversalmente por la lámina horizontal, resulta así dividida por ella en dos

partes, una por encima y otra por debajo. La parte que está por encima reviste la forma de una apósis vertical, aplanada transversalmente, de forma triangular; llámase *apofisis cristagalli*. En ella se inserta la hoz del cerebro. La parte que está por debajo es una lámina relativamente delgada y se llama *lámina perpendicular del etmoides*. Separa entre sí las dos fosas nasales.

2.ª **Lámina horizontal.** — La lámina horizontal de forma cuadrilátera más prolongada en sentido anteroposterior que en sentido transversal, se extiende de una masa lateral a la otra.

a) *Cara inferior.* — Su cara inferior, muy estrecha, forma parte de la bóveda de las fosas nasales.

b) *Cara superior.* — Su cara superior está en relación con los centros nerviosos. Está dividida por la apósis cristagalli en dos mitades derecha e izquierda. Cada una de estas dos mitades está representada por un canal anteroposterior, el *canal etmoidal u olfatorio*. El fondo de este canal está acribillado de agujeros (*agujeros olfatorios*), y de ahí el nombre de *lámina cribosa del etmoides* con que se designa ordinariamente esta lámina horizontal. Los agujeros olfatorios están por lo común dispuestos (no siempre) en tres hileras longitudinales. Son de notar muy especialmente los dos agujeros colocados en la parte más anterior: el interno es la *hendidura etmoidal* (en estado fresco está cerrado por una prolongación de la duramadre); el externo es el *agujero etmoidal anterior* (da paso al nervio nasal interno).

3.ª **Masas laterales.** — En número de dos, derecha e izquierda, están como suspendidas de las partes laterales de la lámina horizontal. Tienen forma cuboidea y presentan seis caras: externa, interna, superior, inferior, anterior y posterior.

a) *Cara externa.* — La cara externa, plana y lisa, se conoce con el nombre de *hueso plano del etmoides*. Forma parte de la pared interna de la órbita.

b) *Cara interna.* — La cara interna constituye la mayor parte de la pared externa de las fosas nasales. De esta cara se desprenden dos láminas delgadas, que se dirigen en seguida hacia abajo y adentro: son las dos conchas llamadas *cornete superior y cornete medio*. Por encima y por fuera de cada una de ellas se encuentra un espacio llamado *meato* (*meato superior* para el cornete superior y *meato medio* para el cornete medio). En éstos hay que notar: 1.º, en el meato superior, uno o muchos pequeños orificios, que comunican con el grupo de las

células etmoidales posteriores, 2.º, en el meato medio, un primer orificio, en relación con los senos frontales, y un segundo orificio situado un poco por detrás del precedente y en comunicación con las células etmoidales anteriores.

c) *Cara superior*. — La cara superior presenta, en toda su extensión, semicélulas muy irregulares, que completan, en el cráneo articulado, las semicélulas correspondientes a. frontal. Entre estas semicélulas hay una, colocada en la parte más anterior, que merece especial mención, es el *infundibulum*, que está en relación por arriba con la abertura inferior del seno frontal y desemboca por abajo en el orificio antes indicado, en el meato medio.

d) *Cara inferior*. — La cara inferior presenta sucesivamente, de dentro afuera: 1.º, el borde inferior del cornete medio, 2.º, el meato medio; 3.º, una superficie rugosa, que se articula con el maxilar superior. De la parte anterior del meato medio se destaca una laminilla ósea, larga y delgada, que se dirige en seguida hacia atrás y abajo; es la *apófisis unciniforme* la cual, en el cráneo articulado, se une a la apófisis etmoidal de la concha inferior.

e) *Cara anterior*. — La cara anterior presenta semicélulas que completan las del unguis.

f) *Cara posterior*. — La cara posterior, cuadrilátera, desigual rugosa a trechos, se articula a la vez con el cuerpo del esfenoides y con la apófisis orbitaria del palatino.

4.º **Conformación interior, células etmoidales.** — El etmoides está casi enteramente formado de tejido compacto. Este tejido compacto está dispuesto en forma de laminillas muy delgadas y muy frágiles, que se unen unas con otras y circunscriben así cavidades anfractuosas: las *células etmoidales*. Estas células (unas pertenecen exclusivamente al etmoides y otras están formadas a la vez por el etmoides y los huesos vecinos) se dividen en dos grupos, *grupo anterior*, que se abre en el meato medio, y *grupo posterior*, que se abre en el meato superior.

3.º *Esfenoides*

Impar y medio, el esfenoides ocupa la parte anterior y media de la base del cráneo, en donde está enclavado a manera de cuña entre los huesos que lo rodean. Distinguiremos en él: 1.º, el *cuerpo*; 2.º, dos *alas menores*, 3.º, dos *alas mayores*, 4.º, dos *apófisis pterigoides*

1.º **Cuerpo.**—El cuerpo ocupa la parte central del hueso. De forma cuboidea, tiene naturalmente seis caras:

a) **Cara superior.**—Encontramos en ella sucesivamente de delante atrás: 1.º, los dos *canales olfatorios*, de dirección anteroposterior; 2.º, el *canal óptico*, de dirección transversal; 3.º, una excavación profunda, la *silla turca* o *fosa pituitaria*; 4.º, una lámina ósea, de forma cuadrilátera y colocada verticalmente, la *lámina cuadrilátera del esfenoides*. La silla turca está limitada en sus cuatro ángulos por cuatro eminencias, llamadas *apofisis clinoides*. Se distinguen en anteriores y posteriores: las anteriores, situadas por detrás y por fuera de los agujeros ópticos, forman parte de las alas menores; las posteriores son simplemente los ángulos libres de la lámina cuadrilátera.

b) **Cara inferior.**—La cara inferior presenta: 1.º, en la línea media, una cresta anteroposterior, la *cresta inferior* del esfenoides, la cual termina por delante por el llamado *pico* o *rostrum*; 2.º, a cada lado de la línea media, un primer surco que está en relación con el borde adelgazado de la base del vómer; un segundo surco que la yuxtaposición de la apófisis esfenoidal del palatino transforma en conducto, llamado *conducto pterigopalatino*.

c) **Cara anterior.**—Encontramos en ella sucesivamente: 1.º, en la línea media, una cresta vertical, la *cresta anterior* del esfenoides; 2.º, a derecha y a izquierda de esta cresta un canal vertical (que forma parte de las fosas nasales), la entrada de los senos esfenoidales y una superficie rugosa para las masas laterales del etmoides.

d) **Cara posterior.**—La cara posterior, de forma cuadrilátera, queda unida pronto al occipital. En el adulto está representada generalmente por un corte de sierra.

e) **Caras laterales.**—Las caras laterales sirven de punto de implantación a las alas mayores. Están separadas de la silla turca por un canal en forma de S *italica*, que es el *canal cavernoso* (para los senos cavernosos y la carótida interna).

2.º **Alas menores.**—Llamadas también *apofisis de Ingrassias*, son dos láminas aplanadas de arriba abajo, que tienen la forma de un triángulo de base interna. La *cara superior* corresponde al cerebro. La *cara inferior*, a la bóveda orbitaria. El *borde anterior*, finamente dentado, se articula con el frontal y la lámina cribosa del etmoides. El *borde posterior*, sinuoso y cortante por fuera y redondeado por dentro, separa los departamentos anterior y medio de la base del

cráneo El *vértice*, terminado en punta recibe el nombre de *apéndice ensiforme* o *xifoides*. La *base*, unida al cuerpo del esfenoides, está horadada por un agujero, el *agujero óptico* (para el nervio óptico y la arteria oftálmica)

3.º *Alas mayores*. — Las alas mayores del esfenoides parten de las caras laterales del cuerpo del esfenoides. Presentan *tres caras y tres bordes*.

a) *Caras*. — Se distinguen en posterior, anterior y externa. La *cara posterior*, fuertemente cóncava, corresponde al cerebro (impresiones digitales y eminencias mamilares). La *anterior*, plana y cuadrilátera, forma parte de la cara externa de la órbita. La *externa* está dividida por una cresta anteroposterior, la *cresta esfenotemporal*, en dos partes: una superior, que pertenece a la fosa temporal, y otra inferior que forma parte de la fosa cigomática.

b) *Bordes*. — En número de tres, se distinguen en anterior, externo e interno. El *borde anterior* degado, vertical, con dentellones irregulares, se articula con el maxilar. El *borde externo*, cóncavo, se articula con la porción escamosa del temporal. El *borde interno*, el más importante de los tres, es muy convexo. Libre por delante y detrás, se une, por su parte media, con el cuerpo del esfenoides. A lo largo de este borde, y siguiendo de delante atrás, encontramos cuatro orificios, a saber, 1.º, la *hendidura esfenoidal*, ancha por dentro y estrecha hacia fuera (para los nervios motores del ojo, las tres ramas del oftálmico y la vena oftálmica); 2.º, el *agujero redondo mayor* (para el nervio maxilar superior); 3.º, el *agujero oval* (para el nervio maxilar inferior); 4.º, el *agujero redondo menor* o *esfenoespinoso* (para la arteria meníngea media). A veces se encuentra hacia dentro y un poco por delante del agujero oval, un orificio muy pequeño, que es el llamado *agujero de Vesalio* (para una vena emisaria). Los bordes interno y externo de las alas mayores se encuentran por sus dos extremos, su punto de unión anterior forma una superficie triangular rugosa, que se articula con una superficie igual del frontal, de su punto de unión posterior parte una apófisis descendente que es la *espinas del esfenoides* (para el ligamento esfenomaxilar y el músculo del martillo).

4.º *Apófisis pterigoides*. Forman dos columnas óseas, dirigidas verticalmente de arriba abajo, que parten a la vez de la cara inferior del cuerpo del esfenoides y del borde interno de sus alas ma-

yores. Se estudian en ellas una *base*, un *vértice* y cuatro *caras* (interna, externa, anterior y posterior). La *base*, situada en la parte superior, está atravesada de delante atrás por un conducto recto, que es el llamado *conducto vidiano* (para el nervio del mismo nombre). El *vértice*, bifurcado, está formado por dos láminas óseas, que se designan con el nombre de *ala externa* y *ala interna*, esta última termina con un gancho por el cual se desliza el tendón del periostafilino externo. Entre las dos alas se encuentra una escotadura que, en el cráneo articulado, está ocupada por la apófisis piramidal del palatino. La *cara interna*, estrecha y plana, contribuye a formar la pared externa de las fosas nasales. La *cara externa*, ancha y rugosa, forma la pared interna de la fosa cigomática (sirve de inserción al fascículo inferior del pterigoideo externo). La *cara anterior*, lisa por arriba, es rugosa en su parte inferior para articularse con el palatino. La *cara posterior* forma una excavación profunda, la *fosa pterigoidea* (para el pterigoideo interno). En la parte superior e interna de esta fosa se encuentra una pequeña depresión oval, la *fosa escafoidea* (para el periostafilino externo).

5.º **Conformación interior, senos esfenoidales.**— Están formados casi enteramente de tejido compacto; hay escasa cantidad de tejido esponjoso en la parte posterior del cuerpo, en la base de las apófisis pterigoides, en las partes más gruesas de las alas mayores y en el borde posterior de las alas menores. En número de dos, los *senos esfenoidales* (excavados en el cuerpo del hueso) están separados entre sí por un tabique medio. Se abren en el meato superior de las fosas nasales. Su orificio está ocupado en parte, en la primera edad, por una laminilla ósea llamada *concha* o *cornete de Bertin*, hacia los dos años se suelda con el cuerpo del esfenoides.

4.º *Occipital*

Hueso impar, medio, simétrico, situado en la parte posterior e inferior del cráneo. Presenta una forma romboidal bastante regular, y por este hecho ofrece al estudio *dos caras* (posteroinferior y anterosuperior), *cuatro bordes* y *cuatro ángulos*.

1.º **Cara posteroinferior.**— Esta cara, fuertemente convexa, presenta en primer lugar un vasto orificio (35 milímetros de longitud por 30 de anchura) llamado *agujero occipital* (para el bulbo, las arterias vertebrales y los dos nervios espinales).

a) *Por delante del agujero occipital se encuentra una superficie cuadrilátera, más larga que ancha, que es la llamada superficie basilar del occipital.* En ella se encuentra una pequeña prominencia, el *tubérculo faríngeo* (para la aponeurosis de la faringe), y por delante de esta eminencia, una ligera depresión en la línea media, la *fosita navicular*.

b) *Por detrás del agujero occipital se extiende la porción a la vez más ancha y más delgada del hueso: la porción escamosa o simplemente la concha.* En ella se encuentran: 1.º, en su parte media, la protuberancia occipital externa; 2.º, encima de la protuberancia, una superficie lisa que corresponde a los tegumentos, 3.º, debajo de la misma protuberancia, una cresta en la línea media, que es la *cresta occipital externa*; 4.º, a cada lado de la cresta, dos líneas curvas de concavidad anterior, la *línea curva occipital superior* y la *línea curva occipital inferior*. Entre las dos líneas curvas y por delante de la línea curva inferior se encuentran superficies rugosas que sirven, lo mismo que las líneas curvas, para prestar inserción a los músculos de la nuca.

c) *A los lados del agujero occipital encontramos dos eminencias elípticas, dirigidas oblicuamente de atrás adelante y de fuera adentro, que constituyen los cóndilos del occipital.* Su cara inferior, convexa y articular, corresponde a las cavidades glenoideas del atlas. Por delante y por detrás del cóndilo se encuentran dos fositas: la *fosita condílea anterior*, con el *agujero condíleo anterior* (para el nervio hipogloso mayor) y la *fosita condílea posterior*, con el *agujero condíleo posterior* (que no es constante, para una vena y a veces una arteriola).

2.º **Cara anterosuperior.** — Esta cara, cóncava, está en relación con la masa encefálica. Encontramos también, como es natural, el agujero occipital.

a) *Por delante del agujero occipital se encuentra un canal anteroposterior, que es el llamado canal basilar* (para el bulbo y la protuberancia).

b) *Por detrás del agujero occipital se ven cuatro depresiones, dos a cada lado, que son las fosas occipitales.* Se dividen en *superiores o cerebrales* (en relación con los lóbulos occipitales del cerebro) e *inferiores o cerebelosas* (en relación con los hemisferios cerebelosos). En el punto de reunión de las cuatro fosas se encuentra una eminencia voluminosa, la *protuberancia occipital interna*. Las dos fosas cerebra-

les están separadas entre sí por un canal medio (para el seno longitudinal superior). Las dos fosas cerebelosas están separadas por una cresta siempre muy acentuada, la *cresta occipital interna* (para la hoz del cerebelo). Finalmente, a cada lado, la fosa cerebral está separada de la fosa cerebelosa correspondiente por un canal transversal, llamado *canal lateral* (para el seno lateral).

c) *A los lados del agujero occipital* encontramos los dos agujeros condíleos anterior y posterior, indicados anteriormente.

3.º **Bordes.**— Son en número de cuatro, dos superiores y dos inferiores. Los *bordes superiores o parietales*, sensiblemente rectilíneos, se articulan con los parietales. Los *bordes inferiores o temporales* presentan, casi en la línea media, una eminencia bastante pronunciada, llamada *apófisis yugular*, la cual divide el borde en dos partes, una anterior y otra posterior. La parte posterior, débilmente dentada, se articula con la porción mastoidea del temporal; la parte anterior, muy irregular, presenta, en primer lugar, la *escotadura yugular* (contribuye a formar el agujero rasgado superior) y, por delante de la escotadura, una superficie rugosa que se articula con el vértice del peñasco.

4.º **Ángulos.**— Son también en número de cuatro (superior, inferior y laterales). El *ángulo superior*, agudo, se aloja en el ángulo entrante que forman los dos parietales. El *ángulo inferior*, muy grueso y truncado (representado en el adulto por un corte de sierra), se articula con el cuerpo del esfenoides. Los *ángulos laterales*, obtusos y dentellados, corresponden, en el cráneo articulado al punto de unión del parietal y el temporal.

5.º **Conformación interior.**— El occipital está formado de dos láminas de tejido compacto, separadas entre sí por una capa más o menos gruesa de tejido esponjoso. No se encuentra este tejido a nivel de las fosas occipitales y principalmente a nivel de las fosas cerebelosas.

5.º *Parietal*

Hueso par, situado encima del temporal, detrás del frontal y delante del occipital. De forma cuadrilátera, tiene, como el hueso occipital, una *cara externa*, otra *interna*, *cuatro bordes* y *cuatro ángulos*.

1.º **Cara externa.**— Muy convexa, forma en su parte media una eminencia redondeada, llamada *eminencia parietal*. Por debajo se ven dos líneas curvas de concavidad inferior, que reciben el nombre de *líneas temporales* y se dividen en superior (para la aponeurosis temporal) e inferior (para el músculo temporal).

2.º **Cara interna.**— Muy cóncava, está en relación con la masa encefálica. Se observan en ella: 1.º, en su parte media, una depresión, la *fosa parietal*; 2.º, un sistema de canales ramificados, que se han comparado a los nervios de una *hoja de higuera* (impresiones de las ramas de la arteria y de las venas meníngicas medias); 3.º, en su parte más superior y próxima al borde superior, una serie de pequeñas fositas irregulares (más acentuadas en los ancianos), que corresponden a los corpúsculos de Pacchioni.

3.º **Bordes.**— En número de cuatro se dividen en superior inferior, anterior y posterior. El *borde superior*, muy grueso y dentellado, se articula con el borde correspondiente del parietal opuesto (*sutura sagital*). En este borde, y en la parte correspondiente a la cara interna, hay un medio canal longitudinal, que, con el del lado opuesto, forman un canal completo llamado *canal longitudinal* (para el seno longitudinal superior). Cerca del borde superior se encuentra el *agujero parietal*, para la vena emisaria de Santorini. El *borde inferior*, delgado y cortante, muy biselado a expensas de la lámina externa, se articula con la porción escamosa del temporal (*sutura paretotemporal*). El *borde anterior*, finamente dentellado, se articula con el frontal. El *borde posterior*, provisto de grandes dentellones, se articula con el occipital (*sutura lambdoidea*).

4.º **Ángulos.**— Son en número de cuatro. 1.º, *ángulo antero-superior*, recto; se articula con el frontal y el parietal del lado opuesto. 2.º *ángulo anteroinferior*; se articula con el ala mayor del esfenoides (en este ángulo se ve el canal de la meníngica media); 3.º, *ángulo posterosuperior*, se articula con el occipital y con el parietal del lado opuesto; 4.º, *ángulo posteroinferior*; se aloja en el ángulo entrante que forma la porción mastoidea del temporal con la porción escamosa del mismo hueso.

5.º **Conformación interior.**— Recuerda la del frontal: un diploe muy delgado (sobre todo en su parte media e inferior) entre una lámina interna y otra externa.

6.° *Tempora.*

Hueso par, situado en la parte inferior y lateral del cráneo, entre el occipital, el parietal y el esfenoides. En el feto de siete u ocho meses se compone de tres piezas óseas distintas: la *escama*, lámina aplanada y muy delgada; el *peñasco*, a expensas del cual ha de desarrollarse más tarde la apófisis mastoideas; el *hueso timpánico*, especie de anillo incompleto (le falta su parte superior) que, desarrollándose hacia fuera, ha de formar la mayor parte (las tres paredes: anterior, posterior e inferior) del conducto auditivo externo. Estas tres piezas se unen más tarde formando una pieza única. En esta forma está constituido el temporal del adulto. Conviene, sin embargo, dividirlo también en tres porciones: 1.°, *porción escamosa*, que representa la escama del hueso fetal; 2.°, *porción mastoidea*, procedente de la parte externa del peñasco fetal; 3.°, *porción petrosa o peñasco*, que representa a la vez la parte interna del peñasco fetal y el hueso timpánico.

1.° **Porción escamosa.** Aplanada lateralmente e irregularmente circular presenta una cara *externa*, otra *interna* y una *circunferencia*.

a) *Cara externa.* — La cara externa, convexa y lisa, forma parte de la fosa temporal. Presenta, por detrás, un *turco vascular* para la arteria temporal profunda posterior. De su parte inferior se desprende una apófisis de dirección anterior, llamada *apófisis cigomática*. Presenta a nuestra consideración: 1.°, una cara externa, convexa, cubierta por la piel; 2.°, una cara interna, cóncava, en relación con el músculo temporal; 3.°, un borde superior, delgado y cortante, para la aponeurosis temporal; 4.°, un borde inferior, más grueso, que da inserción al masetero; 5.°, una extremidad anterior o vértice, muy dentellada, para articularse con el hueso malar; 6.° una extremidad posterior o base, que se divide en dos ramas o raíces: una *raíz transversa o cóndilo del temporal*, dirigida hacia dentro, convexa, cubierta por cartilago, que forma parte de la articulación temporomaxilar, una *raíz longitudinal*, que se dirige hacia atrás y también se bifurca a su vez. El punto de unión de las dos raíces está señalado por una eminencia, el *tubérculo cigomático* (para el ligamento lateral externo de la articulación temporomaxilar). El espacio angular formado por la separación de las dos raíces está ocupado por una excavación ovoidea, cuyo diámetro mayor es transversal: la *cavidad glenoidea del*

temporal. Por detrás de esta cavidad se encuentra una hendidura transversal que recibe el nombre de *cisura de Glaser*.

b) *Cara interna* — Es cóncava y está en relación con el cerebro; tiene numerosos surcos vasculares correspondientes a la meninge media.

c) *Circunferencia*. — Libre en sus tres cuartos anterosuperiores, se articula, por delante, con el ala mayor del esfenoides, y, por detrás, con el parietal. En su cuarto posteroinferior está unida, por una parte, con la porción mastoidea (*sutura escamomastoidea*), y, por otra, con el peñasco (*cisura de Glaser* en la superficie exocraneal del hueso y algunas veces en la superficie endocraneal, *cisura petroescamosa*).

2.º **Porción mastoidea.** Aplanada de fuera adentro, presenta, como la porción escamosa, una cara *externa*, otra *interna* y una *circunferencia*.

a) *Cara externa* — Plana y rugosa, termina por abajo con una eminencia voluminosa, la *apófisis mastoides*. Por dentro de esta apófisis se ve la *ranura digástrica*, para el músculo del mismo nombre. Por encima de la base de la apófisis mastoides, el hueso está atravesado de parte a parte por un conducto oblicuo llamado *conducto mastoideo* (emisaria mastoidea).

b, *Cara interna*. — Cóncava e irregular, corresponde al cerebelo. En su parte anterior, cerca del peñasco, se encuentra un surco vertical para el seno lateral.

c) *Circunferencia*. — Queda libre solamente en su parte superior y posterior: se articula con el parietal y el occipital. En su restante extensión se confunde con la escama y el peñasco. En el punto de contacto de la circunferencia de la escama con la circunferencia de la porción mastoidea se ve una escotadura angulosa, denominada *incisura parietal del temporal*.

3.º **Porción petrosa.** — La porción petrosa o peñasco comprende la parte interna del peñasco fetal, a la cual se ha unido toda la porción timpánica. Tiene la forma de una pirámide cuadrangular y presenta, por consiguiente, una base, un vértice, cuatro caras y cuatro bordes.

a) *Base* — La base, dirigida hacia fuera, se interpone entre las dos partes anteriormente descritas, con las cuales está fuertemente unida. Presenta un ancho orificio oval, que es el *orificio del conducto auditivo externo*. Es de notar que este orificio está formado (como

el conducto): *por arriba*, por la porción escamosa; *por delante*, *abajo* y *detrás*, por la porción timpánica. En la parte superior y posterior del orificio se ve una pequeña lámina ósea (*spina supra meatum*), con una fosita en su parte superior.

b) *Vértice*. — Dirigido hacia dentro y adelante, el vértice se corresponde, en el cráneo articulado, con el ángulo entrante que forman, al unirse, el cuerpo del esfenoides y su ala mayor. Muy truncado, presenta un agujero, que es el *orificio interno del conducto carotídeo*.

c) *Caras*. — En número de cuatro, se dividen en anterosuperior, posterosuperior, anteroinferior y posteroinferior.

a) La *cara anterosuperior* está en relación con el cerebro. Presenta, sucesivamente, de dentro afuera: 1.º, una fosita oval, para el ganglio de Gasser. 2.º, el *hiato de Falopio*, para el nervio petroso superficial mayor (con frecuencia se encuentran, alrededor del hiato principal, *hiatos accesorios* para el nervio petroso superficial menor y los dos nervios petrosos profundos). 3.º, dos pequeños surcos de dirección transversal, que van del hiato de Falopio y de sus accesorios al agujero rasgado anterior; 4.º, en la unión del tercio medio con el tercio externo y cerca del borde superior del hueso, la *eminencia arcuata*, eminencia determinada por el conducto semicircular superior; 5.º, por delante de esta eminencia, el *tegmen tympani*, lámina muy delgada que forma la bóveda de la caja del tímpano.

β) La *cara posterosuperior* está en relación con el cerebelo y el istmo. Presenta: 1.º, el *orificio del conducto auditivo interno* (al cual sigue el conducto del mismo nombre), para el auditivo, el facial y el intermediario; 2.º, por fuera de este orificio, una hendidura estrecha, el *acueducto del vestíbulo*, para el conducto endolinfático, y una prolongación tubular del vestíbulo membranoso. 3.º, entre ambos y cerca del borde superior, los vestigios de una depresión muy marcada en el feto, la *fosa subarcuata*.

γ) La *cara posteroinferior*, muy complicada, puede dividirse en tres zonas, ocupando las tres la superficie exterior de la base del cráneo. La *zona externa* presenta sucesivamente: 1.º, la *apófisis estiloides*, para el ramillete de Riolo; 2.º, por detrás de la apófisis, el *agujero estilomastoideo*, para el nervio facial; 3.º, por detrás de este agujero, una faceta rugosa, para el occipital. La *zona media* está ocupada por una depresión profunda, la *fosa yugular*, donde se halla el golfo de la vena yugular interna. La *zona interna*, que es la mayor de las tres, presenta el *orificio inferior del conducto carotídeo* y, por dentro del mismo, una superficie rugosa para el músculo periestafilino.

interno. Entre el orificio carotídeo y la fosa yugular se levanta una cresta, en cuyo vértice (muchas veces en su vertiente externa) se ve un pequeño orificio: el *orificio raserier del conducto de Jacobson* (para el nervio de Jacobson).

δ) La *cara anteroinferior* pertenece, como la precedente, a la base del cráneo. Esta representada: 1.º en sus dos tercios externos, por una superficie cóncava, lisa y uniforme, que pertenece al hueso timpánico y forma la pared anterior del conducto auditivo externo; 2.º, en su tercio interno, por una pequeña superficie triangular, que pertenece al peñasco y está en relación con el músculo del martillo.

d) *Bordes*.—En numero de cuatro (como las caras), se distinguen en superior, inferior, posterior y anterior

α) El *borde superior*, el más largo de los cuatro, tiene en toda su extensión un canal, el *canal petroso superior* (para el seno del mismo nombre);

β) El *borde inferior* lleva el nombre de *cresta pétrea*. Por delante de la apófisis estiloides forma la *apófisis vaginal*.

γ) El *borde posterior* se articula con el borde inferior del occipital. Presenta sucesivamente, siguiendo de dentro a fuera: 1.º, el *canal petroso inferior* (para el seno del mismo nombre); 2.º, una pequeña excavación de forma piramidal, la *fosa petrosa* (para el ganglio de Andersch), en cuyo fondo se abre el *acueducto del caracol*; 3.º, en el ángulo externo de la fosa petrosa, la *espinia yugular* del temporal; 4.º, hacia fuera, una lámina delgada y cortante, con una ranura, la *ranura yugular* del temporal; 5.º, la *carilla yugular* y el *canal petroso lateral* del temporal

δ) El *borde anterior*, libre en su mitad interna (que corresponde al agujero rasgado anterior), se halla unido, en su mitad externa, a la porción escamosa: esta unión está señalada exteriormente por la cisura de Glaser. La porción libre del borde anterior del peñasco forma con la escama un ángulo entrante, de unos 70°, en cuyo fondo se ven dos conductos óseos superpuestos como los cañones de una escopeta doble: uno superior, *conducto del músculo del martillo*, otro inferior, que representa la porción ósea de la *trompa de Eustaquio*

4.º *Conformación interior*.—La porción escamosa está formada como el ala mayor del esfenoides. La mastoidea presenta numerosas cavidades, llamadas *células mastoideas*. El peñasco está formado casi por completo de tejido compacto. (Para las cavidades y conductos del temporal, véase *Organos de los sentidos*.)

7.º *Huesos wormianos*

Se designan con este nombre unos huesos pequeños supernumerarios que se encuentran accidentalmente entre los huesos del cráneo. Derivan de uno o varios puntos de osificación superpuestos. Se dividen, según su situación, en suturales y fontanelarios. Los *huesos wormianos suturales* se encuentran en las suturas; el más conocido es el *hueso sagital*. Los *huesos wormianos fontanelarios* ocupan las fontanelas. Reciben los nombres de *bregmático*, *lambdoideo*, *astérico*, *ptérico* y *orbitario*. MANOUVRIER ha descrito, con el nombre de *huesos insulares*, un nuevo grupo de huesos wormianos que aparecen en el espesor de un hueso normal.

2. CRÁNEO EN GENERAL

Considerado en su conjunto, debemos estudiar en el cráneo. 1.º, su *configuración interior*, 2.º, su *configuración exterior*.

1.º *Configuración interior*

La caja craneal se divide en dos regiones: la *bóveda* y la *base*. El límite respectivo de estas dos regiones está formado por un plano transversal que pasaría: 1.º, *por delante*, por la protuberancia frontal media, 2.º, *por detrás*, por la protuberancia occipital externa.

1.º *Bóveda*.— Está formada: por delante, por el frontal; en su parte media, por los dos parietales, y por detrás, por la parte más elevada de la concha del occipital. En ella encontramos:

a) *En la línea media*: 1.º, la *cresta frontal*, para la hoz del cerebro; 2.º, el *canal longitudinal*, para el seno longitudinal superior.

β) *En los lados*: 1.º, la fosa frontal, la fosa parietal y la fosa cerebral del occipital; 2.º, entre estas tres fosas, las dos suturas frontoparietal y parietooccipital. Recuérdese la presencia, a cada lado del canal longitudinal, del *agujero parietal* (para una vena emisaria) y de numerosas depresiones debidas a los corpúsculos de Pacchioni.

2.º *Base*.— La base del cráneo, muy limitada de delante atrás y de arriba abajo, se divide en tres compartimientos: *anterior*, *medio* y *posterior*.

A. COMPARTIMIENTO ANTERIOR. — Limitado por delante por el plano convencional que separa la bóveda de la base, está limitado netamente

mente por detrás por el canal óptico y por el borde posterior de las alas menores del esfenoides. Presenta:

a) *En la línea media.* 1.º la parte inferior de la *cresta frontal*; 2.º, el *agujero ciego*; 3.º, la *apófisis cristagalli*; 4.º, una pequeña *cresta media*; 5.º, el *canal óptico*, dirigido transversalmente y terminado a cada lado en el agujero óptico.

B) *En los lados.* 1.º, los *canales olfatorios* (para los nervios y bulbos olfatorios), con los *agujeros olfatorios*, la *hendidura etmoidal* y el *agujero etmoidal* (véase *Etmoides*); 2.º, por fuera de estos canales y limitándolos, la *sutura frontoetmoidal*, a lo largo de la cual se ven *dos agujeros*, que son los orificios internos de los dos conductos orbitarios internos anterior y posterior; 3.º, por fuera de esta sutura, las *protuberancias orbitarias*, con sus eminencias mamilares e impresiones digitales.

B. COMPARTIMIENTO MEDIO. — Conocemos ya su límite anterior, que está formado por el límite posterior del compartimiento que acabamos de estudiar. Su límite posterior está formado: 1.º, en su parte media, por la lámina cuadrilátera del esfenoides. 2.º, a los lados, por el borde superior del peñasco. En este compartimiento encontramos:

a) *En la línea media:* la *silla turca*, que está limitada, por delante, por el canal óptico; por detrás, por la lámina cuadrilátera, por los lados, por el canal cavernoso, y en sus cuatro ángulos, por las cuatro apófisis clinoides (dos anteriores y dos posteriores).

B) *En los lados:* dos excavaciones profundas, llamadas *fosas esfenotemporales*, muy abundantes en impresiones digitales y eminencias mamilares. Se encuentra, además, en la cara anterior del peñasco, la *depresión de Gasser*, para el ganglio del mismo nombre, y además *nueve agujeros*, que son, siguiendo de delante atrás: 1.º, la *hendidura esfenoidal*, que hace comunicar la cavidad craneal con la órbita y por la cual pasan los nervios motores del ojo, el nervio oftálmico (o sus tres ramas), la vena oftálmica y algunas ramas de la arteria meníngea media; 2.º, el *agujero redondo mayor*, para el nervio maxilar superior, 3.º, el *agujero oval*, para el nervio maxilar inferior y la arteria meníngea menor. 4.º, el *conducto innominado de Arnold* (no es constante), para el nervio petroso superficial menor; 5.º, el *agujero redondo menor*, para la arteria meníngea media; 6.º, el *agujero de Vesalio* (tampoco es constante), para dar paso, cuando existe, a una vena emisaria; 7.º, el *hiato de Falopio* y los *hiatos accesorios*, para los dos petrosos superficiales (ramas del facial) y los dos petrosos profundos (ramas del nervio de Jacobson, que procede del glossofarín-

geo); 8.º, el *agujero rasgado anterior*, cerrado en estado fresco por una lámina fibrocartilaginosa, atravesada por el nervio vidiano, y 9.º, finalmente, el *orificio interno del conducto carotideo*, por el cual desemboca la carótida interna en el cráneo.

C. COMPARTIMIENTO POSTERIOR.—El compartimiento posterior de la base del cráneo, limitado por delante por la lámina cuadrilátera del esfenoides y por el borde superior del peñasco, tiene por límite posterior el compartimiento convencional que separa la bóveda del cráneo de su base. En él deben estudiarse las partes siguientes:

a) *En la línea media*, siguiendo de delante atrás: 1.º, el *canal basilar* (para la protuberancia y parte del bulbo raquídeo); 2.º, el *agujero occipital*; 3.º, la *cresta occipital interna* (para la hoz del cerebelo); 4.º, la *protuberancia occipital interna* (en relación con la prensa de Herófilo).

B) *En los lados*: 1.º, las *fosas cerebelosas* (para los hemisferios cerebelosos); 2.º, el *canal petroso superior* (para el seno del mismo nombre); 3.º, el *canal petroso inferior* (para el seno de igual nombre); 4.º, el *canal lateral*, con su *porción horizontal* y su *porción descendente* (para el seno del mismo nombre); 5.º, el *conducto auditivo interno* (para los tres nervios auditivos, facial e intermediario); 6.º, el *acueducto del vestíbulo* (para el conducto endolinfático); 7.º, el *agujero condileo anterior* (para el hipogloso mayor); 8.º, el *agujero condileo posterior* (que no es constante, para una vena anastomótica); 9.º, el *agujero mastoideo*, situado a nivel de la porción descendente del canal lateral (para una vena anastomótica); 10.º, el *agujero rasgado posterior*, gran abertura situada entre el borde anterior del occipital y el borde posterior del peñasco (para la yugular interna y los tres nervios glosofaríngeo, neumogástrico y espinal).

2.º Configuración exterior del cráneo

Atendida su configuración exterior, el cráneo presenta: la *región de la bóveda*, la *región temporal* y la *región de la base*.

1.º **Bóveda.**—Se extiende, en sentido anteroposterior, de la protuberancia frontal media a la protuberancia occipital externa y, en sentido transversal, de una a otra línea temporal superior. Presenta:

a) *En la línea media*: 1.º, la *sutura medifrontal*, que desaparece en el adulto; 2.º, la *sutura biparietal o sagital*, con el *agujero parietal*, colocado algo por fuera de esta sutura; 3.º, la parte más elevada de la concha occipital.

β) En los lados: 1.º, las tres *protuberancias frontal, parietal y occipital*; 2.º, entre estas tres eminencias, las dos suturas *frontoparietal* (o *coronal*) y *occipitoparietal* (o *lambdoidea*).

2.º **Región temporal.**—Situada en la parte lateral del cráneo, la región temporal está limitada, por arriba y por detrás, por la *línea temporal*, que, partiendo de la apófisis orbitaria externa, termina en la fontanela posterolateral o *asterion* de los antropólogos. Simple en su origen, la línea temporal, al llegar a la proximidad de la sutura coronaria, envía una prolongación inferior que se continúa, por detrás, con la rama ascendente de la raíz longitudinal de la apófisis cigomática. Hay, pues, dos líneas temporales: una *superior*, que es la mayor, en la cual se inserta la *aponeurosis temporal*, y otra *inferior*, más pequeña, que sirve de inserción al músculo temporal.

Por delante y abajo, la región temporal presenta una abertura, de forma oval, por la cual comunica directamente con la fosa cigomática. Esta abertura está circunscrita por dentro, por la *cresta esfenotemporal*; por fuera, por el *arco cigomático*.

La región temporal está formada por el parietal, el frontal, el temporal y el ala mayor del esfenoides. Recibe el nombre de *pterion* el punto o línea donde se encuentran estos cuatro huesos.

3.º **Base.**—Si trazamos una línea transversal que comprenda los dos tubérculos cigomáticos (*línea bicigomática*) y otra línea también transversal, que pase por las dos apófisis mastoides (*línea bimasloidea*), dividimos la base del cráneo en tres zonas: anterior, media y posterior.

A **ZONA ANTERIOR O FACIAL.**—La zona anterior, situada por delante de la línea bicigomática, corresponde al macizo óseo de la cara, y de aquí su nombre. Presenta:

α) En la línea media: 1.º, la *espiná nasal del frontal*, 2.º, la *lámina perpendicular del etmoides*; 3.º, la *cresta esfenoidal inferior*.

β) En los lados: 1.º, la *bóveda de las fosas nasales*, formada por la lámina cribosa del etmoides por delante y el cuerpo del esfenoides por detrás, 2.º, por fuera de la lámina cribosa, las *masas laterales del etmoides*, 3.º, por fuera de estas masas laterales, la mitad superior de la órbita. En la zona facial se encuentran los agujeros siguientes: los *agujeros olfatorios*, la *hendidura etmoidal*, el *agujero etmoidal*, los dos *conductos etmoidales* o *conductos orbitarios internos* (que son uno anterior y otro posterior), el *agujero óptico*, la *hendidura esfenoidal* y el *orificio esfenoidal*.

B. ZONA MEDIA O YUGULAR. — La zona media está comprendida entre las dos líneas transversales bicigomática y bimastoidea. Presenta.

a) En la línea media, la superficie basilar del occipital, con el tubérculo faríngeo y la fosa navicular.

β) En los lados: dos cuadriláteros, bastante regulares, uno a derecha y otro a izquierda. Cada uno de éstos presenta, en sus cuatro ángulos, cuatro eminencias óseas (el tubérculo cigomático, la apófisis pterigoides, el cóndilo del occipital y la apófisis mastoidea), quedando de este modo circunscrito por las cuatro líneas rectas que unen entre sí a estas eminencias. Una serie lineal de crestas y eminencias extendidas desde la apófisis mastoidea a las apófisis pterigoides (apófisis estiloides, apófisis vaginal, espina del esfenoides y lámina ósea, prolongación del borde interno del ala mayor del esfenoides) divide el cuadrilátero en dos triángulos sensiblemente iguales: un triángulo anteroexterno y otro posterointerno. El triángulo anteroexterno contiene el conducto auditivo externo, la cavidad glenoidea del temporal (con la cisura de Glaser), el agujero redondo menor y el agujero oval, estos últimos descritos al estudiar la configuración interior del cráneo. El triángulo posterointerno presenta, a su vez: 1.º, el agujero estilomastoideo (para el facial y la arteria estilomastoidea); 2.º, el agujero rasgado posterior (vena yugular, nervios glossofaríngeo, espinal y neumogástrico) y la fosa yugular, hacia fuera y un poco por detrás del mismo; 3.º, el orificio inferior de conducto carotídeo; 4.º, el conducto de Jacobson; 5.º, el acueducto del caracol (en el borde posterior del peñasco); 6.º, la fosa condilea anterior con el conducto condileo anterior en su fondo; 7.º el agujero rasgado anterior, por delante del cual (en la base media de la apófisis pterigoides) se ve el conducto viano.

C. ZONA POSTERIOR U OCCIPITAL. — La zona posterior está situada por detrás de la línea bimastoidea. En esta línea se encuentran seis eminencias, tres a la derecha y tres a la izquierda: 1.º, el cóndilo del occipital, con su superficie articular para el atlas; 2.º, la apófisis yugular, con su superficie rugosa para el músculo recto lateral del cuello; 3.º, la apófisis mastoidea, con la ranura digastrica en su lado interno.

a) En la línea media, la zona occipital presenta el agujero occipital y la protuberancia occipital externa, unidos entre sí por una cresta, la cresta occipital externa.

β) En los lados se ven dos líneas curvas, muy rugosas: la línea curva occipital superior (que va de la protuberancia a la apófisis mastoidea) y la línea curva occipital inferior (que parte de la mitad de

la cresta occipital para ir a parar a la apófisis yugular). Entre ambas líneas curvas y por debajo de la línea curva inferior existen dos superficies muy rugosas para inserciones musculares.

ARTÍCULO II

HUESOS DE LA CARA

La cara es un conglomerado óseo, situado en la parte inferior y anterior de la cabeza que contiene en sus cavidades la mayoría de los aparatos de los sentidos. Como en el cráneo, describiremos primero los diferentes huesos que la constituyen, estudiando después la cara en conjunto.

I. DESCRIPCIÓN DE LOS HUESOS DE LA CARA

El conglomerado óseo cuyo conjunto constituye la cara se divide en dos porciones llamadas *mandíbulas*: la mandíbula superior y la mandíbula inferior. Un solo hueso constituye en el hombre la mandíbula inferior: el *maxilar inferior*. La mandíbula superior, mucho más complicada, se compone de trece huesos, que se agrupan todos alrededor de uno solo, el *maxilar superior*, como alrededor de un centro común. De estos trece huesos uno solo es impar, el *vómer*; los demás son pares y están dispuestos simétricamente a cada lado de la línea media. Son el *maxilar superior*, el *hueso malar*, el *unguis*, el *cornete inferior*, el *hueso propio de la nariz* y el *palatino*.

1.º *Maxilar superior*

Hueso par, de forma cuadrilátera, ligeramente aplanada de fuera adentro, presenta una *cara interna*, otra *externa*, cuatro *bordes* y cuatro *ángulos*.

1.º *Cara interna*.—Presenta en la unión de su tercio inferior con sus dos tercios superiores una eminencia transversal, la *apófisis palatina*, la cual, articulándose en la línea media con la del lado opuesto, forma un tabique transversal, que constituye a la vez el suelo de las fosas nasales y la bóveda palatina. En su parte anterior se ve el *conducto palatino anterior* (para el nervio esfenopalatino interno). Por debajo de la *apófisis palatina*, la cara interna forma parte de la bóveda palatina. Por encima de la *apófisis palatina* presenta sucesivamente, siguiendo de atrás adelante: 1.º, *rugosidades*, para el palatino;

1.°, el orificio del seno maxilar 3.°, el canal nasal, 4.°, la apófisis ascendente del maxilar superior.

2.° **Cara externa.** — Encontramos primero, en su parte anterior y a nivel de los incisivos, la *fosa murtiforme*, limitada por detrás por una eminencia longitudinal, llamada *eminencia canina*. Toda la parte restante de la cara externa está ocupada por una gran eminencia transversal, que es la *apófisis piramidal* del maxilar superior; su *base* forma cuerpo con el hueso; su *vértice*, rugoso, se articula con el hueso malar, su *cara superior*, plana, forma parte del suelo de la órbita (en ella se ve el *canal suborbitario*), su *cara anterior* presenta el *agujero suborbitario* (para el nervio del mismo nombre); su *cara posterior*, ligeramente convexa, forma parte de la fosa cigomática (se ven en ella los *agujeros dentarios posteriores* para los nervios del mismo nombre), su *borde inferior*, cóncavo y redondeado, se dirige hacia el primer molar; su *borde anterior* forma parte del reborde orbitario; su *borde posterior* corresponde al ala mayor del esfenoides (formando, con este último hueso, la *hendidura esfenomaxilar*).

3.° **Bordes.** — Se distinguen en anterior, posterior, superior e inferior. El *borde anterior*, muy irregular, presenta, siguiendo de abajo arriba: la *semiespina nasal anterior*, la *escotadura nasal* (que corresponde al orificio anterior de las fosas nasales) y el borde anterior de la *apófisis ascendente*. El *borde posterior*, grueso y redondeado, constituye la *tuberosidad del maxilar*. Libre por arriba, se articula por su parte inferior con la apófisis pterigoides del esfenoides y con la porción vertical del palatino (entre la tuberosidad y este último hueso se encuentra el *conducto palatino posterior*). El *borde superior*, muy delgado, se articula en el unguis, el hueso plano del etmoides y la apófisis orbitaria del palatino. El *borde inferior* o *borde alveolar* presenta los alvéolos de los dientes, cavidades más o menos espaciales, simples o tabicadas.

4.° **Ángulos.** — Son en número de cuatro: anterosuperior, antero-inferior, posterosuperior y posteroinferior. Los tres últimos no ofrecen ninguna particularidad. El *ángulo superior* está representado por la *apófisis ascendente* del maxilar superior; su *base* forma cuerpo con el hueso; su *vértice*, rugoso, se articula con la apófisis orbitaria interna del frontal; su *cara interna* forma parte de las fosas nasales; su *cara externa*, lisa, da inserción a diversos músculos; su *borde anterior*, rugoso, se articula con los huesos propios de la nariz; su *borde poste-*

rior limita por dentro el contorno de la órbita (en este borde se ve un canal que contribuye a formar, con el unguis, el *canal lacrimonasal*).

5.º **Conformación interior.** — *Seno maxilar* — El maxilar superior está formado casi exclusivamente de tejido compacto; sólo hay una pequeña masa de tejido esponjoso en la parte anterior de la apófisis palatina, en la base de la apófisis ascendente y a nivel de borde alveolar. En el centro del hueso se halla una vasta excavación de la misma forma general que el hueso; el llamado *seno maxilar* o *antro de Highmore*. Tiene la forma de una pirámide cuadrangular, cuyo vértice corresponde al vértice de la apófisis piramidal y cuya base corresponde a su orificio de entrada.

2.º Hueso malar

Hueso par, situado en la parte más externa de la cara. Aplanado de fuera adentro, de forma cuadrilátera, presenta dos caras, cuatro bordes y cuatro ángulos.

1.º **Caras.** — De las dos caras, una es externa y otra interna. La *cara externa*, convexa y lisa, sirve de punto de inserción a varios músculos. La *cara interna* forma parte a la vez de la fosa cigomática y de la fosa temporal.

2.º **Bordes.** — Son en número de cuatro. El *borde anterosuperior* forma parte del reborde de la órbita, y da origen por dentro a una lámina ósea, la *apófisis orbital*. El *borde posterosuperior* sirve de límite a la fosa temporal en sus partes inferior y anterior. Presenta dos porciones, una horizontal y otra vertical: en esta última se encuentra la *apófisis marginal*. El *borde anteroinferior*, casi rectilíneo, se articula con el maxilar superior. El *borde posteroinferior*, grueso y rugoso, sigue la dirección del arco cigomático.

3.º **Ángulos.** — Son también en número de cuatro. El *ángulo superior*, rugoso, se articula con la apófisis orbital externa del frontal. El *ángulo posterior*, igualmente rugoso, se articula con la apófisis cigomática del temporal. El *ángulo anterior* y el *ángulo inferior* se confunden uno y otro con el borde anteroinferior, para articularse los dos con el maxilar superior.

4.º **Conformación interior.** — Está formado casi por completo de tejido compacto. Está atravesado de parte a parte por el *conducto*

malar, en forma de Y invertida (Y), con un orificio de entrada en la apófisis orbitaria y dos orificios de salida, uno en la cara externa y otro en la cara interna.

3.º *Hueso propio de la nariz*

Hueso par, colocado a cada lado de la línea media, entre las dos apófisis ascendentes del maxilar superior. Forma una lámina cuadrilátera con *dos caras y cuatro bordes*.

1.º *Caras*.—Son una anterior y otra posterior. La *cara anterior*, convexa en sentido transversal y cóncava en el vertical, corresponde al músculo piramidal. La *cara posterior*, notablemente cóncava en el sentido transversal, forma parte de las fosas nasales.

2.º *Bordes*.—Son en número de cuatro: superior, inferior, externo e interno. El *borde superior*, muy dentado (es la parte más gruesa del hueso), se articula con el frontal. El *borde inferior*, más ancho, pero mucho más delgado, se une con los cartílagos laterales de la nariz (pequeña escotadura para el nervio nasolobular). El *borde externo* se articula con la rama ascendente del maxilar superior. El *borde interno*, relativamente grueso, se articula, primero con el del lado opuesto, y luego (en su parte más superior) con la espina nasal del frontal y la lámina perpendicular del etmoides.

4.º *Unguis*

El unguis o *lagrimal* es un hueso par, que se halla situado en la parte anterior de la cara interna de la fosa orbitaria. Constituye una pequeña lámina ósea, de forma cuadrilátera irregular, que presenta, así como el hueso propio de la nariz, *dos caras y cuatro bordes*.

1.º *Caras*.—Son una externa y otra interna. La *cara externa* presenta, en su parte media, una cresta vertical, la *cresta del unguis*, terminada en su parte inferior por una pequeña apófisis en forma de gancho. Por detrás de la cresta se ve una superficie plana; por delante, un canal longitudinal que, uniéndose con el de la apófisis ascendente del maxilar superior, forma el *canal lacrimonasal* (para el saco lagrimal). La *cara interna* se articula por detrás con las masas laterales del etmoides, y por delante forma parte de las fosas nasales.

2.º *Bordes*.—Son en número de cuatro, irregulares y muy delgados. El *borde superior* se articula con la apófisis orbitaria interna

del frontal. El *borde inferior* completa en parte el conducto nasal. El *borde posterior* se articula con el *os planum*. El *borde anterior* se une, con el canal lacrimonasal, con la apófisis ascendente del maxilar superior.

3° Conformación interior. — El ungüis está formado exclusivamente de tejido compacto.

5.° Hueso palatino

Los dos huesos palatinos ocupan, uno en el lado derecho y otro en el izquierdo, la parte más posterior de la cara. Estos huesos se componen de dos partes: una *horizontal* y otra *vertical*.

1.° Porción horizontal. — La porción horizontal del palatino tiene la forma de una lámina cuadrilátera, algo más alargada en sentido transversal que en el anteroposterior. Hay que considerar en ella dos caras y cuatro bordes.

A. CARAS. — Se distinguen en superior e inferior. La *cara superior*, lisa y ligeramente cóncava en sentido transversal, forma parte del suelo de las fosas nasales. La *cara inferior*, algo irregular, constituye la parte más posterior de la bóveda palatina.

B. BORDES. — De los cuatro bordes: 1.°, el *externo* se confunde con la porción vertical del hueso; 2.°, el *interno* se articula con su homólogo del lado opuesto; 3.°, el *anterior* se articula con el borde posterior de la apófisis palatina del maxilar; 4.°, el *posterior*, delgado, libre y cortante, limita por detrás con la fosa nasal correspondiente (forma, uniéndose en la línea media con el del lado opuesto, una apófisis en forma de espina, la *espinas nasal posterior*).

2° Porción vertical. — Lámina cuadrilátera, más alta que ancha. Presenta dos caras y cuatro bordes.

A. CARAS. — Se distinguen en externa e interna. La *cara interna* forma parte de la pared externa de las fosas nasales. En ella encontramos dos crestas anteroposteriores (la inferior sirve de apoyo al concha inferior). La superficie situada entre las dos crestas forma parte del meato inferior. La *cara externa*, plana y lisa por arriba (donde forma el fondo de la fosa *pterygomaxilar*), presenta por abajo dos superficies rugosas: una superficie anterior, para la tuberosidad del maxilar, otra superficie posterior, para la apófisis pterigoides. Entre estas dos superficies rugosas se ve un canal vertical que, uniéndose

con un canal semejante situado en la tuberosidad del maxilar, constituye un conducto completo al que se da el nombre de *conducto palatino posterior*.

B BORDES.—Se distinguen en anterior, posterior, inferior y superior.

a) El *borde anterior*, muy delgado, se aplica contra la cara interna del maxilar (estrechando el seno)

β) El *borde posterior*, también muy delgado, se articula con la cara interna de la apófisis pterigoides.

γ) El *borde inferior* se confunde con el borde externo de la porción horizontal. De la arista que resulta de esta fusión de las dos porciones del palatino se desprende, para dirigirse hacia atrás y afuera, una gran apófisis, la *apófisis piramidal* del palatino. Esta apófisis, que en el cráneo articulado llena el espacio angular comprendido entre las dos alas de la apófisis pterigoides, presenta: 1.º, una faceta media, lisa, que forma parte de la fosa pterigoides; 2.º, una faceta interna y otra externa, ambas rugosas para articularse con las dos alas precitadas de la apófisis pterigoides. Son de notar, en la parte inferior e interna de la apófisis piramidal, los orificios de dos conductos, los *conductos palatinos accesorios*.

δ) El *borde superior* presenta en su parte media una escotadura profunda, la *escotadura palatina* (hay que tener presente que el cuerpo del esfenoides, colocándose en la parte superior de esta escotadura, la transforma en agujero, el *agujero esfenopalatino*). La escotadura palatina está limitada por delante y por detrás por dos apófisis: por delante, la *apófisis orbitaria*; por detrás, la *apófisis esfenoidal*. La *apófisis orbitaria*, así llamada porque se dirige hacia la parte posterior de la órbita, presenta cinco facetas: dos lisas y no articulares (una para la parte más posterior del suelo de la órbita, otra para la fosa pterigomaxilar); las tres restantes rugosas y articulares (para el maxilar superior, el etmoides y el esfenoides). La *apófisis esfenoidal*, dirigiéndose hacia arriba y adentro, se aplica, por su cara superior, contra la base de la apófisis pterigoides (nótese que, entre los dos huesos, se halla el *conducto pterigopalatino*, para el nervio del mismo nombre); su cara inferior forma parte de la pared externa de las fosas nasales.

3.º Conformación interior.—Está formado casi exclusivamente de tejido compacto; sólo la apófisis piramidal contiene tejido esponjoso.

6.º *Cornete inferior*

Hueso par, situado en la parte inferior de las fosas nasales. Se le consideran *dos caras, dos bordes y dos extremidades*

1.º **Caras.** - Se dividen en interna y externa. La *cara interna*, convexa, mira a tabique de las fosas nasales. La *cara externa*, cóncava, mira a la pared externa de las fosas nasales. Entre la cara externa y esta pared se encuentra el *meato inferior*.

2.º **Bordes.** - Son uno superior y otro inferior. El *borde inferior* está libre dentro de la fosa nasal. El *borde superior* se fija en la pared externa de dicha fosa. Presenta tres prolongaciones, a saber: 1.º la *apófisis lagrimal* o *nasal*, que completa por abajo el conducto nasal; 2.º la *apófisis maxilar* o *articular*, de dirección descendente, que se aplica contra la pared inferior del orificio del seno maxilar, estrechándolo; 3.º la *apófisis etmoidal*, situada por detrás de la anterior, que se continúa con la apófisis unciforme del etmoides.

3.º **Extremidades.** - Una es anterior y otra posterior. La *extremidad anterior*, en forma de punta, se articula con el maxilar superior. La *extremidad posterior*, que termina también en punta, pero más afilada que la anterior, se articula con la porción vertical del palatino.

4.º **Conformación interior.** - Está formada exclusivamente de tejido compacto.

7.º *Vómer*

Hueso impar, medio, que constituye la parte posterior del tabique de las fosas nasales. Es una lámina cuadrilátera, muy delgada, que presenta *dos caras y dos bordes*.

1.º **Caras.** - En número de dos, una a la derecha y otra a la izquierda, son más o menos planas y tienen algunos surcos (para vasos y nervios).

2.º **Bordes.** - Son en número de cuatro: anterior, posterior, superior e inferior. El *borde posterior*, delgado y cortante, separa uno de otro los dos orificios posteriores de las fosas nasales. El *borde inferior*, también muy delgado, descansa sobre la sutura media, formada por las apófisis palatinas del maxilar superior y por las

porciones horizontales de los palatinos. El *borde anterior*, dirigido oblicuamente hacia abajo y adelante, se une por arriba con la lámina vertical del etmoides y, por abajo, con el cartilago del tabique. El *borde superior* presenta un canal anteroposterior, cuyos dos labios, muy inclinados hacia fuera, constituyen las *alas del vómer*. Se articula con la cresta media que existe en la cara inferior del cuerpo del esfenoides, el *canal esfenovomeriano*.

3.º Conformación interior.—El vómer está formado por una sola lámina de tejido compacto, que resulta de la fusión, en la línea media, de dos láminas óseas primitivas.

3.º *Maxilar inferior*

Hueso impar, medio, simétrico, situado en la parte inferior de la cara, forma por sí solo la mandíbula inferior. Se divide en dos partes: una parte media o *cuerpo* y dos partes laterales o *ramas*.

1.º Cuerpo.—Tiene forma de herradura con la concavidad dirigida hacia atrás. Se estudian en él una cara anterior, otra posterior, un borde superior y otro inferior.

a) *Cara anterior.*—Presenta: 1.º, en la línea media, la *sinfisis mentoniana*, que termina, en su parte inferior, con una pequeña eminencia piramidal llamada *eminencia mentoniana*; 2.º, a la derecha e izquierda de la sínfisis, una línea ascendente, la *línea oblicua externa* (va de la eminencia mentoniana al borde anterior de la rama); 3.º, un poco encima de esta línea, a nivel del segundo premolar, el *agujero mentoniano*, por el cual pasan el nervio y los vasos mentonianos.

b) *Cara posterior.*—Presenta a su vez: 1.º, en la línea media, cuatro eminencias dispuestas dos a dos, las *apófisis geni* (las dos superiores para los genioglosos y las dos inferiores para los genihioideos); 2.º, una línea oblicuamente ascendente, la *línea oblicua interna* o *mioloidea*; 3.º, por encima de esta línea y un poco por fuera de las apófisis geni, la *fosita sublingual* (para la glándula del mismo nombre); 4.º, por debajo de esta misma línea y a nivel de los dos o tres últimos molares, la *fosita submaxilar* (para las glándulas del mismo nombre).

c) *Borde superior o alveolar.*—Está ocupado por las cavidades *alveolodentarias* (para la implantación de los dientes).

d) *Borde inferior.*—Redondeado y obtuso, presenta en su parte interna, inmediatamente por fuera de la sínfisis, la *fosita digástrica*

(para el músculo del mismo nombre). En su parte externa, lugar donde comienzan las ramas, se encuentra ordinariamente un pequeño canal, por el cual pasa la arteria facial.

2.ª **Ramas.**—Son cuadriláteras, más anchas que altas, y están oblicuamente dirigidas de abajo arriba y de delante atrás. Cada una de ellas presenta dos caras y cuatro bordes.

A **CARAS.**—De las dos caras, una es externa y la otra interna. La cara externa, plana, presenta (sobre todo en su parte inferior) líneas rugosas para el masetero. La cara interna presenta en su centro el orificio superior del conducto dentario (para el nervio y los vasos dentarios inferiores). En el borde de este orificio, por delante y debajo del mismo, se encuentra una laminilla ósea triangular, la *espinas de Spix*. De la parte posteroinferior de este orificio parte un canal oblicuamente descendente, el canal *milohioideo* (para el nervio y los vasos milohioideos). Toda la parte inferior de esta cara está sembrada de verrugosidades para la inserción del pterigoideo interno.

B. **BORDES.**—Dividense en anterior, posterior, superior e inferior. El *borde anterior* es cóncavo, formando canal. El *borde posterior*, ligeramente encorvado en forma de *S itálica*, redondeado y obtuso, está en relación con la parótida (borde parotídeo). El *borde superior* presenta, en su parte media, una gran escotadura, la escotadura sigmoidea, por la cual pasan el nervio y los vasos masetéricos. Por delante de esta escotadura se levanta una eminencia laminar en forma de triángulo, llamada *apófisis coronoides* (para el músculo temporal). Por detrás de la escotadura sigmoidea se encuentra una segunda eminencia, el *cóndilo del maxilar*; es elipsoide, aplanado de delante atrás, y con su eje mayor dirigido oblicuamente de fuera adentro y de delante atrás; está sostenido por una porción más estrecha, el *cuello*, en cuyo lado interno se encuentra una *depresión rugosa* para el pterigoideo externo. El *borde inferior* se continúa directamente con el borde inferior del cuerpo. El punto saliente en que encuentra, por detrás, el borde posterior de la rama, constituye el *ángulo del maxilar* o *ángulo mandibular* (*gonio* de los antropólogos). Mide de 150 a 160° en el recién nacido, de 115 a 125° en el adulto, y de 130 a 140° en los ancianos (por la falta de los dientes).

3.ª **Conformación interior.**—*Conducto dentario inferior*—El maxilar inferior está constituido por una masa central de tejido esponjoso, circunscrita en toda su extensión por una cubierta muy gruesa y resistente de tejido compacto. Recorre cada una de sus mitades

un conducto, el *conducto dentario inferior*, que comienza en la espina de Spix, se dirige oblicuamente hacia abajo y adelante hasta el segundo premolar, dividiéndose en este punto en dos ramas, una externa (*conducto mentoniano*), que termina en el agujero mentoniano, y otra interna (*conducto incisivo*), que termina debajo de los incisivos.

2. CARA EN GENERAL

El conglomerado óseo de la cara puede considerarse como un prisma triangular, cuyas dos bases son laterales y cuyas tres caras son, una superior, otra anterior y la tercera posterior.

1.º **Bases.**—Las dos bases (bases laterales) están constituidas por la cara externa del hueso malar, la porción posterior del reborde alveolar del maxilar superior y la cara externa de la rama del maxilar inferior. Se encuentran en ellas: 1.º, el *agujero malar*, que se abre en la cara externa del hueso del mismo nombre, 2.º, la *escotadura sigmoides* del maxilar inferior, con el *arco cigomático* por encima y limitada por delante por las *apófisis coronoides* y por detrás por el *cóndilo*, 3.º, las *tres suturas* que unen el hueso malar con sus límites.

2.º **Cara anterior.**—Limitada, *por arriba*, por una línea transversal que pasaría por las dos suturas frontomalares, tiene por límite, *por abajo*, el borde inferior del cuerpo del maxilar inferior. Presenta:

a) En la *línea media*, siguiendo de arriba abajo. 1.º, la *articulación nasofrontal*; 2.º, la *sutura medionasal*; 3.º, el *orificio anterior de las fosas nasales*; 4.º, la *sutura bimaxilar*; 5.º, la *sinfisis mentoniana*, que termina por abajo en la *eminencia mentoniana*.

b) A cada lado de la *línea media*, y siguiendo también de arriba abajo. 1.º, la cara externa del hueso nasal; 2.º, la cara externa de la *apófisis ascendente* del maxilar superior. 3.º, la base de la órbita; 4.º, el *agujero suborbitario* (para el nervio del mismo nombre); 5.º, la *fosa canina*, la *eminencia canina* y la *fosa mirliforme*, 6.º, los dos *bordes alveolares*, con los dientes; 7.º, la cara externa del maxilar inferior, con la *línea oblicua externa* y el *agujero mentoniano* (para el nervio y los vasos mentonianos).

3.º **Cara superior.**—Está en relación con la base del cráneo. Está formada, en la *línea media*, por la articulación del vómer, primero con la lámina perpendicular del etmoides y luego con la cresta

inferior del esfenoides. En los lados forma la parte más elevada de las fosas nasales por dentro, y por fuera el suelo de la órbita.

4.º Cara posterior. Representa una vasta cavidad que se encuentra circunscrita: 1.º, por detrás, por una línea convencional que pasa por las dos cavidades glenoideas; 2.º, en su restante contorno, por el borde inferior del cuerpo del maxilar y el borde posterior de su rama. En ella encontramos.

a) En la línea media, siguiendo de atrás adelante: el borde posterior del vómer, la *espina nasal posterior*, la *sutura mediopalatina*, el *conducto palatino anterior* y la *sinfisis mentoniana* (con sus cuatro *apófisis geni*).

β) En los lados, y siguiendo la misma dirección: los *orificios posteriores de las fosas nasales o coanas*, la mitad correspondiente de la bóveda palatina, los dos rebordes alveolares con sus dientes y, por último, la cara posterior del maxilar (con el *orificio superior del conducto dentario*, la *espina de Spix*, el *canal milohioideo*, la *línea oblicua interna* y las *tres fositas submaxilar, sublingual y digástrica*).

ARTÍCULO III

REGIONES COMUNES AL CRÁNEO Y A LA CARA

Uniéndose entre sí, el cráneo y la cara forman un número determinado de regiones comunes. Estas son: la *órbita*, las *fosas nasales*, la *fosa pterigodea*, la *fosa cigomática*, la *fosa pterigomaxilar* y la *bóveda palatina*.

1.º Órbita. — Las órbitas son cavidades excavadas entre la cara y el cráneo a derecha e izquierda de la línea media. Tienen la forma de una pirámide cuadrangular, de base anterior, cuyo eje se dirige oblicuamente de delante atrás y de fuera adentro. La profundidad de la órbita varía de 42 a 50 milímetros. La amplitud de la base es, por término medio, de 40 milímetros, y su altura, de 35. En la órbita se estudian una base, un vértice, cuatro paredes y cuatro ángulos.

a) *Base*. — De forma cuadrilátera y ángulos redondeados, en su contorno o reborde orbitario se hallan: 1.º, por arriba, la *escotadura supraorbitaria* (muchas veces convertida en agujero); 2.º, por abajo, el *conducto* y el *agujero suborbitario*; 3.º, por arriba y adentro, la *fosa troclear*, para la polea del oblicuo mayor.

b) *Vértice*. — Corresponde a la porción más interna y ancha de la hendidura esfenoidal. En él se encuentra un pequeño tubérculo óseo para el anillo de Zinn.

c) *Paredes*. — Se distinguen en superior, inferior, interna y externa. La *pared superior* o *bóveda*, cóncava, está formada por el frontal y el ala menor del esfenoides. En su parte anteroexterna se encuentra la *fosita lagrimal*. La *pared inferior* o *suelo* descansa sobre el seno maxilar. Está formada por el maxilar superior, la apófisis orbitaria del malar, y en su parte más posterior, por la carilla orbitaria del palatino. En ella se encuentra el *canal suborbitario* (para el nervio maxilar superior). La *pared externa*, plana, está formada por el ala mayor del esfenoides, la apófisis orbitaria del malar y la parte más externa del frontal. La *pared interna*, también plana, está formada por la apófisis ascendente del maxilar, el unguis, el hueso plano del etmoides y el cuerpo del esfenoides. En su parte anterior se encuentra el *canal lacrimonasal* (que contiene en su interior el saco lagrimal), que se continúa por abajo con el *conducto nasal*.

d) *Bordes o ángulos*. — Son en número de cuatro y están situados en los puntos de contacto de las cuatro caras. El *borde superoexterno* se confunde por delante con la fosita lagrimal y por detrás, con la hendidura esfenoidal. El *borde superointerno* presenta: 1.º, a lo largo de la sutura frontoetmoidal, los dos *conductos etmoidales u orbitarios internos*, excavados entre el frontal y el etmoides (el anterior para la arteria etmoidal anterior y el filete etmoidal del nervio nasal, el posterior para la arteria etmoidal posterior y un pequeño filete nervioso); 2.º, muy hacia atrás, el *agujero óptico* (para el nervio óptico y la arteria oftálmica). El *borde inferointerno* es obtuso y está casi borrado. El *borde inferoexterno* se confunde, por detrás, con la hendidura esfenomaxilar.

2.º **Fosas nasales**. — Largos corredores, aplanados, transversalmente situados a derecha e izquierda de la línea media. Cada uno de ellos presenta *cuatro paredes* y *dos aberturas*, una anterior y otra posterior.

a) *Paredes*. — Se distinguen en superior, inferior, interna y externa. La *pared superior* o *bóveda* está representada por un canal estrecho y muy curvo, cuya concavidad se dirige hacia abajo. Está formada por los huesos de la nariz, la espina nasal del frontal, la lámina cribosa del etmoides y el cuerpo del esfenoides. En ella se encuentra el *conducto pterigopalatino* (para el nervio del mismo nom-

bre) La *pared inferior* o *suelo*, plana en sentido anteroposterior y cóncava transversalmente está formada por el maxilar superior y el palatino. En su parte anterior se encuentra el *conducto palatino anterior* (dispuesto en V o Y). La *pared interna*, situada en el plano medio más o menos inclinada lateralmente, está formada por la lámina vertical del etmoides y por el vómer. La *pared externa*, dirigida oblicuamente hacia abajo y afuera, está formada por seis huesos: maxilar superior, unguis, etmoides, esfenoides, palatino y cornete inferior. Presenta *tres cornetes* (superior, medio e inferior) y *tres meatos* (superior, medio e inferior). En esta pared se encuentran numerosos orificios, a saber: 1.º, detrás del meato superior, el *orificio del seno esfenoidal* y el *agujero esfenopalatino*; 2.º, en el meato superior, el *orificio de las células etmoidales posteriores*; 3.º, en el meato medio, el *orificio del seno maxilar*, el del *infundibulum* y el de las *células etmoidales anteriores*; 4.º, en el meato inferior, el *orificio inferior del conducto nasal*.

b) *Abertura anterior*.—Común a las dos fosas nasales, tiene la forma de un corazón de naipe francés, cuya base está dirigida hacia abajo. Está circunscrita por los dos maxilares y los nasales. Por delante se ve la *espinas nasal anterior*.

c) *Abertura posterior o coana*.—Es cuadrilátera y más alta que ancha. Está formada: por arriba, por el cuerpo del esfenoides; por abajo, por el palatino; por dentro, por el vómer, por fuera, por el ala interna de la apófisis pterigoides. El plano de esta abertura está dirigido oblicuamente de arriba abajo y de atrás adelante.

3.º *Fosa pterigoidea*.—Situada en la cara posterior de la apófisis pterigoides, se forma con esta apófisis (en su parte más inferior) y la piramidal del palatino. Prolongada verticalmente, sirve de punto de inserción al pterigoideo interno. En su parte superior e interna se ve la *fosita navicular*, para el periestafilino externo.

4.º *Fosa cigomática*.—Se designa con este nombre el espacio situado por debajo del arco cigomático, entre la apófisis pterigoides y la rama del maxilar inferior. Está limitada: 1.º, *por arriba*, por la superficie rugosa comprendida entre la apófisis pterigoides y la cresta esfenotemporal; 2.º, *por fuera*, por el malar y el maxilar inferior; 3.º, *por delante*, por la tuberosidad del maxilar; 4.º, *por dentro*, por la apófisis pterigoides y la hendidura que conduce a la región siguiente. La fosa cigomática comunica con la fosa temporal y con la órbita (por la hendidura esfenomaxilar).

5.° Fosa pterigomaxilar. — Pequeña región situada por dentro de la fosa cigomática, que tiene la forma de una pirámide cuadrangular, con *cuatro paredes*, una *base* y un *vértice*.

a) *Paredes* — Se distinguen en: 1.°, *anterior*, formada por la tuberosidad del maxilar; 2.°, *posterior*, constituida por la apófisis pterigoides; 3.°, *interna*, que corresponde a la porción vertical del palatino y separa la región de la fosa nasal correspondiente; 4.°, *externa*, reemplazada por una hendidura que hace comunicar esta región con la fosa cigomática.

b) *Vértice*. — Dirigido hacia abajo, está formado por la unión de las dos paredes anterior y posterior.

c) *Base*. — Dirigida hacia arriba, está constituida por el ala mayor del esfenoides.

d) *Orificios de comunicación con las regiones vecinas*. — Son muy numerosos. 1.°, *agujero redondo mayor* (para el nervio maxilar superior); 2.°, *hendidura esfenomaxilar*; 3.°, *agujero esfenopalatino*, formado por la escotadura palatina y el cuerpo del esfenoides (para la arteria y el nervio del mismo nombre). 4.°, *conducto vidiano* (para el nervio del mismo nombre); 5.°, *conducto palatino posterior* y *conductos palatinos accesorios* (para los tres nervios palatinos anterior, medio y posterior); 6.°, *agujeros dentarios posteriores* (para los nervios del mismo nombre).

6.° Bóveda palatina. — Región en forma de herradura, circunscrita: 1.°, *por detrás*, por el borde posterior de la porción horizontal del palatino; 2.°, *por delante y a los lados*, por el borde alveolar del maxilar superior. Está formada por la apófisis palatina de los dos maxilares superiores y la porción horizontal de los dos palatinos (*sutura en cruz*), que une los cuatro huesos precitados. Son de notar: 1.°, *por delante*, el orificio único de los dos *conductos palatinos anteriores*; 2.°, *por detrás y a los lados*, el *conducto palatino posterior* y sus dos *conductos accesorios*.

ARTÍCULO IV

HUESO HIÓIDES

Hueso impar, medio, simétrico, situado en la parte anterior del cuello. Convexo por delante, cóncavo por detrás, adopta la forma de una U mayúscula. Se le consideran un *cuerpo* y cuatro *prolongaciones* o *astas*.

1.º **Cuerpo.** — El cuerpo representa un segmento de elipse, con su eje mayor dirigido transversalmente. Presenta dos caras, dos bordes y dos extremidades:

a) *Caras.* — Son una anterior y otra posterior. La *cara posterior* es muy excavada (corresponde a la membrana tirohioidea, de la cual está separada por la bolsa serosa de Boyer). La *cara anterior*, muy convexa, está dividida por una cresta transversal en dos partes: una parte superior, dirigida hacia arriba, y otra inferior, dirigida hacia delante. Cada una de estas partes se encuentra subdividida a su vez en dos carillas laterales por una cresta media más o menos acentuada. En esta cara se insertan el digástrico, el estilohioideo, el milohioideo, el genihioideo y el hiogloso.

b) *Bordes.* — De los dos bordes, el *superior*, muy delgado, sirve de punto de inserción a la membrana hioglosa; el *inferior*, también muy delgado, corresponde a los músculos tirohioideos.

c) *Extremidades.* — Dirigidas hacia fuera, sirven de base de implantación, a uno y otro lado, a las astas mayores y menores.

2.º **Astas.** — Se dividen en mayores y menores:

a) Las *astas mayores* se dirigen horizontalmente hacia fuera y atrás describiendo una curva de concavidad posterior: la *cara superior*, para los músculos hiogloso y constrictor medio de la faringe; la *cara inferior*, para la membrana tirohioidea; una *base*, articulada con el cuerpo; un *vértice*, libre, más o menos abultado, para la inserción del ligamento tirohioideo lateral.

β) Las *astas menores* se separan, como las precedentes, de las extremidades del hioides. Tienen la forma de dos granos de cebada dirigidos oblicuamente de abajo arriba, de dentro afuera y de delante atrás. Presentan: 1.º un *cuerpo*, para la inserción de los músculos, 2.º, una *base*, que corresponde a la extremidad del hioides; 3.º, un *vértice*, para el ligamento estilohioideo.

3.º **Conformación interior.** — El hioides está compuesto casi exclusivamente de tejido compacto. Únicamente se encuentra una pequeña cantidad de tejido esponjoso en las partes más gruesas del cuerpo y de las astas mayores.

CAPITULO IV

MIEMBROS

Los miembros o extremidades son largos apéndices anexos al tronco y destinados a ejecutar todos los grandes movimientos, y en particular la locomoción y la prensión. Son en número de cuatro y están simétricamente dispuestos a cada lado de la línea media, se distinguen en *miembros superiores*, o *torácicos*, y *miembros inferiores*, o *pelvianos*.

ARTÍCULO PRIMERO

MIEMBRO SUPERIOR O TORACICO

El miembro superior o torácico está formado por cuatro segmentos, que son, siguiendo desde la raíz del miembro a su extremo libre: 1.º, *hombro*, 2.º, *brazo*, 3.º, *antebrazo*; 4.º *mano*.

1. HUESOS DEL HOMBRO

El hombro (cintura escapular) está constituido, en el hombre, por dos huesos: 1.º, la *clavícula*, por delante; 2.º, el *omóplato*, por detrás.

1.º *Clavícula*

Hueso largo, par, situado transversalmente entre el mango del esternón y el omóplato. Entorvado en forma de S itálica, presenta dos curvaturas: una interna, de concavidad posterior, y otra externa, de concavidad anterior. Se le consideran dos caras, dos bordes y dos extremidades.

1.º *Caras*. — Son una superior y otra inferior. La *cara superior*, casi plana en su tercio externo, es convexa de delante atrás en sus dos tercios internos. Es lisa y uniforme en su parte media; en sus partes

externa e interna presenta algunas rugosidades para el esternocleido mastoideo, el deltoides y el trapecio. La *cara inferior* es mucho más accidentada. En ella encontramos, siguiendo de dentro afuera: 1.º, muy cerca de la extremidad interna, una primera *superficie rugosa*, para la inserción del ligamento costoclavicular; 2.º, un *canal longitudinal*, para el subclavio; 3.º, una segunda *superficie rugosa*, para los dos ligamentos conoide y trapecoide.

2º **Bordes.** — De los dos bordes (los dos sinuosos y en forma de S itálica), el *anterior*, obtuso y más o menos redondeado, presta inserción, por dentro, al pectoral mayor y por fuera, al deltoides, el *posterior*, más delgado, presta inserción, por dentro, al esternocleidomastoideo, y por fuera, al trapecio.

3º **Extremidades** — Se distinguen en interna y externa. La *extremidad interna o esternal*, muy voluminosa, termina junto al esternón con una carilla articular, cuyo contorno, muy variable según los individuos, puede presentar la forma de un cuadrado, de un triángulo o de un óvalo (en su parte posterior se inserta el haz clavicular del esternocleidomastoideo). La *extremidad externa o acromial*, muy aplanada de arriba abajo y prolongada de delante atrás, termina por fuera con una pequeña carilla ovalada, con el eje mayor dirigido de delante atrás, que se articula con el acromion.

4º **Conformación interior.** — La clavícula presenta, como todos los huesos largos, un conducto medular, pero solamente ocupa el tercio medio del hueso. Sus dos extremidades están constituidas, en gran parte, por tejido esponjoso.

2º Omóplato

El omóplato o escápula es un hueso par. plano y muy delgado, de forma triangular en el cual deben estudiarse una cara posterior y otra anterior, tres bordes y tres ángulos.

1º **Cara posterior.** — Muy convexa, presenta, en la unión de su cuarto superior con los tres cuartos inferiores, una eminencia aplanada, de forma triangular, llamada *espiná del omóplato*. Por dentro, esta espina se confunde con el borde interno del hueso, por fuera, termina con una apófisis voluminosa, aplanada de arriba abajo, llamada *acromion* (en su borde interno se encuentra una pequeña carilla

oval para la clavícula). La espina divide esta cara posterior en dos partes, una, situada por encima, llamada *fosa supraespinosa* (para el músculo supraespinoso); otra situada por debajo, denominada *fosa infraespinosa* (para el músculo infraespinoso). Es de notar que las dos fosas comunican entre sí, en su parte externa, entre la espina y la cavidad glenoidea.

2.º **Cara anterior.**— Profundamente excavada, constituye la *fosa subescapular* (para el músculo del mismo nombre: tiene dos o tres crestas oblicuas para la inserción de este músculo). Está limitada por fuera por un canal longitudinal, al que se insertan los haces axilares del músculo subescapular.

3.º **Bordes.**— Se distinguen en interno superior y externo. El *borde interno o espinal* es casi rectilíneo en sus tres cuartos inferiores y oblicuamente dirigido hacia fuera en su cuarto superior. Presta inserción: 1.º, en su labio posterior a los músculos supra e infraespinosos; 2.º en su labio interno, al músculo serrato mayor; 3.º, en su intersticio, al angular y al romboides. El *borde superior*, delgado y cortante, termina hacia fuera con una escotadura, llamada *escotadura coracoidea*. El *borde externo o axilar*, también muy delgado, termina por arriba con una carilla triangular, rugosa, llamada *cara subglenoidea* (para la porción larga del tríceps braquial).

4.º **Ángulos.**— Se distinguen en superior, inferior y anterior. El *ángulo superior*, más o menos recto, presta inserción al angular. El *ángulo inferior* es redondeado. En él se insertan los músculos subescapular, redondo mayor y serrato mayor (a veces un fascículo supernumerario del dorsal ancho). El *ángulo anterior*, truncado, está ocupado por la *cavidad glenoidea*, que es oval; tiene su eje mayor dirigido en sentido vertical y su extremo más ancho en la parte inferior. Está unida al cuerpo del omóplato por una parte más estrecha, llamada *cuello*. Por encima de la cavidad glenoidea, entre ella y la escotadura coracoidea se levanta una gran apófisis, llamada *apófisis coracoides*. Se dirige primero hacia arriba y adelante y luego casi horizontalmente hacia fuera. Se describen en ella: una *base*, un *vértice* (para los tendones comunes del bíceps y del coracobraquial), una *cara superior* (rugosidades para los ligamentos coracoclaviculares), una *cara inferior*, un *borde externo* (para el ligamento acromiocracóideo) y un *borde interno* (para el pectoral menor).

5.° Conformación interior. Consta casi exclusivamente de tejido compacto. Tejido esponjoso, en cantidad variable, en las apófisis acromial y coracoidea, a nivel de la espina del ángulo anterior.

2 HUESO DEL BRAZO O HÚMERO

Hueso largo, par, no simétrico, presenta, como todos los huesos largos, un cuerpo y dos extremidades (superior e inferior).

1.° Cuerpo.—Casi rectilíneo, parece retorcido sobre su eje. Irregularmente cilíndrico en su parte superior, es prismático triangular en su mitad inferior. De aquí que presente tres caras y tres bordes.

A. CARAS.—Se distinguen en externa, interna y posterior. La *cara externa* presenta, un poco por encima de su parte media, la *impresión deltoidea* o *V deltoidea* (para el deltoides en su labio superior, y el braquial anterior en su labio inferior). La *cara interna* es, por lo general, lisa, excepto en su tercio superior, en el cual se ve una impresión rugosa para el coracobraquial; en su parte media, el *agujero nutricio* del hueso. La *cara posterior* es recorrida por un canal oblicuo hacia abajo y afuera, llamado *canal de torsión* (para el nervio radial y la arteria humeral profunda). Por encima del canal se inserta el vasto externo; por debajo, el vasto interno.

B. BORDES.—Se distinguen en anterior, externo e interno. El *borde anterior* (*línea áspera*), rugoso por arriba, obtuso y redondeado por abajo, se bifurca en su parte inferior para englobar la cavidad coronoides. El *borde externo* y el *borde interno*, más acentuados por abajo que por arriba, sirven de inserción a los dos tabiques intermusculares. El externo está interrumpido por el paso del canal de torsión.

2.° Extremidad superior.—El húmero termina por arriba con una superficie articular, redondeada y lisa, la *cabeza del húmero*; representa una tercera parte de esfera, está dirigida hacia arriba, adentro y un poco atrás, y es ligeramente aplanada de atrás adelante. Está sostenida por una porción rugosa y más o menos estrecha, llamada *cuello anatómico*. Por fuera de la mitad superior del cuello anatómico se ven dos eminencias: por delante, el *troquín* (para el subescapular); por detrás, el *troquíter*, con sus tres carillas (para los músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor). Entre el troquín y el troquíter se encuentra un canal vertical, llamado *corredera bicipital* (para la porción larga del bíceps), con sus dos labios anterior (para el pectoral mayor) y posterior (para el dorsal ancho y el redondo

mayor) Es de notar que esta corredora desciende hasta la cara interna del hueso. La extremidad superior del húmero está unida al cuerpo por una parte ma. limitada, llamada *cuello quirúrgico*.

3.º **Extremidad inferior.** — Aplanada de delante atrás, relativamente ancha, se encorva ligeramente de atrás adelante. Presenta una superficie articular, fositas y eminencias supraarticulares.

a) La *superficie articular* (para los dos huesos del antebrazo) se compone de dos partes: 1.º, una parte externa semiesférica, algo aplanada transversalmente, que mira directamente adelante, y constituye el *cóndilo o cabeza pequeña del húmero*; 2.º, una parte interna, que tiene forma de polea, llamada *tróclea humeral*, con dos bordes y una garganta. Debe notarse que la tróclea sólo está interrumpida en su parte superior, que su borde externo desciende más abajo que el interno y que su garganta no es exactamente paralela al plano medio, sino que se dirige oblicuamente de abajo arriba y de dentro afuera.

β) Las *fositas supraarticulares* son en número de tres: 1.º, en el plano anterior del hueso, la *fosita condílea* por encima del cóndilo (para alojar la cúpula radial) y la *fosita coronoides* por encima de la tróclea (para la apófisis coronoides del cúbito); 2.º, en el plano posterior, la *fosita olecraniana* por encima de la tróclea (para la extremidad libre del olécranon)

γ) Las *eminencias supraarticulares* son en número de dos: una externa, el *epicóndilo*, para el ligamento lateral externo y los seis músculos llamados *epicóndíleos* (segundo radial externo, supinador corto, extensor común de los dedos, extensor propio del dedo meñique, cubital posterior y anconeó); otra interna, la *epitróclea*, para el ligamento lateral interno y los cinco músculos llamados *epitrocleares* (pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, cubita. anterior y flexor superficial de los dedos)

4.º **Conformación interior.** — Tejido esponjoso en los dos extremos, tejido compacto en la parte media. Conducto medular en toda la extensión del cuerpo, ensanchándose progresivamente a medida que se aproxima a la epífisis.

3. HUESOS DEL ANTEBRAZO

El antebrazo está constituido por dos huesos dispuestos paralelamente entre sí en el sentido de la longitud del miembro: 1.º, el *cúbito*, por dentro; 2.º, el *radio*, por fuera.

1.º *Cubito*

Hueso largo, par, no simétrico, encorvado ligeramente por delante en su extremo superior, e inclinado hacia fuera en su extremo inferior para acercarse al radio. Se estudian en él un cuerpo y dos extremidades: una superior y otra inferior.

1.º **Cuerpo.** — Su volumen disminuye de arriba abajo. Es prismático triangular y presenta *tres caras y tres bordes*.

A. CARAS. — Se distinguen en anterior, posterior e interna. La *cara anterior* está excavada en canal en su parte superior (para el flexor profundo de los dedos) y plana en su parte inferior (para el pronador cuadrado). En esta cara se encuentra el *agujero nutritivo*. La *cara posterior* presenta: 1.º, en su parte superior, una superficie triangular (para el anócone); 2.º, en su parte inferior, una cresta longitudinal, que divide esta cara en una parte interna ligeramente excavada (para el cubital posterior) y una parte externa muy rugosa (para los cuatro músculos de la región profunda del antebrazo). La *cara interna* presta inserción, por arriba, a algunos haces del flexor profundo de los dedos, que la cubren.

B. BORDES. — Son anterior, posterior y externo. El *borde anterior* presta inserción, por arriba, al flexor profundo de los dedos, por abajo, al pronador cuadrado. El *borde posterior*, en forma de S itálica, nace en su parte superior de dos ramas divergentes, que proceden del olécranon. Termina por abajo hacia el cuarto inferior del hueso. El *borde externo*, obtuso por abajo, cortante en el resto de su extensión, presta inserción al ligamento interóseo. Es de notar que en su parte superior se divide en dos ramas, que van a parar a los dos extremos de la cavidad sigmoidea menor: entre estas dos ramas se encuentra una pequeña superficie rugosa (para el supinador corto).

2.º **Extremidad superior.** — Muy voluminosa, presenta a primera vista, cuando se examina por su cara anterior, una cavidad articular para la tróclea humeral: la *cavidad sigmoidea mayor*, en forma de media luna, con una eminencia longitudinal y dos vertientes, una externa y otra interna.

a) *Por detrás*, una eminencia voluminosa, el olécranon, con: una base inferior; un vértice o pico dirigido hacia arriba; una cara anterior, articular, que constituye la parte superior de la cavidad sigmoidea mayor; una cara posterior, erizada de rugosidades en su

parte inferior (para el tríceps), dos bordes, uno interno (para los ligamentos) y otro externo (para los fascículos superiores del anconeó).

B) Por delante, otra eminencia más pequeña, llamada *apófisis coronoides*, con: una base; un vértice o *pico*, dirigido hacia delante; una cara superior, articular, que constituye la parte inferior de la cavidad sigmoidea mayor; una cara inferior, rugosa (para el braquial anterior); dos bordes, uno interno y otro externo (para los ligamentos). En la base de la apófisis coronoides se encuentra el *tubérculo subcoronoideo* (para el ligamento de Weithrecht).

γ) En el lado externo del extremo superior se ve una pequeña carilla articular prolongada de delante atrás, es la *cavidad sigmoidea menor* (para el perimetro de la cúpula del radio). Por arriba se continúa en la cavidad sigmoidea mayor.

3.º **Extremidad inferior.**—Tiene por elemento principal un pequeño abultamiento más o menos esférico, llamado *cabeza del cúbito*, articular en su parte externa y en su parte inferior (para la cavidad sigmoidea del radio). Por dentro de la cabeza se encuentra una apófisis, llamada *apófisis estiloides*, de dirección vertical, de forma cilíndrica, con su base superior y vértice inferior (para los ligamentos).

4.º **Conformación interior.**—Tejido compacto en el cuerpo, esponjoso en las extremidades. El conducto medular llega, por arriba, hasta la base de la apófisis coronoides, y por abajo se detiene en el cuarto inferior.

2.º Radio

Hueso largo, par, no simétrico, situado por fuera del cúbito. Presenta, como este último, un cuerpo, una extremidad superior y una extremidad inferior.

1.º **Cuerpo.**—Su volumen disminuye de abajo arriba (al revés de lo que ocurre en el cúbito). Prismático triangular, presenta como tal tres caras y tres bordes.

A. CARAS.—Son: anterior, posterior y externa. La *cara anterior*, casi plana, presta inserción, por arriba, al flexor propio del pulgar, por abajo, al pronador cuadrado. En esta cara se encuentra el *agujero nutricio*. La *cara posterior* es redondeada en su tercio superior (que está cubierto con el supinador corto) y ligeramente excavada en su restante extensión (para el abductor largo y el extensor corto del pulgar). La *cara externa* es convexa y redondeada. En su parte supe-

rior se inserta el supinador corto. En su parte media se encuentra una superficie rugosa para el pronador redondo.

B. BORDES — Se distinguen en anterior, posterior e interno. El *borde anterior* parte de la tuberosidad bicipital. Muy acentuado en su origen, va disminuyendo y borrándose insensiblemente. El *borde posterior* es delgado y está más o menos borrado. El *borde interno*, delgado, cortante, casi siempre cóncavo como el cuerpo del hueso, presta inserción al ligamento interóseo.

2.° Extremidad superior. — Presenta en su porción más alta una parte voluminosa y redondeada, llamada *cabeza del radio*. La constituye un segmento de cilindro de 20 a 22 milímetros de diámetro por 8 ó 10 milímetros de altura. Su cara inferior forma cuerpo con el hueso. Su cara superior, articular (para el cóndilo del húmero), está excavada en forma de cúpula. Esta excavación recibe el nombre de *cavidad glenoidea del radio*. Su contorno, que forma una circunferencia bastante regular, más alto por dentro que por fuera, es articular en sus tres cuartas partes internas (para la cavidad sigmoidea menor del cúbito). La cabeza del radio descansa sobre una porción más estrecha, de 10 a 12 milímetros de altura llamada *cuello*. Por debajo del cuello y en el lado anterointerno del hueso se levanta la *tuberosidad bicipital*, eminencia ovoidea, que tiene su eje mayor dirigido verticalmente (con sus dos raíces *superior* e *inferior*), lisa por delante, donde se encuentra una sinovial, y rugosa por detrás (para el tendón del bíceps).

3.° Extremidad inferior. Constituye la parte más voluminosa del hueso. Aplanada de delante atrás, de forma irregularmente cuboide, presenta seis caras, que son: superior e inferior, anterior y posterior, interna y externa. La *cara superior* se confunde con el cuerpo del hueso. La *cara inferior*, articular (para el carpo), tiene la forma de un triángulo de vértice dirigido hacia fuera. Una línea obtusa anteroposterior la divide en dos carillas: una externa, triangular (para el escafoides); otra interna, cuadrilátera (para el semilunar). Por fuera de esta cara se encuentra una apófisis, llamada *apófisis estiloides del radio*, dirigida verticalmente (en su base se inserta el supinador largo; en su vértice se fija el ligamento lateral externo de la articulación de la muñeca). La *cara anterior*, plana, corresponde al pronador cuadrado. La *cara posterior* presenta dos canales: uno interno (para los tendones del extensor propio del índice y del extensor común de los dedos) y otro externo (para el tendón del extensor largo del pul

gar) La *cara externa*, o mejor *posteroexterna*, está ocupada también por dos canales: uno interno, llamado *canal de los radiales* (para los tendones de los músculos primer radial externo y segundo radial externo), y otro externo (para los tendones de los músculos abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar). La *cara interna*, en su parte inferior, presenta una carilla articular, cóncava, en dirección anteroposterior: es la *cavidad sigmoides del radio*, destinada a articularse con la cabeza del cúbito.

4.º **Conformación interior.** Igual que en el radio, tejido compacto en el cuerpo y esponjoso en las extremidades. Conducto medular más estrecho en su parte media que en sus extremos, que llega por arriba hasta el cuello y por abajo se detiene en el cuarto inferior del cuerpo.

4. HUESOS DE LA MANO

La mano comprende veintisiete huesos distribuidos en tres grupos: 1.º, *huesos del carpo*; 2.º, *huesos del metacarpo*; 3.º, *huesos de los dedos*.

1.º **Huesos del carpo.**—El carpo está constituido por ocho pequeños huesos dispuestos en dos filas transversales. una *fila superior*, que comprende cuatro huesos, que son, siguiendo de fuera adentro, escafoides, semilunar piramidal y pisiforme, y una *fila inferior*, que comprende también cuatro huesos que son, siguiendo el mismo sentido, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Todos estos huesos son cuboideos teniendo cada uno seis caras, que se designan con los nombres de anterior, posterior, superior inferior, interna y externa; las dos primeras, más o menos rugosas, corresponden a las partes blandas de la cara palmar y de la cara dorsal, las otras cuatro (excepto en los huesos extremos de cada fila, que poseen una o varias carillas articulares menos) son articulares. Veamos las particularidades que presenta cada uno de estos huesos.

1.º **ESCAFÓIDES** — De sus seis caras, tres son articulares y tres no. Las tres carillas articulares son: la *cara superior*, convexa (para el radio); la *cara inferior*, convexa también (para el trapecio y el trapezoide), y la *cara interna*, subdividida en dos carillas superpuestas (para el semilunar y el hueso grande). Las tres caras no articulares son: la *cara externa*, con un gran tubérculo, llamado *tubérculo del escafoides* (para el ligamento lateral externo de la articulación de la

muñeca), la *cara anterior*, que se ensancha en su parte inferior, y la *cara posterior*, rugosa.

2.º SEMILUNAR. — Tiene la forma de media luna, con la concavidad dirigida hacia abajo. Cuatro caras *articulares*: la *superior* (para el radio); la *inferior*, cóncava (para el hueso grande y el ganchoso); la *externa*, plana (para el escafoides), y la *interna* (para el piramidal). Dos caras *no articulares*: la *anterior*, convexa, y la *posterior*, plana.

3.º PYRAMIDAL. — Tiene la forma de una pirámide cuya base estuviese dirigida arriba y afuera. Cuatro caras *articulares*: la *superior* (para el ligamento triangular de la articulación radiocubital inferior); la *inferior*, cóncava (para el hueso ganchoso), la *externa*, plana (para el semilunar), la *interna*, redondeada (para el pisiforme). Dos caras *no articulares*: la *anterior* y la *posterior*, esta última con una cresta transversal, llamada *cresta del piramidal*.

4.º PISIFORME. — Hueso pequeño que se ha comparado con un guisante, y por esto recibe este nombre. En su parte posterior se ve una carilla redondeada u oval, plana, ligeramente excavada (para el piramidal). Todas sus demás caras son más o menos convexas y rugosas (para los ligamentos y un músculo, el cubital anterior).

5.º TRAPECIO. — Tres caras articulares y tres no articulares. Las tres caras *articulares* son: la *superior*, triangular (para el escafoides); la *inferior*, en forma de silla de montar (para el primer metacarpiano), y la *interna* (a la vez para el trapezoide y el segundo metacarpiano). Las tres caras *no articulares* son: la *anterior* (con el *tubérculo del trapecio*, por dentro del cual se ve un canal para el tendón del palmar mayor); la *posterior*, rugosa, acribillada de agujeros, y la *externa*, cuadrilátera y rugosa (para los ligamentos).

6.º TRAPEZOIDE. — Cuatro caras articulares y dos no articulares. Las caras *articulares* son: la *superior* (para el escafoides), la *inferior* (para el segundo metacarpiano), la *externa* (para el trapecio) y la *interna* (para el hueso grande). Las caras *no articulares* son: la *anterior* y la *posterior*, ambas rugosas.

7.º HUESO GRANDE. — El más voluminoso de los huesos del carpo, el hueso grande, prolongado de arriba abajo, presenta una *cabeza*, un *cuello* y un *cuerpo*. Posee cuatro caras articulares y dos no articulares. Las caras *articulares* son: la *superior*, convexa (para la concavidad del semilunar), la *inferior*, dividida en tres carillas más o menos distintas (para los 1.º, 3.º y 4.º metacarpianos); la *externa*, subdividida en dos carillas (para el escafoides por arriba y el trapezoide por abajo), y la *interna* (para el hueso ganchoso). Las dos caras *no articulares*, *anterior*

y *posterior*, presentan, por arriba, un canal transversal que corresponde al cuello y por abajo, una superficie rugosa con agujeros vasculares. En la cara posterior, por abajo y afuera, se ve la *apófisis del hueso grande*, para el cuarto metacarpiano.

8.º **HUESO GANCHOSO.** — Es el último de la segunda fila. En su *cara anterior* se levanta una larga apófisis, la *apófisis unciforme*, en forma de gancho, en cuyo vértice se fija el ligamento anterior del carpo. Su *cara posterior* es rugosa. Su *cara superior*, articular (parece más bien un borde obtuso), para el semilunar. Su *cara inferior* posee dos carillas para los dos últimos metacarpianos. Su *cara externa* es articular (para el hueso grande). Su *cara interna*, articular también en casi toda su extensión (para el piramidal).

2.º **Huesos del metacarpo.** — El metacarpo está constituido por cinco huesos, llamados *metacarpianos*. Se designan con los nombres de 1.º, 2.º, 3.º etc., contando de fuera adentro.

A. **CARACTERES GENERALES.** — Son huesos largos, que presentan cada uno un cuerpo y dos extremidades, una superior y otra inferior.

a) *Cuerpo.* — Está ligeramente encorvado, de manera que resulta algo cóncavo por delante; es prismático, triangular, con tres caras y tres bordes (iguales su orientación y nombres que en el húmero). De las tres caras la *posterior*, lisa, corresponde a los tendones extensores de los dedos; en las *interna* y *externa* se insertan los interóseos. De los tres bordes uno es *anterior* y los otros dos *laterales*. De ordinario son poco acentuados.

b) *Extremidad superior.* — Presenta por lo general: 1.º, dos carillas *no articulares*, una *anterior* y otra *posterior* (esta última mayor que la primera); 2.º, tres carillas *articulares*, una *superior* (para el carpo) y las otras dos *laterales* (para los metacarpianos próximos).

c) *Extremidad inferior.* — Es una *cabeza articular*, aplanada en sentido transversal (para la primera falange de los dedos). En los lados, por dentro y por fuera, se encuentra una depresión rugosa, limitada por detrás por un *tubérculo grueso* (para el ligamento lateral de la articulación metacarpofalángica).

B. **CARACTERES DIFERENCIALES.** Los metacarpianos se distinguen entre sí por algunos caracteres particulares.

a) *Primer metacarpiano* no tiene carillas laterales (es el único que se encuentra en este caso); la carilla superior es convexa en un sentido y cóncava en otro (en forma de silla de montar); el cuerpo, muy aplanado, recuerda el de una falange.

b) *Segundo metacarpiano*: no tiene carilla lateral externa; la carilla superior está subdividida en tres carillas (para los tres primeros huesos de la segunda fila del carpo); por detrás y adentro presenta una apófisis llamada *apófisis estiloides* (para el primer radial externo).

c) *Tercer metacarpiano*: posee las tres carillas superior, interna y externa. Por detrás tiene también la *apófisis estiloides* (para el segundo radial externo).

d) *Cuarto metacarpiano*: posee, como los dos anteriores, las tres carillas típicas, pero carece de apófisis estiloides.

e) *Quinto metacarpiano*: tiene solamente dos carillas, la superior y la externa, y una *apófisis estiloides* (para el cubital posterior).

C. RESUMEN — Los caracteres diferenciales de los cinco metacarpianos pueden resumirse del modo siguiente:

a) Sin carilla articular lateral	1.º METACARPIANO
b) Una sola carilla articular lateral	2.º METACARPIANO
c) Dos carillas articulares laterales	3.º METACARPIANO
d) Sin apófisis estiloides	4.º METACARPIANO

3.º **Huesos de los dedos.** — Los dedos son apéndices muy móviles, articulados con los metacarpianos, cuya dirección continúan. En número de cinco, reciben los nombres de 1.º, 2.º, 3.º, etc., contando de fuera adentro, o bien de *pulgar*, *índice*, *medio*, *anular* y *auricular* o *meñique*. Cada dedo está constituido por tres columnitas óseas, llamadas *falanges*. Se designan con los nombres de 1.ª, 2.ª, 3.ª, contando de arriba abajo. Se las denomina también *falange*, *falangina* y *falangea*. Por excepción, el pulgar no tiene más que dos falanges.

A. PRIMERA FALANGE. Hueso largo, consta de un cuerpo, una extremidad superior y otra extremidad inferior. El *cuerpo*, ligeramente encorvado por delante, adopta la forma de medio cilindro, con una *cara anterior*, plana; una *cara posterior*, convexa, y dos *bordes laterales*, generalmente muy marcados. La *extremidad superior* posee una cavidad articular, *cavidad glenoidea*, más ancha en sentido transversal que en sentido anteroposterior (para la cabeza del metacarpiano). A cada lado se encuentran dos tubérculos (para ligamentos). La *extremidad inferior* tiene la forma de una polea o tróclea: la garganta es anteroposterior y hacia ella se inclinan dos carillas laterales. A cada lado se encuentran dos depresiones redondeadas para inserciones ligamentosas.

B. SEGUNDA FALANGE. — Lo mismo que la primera, tiene un cuerpo y dos extremidades. El *cuerpo* es como el de la primera falange, pero más corto. La *extremidad superior*, que corresponde a una tróclea, posee: 1.º, en su parte media, una cresta obtusa anteroposterior (para la garganta de la tróclea), 2.º, por dentro y por fuera, dos pequeñas cavidades glenoideas (para las partes laterales de la tróclea). A cada lado se encuentran dos tubérculos (para ligamentos laterales). La *extremidad inferior* es igual que la de la primera falange.

C. TERCERA FALANGE. La tercera falange o falange angular presenta también, a pesar de su pequeño tamaño, un cuerpo y dos extremidades. El *cuerpo* es rectilíneo, más ancho por arriba que por abajo. La *extremidad superior* es igual que la extremidad similar de la segunda. La *extremidad inferior* tiene la forma de una herradura. Lisa por detrás, por corresponder a la uña, es rugosa por delante, donde está en relación con el pulpejo del dedo.

ARTÍCULO II

MIEMBRO INFERIOR O PELVIANO

El miembro inferior o pelviano comprende, lo mismo que el superior, cuatro segmentos, que son, siguiendo de arriba abajo: 1.º, *cadera*; 2.º, *muslo*, 3.º, *pierna*, 4.º, *pie*.

I. HUESO DE LA CADERA, PELVIS

La cadera (cintura pélvica) está formada por un solo hueso, llamado *hueso coxal*, como también *hueso ilíaco* o *innominado*. Los dos huesos coxales, en unión del sacro, circunscriben un vasto recinto óseo, llamado *pelvis*.

1.º Hueso coxal

El *hueso coxal* se compone, en su estado primitivo, de tres piezas óseas: el *ilíon* por arriba, el *pubis* por delante y el *isquion* por abajo. Estas tres piezas, que se reúnen en el centro de la cavidad cotiloides, están íntimamente unidas en el adulto, formando un solo hueso, aplanado en el sentido transversal, de contorno cuadrilátero irregular, en el cual deben estudiarse: una *cara externa*, otra *interna*, cuatro *bor-*
des y cuatro *ángulos*.

1.º Cara externa. La cara externa presenta en su parte media una gran cavidad articular, llamada *cavidad cotiloidea* o *cotilo*. Tiene la forma de un esferoide hueco, circunscrito por un reborde articular llamado *cresta cotiloidea*. Este reborde, a cuya formación contribuyen a la vez las tres piezas primitivas del hueso coxal, presenta en los puntos de unión de aquellas piezas tres escotaduras, *ilíopúbica*, *ilíoisquiótica* e *isquiópúbica*; las dos primeras, por regla general, poco acentuadas, y la última siempre muy profunda.

El cotilo se divide en dos porciones: 1.º una porción no articular, cuadrilátera (que es el *trasfondo de la cavidad cotiloidea*), 2.º, una porción articular, que rodea a la anterior en forma de media luna.

Por encima de la cavidad cotiloidea se encuentra una gran superficie, llamada *fosa ilíaca externa*. Dos líneas rugosas, llamadas *líneas semicirculares*, una anterior y otra posterior, dividen la fosa en tres zonas: zona posterior, para el glúteo mayor; zona media, para el glúteo mediano; zona anterior, para el glúteo menor (en esta última zona se encuentra el *agujero nutricio*).

Por debajo de la cavidad cotiloidea se abre un vasto orificio el *agujero obturador* o *agujero isquiópúbico*. De forma triangular, con ángulos redondeados está circunscrito por dos semicircunferencias, una interna y otra externa, que se fusionan en la parte inferior del agujero, mientras que en su parte superior se separan una de otra, dirigiéndose la interna hacia atrás y la externa hacia delante; la separación de estas dos semicircunferencias forma un canal transversal, llamado *canal subpúbico* (para el nervio y los vasos obturadores). En estado fresco este agujero isquiópúbico está cubierto por una membrana fibrosa, la *membrana obturatriz* (véase *Artrología*).

2.º Cara interna. — En su parte media se ve una línea obtusa, oblicua hacia abajo y adelante, llamada *línea innominada*.

a) Por encima de la *línea innominada* se encuentra una superficie excavada, la *fosa ilíaca interna* (para el músculo ilíaco).

b) Por debajo de la *línea innominada* se encuentran sucesivamente, de arriba abajo: 1.º, una superficie rugosa, la *tuberosidad ilíaca* (para inserción de ligamentos); 2.º, una superficie articular, la *carilla articular* del hueso coxal, en forma de escuadra (para el sacro); 3.º una superficie cuadrilátera, lisa y uniforme, que corresponde a la cavidad cotiloidea (forma en su parte media una eminencia angular, que corresponde al *estrecho medio de la pelvis*; 4.º, por último, el *agujero obturador*).

3.º Bordes. — Son en número de cuatro: anterior, posterior, superior e inferior.

a) *Borde anterior.* — El borde anterior, curvado, con la concavidad dirigida hacia delante, presenta, siguiendo de arriba abajo: 1.º, una primera eminencia, la *espinia iliaca anterior y superior* (para el sartorio y el tensor de la fascia lata); 2.º, una escotadura sin nombre; 3.º, una segunda eminencia, la *espinia iliaca anterior e inferior* (para el tendón directo del recto anterior); 4.º, una escotadura (para el psoasílico); 5.º, una tercera eminencia, ancha, redondeada y obtusa, la *eminencia iliopectínea* (para la cintilla del mismo nombre); 6.º, una superficie triangular, la *superficie pectínea* (para el músculo pectíneo), limitada por detrás por una cresta casi cortante, la *cresta pectínea*; 7.º, un tubérculo, la *espinia del pubis*, y, por dentro de esta espinia, una pequeña superficie rugosa para el recto mayor y el piramidal.

b) *Borde posterior.* — El borde posterior es, como el anterior, muy irregular. En él se encuentran, siguiendo de arriba abajo: 1.º, la *espinia ilíaca posterosuperior* (para ligamentos); 2.º, una escotadura que no tiene nombre; 3.º, la *espinia ilíaca posteroinferior* (para ligamentos); 4.º, la *escotadura ciática mayor* (para el piramidal de la pelvis, vasos y nervios glúteos superiores, ciáticos mayor y menor, vasos isquiatícos, vasos y nervios pudendos internos); 5.º, la *espinia ciática* (para el pequeño ligamento sacrociático, el gémino superior y algunos haces del elevador del ano); 6.º, la *escotadura ciática menor* (para el obturador interno y los vasos y nervios pudendo internos).

c) *Borde superior.* — El borde superior o *cresta ilíaca* es incurvado en forma de S itálica, muy grueso por delante y por detrás y delgado en su parte media. En él se insertan los músculos anchos del abdomen (oblicuo mayor en su labio externo, transverso en su labio interno y oblicuo menor en el intersticio).

d) *Borde inferior.* — El borde inferior se dirige primeramente hacia abajo y atrás; luego, apartándose de la línea media, se incurva hacia fuera. Está formado por la rama descendente del pubis y la rama ascendente del isquion. Presenta, en su parte superior, una carilla articular, de forma oval (para el pubis del lado opuesto); por debajo de esta carilla, muchas rugosidades (para la aponeurosis perineal media, los cuerpos cavernosos del pene y los tres músculos, isquio-cavernoso, recto interno y aductor mayor).

4.º Angulos. — Se distinguen en: 1.º, *anterosuperior* (formado por la espinia ilíaca anterosuperior); 2.º, *posterosuperior* (corresponde

a la espina ilíaca posterosuperior) 3.º, *anteroinferior o interno* (corresponde a un ángulo llamado *ángulo del pubis*); 4.º, *posteroinferior o externo*, masa voluminosa conocida con el nombre de *tuberosidad isquiática*, que representa la parte más gruesa del hueso coxal (en ella se insertan por dentro, el isquiocavernoso y el transverso del perineo; por fuera, el aductor mayor del muslo, por detrás, el gemino inferior de la pelvis, el cuadrado crural, el semitendinoso, el semimembranoso y el bíceps crural).

5.º **Conformación interior.** — Está formado por dos láminas de tejido compacto, separadas por una capa muy variable de tejido esponjoso (es más abundante especialmente en la cresta ilíaca).

2.º Pelvis en general

La pelvis es la porción del esqueleto formada por la unión de los dos huesos coxales, el sacro y el cóccix. Constituye la parte mas inferior del tronco.

1.º **Conformación general.** — En su conjunto, la pelvis tiene la figura de un cono truncado, cuya base, muy escotada por delante, está situada en la parte superior, y cuyo vértice mira hacia abajo. Estudiaremos: 1.º, una superficie exterior; 2.º, una superficie interior; 3.º, dos aberturas, una superior y otra inferior.

A. SUPERFICIE EXTERIOR O EXOPÉLVICA. — Se divide en cuatro regiones, anterior, posterior y laterales.

a) La *región anterior* mira hacia abajo y adelante. Presenta: 1.º, en la línea media, la sínfisis púbica (35 a 50 milímetros de altura), 2.º, a cada lado, el cuerpo del pubis con sus dos ramas horizontal y descendente, la rama ascendente del isquion y el agujero obturador.

B) La *región posterior*, muy convexa, está formada por la cara posterior del sacro y del cóccix y por la porción del borde posterior del hueso coxal situada por encima de la escotadura ciática mayor.

γ) La *región lateral*, comprendida entre las dos precedentes, es muy irregular. En ella se encuentra sucesivamente, siguiendo de arriba abajo: la *fosa ilíaca externa*, con sus dos líneas semicirculares, la *cavidad cotiloidea*, el *agujero obturador* y el *isquion*. Está limitada, por delante, por el borde anterior del hueso coxal, y por detrás, por la parte inferior del borde posterior (con la escotadura ciática mayor, la espina ciática y la escotadura ciática menor). Notemos que esta región lateral se encuentra separada de la región posterior por una

gran *escotadura sacrocóccica*, que queda cubierta en parte, en estado fresco, por los dos ligamentos sacrocóccicos.

B. SUPERFICIE INTERIOR O ENDOPÉLVICA.— Un estrechamiento anular que parte de la base del sacro y termina en la sínfisis púbica, llamado *estrecho superior* de la pelvis, divide la cavidad pélvica en dos cavidades secundarias: una situada en la parte superior, la *pelvis mayor*, y otra en la parte inferior, la *pelvis menor*.

a) *Estrecho superior*. El estrecho superior, de forma triangular, con los ángulos redondeados, está formado: por detrás, por el ángulo sacrovertebral o *promontorio* de los tocólogos, y a cada lado del promontorio, por el borde anterior de las alas del sacro, por delante, por la espina del pubis y el borde superior de la sínfisis; a los lados, por la línea innominada y la cresta pectínea. Estudiamos en él: 1.º, el *diámetro anteroposterior*, que va de la parte superior de la sínfisis púbica al ángulo sacrovertebral (11 centímetros); 2.º, el *diámetro transversal*, que corresponde a la mayor amplitud transversal del estrecho (13,5 centímetros); 3.º, los dos *diámetros oblicuos*, que van de la sínfisis sacroilíaca de un lado a la eminencia iliopectínea del lado opuesto (13 centímetros).

b) *Pelvis mayor*.— Está formada por las fosas ilíacas internas del hueso coxal y por las alas del sacro. Presenta *dos escotaduras*: una anterior, grande, cerrada en estado fresco por la pared abdominal anterior, otra posterior, más pequeña, ocupada por la columna vertebral.

c) *Pelvis menor*.— Llámase también *excavación pélvica*, y presenta cuatro paredes: anterior, posterior y laterales. La *pared anterior*, inclinada hacia arriba y atrás, forma con la vertical un ángulo de unos 60°. Está constituida exactamente por los mismos elementos que la cara anterior de la superficie exopélvica. La *pared posterior* está formada por la cara anterior de la columna sacrocóccica; tiene una longitud de 12 a 15 centímetros; adopta la forma de una bóveda triangular, cuya concavidad mira hacia abajo y adelante. Las *paredes laterales* corresponden, a derecha e izquierda, a la superficie cuadrilátera que se encuentra situada por delante de la cavidad cotinoidea. Mide de 9 a 10 centímetros de altura, y se inclina oblicuamente de arriba abajo y algo de fuera adentro.

G. CIRCUNFERENCIA SUPERIOR O BASE.— Está dirigida oblicuamente hacia arriba y adelante. Está formada: por detrás por la articulación sacrovertebral y por el borde posterior de las alas del sacro; por delante, por el borde anterior del hueso coxal; a los lados, por

la cresta iliaca (curvada en forma de S). El *diámetro transversal máximo* mide, de una a otra cresta ilíacas, 29 centímetros, el *diámetro transversal* de una espina ilíaca anterosuperior a la espina ilíaca anterosuperior del lado opuesto, 25 centímetros, el *diámetro transversal* de una a otra espina ilíacas anteroinferiores, 30 centímetros.

D. CIRCUNFERENCIA INFERIOR O ESTRECHO INFERIOR. Está formada por delante, por la parte más inferior de la sínfisis púbica, por detrás, por el vértice del cóccix, a los lados, por los isquiones unidos a la sínfisis por la rama isquiopúbica y al cóccix por el ligamento sacrococcígeo mayor. Se estudian en ella cuatro diámetros: 1.º, *diámetro anteroposterior o cocci-subpúbico* = 9 centímetros (debe tenerse presente que, al pasar la cabeza fetal, puede llegar hasta 12,5 centímetros por la rotación del sacro [véase *Artrología* y la retropulsión del cóccix]; 2.º, *diámetro transversal o bisquático* = 12,5 centímetros, 3.º y 4.º, *diámetros oblicuos*, que van del punto medio del ligamento sacrococcígeo a la mitad de la rama isquiopúbica del lado opuesto = 12 centímetros.

1.º Inclinación y ejes de la pelvis.—La pelvis, vista en situación, está fuertemente inclinada de arriba abajo y de delante atrás. Esta posición está claramente indicada por la inclinación de dos planos: uno (*plano del estrecho superior*) que pasa por el estrecho superior, y otro (*plano del estrecho inferior*) que pasa por el estrecho inferior. El primero forma con la horizontal un ángulo de 60°, el segundo, uno de 10° solamente.

Se conocen con el nombre de *eje del estrecho superior* y *eje del estrecho inferior* dos líneas que pasan perpendicularmente, una por el centro del plano del estrecho superior y otra por el centro del plano del estrecho inferior. El *primero* de estos dos ejes, prolongado por arriba, encontraría la pared abdominal cerca del ombligo; prolongado por abajo, pasa por delante del cóccix. El *segundo*, prolongado también en ambos sentidos, iría a parar, por arriba, a la primera vértebra sacra, y por abajo, a algunos milímetros por delante del ano.

Se designa con el nombre de *eje de la excavación* una línea ficticia que atraviesa de arriba abajo la pelvis menor, siguiendo el plano medio y quedando siempre a igual distancia de las paredes de la cavidad. Representa el camino que sigue el feto para llegar hasta el suelo perineal y salir por la vulva.

3.º Pelvimetría. — La pelvimetría está destinada a evaluar las diferentes dimensiones de la pelvis. Hay que distinguir la pelvimetría

externa (mediciones de la superficie externa de la pelvis) y la pelvimetría interna (mediciones de la superficie interna).

a) *Pelvimetría externa*.— Los diámetros principales son: 1.º, *diámetro anteroposterior* (desde la apófisis espinosa de la V lumbar al vértice de la sínfisis del pubis)=20 centímetros; 2.º, *diámetro biespinoso anterior* (de una espina ilíaca anterosuperior a la otra)=24 centímetros; 3.º, *diámetro bicrestal* (entre los dos puntos más salientes de ambas crestas ilíacas)=de 26 a 28 centímetros; 4.º, *diámetro biespinoso posterior* (entre las dos espinas ilíacas posterosuperiores) 10 centímetros; 5.º, *diámetro bitrocantéreo* (entre los dos trocánteres)=32 cm.

b) *Pelvimetría interna*.— Se evalúa mediante el tacto vaginal y también por medio de la radiopelvimetría (véase más adelante, *Mediciones del estrecho superior y del estrecho inferior*).

4.º Diferencias sexuales. — Escriban éstas:

a) *En el grosor*: la pelvis del hombre es generalmente mucho más gruesa que la de la mujer, las eminencias óseas (para inserciones musculares o ligamentosas) son también más pronunciadas.

β) *En las dimensiones*: en general, la pelvis del hombre es más alta que la de la mujer; en cambio, la de la mujer es más ancha.

γ) *En la inclinación*: la pelvis de la mujer es más inclinada que la del hombre (el ángulo que forma el estrecho superior con la horizontal es de 58º en la mujer y 54º en el hombre).

δ) *En la forma*, en la mujer las fosas ilíacas internas son más anchas, más extensas y están más inclinadas hacia fuera; crestas ilíacas delgadas, sinuosas; ángulo sacrovertebral más pronunciado, sínfisis púbica más baja (45 milímetros en lugar de 50 milímetros en el hombre), el ángulo que representa el arco del pubis es más abierto; el agujero obturador es más bien triangular (ovalado en el hombre), el diámetro bíilíaco mayor (71 milímetros en lugar de 60 milímetros que tiene el hombre), la pelvis menor es más espaciosa, sobre todo en el sentido de la amplitud; el diámetro transversal máximo del estrecho superior pasa por delante del punto donde se cruzan los diámetros oblicuos (en el hombre pasa por detrás).

2. HUESO DEL MUSLO O FÉMUR

Hueso largo, par, dirigido oblicuamente de arriba abajo y de fuera adentro, incurvado en arco de concavidad posterior, ligeramente torcido alrededor de su eje. Se distinguen en él un *cuerpo*, una *extremidad superior* y una *extremidad inferior*.

1.º Cuerpo. — El cuerpo es prismático triangular, con *tres caras y tres bordes*.

A. **CARAS.** — Son *tres*: interior, interna y externa. La *cara anterior* es lisa, convexa (cubierta por el cuádriceps y el tensor de la sinovial de la rodilla). Las *dos caras interna y externa* son convexas y lisas, más anchas por arriba que por abajo, donde terminan en punta (cubiertas por el crural y los dos vastos interno y externo).

B. **BORDES.** — Divídense en interno, externo y posterior. Los *bordes interno y externo* apenas si están señalados. El *borde posterior o línea áspera* es, por el contrario, muy grueso, muy saliente y rugoso en extremo (presta inserción, por su labio interno, al vasto interno; por su labio externo, al vasto externo; por el intersticio, a los tres aductores del muslo y a la porción corta del bíceps). Por *abajo*, la línea áspera se divide en dos ramas divergentes, que se dirigen hacia los cóndilos: la externa (para la porción corta del bíceps) es más marcada que la interna; entre las dos queda un espacio triangular, llamado *espacio poplíteo*. Por *arriba* se divide en tres ramas también divergentes: la externa va al trocánter mayor (para el glúteo mayor); la media se dirige al trocánter menor (para el pectíneo); la interna va al cuello (para el vasto interno). En la parte media de la línea áspera se encuentra el *agujero nutricio* del hueso.

2.º Extremidad superior. — Presenta: 1.º, la *cabeza*; 2.º, el *cuello anatómico*; 3.º, dos eminencias voluminosas, los *trocánteres mayor y menor*; 4.º, el *cuello quirúrgico*.

a) **Cabeza.** Es redondeada de un modo regular, representa aproximadamente los dos tercios de una esfera y está dirigida hacia arriba, adentro y un poco adelante. Algo por debajo y por detrás de su centro se encuentra una depresión rugosa, la *fosa del ligamento redondo* (para el ligamento redondo y los vasos).

b) **Cuello anatómico** — Situado entre la cabeza y los trocánteres, muy inclinado hacia abajo y hacia fuera (forma con el cuerpo del hueso un ángulo de 130º), de 35 a 40 milímetros de largo, el cuello anatómico presenta la forma de un cilindro aplanado de delante atrás, lo cual hace que tenga dos caras, dos bordes y dos extremos. La *cara anterior es casi plana* (corresponde, en toda su extensión, al ligamento capsular). La *cara posterior es convexa en sentido vertical y cóncava en dirección transversal* (corresponde al ligamento capsular solamente en sus dos tercios internos). El *borde superior* es relativamente corto y casi horizontal. El *borde inferior* es más largo y oblicuo. El *extremo*

interno se ensancha para sostener la cabeza y está lleno de grandes orificios vasculares. El *extremo externo*, muy voluminoso, corresponde a las tuberosidades. Está limitado 1.º, por delante, por una línea rugosa, que desciende del borde anterior del trocánter mayor hacia el trocánter menor, llamada *línea oblicua* del fémur o *cresta intertrocanterea anterior* (para la cápsula articular); 2.º, por detrás, por una cresta mucho más saliente, la *cresta intertrocanterea posterior* (para el cuadrado crural).

c) *Trocánter mayor*. — Eminencia cuadrilátera, situada por fuera del cuello. Aplanada transversalmente, presenta dos caras (externa e interna) y cuatro bordes (superior inferior anterior y posterior). La *cara externa*, convexa, está atravesada diagonalmente por una línea rugosa (para el glúteo mediano). Por encima y por debajo se encuentran dos superficies en relación con dos bolsas serosas (serosa del glúteo mediano y serosa del glúteo mayor). La *cara interna* se confunde, en gran parte con el cuello. En su parte posterior se ve una depresión profunda, llamada *cavidad digital* (para los dos obturadores y los dos gemelos). El *borde superior* es casi horizontal, en su parte media se encuentra una pequeña faceta redondeada (para el piramidal). El *borde inferior* está marcado exteriormente por una cresta rugosa (para el vasto externo). El *borde posterior*, muy acentuado, se continúa por abajo con la cresta intertrocanterea posterior. El *borde anterior*, muy grueso, presta inserción al glúteo menor.

d) *Trocánter menor*. — Griego tubérculo o mamelón, situado en la parte posterior e inferior del cuello (para el psoasiliaco). De su base parten, en forma de radios, tres líneas divergentes, que se dirigen una hacia el cuello la segunda hacia la línea áspera (esta última para el pectíneo) y la tercera hacia el trocánter mayor.

e) *Cuello quirúrgico*. — Es, como en el humero, la porción del fémur que une el cuerpo del hueso con su extremidad superior.

3.º **Extremidad inferior.** — Constituye una masa voluminosa, de forma irregularmente cúbica, algo encorvada de delante atrás.

Vista por delante, esta extremidad presenta una superficie articular en forma de polea, la *tróclea femoral*; está formada por una garganta anteroposterior, hacia la cual se inclinan dos carillas laterales (la externa más ancha que la interna). En la parte inferior del hueso, las dos carillas, hasta entonces contiguas, se separan, y la garganta de la polea, que por ese hecho desaparece, queda remplazada por una vasta escotadura, la *escotadura intercondílea*.

Por dentro y por fuera de la escotadura y limitándola, se encuentran los *dos cóndilos*, interno y externo, el cóndilo interno se distingue del externo en que es menos grueso, está situado más hacia fuera de la línea axil del hueso y desciende más que el externo.

Cada cóndilo presenta: 1.º, una *cara superior*, que forma cuerpo con el hueso, 2.º, una *cara inferior*, otra *anterior* y otra *posterior*, las tres articulares y dispuestas en semicírculo para deslizarse sobre la tibia; 3.º, una *cara media* (con relación al eje del hueso), que forma parte del espacio intercondileo (rugosa, para los ligamentos cruzados); 4.º, una *cara lateral*, relativamente superficial, en relación con los tegumentos. En la *cara lateral* del cóndilo interno se ven: la *tuberosidad interna*, para el ligamento lateral interno de la rodilla; el *tubérculo del aductor mayor*, para el músculo del mismo nombre, y una pequeña excavación para el gemelo interno, en la *cara lateral* del cóndilo externo se ven: la *tuberosidad externa*, para el ligamento lateral externo de la rodilla, y por detrás de esta eminencia, dos pequeñas excavaciones, una para el gemelo externo y otra para el poplíteo.

En la extremidad inferior del fémur son de notar, además: 1.º, por delante y por encima de la tróclea el *huevo supratroclear*, 2.º, por detrás y por encima de la escotadura intercondilea, la porción más ancha del *espacio poplíteo*; todas estas regiones están llenas de agujeros vasculares.

4.º **Conformación interior.** - Tejido esponjoso en las extremidades o epífisis y tejido compacto en el cuerpo. Este último tiene un conducto medular que se extiende desde el cuarto inferior del hueso hasta el trocánter menor (nótese la disposición especial de las trabéculas óseas en las epífisis, *espolón femoral* de Merkel, rarefacción de las trabéculas óseas de las epífisis de los ancianos, etc.).

3. HUESOS DE LA PIERNA

La pierna se compone, como el antebrazo, de dos huesos, la *tibia* y el *peroné* con los cuales se estudia, de ordinario, la *rótula*

1.º *Rótula*

Hueso corto, aplanado de delante atrás, más ancho por arriba que por abajo, triangular de base superior. Tiene *dos caras* (anterior y posterior), *dos bordes*, *base* y *vértice*.

1.º **Cara anterior.** — Convexa, presenta, en su parte media, una serie de estrias verticales y paralelas que le dan un aspecto fibroide. Numerosos orificios vasculares.

2.º **Cara posterior.** Una línea transversal, correspondiente a la unión de su cuarto inferior con sus tres cuartos superiores, la divide en dos partes: 1.ª, una parte inferior, rugosa, en relación con el paquete adiposo anterior de la rodilla; 2.ª, una parte superior, articular, que corresponde a la tróclea femoral; presenta, como es de suponer, una cresta vertical y obtusa (para la garganta de la tróclea), y, a cada lado, dos carillas cóncavas, una interna y otra externa. La externa es a la vez mayor y más excavada que la interna.

3.º **Base.** — La base tiene la forma de una pequeña superficie triangular, de vértice posterior. En su mitad anterior se inserta el tendón del cuádriceps crural.

4.º **Vértice.** — El vértice, dirigido hacia arriba, da inserción al ligamento rotuliano.

5.º **Bordes.** — Se distinguen en interno y externo. Partiendo de la base se dirigen hacia el vértice, describiendo cada uno una semicircunferencia. En ellos se insertan los fascículos inferiores de los vasos y las aletas de la rótula.

6.º **Conformación interior.** Como todos los huesos cortos, la rótula está constituida por una masa central de tejido esponjoso, completamente envuelta en una lámina de tejido compacto, más gruesa por delante que por detrás.

2.º Tibia

Hueso largo, par, no simétrico, situado en la parte anterior e interna de la pierna; presenta dos curvaturas de sentido contrario: una superior, cóncava hacia fuera; otra inferior, cóncava hacia dentro (en forma de S itálica). Se le consideran un *cuerpo*, una *extremidad superior* y una *extremidad inferior*.

1.º **Cuerpo.** El cuerpo es prismático triangular, con *tres caras* y *tres bordes*.

A CARAS. Se distinguen en interna, externa y posterior. La *cara interna*, casi plana en sus dos extremidades, es convexa en su parte media y está en relación directa con los tegumentos. En su parte más alta presta inserción a los tendones de la pata de ganso. La *cara externa*, excavada en forma de canal en su parte superior (para el tibial anterior), se hace convexa en su parte inferior. La *cara posterior* presenta, en su parte superior, una cresta oblicua hacia abajo y adentro, la *línea oblicua de la tibia* (para cuatro músculos: sóleo en el intersticio, popliteo en el labio superior, tibial posterior y flexor común de los dedos del pie en el labio inferior). Por encima de la línea oblicua se encuentra una superficie triangular para el popliteo. Por debajo se halla una cresta vertical, que subdivide esta cara en dos porciones: una interna, para el flexor común de los dedos del pie; otra externa, para el tibial posterior. Un poco por debajo de la línea oblicua se encuentra el agujero nutricional.

B BORDES. —Son: anterior, interno y externo. El *borde anterior o cresta de la tibia* está torcido en S estática. Es obtuso y redondeado en sus dos extremos y cortante en su parte media. El *borde interno*, poco marcado por arriba, es muy prominente en su parte inferior. Presta inserción a la aponeurosis tibial. El *borde externo* presta inserción a la aponeurosis interósea. En su parte inferior se bifurca, circunscribiendo de este modo, entre sus dos ramas, un espacio triangular rugoso (para ligamentos) que termina por abajo en una pequeña carila articular (para el maléolo del peroné).

2° Extremidad superior. — Es muy voluminosa, cuadrangular y prolongada en sentido transversal. Su cara superior, destinada a articularse con los cóndilos femorales, presenta, para este objeto, dos superficies articulares horizontales, ligeramente excavadas en su centro y llamadas *cavidades glenoideas* de la tibia (la interna es más larga y más excavada que la externa; en cambio, la externa es un poco más ancha).

Las dos cavidades glenoideas están separadas una de otra: 1°, en su parte media, por una eminencia, la *espiná de la tibia* dividida por una escotadura en dos tubérculos, uno interno y otro externo; 2°, por delante y por detrás de la espina, por dos superficies triangulares y rugosas, llamadas superficies *preespinal* y *retroespinal*.

Las dos cavidades glenoideas descansan en dos masas voluminosas, llamadas *tuberosidades de la tibia*. La *tuberosidad interna*, más desarrollada que la externa presenta: 1°, por detrás, una impresión

rugosa (para el tendón directo del semimembranoso); 2.ª, por delante, un canal horizontal (para el tendón horizontal de este mismo músculo). La *tuberosidad externa* posee en su parte posteroexterna una carilla articular, de perimetro redondeado u oval, que mira hacia abajo, atrás y un poco afuera es la *carilla peronea del hueso* (para el peroné).

Las dos tuberosidades, separadas por detrás por una escotadura vertical, se confunden íntimamente en su parte anterior. Por delante de las mismas se ve una superficie triangular, rugosa y llena de agujeros, en la parte inferior de la cual se encuentra una eminencia oval, llamada *tubérculo anterior* o *tuberosidad anterior* de la tibia (para el ligamento rotuliano). Del lado externo del tubérculo anterior parte una cresta, que es oblicuamente ascendente, y termina en el *tubérculo de Gerdy* (para el músculo tibial anterior).

3.º Extremidad inferior.— Menos voluminosa que la precedente, pero también de forma cuboidea. *Por abajo (cara inferior)* se articula con la polea del astrágalo. Posee, para este objeto, una extensa superficie cuadrilátera, cóncava de delante atrás, con una cresta anteroposterior obtusa (para la garganta de la polea) en su parte media y dos porciones laterales (para las dos vertientes de esta misma polea). *Por delante*, la extremidad inferior es convexa y lisa (corresponde a los tendones extensores). *Por detrás* es también convexa el canal oblicuo para el tendón del flexor propio del dedo gordo. *Por fuera* se ve una excavación triangular de vértice superior (para inserciones ligamentosas). *Por dentro*, la extremidad inferior se prolonga en una apófisis descendente, llamada *mateolo interno*, la cara interna, lisa (en relación con la piel); la cara externa, articular (para la carilla lateral interna del astrágalo), el borde anterior, rugoso, (para ligamentos), el borde posterior, con un canal oblicuo (para los tendones de los músculos tibial posterior y flexor común de los dedos del pie); el vértice, dividido por una escotadura (en la cual se inserta el ligamento lateral externo) en dos eminencias, una anterior y otra posterior.

4.ª Conformación interior.— El cuerpo del hueso está constituido por tejido compacto, en el que se encuentra un conducto medular en su centro, más ancho en sus dos extremidades que en su parte media. Las dos extremidades superior e inferior están formadas por tejido esponjoso.

3° *Peroné*

Hueso largo, par, no simétrico, situado en la parte posterior y externa de la pierna. Más delgado que la tibia, presenta también, como ésta, un *cuerpo* y dos *extremidades*, una superior y otra inferior.

1° **Cuerpo.** — El cuerpo es prismático triangular, con *tres caras* y *tres bordes*.

A. **CARAS** — Están orientadas exactamente igual que las de la tibia. La *cara externa*, redondeada por arriba, excavada en su parte media (para los dos músculos peroneos), presenta, en su parte inferior, un canal oblicuo hacia abajo y atrás (para los tendones de estos últimos músculos), llamado *canal de los peroneos*. La *cara interna* se encuentra dividida por una cresta longitudinal (para el ligamento interóseo), en dos partes: una anterior, más pequeña (para los tres músculos: extensor común de los dedos del pie, peroneo anterior y extensor propio del dedo gordo); otra posterior, para la inserción del tibial posterior. La *cara posterior*, convexa y rugosa, presta inserción, por arriba al sóleo, y por su parte media, al flexor propio del dedo gordo. En su cuarto inferior tiende a hacerse interna. En el tercio medio de la cara posterior se ve el *agujero nutritivo*.

B. **BORDES** — Los tres bordes se distinguen en anterior, interno y externo. El *borde anterior*, delgado y cortante (*cresta del peroné*), se bifurca por abajo, interceptando, entre sus dos ramas de bifurcación, una pequeña superficie triangular. El *borde interno*, muy acentuado en su parte media, presta inserción al tibial posterior. El *borde externo*, redondeado y obtuso en su mitad superior, es casi cortante en su mitad inferior (en él se inserta el tabique fibroso que separa los peroneos de los músculos posteriores).

2° **Extremidad superior.** — Llamada también *cabeza del peroné*, presenta, por dentro, una superficie articular plana, redondeada u oval, para la tibia. Por fuera y detrás de esta faceta se levanta una eminencia piramidal, la *apófisis estiloides* (para el tendón del bíceps y, por dentro del mismo, el ligamento lateral externo de la articulación de la rodilla). Se encuentran, además, rugosidades pre y retro-estiloides (para inserciones ligamentosas).

3° **Extremidad inferior.** — Está constituida por el *maléolo externo*, especie de pirámide triangular, que presenta tres caras, tres

bordes, una base y un vértice. La *cara interna*, plana y articular en su parte anterior (para la tibia y el astrágalo), es excavada y rugosa en su parte posterior (para inserciones ligamentosas). La *cara anteroexterna*, convexa y lisa, corresponde a la piel. La *cara posteroexterna* presenta un canal vertical, que es continuación del canal de los peroneos. Los *bordes* se distinguen en anterior (rugoso, para ligamentos), externo y posterior (para inserción de ligamentos). La *base* se confunde con el hueso. El *vértice* está dividido en dos eminencias por una especie de escotadura en la cual se inserta el ligamento peroneocalcáneo.

4.º **Conformación interior.** — El cuerpo está formado de tejido compacto, con un conducto medular muy estrecho en su parte central. Las dos extremidades están formadas por tejido esponjoso.

4 HUESOS DEL PIE

El pie comprende veintiséis huesos, dispuestos en tres grupos, a saber: 1.º, *tarso*, 2.º, *metatarso*, 3.º, *dedos*.

1.º **Huesos del tarso.** El tarso está formado por siete huesos, dispuestos en dos filas: una fila posterior, que comprende el *astrágalo* y el *calcáneo*, y otra anterior, formada por el *cuboides*, el *escafoides* y las tres *cuñas*. Todos éstos son huesos cortos.

1.º **ASTRÁGALO.** — Está situado entre los huesos de la pierna y el calcáneo. Se le consideran cuerpo, cabeza y cuello. Presenta *seis caras*: superior, inferior anterior, posterior, interna y externa.

a) *Cara superior* — Está ocupada en su mayor extensión por una superficie articular, llamada *polea astragalina* (para los dos huesos de la pierna): garganta anteroposterior, extremadamente obtusa, hacia la cual se inclinan las dos vertientes laterales. Esta limitada, por dentro y fuera, por dos bordes laterales, ambos semicirculares. Por delante de la polea la cara superior del hueso está formada por la parte superior del cuello: es irregular y está llena de agujeros vasculares.

b) *Cara inferior*. — Destinada a articularse con el calcáneo, presenta, con este objeto, dos carillas: 1.º, la *carilla anteroexterna*, prolongada de delante atrás, dirigida directamente hacia abajo; 2.º, la *carilla posteroexterna*, mayor que la precedente, plana en sentido transversal y cóncava en dirección anteroposterior. Entre las dos carillas se encuentra un canal profundo y rugoso, llamado *ranura astragalina* (para ligamentos).

c) *Cara externa.* — Articulada con el maléolo peroneo, presenta una carilla triangular, de base superior. Por delante de ella se encuentra el *cuello* del hueso, que en este punto tiene el aspecto de un borde obtuso.

d) *Cara interna.* Articulada con el maléolo tibial, presenta una carilla articular en forma de una coma colocada horizontalmente, cuya cabeza corresponde a la parte anterior y la cola a la posterior. Por delante y por debajo de esta carilla se encuentran rugosidades (para inserciones ligamentosas).

e) *Cara anterior.* — Tiene la forma de una cabeza, *cabeza del astrágalo*, más ancha que alta, perfectamente circunscrita por arriba y por los lados y continuada por abajo por la carilla antero-interna de la cara inferior del hueso. Forma con el cuerpo ángulos de inclinación, de declinación y de rotación. Se articula con el escafoide.

f) *Cara posterior.* — Muy pequeña, más parece un borde que una cara. En su parte interna se ve un canal oblicuo hacia abajo y adentro (para el tendón del flexor propio del dedo gordo).

2.ª **CALCÁNEO** — El más voluminoso de los huesos del tarso, el calcáneo es un hueso alargado de delante atrás, irregularmente cúbico y que presenta, por consiguiente, seis caras, orientadas en la misma dirección que las del hueso precedente.

a) *Cara superior.* — Tiene un aspecto distinto, según se la considere en su parte anterior o en su parte posterior. Por delante, en sus dos tercios anteriores, se articula con el astrágalo y presenta, para este objeto, dos carillas articulares, una antero-interna y otra postero-externa (configuradas en sentido inverso de las carillas correspondientes del astrágalo), separadas entre sí por la *ranura calcánea* (para inserciones ligamentosas). Por detrás, la cara superior es rugosa, cóncava en sentido aneroposterior y convexa en dirección transversa.

b) *Cara inferior.* — Muy irregular y llena de agujeros vasculares. Presenta: 1.º, por detrás, dos eminencias, la *tuberosidad interna* y la *tuberosidad externa* (para inserciones musculares); 2.º, por delante, una tercera eminencia, la *tuberosidad anterior* (para los haces profundos del ligamento calcaneocuboides).

c) *Cara externa.* — Irregularmente plana. En la unión de su tercio anterior con sus dos tercios posteriores se ve una pequeña eminencia, llamada *tubérculo externo del calcáneo*. Por encima de este tubérculo se ve un canal oblicuo hacia abajo y adelante (para el peroneo lateral corto). Por debajo de este mismo tubérculo se encuentra un canal análogo (para el peroneo lateral largo).

d) *Cara interna*. — Presenta un ancho canal oblicuo hacia abajo y adelante, es el *canal calcáneo interno* (para los músculos, vasos y nervios que de la región posterior de la pierna, pasan a la región plantar). Este canal está circunscrito por delante por una fuerte eminencia, la *apófisis menor del calcáneo*; por detrás de esta apófisis, por dos canales, se deslizan los tendones de los músculos flexor común de los dedos y flexor propio del dedo gordo.

e) *Cara anterior*. — Está ocupada por una carilla articular, cóncava de arriba abajo y convexa en sentido transversal (para el cuboide). Esta carilla está sostenida por una especie de columna ósea, que se designa con el nombre de *apófisis mayor del calcáneo*.

f) *Cara posterior*. — Más ancha por abajo que por arriba. En su parte inferior, rugosa, se inserta el tendón de Aquiles, y su parte superior, lisa, corresponde a una bolsa serosa que la separa de este tendón.

3° *Cuboides*. — El cuboide está situado delante del calcáneo. Su forma cuboidea permite considerarle *seis caras*, orientadas en sentido exactamente igual a las del calcáneo. La *cara superior* o *dorsal*, plana e irregular, corresponde a ligamentos y al músculo pedio. La *cara inferior* o *plantar* presenta, un poco por delante de su parte media, una gran eminencia, llamada *tuberosidad o cresta del cuboide*, por delante de esta tuberosidad se encuentra un canal oblicuo hacia delante y adentro que recibe el nombre de *canal del cuboide* (para el tendón del peroneo lateral largo); por detrás se encuentra una superficie rugosa y ligeramente excavada (para inserciones ligamentosas y musculares). La *cara posterior* está ocupada por una carilla articular (para el calcáneo), convexa en sentido transversal y cóncava en el vertical. Tiene forma triangular; su vértice, dirigido hacia abajo, se propaga formando una eminencia, llamada *apófisis piramidal del cuboide*. La *cara anterior*, también articular, está dividida en dos carillas: una interna (para el cuarto metatarsiano) y otra externa (para el quinto metatarsiano). La *cara interna* presenta, en su parte media, una carilla plana y oval (para el tercer cuneiforme), y a veces una segunda carilla (para el escafoide). Finalmente, la *cara externa*, situada a lo largo del borde externo del pie, se encuentra reducida a las dimensiones de un simple borde.

4° *Escafoide*. — Está situado por detrás del cuboide y por delante del astrágalo. Aplanado de delante atrás, presenta *dos caras* (anterior y posterior), *dos bordes* (superior e inferior) y *dos extremidades* (interna y externa). La *cara posterior* está ocupada por una cavidad articular, más ancha que alta, en forma de cavidad glenoides

(para la cabeza del astrágalo). La *cara anterior*, también articular, se encuentra subdividida en tres carillas triangulares (para las tres cuñas). El *borde superior* o *dorsal*, rugoso (para ligamentos), está inclinado hacia abajo y adentro. El *borde inferior* o *plantar* es también rugoso (para ligamentos). La *extremidad externa* está marcada por una eminencia, a la que se conoce por *tubérculo del escafoides* (para el tibial posterior).

5° **CUNEIFORMES.** — Llamados así porque tienen forma de cuña, son en número de tres, que se designan con los nombres de 1.°, 2.° y 3.°, contando de dentro afuera.

a) *Primer cuneiforme.* — El primero o *cuneiforme mayor*, ocupa el borde interno del pie y tiene la forma de una cuña de base inferior y vértice superior. Se notan en él: 1.°, en su *cara posterior*, una carilla triangular (para el escafoides); 2.°, en su *cara anterior*, una carilla articular en forma de media luna (para el primer metatarsiano); 3.°, en su *cara interna*, una impresión circular (para el tibial anterior); 4.°, en su *cara externa*, dos carillas articulares, una anterior (para el segundo metatarsiano) y otra posterior (para el segundo cuneiforme). La *base* del primer cuneiforme es ancha y desigual. Su *vértice* tiene la forma de un borde.

b) *Segundo cuneiforme.* — Es también una cuña (*cuneiforme menor*), pero que tiene la base en su parte superior y el vértice en la inferior. Se le consideran: 1.°, en su *cara posterior*, una carilla triangular (para el escafoides); 2.°, en su *cara anterior*, una segunda carilla, también triangular (para el segundo metatarsiano); 3.°, en su *cara interna*, una carilla articular en forma de escuadra (para el primer cuneiforme); 4.°, en su *cara externa*, otra carilla articular (para el tercer cuneiforme). La *base* es cuadrilátera y rugosa. El *vértice*, rectilíneo, degado, casi cortante.

c) *Tercer cuneiforme.* — El tercero, o *cuneiforme mediano*, tiene la misma forma y está orientado en igual sentido que el anterior. Se notan en él: 1.°, en su *cara posterior*, una carilla triangular (para el escafoides); 2.°, en su *cara anterior*, una segunda carilla plana y triangular (para el tercer metatarsiano); 3.°, en su *cara interna*, dos carillas, una posterior (para el segundo cuneiforme) y otra anterior (para el segundo metatarsiano); 4.°, en su *cara externa*, dos carillas articulares, una posterior (para el cuboide) y otra anterior, muy pequeña, pero no constante (para el cuarto metatarsiano). La *base* es cuadrilátera y rugosa. El *vértice*, redondeado y desigual, forma prominencia en la región plantar.

2° Huesos del metatarso. — El metatarso está constituido por cinco huesos, llamados *metatarsianos*. Se conocen con los nombres de 1°, 2°, 3°, etc., contando de dentro afuera.

1° CARACTERES GENERALES — Son huesos largos, que están colocados en situación anteroposterior, y presentan cada uno un cuerpo, una extremidad posterior y otra anterior.

a) *Cuerpo* — El cuerpo describe una curva de concavidad inferior, y está, además, ligeramente torcido sobre su eje. Es prismático triangular, con tres caras y tres bordes. De las tres caras, la superior forma parte de la región dorsal del pie. Las otras dos, interna y externa circunscriben espacios elípticos, llamados *espacios interóseos*. Los tres bordes se distinguen en inferior, interno y externo.

b) *Extremidad posterior* — Presenta, por regla general: 1°, dos carillas no articulares, una superior o dorsal y otra inferior o plantar, 2°, tres carillas articulares: una posterior (para el tarso) y las otras dos laterales (para los huesos inmediatos).

c) *Extremidad anterior*. — Es una especie de cabeza articular, aplanada en sentido transversal: un verdadero *cóndilo* (para la primera falange de los dedos). A cada lado del cóndilo se ven una fosa rugosa y un tubérculo (para la inserción de los ligamentos laterales de la articulación metatarsofalángica).

B° CARACTERES DIFERENCIALES. — Los cinco metatarsianos se distinguen entre sí por algunos caracteres particulares.

a) *Primer metatarsiano*: no posee, en su extremidad posterior más que una sola carilla lateral, que aún no es constante, está situada por fuera y destinada al segundo metatarsiano. Hacia abajo y afuera se encuentra una apófisis más o menos desarrollada (para el tendón del peroneo lateral largo). La extremidad anterior se distingue por su forma cuadrilátera y sus grandes dimensiones, así como también por el hecho de presentar, por parte de la región plantar, dos *ranuras anteroposteriores* (para los dos huesos sesamoideos de la articulación metatarsofalángica del dedo gordo).

b) *Segundo metatarsiano*. presenta, por detrás, una primera carilla (para el segundo cuneiforme), por dentro, dos carillas, una posterior (para el primer cuneiforme) y otra anterior (para el primer metatarsiano) por fuera, cuatro carillas, dos en la parte posterior (para el tercer cuneiforme) y dos en la anterior (para el tercer metatarsiano), total, siete carillas articulares.

c) *Tercer metatarsiano*: por detrás una carilla articular (para el tercer cuneiforme), por dentro, dos pequeñas carillas superpuestas

(para las dos carillas correspondientes del segundo metatarsiano); por fuera, una sola carilla, plana y oval (para el cuarto metatarsiano).

d) *Cuarto metatarsiano*: por detrás, una carilla plana (para el cuboides); por dentro, dos pequeñas carillas, una posterior (para el tercer cuneiforme) y otra anterior (para el tercer metatarsiano); por fuera, una sola carilla (para el quinto metatarsiano).

e) *Quinto metatarsiano*: sólo posee dos carillas articulares, una posterior (para el cuboides) y otra interna (para el cuarto metatarsiano). Por detrás y afuera se ve una apófisis voluminosa, la *apófisis del quinto metatarsiano* (para el tendón del peroneo lateral corto).

C. RESUMEN. — Los caracteres diferenciales de los cinco metatarsianos pueden resumirse del modo siguiente.

1.ª Una sola carilla lateral	$\left\{ \begin{array}{l} a) \text{ Situada hacia fuera (no constante).} \\ b) \text{ Situada hacia dentro (constante).} \end{array} \right.$	$\left. \begin{array}{l} 1.^\circ \text{ METATARSIANO} \\ 3.^\circ \text{ METATARSIANO} \end{array} \right\}$
2.ª Tres carillas laterales, de las cuales dos están situadas hacia dentro.	$\left\{ \begin{array}{l} a) \text{ Superpuestas en sentido vertical y separadas por canal.} \\ b) \text{ Superpuestas en sentido anteroposterior y contiguas.} \end{array} \right.$	$\left. \begin{array}{l} 5.^\circ \text{ METATARSIANO} \\ 4.^\circ \text{ METATARSIANO} \end{array} \right\}$
3.ª Seis carillas laterales, de las cuales cuatro están situadas hacia fuera y dos hacia dentro.		2.º METATARSIANO

3.º **Huesos de los dedos.** — Los dedos del pie son en número de cinco, designados con los nombres de 1.º, 2.º, 3.º, etc., contando de dentro afuera. El 1.º y el 5.º se llaman también *dedo gordo* y *dedo pequeño*. Cada dedo está constituido como los de las manos, por tres falanges (1.ª, 2.ª, 3.ª, o bien, *falange*, *falangina* y *falangeta*); el dedo gordo posee dos, le falta la tercera.

A. CARACTERES GENERALES. — Las falanges de los dedos del pie tienen una conformación semejante a las de la mano (véase pág. 65). Están, no obstante, mucho menos desarrolladas.

B. CARACTERES DIFERENCIALES. — Por lo demás, se distinguen entre sí por caracteres perfectamente distintos.

a) *Primeras falanges*: cuerpo muy corto y delgado, cilíndrico o aplanado en sentido transversal.

b) *Segundas falanges*: más reducidas todavía que las primeras, no tienen, por decirlo así, más que un cuerpo teórico, ya que están formadas por sus dos extremidades unidas.

c) *Terceras falanges*. son también mucho más pequeñas y terminan, como en la mano, por una media corona que sirve de base al pulpejo del dedo y a la uña.

ARTÍCULO III

HUESOS SESAMOIDEOS

Los sesamoideos son huesos cortos, redondeados u ovales, que se desarrollan unas veces alrededor de las articulaciones (éstos son los *sesamoideos periarticulares*) y otras en el espesor de los tendones (*sesamoideos intratendinosos*).

1.º Sesamoideos periarticulares. — Aparecen en los extremos libres de los miembros. manos y pies.

A. SESAMOIDEOS DE LA MANO. — Se encuentran todos en la cara palmar y, por consiguiente, en el lado de la flexión. Su número varía comúnmente de dos a siete. Se describen: 1.º, los *sesamoideos metacarpofalángicos del pulgar*, en número de dos, uno interno y otro externo, situados en estado fresco en el espesor del ligamento glenoideo, son constantes; 2.º, los *sesamoideos interfalángicos del pulgar*, situados en la parte anterior de la articulación de la primera falange con la segunda. 3.º, los *sesamoideos metacarpofalángicos del índice y del dedo meñique*, situados en las articulaciones metacarpofalángicas del segundo y del quinto dedos. 4.º, los *sesamoideos metacarpofalángicos del medio y el anular*. 5.º, los *sesamoideos interfalángicos de los cuatro últimos dedos*, sumamente raros.

B. SESAMOIDEOS DEL PIE — Ofrecen gran analogía con los de la mano. Se encuentran: 1.º, los *sesamoideos metatarsfalángicos del dedo gordo* (constantes), en número de dos, uno interno y otro externo, situados, como en la mano, en el espesor del ligamento glenoideo; 2.º, los *sesamoideos interfalángicos del dedo gordo*, situados en dirección transversal por debajo de la articulación de la primera falange con la segunda. 3.º, los *sesamoideos metatarsfalángicos del segundo y quinto dedos*, que presentan la misma disposición que en la mano, pero son menos frecuentes y de menor tamaño.

2.º Sesamoideos intratendinosos. Son todavía mucho más variables que los sesamoideos periarticulares.

a) En el miembro superior no los hay en estado normal.

b) En el miembro inferior encontramos: 1.º, la *rotula*, desarrollada en el interior del cuádriceps crural; 2.º, el *sesamoideo del gemelo externo*; 3.º, el *sesamoideo del tibial posterior*; 4.º, el *sesamoideo del peroneo lateral largo*. Estos tres últimos son muy variables.

LIBRO II

ARTROLOGIA

La artrología es la parte de la anatomía que tiene por objeto el estudio de las articulaciones. Las articulaciones pueden definirse a su vez, el conjunto de partes blandas y duras por medio de las cuales se unen dos o más huesos próximos. Estas articulaciones se dividen en tres clases: 1.ª, articulaciones móviles o *diartrosis*; 2.ª, articulaciones semimóviles o *anfiartrosis*; 3.ª, articulaciones inmóviles o *sinartrosis*.

a) Las *diartrosis* poseen una cavidad articular. Se subdividen en seis géneros, a saber: 1.º, *enartrosis* o articulaciones de superficie esférica (ejemplo: la articulación del hombro); 2.º, *articulaciones condíleas* o *condilartrrosis*, que tienen por superficies articulares zonas esféricas más o menos alargadas (ejemplo: la articulación de la rodilla); 3.º, *articulaciones por encaje recíproco* llamadas también *articulaciones en silla de montar*, en las cuales las superficies articulares, correspondientes exactamente, son convexas en un sentido y cóncavas en otro (ejemplo: la articulación calcaneocuboides); 4.º, *articulaciones en troclea* o *trocleartrosis*, que tienen forma de polea (ejemplo: la articulación humerocubital); 5.º, *articulaciones trocoides*, en las cuales las dos superficies articulares están constituidas una por un cilindro óseo que gira alrededor de su eje, y otra por un anillo osteofibroso (ejemplo: la articulación radiocubital superior); 6.º, *artrodias*, en las cuales las superficies articulares son planas o casi planas (ejemplo: la articulación de las apófisis articulares de las vértebras).

β) Las *anfiartrosis* o articulaciones poco móviles, articulaciones de movimientos poco extensos, se subdividen en dos grupos: 1.º, *anfiartrosis verdaderas* o *típicas*, en las cuales las dos superficies articulares, cada una con un cartilago hialino, están unidas entre sí por un fibrocartilago interóseo (ejemplo: la articulación de los cuerpos verte-

brales entre sí), 2.º, *diartroanfiartrosis*, tipo de transición entre las diartrosis y las anfiartrosis, caracterizada por presentar el fibrocartilago interóseo, en su centro, una cavidad rudimentaria (ejemplo: sínfisis púbica)

y) Las *sinartrosis* o *suturas*, articulaciones completamente inmóviles, se distinguen, según la naturaleza de la sustancia que se encuentra interpuesta entre las superficies articulares, en dos grupos. 1.º, *sinartrosis con sustancia interpuesta cartilaginosa*; 2.º, *sinartrosis con sustancia interpuesta fibrosa*. Las primeras son relativamente raras (ejemplo: articulación de la apófisis estiloides con el peñasco). Las segundas, que son las que más abundan, se subdividen, según la configuración de sus superficies articulares, en cuatro géneros, a saber: 1.º, *suturas dentadas* (aquellas en que las superficies articulares están provistas de dientes que engranan recíprocamente); 2.º, *suturas escamosas* (las que tienen los dos huesos cortados a bisel); 3.º, *suturas armónicas* (en las cuales los huesos establecen contacto por superficies regularmente lisas); 4.º, *esquindilesis* (aquellas en las cuales se encuentran como superficies articulares, por una parte, una ranura, y por otra, una cresta obtusa o cortante).

Desde el punto de vista topográfico las articulaciones se dividen en cuatro grupos, a saber:

- 1.º *Articulaciones de la columna vertebral.*
- 2.º *Articulaciones de la cabeza.*
- 3.º *Articulaciones del tórax.*
- 4.º *Articulaciones de los miembros.*

CAPÍTULO PRIMERO

ARTICULACIONES DE LA COLUMNA VERTEBRAL

Comprendemos bajo este nombre los tres grupos de articulaciones siguientes: 1.º, *articulaciones comunes a la mayor parte de las vértebras*; 2.º, *articulaciones propias de algunas vértebras*; 3.º, *articulaciones propias de la columna con la cabeza*.

ARTÍCULO I

ARTICULACIONES COMUNES A LA MAYORIA DE LAS VERTEBRAS

Las vértebras se articulan principalmente por sus cuerpos y por sus apófisis articulares. Están unidas, además, a distancia por sus láminas, sus apófisis espinosas y sus apófisis transversas.

1.º **Articulaciones de los cuerpos vertebrales entre sí.**— Constituyen el tipo de la verdadera anfiartrosis.

A. SUPERFICIES ARTICULARES.— Están formadas por las dos caras superior e inferior de los cuerpos vertebrales. Ligeramente cóncavas en estado seco, están cubiertas, en estado fresco y en su porción central, por una delgada lámina cartilaginosa.

B. MEDIOS DE UNIÓN.— Dos clases de ligamentos: interóseos y periféricos.

a) *Ligamentos interóseos.*— Llamados también *meniscos* o *discos intervertebrales*, representan a manera de discos dispuestos entre dos vértebras consecutivas. Sus dos caras, superior e inferior, se adaptan a las caras de los cuerpos vertebrales, quedando íntimamente adheridas a las mismas. Su altura, comparada con la de los cuerpos vertebrales, es como 2 es a 5 en la región cervical, 1 es a 3 en la región dorsal y 1 es a 5 en la región lumbar. Cada disco intervertebral,

considerado aisladamente, no presenta en todas sus partes una altura igual en el cuello y en la región lumbar es más grueso por delante que por detrás; en la región dorsal es, por el contrario, más grueso por detrás que por delante. Las curvaturas de la columna en sentido anteroposterior son debidas, en parte, a estas desigualdades.

b) *Ligamentos periféricos.* Representan dos largas cintas fibrosas que ocupan toda la extensión de la columna y se llaman *ligamentos vertebrales comunes*. Se distinguen en anterior y posterior.

a) *El ligamento vertebral común anterior*, situado por delante de la columna vertebral, es una larga cinta que se extiende desde el axis hasta la parte superior del sacro. En el cuello es estrecho y afilado y no cubre mas que la parte media de la columna. En la región dorsal es mucho más ancho y cubre toda la parte de la columna que está situada por delante de la cabeza de las costillas (tiene una porción media y dos porciones laterales). En la región lumbar se estrecha de nuevo y se reduce a una cinta única, que descansa sobre la porción media de la columna. En la región sacra se extiende por la cara anterior de la primera pieza sacra y termina, de ordinario, a nivel de la segunda. El ligamento vertebral común anterior está adherido intimamente a los cuerpos vertebrales y a los discos fibrocartilaginosos que los separan.

β) *El ligamento vertebral común posterior* situado por detrás de los cuerpos vertebrales y, por consiguiente, en pleno conducto raquídeo, representa también una larga cinta fibrosa que se extiende desde el occipital al sacro. Ancho a nivel de los discos interóseos y relativamente estrecho a nivel de los cuerpos vertebrales, tiene bordes señaladamente festoneados. Por arriba, parte del canal basilar; por abajo, se transforma a nivel del sacro en una especie de cordón medio, que, por lo común, puede seguir hasta la primera pieza coccigea. El ligamento vertebral común posterior adhiere intimamente, por su cara anterior, a los discos intervertebrales, y también a los dos bordes superior e inferior de los cuerpos vertebrales, el resto está separado de la parte media de estos últimos por gruesas venas.

1.° **Articulaciones de las apófisis articulares entre sí.** — Pertenecen al grupo de las artrodias.

A. **SUPERFICIES ARTICULARES.** — Son distintas según las regiones: en el cuello son casi planas y de forma oval; en la región dorsal, también planas; en la región lumbar están representadas por segmentos de cilindros, cilindro macizo para la apófisis articular de la vér-

tebra que está por encima, cilindro hueco para la de la vértebra que está por debajo. Todas estas carillas están cubiertas de una capa de cartilago hialino.

B. MEDIOS DE UNIÓN — Difieren también, según las regiones: *en el cuello*, cápsula delgada, de tejido laxo, más gruesa por detrás que por delante; *en la región dorsal*, también una cápsula, pero más compacta, cubierta por dentro por el ligamento amarillo, reforzada por detrás y por fuera por un haz fibroso de coloración blanquecina (especie de *ligamento posterior*), *en la región lumbar*, también una cápsula, reforzada a su vez, por delante, por el ligamento amarillo correspondiente, y por detrás, por un ligamento posterior.

C. SINOVIAL. — Cada articulación posee una sinovial, notable por su laxitud.

3.º Unión de las láminas vertebrales entre sí. — Las láminas vertebrales están unidas entre sí por los *ligamentos amarillos*. Cada lámina va unida a la lámina próxima por dos ligamentos, uno a la derecha y otro a la izquierda

Cada uno de estos ligamentos tiene una forma cuadrilátera, con: 1.º, un *borde superior*, que se inserta en la cara anterior de la lámina que está por encima, 2.º, un *borde inferior* que se inserta en el borde superior de la lámina que está por debajo; 3.º, una *cara anterior*, que corresponde a la duramadre raquídea, 4.º, una *cara posterior*, que está en relación con las láminas vertebrales, y, por medio de éstas, con los músculos espinales; 5.º, un *extremo externo*, que corresponde al lado posterior del agujero de conjunción; 6.º, un *extremo interno*, que corresponde a la base de las apófisis espinosas (en este punto, el ligamento derecho y el izquierdo se continúan recíprocamente uno con otro, excepto en la región cervical, donde están separados por un pequeño intersticio).

Considerados en las distintas regiones de la columna, los ligamentos amarillos disminuyen de amplitud a medida que se desciende. su altura, por el contrario, aumenta gradualmente en el mismo sentido. Lo mismo puede decirse de su grosor.

Entre las láminas de las vértebras cervicales se encuentran pequeñas serosas (*serosas sublaminares*), señaladas por TROLARD.

4.º Unión de las apófisis espinosas entre sí. — Las apófisis espinosas están unidas entre sí: 1.º, por *ligamentos interespinosos*; 2.º, por *ligamentos supraespinosos*

a) *Ligamentos interespinosos.* — Están constituidos por tabiques fibrosos, verticales y situados en la línea media, que llenan por completo los espacios comprendidos entre las apófisis espinosas. Cada uno de estos tabiques se inserta, por arriba, en la apófisis espinosa que está por encima, y por abajo, en la apófisis espinosa que está por debajo. Sus dos caras, laterales, se hallan en relación, a derecha e izquierda, con los músculos de los canales.

b) *Ligamento supraespinoso.* — Es un cordón largo, impar y medio, que se extiende sin interrupción de uno a otro extremo de la columna, adherido íntimamente al vértice de las apófisis espinosas. *En la región lumbar es poco marcado. En la región dorsal se distingue claramente. En el cuello tiene proporciones considerables y recibe el nombre de ligamento cervical posterior.* En esta región adquiere el aspecto de un tabique vertical y medio, de forma triangular, cuyo vértice, dirigido hacia abajo, se inserta en la apófisis espinosa de la sexta o de la séptima cervicales, y cuya base corresponde a la protuberancia occipital externa y a la cresta media que parte de la misma. Rudimentario en el hombre, el ligamento cervical posterior está extraordinariamente desarrollado en los mamíferos cuadrúpedos, en los cuales tiene por objeto sostener en posición la cabeza y el cuello.

5.º *Unión de las apófisis transversas entre sí.* — Están unidas entre sí por los *ligamentos intertransversos*. *En el cuello están poco desarrollados o faltan por completo. En la región dorsal tienen la forma de pequeños fascículos fibrosos, que van desde el vértice de una apófisis transversa al vértice de la apófisis transversa situada por debajo. En la región lumbar, donde se hallan dichos ligamentos más desarrollados, van de la base de la apófisis transversa de una vértebra al tubérculo mamilar y a la apófisis articular superior de la vértebra situada por debajo.*

6.º *Movimientos de conjunto de la columna vertebral.* — La columna vertebral, en su conjunto, puede ejecutar cinco clases de movimientos: flexión, extensión, inclinación lateral (a derecha o a izquierda), circunducción y rotación.

ARTÍCULO II

ARTICULACIONES PROPIAS DE ALGUNAS VERTEBRAS

Bajo esta denominación comprenderemos los tres grupos siguientes: 1.º, las *articulaciones del sacro con los huesos próximos*; 2.º, las *articulaciones de las piezas coccigeas entre sí*; 3.º las *articulaciones de las dos primeras vertebrae cervicales entre sí*.

1. ARTICULACIONES DEL SACRO CON LOS HUESOS PRÓXIMOS

El sacro se articula: 1.º, *por arriba*, con la quinta lumbar; 2.º, *por abajo*, con el cóccix; 3.º, *lateralmente*, con los huesos coxales. Esta última articulación la describiremos más adelante al estudiar la pelvis.

1.º **Articulación sacrovertebral.**— La base del sacro se articula con la quinta vértebra lumbar: 1.º, en la línea media; 2.º, en los lados.

a) *Articulación sacrovertebral media* — Es una verdadera anfiartrosis, semejante a las que unen los cuerpos vertebrales entre sí. Tres ligamentos: 1.º, un ligamento interóseo (disco mucho más grueso por delante que por detrás); 2.º la parte correspondiente del ligamento vertebral común anterior, 3.º, la parte correspondiente del ligamento vertebral común posterior.

b) *Articulaciones sacrovertebrales laterales* — Están constituidas por las articulaciones de las apófisis articulares del sacro con las de la quinta lumbar. Son artrodias que difieren muy poco de las artrodias similares situadas por encima.

c) *Ligamentos a distancia* — Además de las dos articulaciones precitadas, encontramos en la articulación sacrovertebral, 1.º, dos ligamentos amarillos, 2.º, un ligamento interespinoso y un ligamento supraespinal, 3.º un ligamento especial, llamado *ligamento sacrovertebral* (no es constante), que va de la apófisis transversa de la quinta lumbar a la base del sacro.

2.º **Articulación sacrococcigea.**— La articulación del sacro con el cóccix es una anfiartrosis.

a) *Superficies articulares* — Encontramos: 1.º *en el sacro*, una carilla oval, de eje mayor transversal, ligeramente convexa, 2.º, *en el cóccix*, una carilla similar, ligeramente cóncava.

b) *Medios de unión.* — Dos ligamentos: uno interóseo y otro periférico. El *ligamento interóseo* es un fibrocartilago, semejante al que une los cuerpos vertebrales entre sí. Disminuye a medida que el individuo tiene más edad, llegando muchas veces en los viejos a desaparecer. Los *ligamentos periféricos* se distinguen en: 1.º, *ligamento sacrococcigeo anterior*, situado por delante; 2.º, *ligamento sacrococcigeo posterior*, situado por detrás; 3.º, *ligamentos sacrococcigeos laterales*, situados a derecha e izquierda (en cada uno de ellos se distinguen tres haces: interno, medio y externo).

2. ARTICULACIONES INTERCOCÍGEAS

Las diferentes piezas coccígeas están unidas entre sí (*articulaciones intercoccígeas*) por verdaderas anfiartrosis, con los elementos siguientes: 1.º, carillas planas u ovales; 2.º, un pequeño disco interóseo; 3.º, ligamentos periféricos que forman una especie de manguito. Estas articulaciones sólo tienen, generalmente, una existencia efímera.

3. ARTICULACIONES DEL ATLAS CON EL AXIS

El axis se articula con el atlas: 1.º, por sus *elementos propios*, 2.º, por su *apófisis odontoides*.

1.º *Articulación atloldoaxoidea propiamente dicha.* — Esta articulación, que representa, entre el atlas y el axis, las articulaciones de las apófisis articulares de las vértebras siguientes pertenece a la clase de las artrodias.

a) *Superficies articulares.* Por parte del atlas, las carillas que ocupan la cara inferior de las masas laterales; por parte del axis, las apófisis articulares superiores de esta vértebra. *En estado seco*, las carillas atloldoideas son redondeadas de un modo irregular, cóncavas en sentido transversal y planas en sentido anteroposterior. Referente a las carillas axoideas, son ovales, planas en sentido transversal y convexas en sentido anteroposterior. *En estado fresco*, gracias a una cubierta cartilaginosa (más gruesa en el centro que en la periferia), las cuatro carillas atloldoideas y axoideas son convexas en todos sentidos.

b) *Medios de unión.* Cuatro ligamentos: anterior, posterior y laterales. Los *ligamentos atloldoaxoideos laterales*, en número de dos, uno a la derecha y otro a la izquierda, están constituidos, en cada lado, por una especie de capsula fibrosa que se extiende desde el contorno de la carilla atloldoidea al contorno de la carilla axoidea. El *ligamento*

atloidoaxoideo anterior es un tabique fibroso que se extiende desde el borde inferior del arco anterior del atlas a la cara anterior del cuerpo del axis. El *ligamento atloidoaxoideo posterior* lo constituye también un tabique fibroso que parte, por arriba, del arco posterior del atlas y de su tubérculo, y se inserta, por abajo, en las láminas del axis y en la base de su apófisis espinosa.

c) *Sinovial*. Sinovial muy laxa, sobre todo por delante. Dos franjas sinoviales, una anterior y otra posterior.

2.º **Articulación atloidoodontolea.**—Constituye el tipo más perfecto de las articulaciones trocoides.

a) *Superficies articulares*.—Esta articulación está formada. 1.º, por un pequeño cilindro óseo de dirección vertical, constituido por la apófisis odontoides. 2.º, por una especie de anillo osteofibroso, que es el anillo atloideo. El *anillo atloideo* está constituido, por delante, por el arco anterior del atlas, y por detrás, por el *ligamento transverso*, cinta fibrosa muy resistente que se extiende transversalmente de una a otra masa lateral. Unido al occipital por un manojito ascendente (llamado *transversooccipital*) y al axis por un manojito descendente (llamado *transversoaxoideo*), reviste la forma de una cruz, y de aquí su nombre de *ligamento cruciforme*. La *apófisis odontoides* o *diente* presenta dos carillas articulares de forma oval: una, anterior, corresponde al arco anterior del atlas; la otra, posterior, al *ligamento transverso*.

b) *Medios de unión*.—Están representados por dos manojos fibrosos que van del occipital al diente y que describimos en la página siguiente, al estudiar la articulación occipitoaxoidea.

c) *Sinoviales*.—Son en número de dos: una *anterior*, para la articulación del diente con el arco anterior del atlas; la otra *posterior*, para la articulación del diente con el *ligamento transverso*.

ARTÍCULO III

ARTICULACIONES DE LA COLUMNA VERTEBRAL CON LA CABEZA

La cabeza se une por uno de sus huesos, el occipital, con las dos primeras vértebras cervicales, el atlas y el axis. De aquí dos articulaciones distintas.

1.º Articulación occipitoatloidea.—La articulación que une el occipital con el atlas pertenece a la clase de las diartrosis, género de las bicondíleas.

a) *Superficies articulares*.—Por parte del occipital, los dos cóndilos de este hueso; por parte del atlas, las dos cavidades glenoideas correspondientes a sus masas laterales. Los cóndilos del occipital son oblongos, con su eje mayor dirigido oblicuamente de atrás adelante y de fuera adentro; convexos a la vez en sentido anteroposterior y en sentido transversal. Las cavidades glenoideas del atlas, cóncavas en todos sentidos, se corresponden con bastante exactitud con los cóndilos occipitales.

b) *Medios de unión*.—Cuatro ligamentos: anterior, posterior y laterales. Los *ligamentos laterales* o *capsulares* están formados por un conjunto de manojos verticales, que se insertan, por arriba, en la periferia del cóndilo, y por abajo, en el borde de la cavidad glenoidea correspondiente. Son mucho más gruesos por fuera que por dentro. El *ligamento occipitoatloideo anterior* es una ancha membrana que va de la parte anterior del agujero occipital al borde superior del arco anterior del atlas. El *ligamento occipitoatloideo posterior* es también una membrana fibrosa bastante ancha, que va desde el borde posterior del agujero occipital hasta el borde superior del arco posterior del atlas.

c) *Sinoviales*.—Para cada condilartrosis occipitoatloidea existe una sinovial muy laxa, sobre todo en su parte interna.

2.º Articulación occipitoaxoidea.—Como el occipital y el axis no están en relación inmediata por ningún punto, no tienen superficies articulares. Ambos huesos están unidos simplemente por *ligamentos a distancia*. Estos son de dos clases: unos van a parar al laxis y otros terminan en las apófisis odontoides.

A *LIGAMENTOS OCCIPITOAXOIDEOS PROPIAMENTE DICHOS*.—Son en número de tres: uno medio y dos laterales.

a) *Ligamento occipitoaxoideo medio*.—Cinta fibrosa, de 10 a 12 milímetros de ancho, que se inserta por arriba en el canal basilar, un poco por delante del agujero occipital, y termina por abajo en la cara posterior del cuerpo del axis.

b) *Ligamentos occipitoaxoideos laterales*.—En número de dos, uno a la derecha y otro a la izquierda, se insertan, por un extremo, a los dos lados del agujero occipital, y por el otro extremo, a la cara posterior del cuerpo del axis, un poco por fuera del precedente.

E. LIGAMENTOS OCCIPITOODONTOIDEOS. — Son, como los que acabamos de describir, en número de *tres*: uno medio y dos laterales.

a) *Ligamento occipitodontideo medio.* — Cordón fibroso, muy corto, que va de la parte anterior del agujero occipital al vértice de la apófisis odontoides (*ligamento suspensorio de la apófisis odontoides*). Es un pseudoligamento: representa, en efecto, el disco intervertebral que une la primera vértebra craneal con la primera vértebra cervical, esta vértebra cervical no es otra que la apófisis odontoides.

b) *Ligamentos occipitodontideos laterales.* — En número de dos, uno a cada lado, muy cortos y en extremo potentes, parten de la cara interna de los cóndilos occipitales y van a parar a los lados de la mitad superior de la apófisis odontoides.

CAPITULO II

ARTICULACIONES DE LA CABEZA

Las articulaciones de la cabeza comprenden los tres grupos siguientes: 1.º, *articulaciones de los huesos del cráneo entre sí*; 2.º, *articulaciones de los huesos de la mandíbula superior entre sí*; 3.º, *articulación del maxilar inferior con el cráneo o articulación temporomaxilar*.

1. ARTICULACIONES DE LOS HUESOS DEL CRÁNEO ENTRE SÍ

Los huesos del cráneo se unen entre sí por medio de suturas o sinartrosis, como la *sutura escamosa* (véase anteriormente, pág. 88).

2. ARTICULACIONES DE LOS HUESOS DE LA MANDÍBULA SUPERIOR ENTRE SÍ Y CON EL CRÁNEO

Los huesos de la mandíbula superior se articulan también entre sí formando *suturas*; la variedad predominante es la *sutura armónica*. Por otra parte, la mandíbula superior, considerada en su totalidad, se une a la parte anterior de la base del cráneo, formando una nueva serie de sinartrosis. Estas *sinartrosis craneofaciales* corresponden a los tres tipos siguientes: *sutura dentada* (ejemplo: articulación de los huesos propios de la nariz con el frontal); *sutura armónica* (ejemplo: articulación del palatino con la apófisis pterigoideas); la *esquindileis* (ejemplo: articulación del borde superior del vómer con la cara inferior del cuerpo del esfenoideas).

3. ARTICULACIÓN TEMPOROMAXILAR

La articulación temporomaxilar pertenece, en el hombre, al género de las articulaciones bicondíleas.

1.º Superficies articulares. — De las dos superficies articulares, una pertenece al maxilar inferior y otra al temporal.

a) *Superficie maxilar* — Esta constituida por el cóndilo, eminencia elipsoidal que mide 25 milímetros de longitud por 8 de anchura y se dirige oblicuamente de fuera adentro y de delante atrás. Los ejes mayores de los dos cóndilos, prolongados por dentro, se encuentran un poco por delante de la parte central del agujero occipital. Cada cóndilo presenta una *vertiente anterior* y una *vertiente posterior*, que se unen entre sí en el punto culminante del cóndilo, formando una arista obtusa transversal (es digno de mención que el revestimiento de la superficie articular es una formación conjuntiva y no una formación cartilaginosa). El cóndilo descansa sobre una porción más estrecha, llamada *cuello* (en su parte anteroexterna se encuentran una depresión para el pterigoideo externo).

b) *Superficie temporal*. — El temporal, para esta articulación, presenta 1.º, por delante una eminencia transversal, francamente convexa de delante atrás, ligeramente cóncava de dentro afuera, llamada *condilo del temporal*, que está formada por la raíz transversa de la apofisis cigomática. 2.º, por detrás del cóndilo, la *cavidad glenoidea* (depresión profunda de forma elipsoidal con su eje mayor dirigido transversalmente, dividida por la *cisura de Glaser* en dos porciones, una anterior y otra posterior, de estas dos porciones, únicamente la primera es articular, esto es, está cubierta del cartilago (también aquí el revestimiento es conjuntivo y no cartilaginoso). Unidos entre sí el cóndilo del temporal y la porción articular de la cavidad glenoidea representan una especie de cuadrilátero, que mide 22 milímetros en sentido transversal y 20 en sentido anteroposterior.

2.º Menisco interarticular. — Como la superficie maxilar es muy convexa y la superficie temporal es a la vez cóncava y convexa, las dos superficies no se corresponden. La concordancia se establece por la interposición de un menisco interarticular. Este menisco es de forma elíptica y tiene su eje mayor dirigido transversalmente, estando orientado de manera que una de sus caras mira hacia arriba y adelante y la otra hacia abajo y atrás. La primera, en relación con el cóndilo temporal, es cóncava en su parte anterior y convexa en su parte posterior; la segunda, en relación con el cóndilo maxilar, es cóncava en toda su extensión. De los dos bordes del menisco, el posterior es siempre más grueso que el anterior. De sus dos extremos, el interno y el externo se doblan ligeramente hacia abajo y se fijan, por

medio de delgados fascículos fibrosos, a los extremos correspondientes del cóndilo, de esta disposición resulta que, al efectuarse los movimientos, el menisco acompaña siempre al cóndilo.

3.º Medios de unión. — Existe un *ligamento capsular*, reforzado a los lados por dos *ligamentos laterales*.

a) *Ligamento capsular.* — Forma una especie de manguito dispuesto alrededor de la articulación, y se inserta: 1.º, *por abajo*, por su circunferencia inferior alrededor del cuello. 2.º, *por arriba*, por su circunferencia superior, en el borde anterior de la raíz transversa del arco cigomático, en el tubérculo cigomático, en el fondo de la *cavidad glenoidea* (un poco por delante de la cisura de Glaser) y en la base de la espina del esfenoides. El ligamento capsular está adherido a los bordes.

b) *Ligamento lateral externo.* — Situado por fuera de la cápsula, se inserta, por arriba, en el tubérculo cigomático y, por detrás del mismo, en la raíz longitudinal del cigoma. Desde este punto se dirige oblicuamente hacia abajo y atrás y va a fijarse en la parte posteroexterna del cuello. Es el medio de unión principal de esta articulación.

c) *Ligamento lateral interno.* — Situado en el lado interno de la cápsula, se extiende desde el borde interno de la cavidad glenoidea a la parte postero-interna del cuello. Presenta grandes analogías con el precedente, pero es mucho más delgado.

d) *Ligamentos accesorios.* — Estos son los pseudoligamentos. 1.º, el *ligamento esfenomaxilar*, cinta rectangular (4 milímetros de ancho en su parte media) que parte del lado externo de la espina del esfenoides y termina cerca del orificio superior del conducto dentario, unas veces en la espina de Spix y otras por detrás de la espina; 2.º, el *ligamento estilomaxilar*, que es también una cinta fibrosa de forma triangular, que se inserta por su vértice en el vértice de la apófisis estiloides y, por su base, en el borde parotídeo del maxilar, un poco por encima del ángulo inferior; 3.º, el *ligamento pterigomaxilar* (o *oponeurosis buccinofaringea*), hoja fibrosa, más o menos marcada, que va desde el gancho del ala interna de la apófisis pterigoides al extremo posterior del borde alveolar del maxilar inferior.

4.º Sinoviales. — Existen dos sinoviales: una *superior*, situada entre el menisco y el temporal (es la más extensa), y otra *inferior*, situada por debajo del menisco, entre éste y el cóndilo. A veces las

dos sinoviales comunican entre sí por un agujero que ocupa la parte central del menisco

5° **Movimientos.**—El maxilar puede ejecutar tres clases de movimientos 1.°, *movimientos de descenso y elevación* (movimientos de rotación alrededor de un eje transversal que pasaría por la parte media de la rama del maxilar inferior, un poco por encima del orificio del conducto dentario); 2.°, *movimientos de proyección hacia delante y atrás*, 3.°, *movimientos de lateralidad o de diducción*, por los cuales el mentón se dirige alternativamente a izquierda y a derecha de la línea media (movimientos de rotación alrededor de un eje cervical que pasaría alternativamente por el cóndilo izquierdo y por el cóndilo derecho).

CAPITULO III

ARTICULACIONES DEL TORAX

En el tórax se encuentran los cinco grupos de articulaciones siguientes: 1.º, *articulación de las costillas con la columna vertebral*; 2.º, *articulación de las costillas con los cartílagos costales*; 3.º, *articulación de los cartílagos costales con el esternón*; 4.º, *articulación de los cartílagos costales entre sí*; 5.º, *articulación de las distintas piezas del esternón entre sí*.

1. ARTICULACIÓN DE LAS COSTILLAS CON LA COLUMNA VERTEBRAL.

Las costillas se articulan con la columna vertebral en dos puntos: 1.º, *con los cuerpos vertebrales* (son las *articulaciones costovertebrales* propiamente dichas); 2.º, *con las apófisis transversas* (son las *articulaciones costotransversas*).

1.º *Articulaciones costovertebrales propiamente dichas.*

Está constituida cada una por dos artrodiar:

a) *Superficies articulares* — Encontramos: 1.º, *por parte de la cabeza de la costilla*, dos carillas planas, una superior y otra inferior, que se inclinan recíprocamente una hacia otra y están separadas por una cresta obtusa dirigida de delante atrás; 2.º, *por parte de los cuerpos vertebrales*, dos carillas similares, que pertenecen, una a la vértebra que está encima y otra a la vértebra que está debajo, estando separadas entre sí por el disco intervertebral correspondiente. En resumen, por una parte, una especie de cuña; por otra, un ángulo diedro.

b) *Medias de unión.* — Tres ligamentos: 1.º, *ligamento interóseo*, hoja transversal, muy corta, que va de la cresta costal al disco intervertebral; 2.º, *ligamento anterior o ligamento radiado*, situado por delante de la articulación en forma de abanico, que se inserta en su vértice en la parte anterior de la cabeza y por su base en la co-

lumna vertebral (el disco intervertebral y las dos vértebras adyacentes); 3.º *ligamento posterior*, situado en la parte posterior de la articulación, formado por dos fascículos nacarados que salen de la parte posterior superior del cuello de la costilla y terminan en parte en la cara posterior de los cuerpos vertebrales y en parte en el disco intervertebral.

c) *Sinoviales*. Para cada articulación hay dos sinoviales: una superior y otra inferior, separadas por el ligamento interóseo. De ordinario comunican entre sí por detrás de este ligamento. Hay que advertir que, en la 1.ª, 11.ª y 12.ª articulaciones costovertebrales, las costillas no se articulan más que con una sola vértebra; estas articulaciones están constituidas por una sola artrodia, y por esto no presentan más que una sola sinovial y carecen de ligamento interóseo o sólo tienen un ligamento interóseo muy rudimentario.

d) *Movimientos*.— Véase la articulación siguiente.

2.º **Articulación costotransversa.**— Es también una artrodia. Esta articulación no se efectúa con las dos últimas costillas, llamadas *costillas flotantes*.

a) *Superficies articulares*. Encontramos: 1.º, *por parte de la costilla*, una carilla redondeada y ligeramente convexa, situada en la tuberosidad; 2.º, *por parte de la apófisis transversa*, una carilla similar, ligeramente cóncava, situada en el vértice de la apófisis.

b) *Medios de unión*.— Cuatro ligamentos llamados costotransversos: 1.º, *ligamento costotransverso interóseo*, fascículos fibrosos muy cortos, pero muy resistentes, que van del cuello de la costilla a la cara anterior de la apófisis transversa; 2.º, *ligamento costotransverso posterior*, cinta fibrosa rectangular, que va desde la tuberosidad costal al vértice de la apófisis transversa correspondiente; 3.º, *ligamento costotransverso superior*, fascículo aplanado y cuadrilátero, que va desde el borde del cuello de la costilla al borde inferior de la apófisis transversa situada por encima; 4.º, *ligamento costotransverso inferior* menos importante que el precedente, formado por un conjunto de pequeños manojos que, desde el borde inferior de la costilla, se dirigen hacia el vértice de la apófisis transversa situada por debajo.

c) *Sinoviales*.— Cada articulación costotransversa posee una sinovial rudimentaria.

d) *Movimientos*.— Las costillas se elevan y se hunden. Al elevarse, ejecutan al propio tiempo los tres movimientos siguientes: 1.º, se dirigen hacia delante; 2.º, se dirigen hacia fuera; 3.º, giran de den-

tro afuera, alrededor de un eje ficticio que pasaría por sus dos extremos, de manera que inclinan su cara interna hacia abajo. *Al descender*: 1.º, se dirigen hacia atrás; 2.º, se dirigen hacia dentro, 3.º, giran alrededor del eje ficticio precitado, de manera que inclinan su cara interna hacia dentro. El esternón, por estar unido a las costillas, se dirige hacia delante cuando aquéllas se elevan, y hacia atrás cuando descenden. Por lo que toca a la capacidad del tórax, aumenta en sus tres diámetros cuando las costillas se elevan y disminuye (también en sus tres diámetros) cuando descenden. De aquí esta doble conclusión: 1.º, todos los músculos que elevan las costillas agrandan el tórax y son *inspiratorios*, 2.º, todos los músculos que hunden las costillas estrechan el tórax y son *expiratorios*.

2. ARTICULACIÓN DE LAS COSTILLAS CON LOS CARTÍLAGOS COSTALES

Las costillas y los cartílagos costales se unen entre sí (*articulaciones condrocostales*) formando sinartrosis. Para estas articulaciones se encuentra: 1.º, *por parte de la costilla*, una cavidad elipsoide, de diámetro mayor vertical; 2.º, *por parte del cartílago costal*, una superficie de forma inversa. Los dos segmentos esqueléticos están sostenidos en contacto por su soldadura recíproca, así como por la continuidad, en aquel punto del periostio y el pericondrio.

3. ARTICULACIÓN DE LOS CARTÍLAGOS COSTALES CON EL ESTERNÓN

Solo los siete primeros cartílagos costales están unidos al esternón. Estas articulaciones, llamadas *condroesternales*, son artrodias y presentan gran analogía con las costovertebrales.

1.º **Superficies articulares.** — Encontramos: 1.º, *por parte del esternón*, dos pequeñas carillas planas, una superior y otra inferior, que se inclinan una hacia otra, formando en conjunto un *ángulo diedro* de vértice externo (este ángulo se redondea a medida que el individuo aumenta en edad, y se convierte en una especie de fosita, llamada *fosita esternal*); 2.º, *por parte del cartílago costal*, dos carillas dirigidas en sentido inverso, que transforman el extremo del cartílago en una especie de *cuña*.

2.º **Medios de unión.** — Cuatro ligamentos: 1.º, un *ligamento interdseo*, que va desde el vértice de la cuña cartilaginosa a la parte

mas profunda de la fosita esternal; 2.º, un *ligamento capsular*, que se extiende de la periferia de una a otra superficie articular, 3.º, un *ligamento radiado anterior* (que refuerza por delante a la cápsula articular), dispuesto en forma de abanico, que se inserta por su vértice en el cartílago costal y por su base en la cara anterior del esternón 4.º un *ligamento radiado posterior*, situado por detrás de la articulación, que presenta la misma disposición que el anterior.

3.º **Sinoviales.** Las sinoviales, rudimentarias, son en número de una o dos, según las articulaciones y según los individuos. Generalmente no se encuentran en los individuos de edad avanzada.

4.º **Caracteres particulares de algunas articulaciones condroesternales.** — Es de notar

α) Que la *primera articulación condroesternal* presenta superficies planas en lugar de superficies angulosas, que sólo en muy raros casos tiene cavidad articular y que posee dos ligamentos especiales: los *ligamentos conoides*, que van del borde superior del cartílago costal a la parte correspondiente del esternon;

β) Que a *segunda articulación condroesternal* se caracteriza por una disposición angular mas pronunciada que en las demás articulaciones

γ) Que la *séptima articulación condroesternal* presenta un ligamento especial, llamado *ligamento costoxifoideo*, ancha cinta fibrosa que va desde el séptimo cartílago costal a la cara anterior del apéndice xifoides.

4 ARTICULACIÓN DE LOS CARTÍLAGOS COSTALES ENTRE SÍ

Los 6.º, 7.º y 8.º cartílagos costales (algunas veces también el 5.º y el 9.º) se articulan cada uno con el cartílago subyacente por medio de una artrodia. Estas articulaciones, llamadas *intercondrales*, están situadas, as más de las veces, en la parte media del cartílago. En el punto de contacto se encuentran dos pequeñas carillas ovales. Están sujetas por el pericondrio que se continúa de uno a otro cartílago, y por algunos fascículos fibrosos, dirigidos vertical u oblicuamente, que van del cartílago suprayacente a cartílago subyacente Sinovial muy rudimentaria

5 ARTICULACIÓN DE LAS DISTINTAS PIEZAS DEL ESTERNÓN ENTRE SÍ

Las tres piezas constitutivas del esternón están unidas entre sí por dos articulaciones, llamadas *esternales*, que se distinguen en *superior e inferior*.

1° Articulación esternal superior. Une el mango del esternón con el cuerpo. Forma, según los casos, una anfiartrosis o una diartroanfiartrosis. En cada una de las dos piezas se encuentra una carilla oval con su eje mayor transversal, cubierta por una delgada capa de cartilago hialino. Entre las dos carillas se encuentra un fibrocartilago (verdadero *ligamento interóseo*) que presenta a veces en su centro una parte blanda y difluente o una verdadera cavidad articular. Como medio de unión hay el periostio, que, sin interrumpirse, pasa de una a otra pieza.

2° Articulación esternal inferior. — Une el cuerpo del esternón con el apéndice xifoides. Es una sincondrosis. Dos superficies planas y alargadas en sentido transversal. Están sostenidas por un fibrocartilago interóseo y por el manguito fibroso perióstico. Las dos articulaciones esternales son sólo temporales: la inferior se osifica, de ordinario, a los cincuenta o sesenta años; la superior desaparece también, pero sólo en la extrema vejez.

CAPÍTULO IV

ARTICULACIONES DE LOS MIEMBROS

Las diferentes palancas óseas que entran en la constitución de los miembros, torácicos o pélvicos, están unidas entre sí por articulaciones importantes, que pertenecen, en su mayoría, a la clase de las diartrosis. Al permitir a los miembros los movimientos más diversos y extensos, les facilitan el cumplimiento de las dos principales funciones que les están encomendadas: la locomoción y la prensión. Estudiaremos sucesivamente:

1.º Las articulaciones del miembro superior.

2.º Las articulaciones del miembro inferior

ARTÍCULO I

ARTICULACIONES DEL MIEMBRO SUPERIOR

El miembro superior comprende los seis grupos de articulaciones siguientes: 1.º, las articulaciones de los huesos del hombro entre sí y con el tórax, 2.º, la articulación del brazo con el hombro o articulación escapulohumeral, 3.º, la articulación del antebrazo con el brazo o articulación del codo, 4.º, las articulaciones de los dos huesos del antebrazo entre sí o articulaciones radiocubitales; 5.º, la articulación de la mano con el antebrazo o articulación de la muñeca, 6.º, las articulaciones intrínsecas de la mano

1. ARTICULACIONES DE LOS HUESOS DEL HOMBRO

La clavícula se articula, por una parte, con el esternón y la primera costilla (*articulación esternocostoclavicular*), y por otra, con el acromion (*articulación acromioclavicular*). Se une, además, con la

apófisis coracoides por cierto número de ligamentos especiales, llama-
dos *ligamentos coracoclaviculares*.

1.º Articulación esternoclavicular.—Esta articulación, que une la cintura escapular con el tórax es una articulación por doble encaje recíproco.

a) *Superficies articulares* — 1.º, *por parte del tórax*, en el esternón, una carilla oblonga con el diámetro mayor transversal (situada al lado de la horquilla), en el primer cartílago costal, una pequeña superficie plana triangular (limitada por delante y por detrás por los dos ligamentos conoides y trapezoides; 2.º, *por parte de la clavícula*, dos carillas una vertical y otra horizontal que se continúan recíprocamente formando un ángulo de 85 a 95 grados.

b) *Fibrocartilago interarticular* — La superficie esternocostal es muy cóncava en sentido transversal; la superficie clavicular, con sus dos carillas, tiene la forma de un ángulo diedro saliente. Por lo tanto ambas superficies no se corresponden. La concordancia se establece por la aparición entre las dos superficies articulares de un fibrocartilago o menisco interarticular, el cual por arriba y por abajo, se amolda exactamente a las carillas articulares correspondientes. Por su borde anterior, su borde posterior y su extremo interno, el fibrocartilago interarticular se fusiona con el aparato ligamentoso de la articulación. Por su extremo externo se fusiona, de ordinario, con el primer cartilago costal.

c) *Medios de union* — Cápsula fibrosa, reforzada por cuatro ligamentos (anterior posterior, superior e inferior). El *ligamento anterior* situado por delante de la articulación, se extiende desde la cara anterior del extremo interno de la clavícula a la cara anterior del mango del esternón. El *ligamento posterior* está situado en la cara posterior de la articulación, su disposición es análoga a la del precedente. El *ligamento superior* está formado por fibras muy cortas, que, desde el extremo interno de la clavícula, se dirigen a la parte lateral de la horquilla esternal; a estas fibras se añaden fibras más largas, que van transversalmente de una a otra clavícula (*ligamento interclavicular*). El *ligamento inferior* o *ligamento costoclavicular* está constituido por manojos muy cortos, que van de la parte externa del primer cartilago costal a la cara inferior de la clavícula.

d) *Sinoviales* — Dos sinoviales: una *interna*, situada entre el menisco y el esternón, y otra *externa*, situada entre el menisco y la clavícula.

c) *Movimientos.* La clavícula, llevando consigo el miembro superior, presenta esos movimientos 1.º, *descenso y elevación*; 2.º, *proyección hacia delante y proyección hacia atrás*, 3.º, *circunducción*.

2.º Articulación acromioclavicular. Pertenece al género de las artrodias.

a) *Superficies articulares.* — Encontramos 1.º, *por parte de la clavícula*, y en su extremo externo, una carilla prolongada de delante atrás, casi plana; 2.º, *por parte del acromion*, una carilla semejante, que ocupa la parte más anterior del borde interno de la apófisis que nos ocupa.

b) *Medios de unión.* — Los dos huesos están unidos entre sí por una cápsula, reforzada por dos ligamentos, uno superior y otro inferior. El *ligamento acromioclavicular superior* está formado por un conjunto de manojos fibrosos de dirección transversal, situados en la cara superior de la articulación y que van del acromion a la clavícula. El *ligamento acromioclavicular inferior*, situado en la cara inferior de la articulación es semejante al precedente, aunque mucho más delgado (falta algunas veces).

c) *Fibrocartilago interarticular.* — Entre las dos superficies articulares se interpone con bastante frecuencia (dos veces por tres) un fibrocartilago o menisco, que forma entre los dos huesos un tabique completo o incompleto.

d) *Sinovial.* — Sinovial simple o doble, según que el fibrocartilago ocupe sólo una parte o toda la altura de la articulación.

e) *Movimientos.* — Simples movimientos de deslizamiento. El principal es, para el omóplato, un *movimiento de rotación o de báscula* alrededor de un eje que pasa por las articulaciones acromio y coracoclaviculares, en el cual la cara anterior del hueso se desliza sobre la parte correspondiente del tórax. Estos movimientos son de tal índole, que el ángulo externo y el ángulo superior del omóplato se mueven simultáneamente, pero en sentido inverso, el ángulo externo (y por extensión, el muñón del hombro) desciende cuando el ángulo superior se eleva, y, viceversa, el ángulo externo se eleva cuando desciende el ángulo superior.

3.º Unión de la clavícula con la apófisis coracoides. — La clavícula y la apófisis coracoides, sin formar articulación en el verdadero sentido de la palabra, están unidas por dos ligamentos: uno anteroexterno y otro posterointerno.

a) *Ligamento coracoclavicular anteroexterno* — Este ligamento, llamado también *trapezoide*, tiene la forma de una hoja cuadrilátera orientada en sentido sagital. Nace, por abajo, de la parte posterior del borde interno de la apófisis coracoides, desde este punto se dirige oblicuamente hacia arriba y afuera y va a fijarse en la cara inferior de la clavícula.

b) *Ligamento coracoclavicular posterointerno* — Llamado también *conoide*, tiene la forma de una hoja triangular, orientada en sentido frontal. Por su vértice se inserta en la base de la apófisis coracoides, y desde allí se dirige verticalmente hacia arriba, extendiéndose en forma de abanico, y va a fijarse, por su base, en el borde posterior de la clavícula.

c) *Bolsas serosas subclaviculares* — El espacio comprendido entre los dos ligamentos precisados está ocupado por una masa celulo-adiposa, en el seno de la cual se desarrolla con bastante frecuencia (una vez por dos) una bolsa serosa. Existe a veces una segunda bolsa para el espesor del ligamento conoide.

4° **Ligamentos propios de la escápula.** — Son en número de dos: el *ligamento coracoideo* y el *ligamento acromiocracoteo*.

a) *Ligamento coracoideo* — Cinta fibrosa, plana y delgada que va de la base de la apófisis coracoides a la parte superior y posterior de la escotadura coracoidea, la cual queda de este modo convergida en un agujero. Por este agujero pasan el nervio supraescapular y una o varias venillas, por fuera del agujero, encima del ligamento coracoideo, pasa la arteria supraescapular.

b) *Ligamento acromiocracoteo*. — Otra cinta fibrosa, de forma triangular, que se fija por su vértice en el extremo anterior del acromion y, desde este punto, se dirige transversalmente hacia dentro para ir a terminar en el borde externo de la apófisis coracoides en toda su extensión. Unido a las dos eminencias óseas en las cuales se inserta, este ligamento forma, juntamente con aquellas, una especie de bóveda osteofibrosa llamada *bóveda acromiocracotea*, que sobresale de la articulación del hombro.

2. ARTICULACIÓN ESCAPULOHUMERAL

La articulación escapulohumeral, o articulación del hombro, une el miembro superior con la cintura torácica. Pertenece a la clase de las enartrosis.

1.º Superficies articulares.—Tiene por superficies articulares: 1.º, la cabeza del humero, 2.º, la cavidad glenoidea del omóplato.

a) *Cabeza del humero* — Eminencia redondeada y lisa, que representa aproximadamente el tercio de una esfera cuyo radio fuese de 25 a 30 milímetros. Mira oblicuamente hacia arriba, adentro y atrás. Su eje forma, con el del húmero, un ángulo de 130 a 150 grados. Por fuera de la cabeza se encuentran el cuello anatómico, el troquín, el troquíter y la corredera bicipital (véase *Osteología*). Sobre la cabeza humeral se extiende una cubierta cartilaginosa, cuyo espesor varía de 1,5 a 2 milímetros (este espesor es algo más pronunciado por arriba que por abajo).

b) *Cavidad glenoidea*. — La cavidad glenoidea o *gleno escapular* ocupa el ángulo externo del omóplato. Tiene la forma de un óvalo, de eje mayor vertical y cuya extremidad mayor ocupa la parte inferior. Dimensiones: 35 milímetros de alto por 25 de ancho. Está excavada, pero es poco profunda. En su centro se ve, en el hueso seco, una pequeña eminencia redondeada llamada *tuberculo glenoideo*. El borde que la limita presenta, en su parte interna y superior, una pequeña escotadura, llamada *escotadura glenoidea*. Sobre la cavidad glenoidea se extiende, en estado fresco, una capa de cartilago hialino más gruesa en la periferia que en el centro, y más también en la parte inferior que en la superior. A nivel del tuberculo glenoideo (donde su grosor es mínimo), el cartilago toma el aspecto de una mancha amarillenta, llamada *mancha glenoidea*. Por dentro de la cavidad glenoidea se encuentran el cuello del omóplato, la apófisis coracoides y el acromion (véase *Osteología*).

2.º Rodete glenoideo. Rodeando la cavidad glenoidea a manera de un marco, se encuentra un cordón fibrocartilaginoso, llamado *rodete glenoideo*. Es prismático triangular, y, por consiguiente, presenta tres caras: 1.º una *cara posterior*, que corresponde a la circunferencia de la cavidad glenoidea y está intimamente adherida a la misma en casi toda su extensión (por arriba está separada por una hendidura más o menos profunda); 2.º, una *cara externa*, en la cual se inserta la cápsula; 3.º una *cara interna*, lisa y articular, que se inclina hacia la cavidad glenoidea y se continúa con la misma. Hay que tener presente que, al llegar a la escotadura glenoidea, el rodete pasa unas veces como un puente, caso en el cual queda por debajo del mismo un pequeño agujero por el que se insinúa un fondo de saco de la sinovial. Aunque agrandada por su rodete, la cavidad glenoidea re-

sulta todavía mucho más pequeña que la que debiera ser para alojar la cabeza del humero.

3.º Medios de unión.—Las dos superficies articulares están unidas por una *capsula fibrosa*, reforzada por un *ligamento coracohumeral* y *ligamentos glenohumerales*.

A CÁPSULA FIBROSA — Tiene la forma de un manguito fibroso, que se inserta, por su circunferencia superior, alrededor de la cavidad glenoidea, y por su circunferencia inferior en el cuello del humero. *Por parte del omoplato*, la inserción se efectúa en la parte externa del rodete glenoideo o en la parte próxima al cuello (debe tenerse presente que en la parte superior, la cápsula traspasa los límites del rodete y va a insertarse en la base de la apófisis coracoides). *Por parte del humero*, la inserción se efectúa así: en su mitad superior, en el labio externo del cuello anatómico, en su mitad inferior, en el cuello quirúrgico, a 8 ó 10 milímetros de la cubierta cartilaginosa.

Exteriormente, la cápsula articular está en relación con los cuatro músculos subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, cuyos tendones se fusionan completamente con ella. Fuera de los puntos en que está reforzada por esos tendones, la cápsula es relativamente delgada. Además, es muy laxa y permite a las superficies articulares, cuando se insufla aire en la sinovial, una separación de 2 a 3 centímetros.

Histológicamente el ligamento capsular se compone de manojos fibrosos, longitudinales en su mayor parte, y los que no lo son adoptan una dirección circular u oblicua.

B. LIGAMENTO CORACOHUMERAL — Esta representado por una hoja fibrosa, muy ancha y gruesa, que parte de la base y borde externo de la apófisis coracoides y va a parar al troquíter y cerca de la cápsula articular. Morfológicamente ha de ser considerado como el tendón terminal del pectoral menor, que, secundariamente, se ha fijado en la apófisis coracoides.

C. LIGAMENTOS GLENOHUMERALES.— Se designan con este nombre tres cintas fibrosas, que están aplicadas sobre la cara anterior de la cápsula y, adhiriéndose íntimamente a la misma, desempeñan la misión de reforzarla. Se dividen en superior, medio e inferior.

a) El *ligamento glenohumeral superior* (*supraglenosuprahumeral* de Farabeuf) nace de la parte superior del rodete glenoideo y de la superficie osca próxima. Desde este sitio se dirige transversalmente hacia fuera, para ir a insertarse en el cuello anatómico, entre la ca-

beza y el troquin. Morfológicamente, este ligamento representaría, en el hombro, el ligamento redondo de la articulación de la cadera.

β) El *ligamento glenohumeral medio* (*supraglenohumeral de Farabeuf*) parte del rodete glenoidal a igual nivel que el precedente. Desde este punto se dirige hacia abajo y afuera, para ir a fijarse en la base del troquin. Entre este ligamento y el precedente queda un espacio de forma triangular: el *foramen oval de Wertheim* u *ojo del subescapular* (porque lo atraviesa el tendón de este músculo).

γ) El *ligamento glenohumeral inferior* (*preglenosubhumeral de Farabeuf*), el más largo y más fuerte de los tres, se origina en la parte anterior e inferior del reborde glenoidal y va a fijarse por el otro extremo en la parte anterior e inferior del cuello quirúrgico entre la inserción del músculo subescapular y la del redondo menor.

4° **Sinovial.** - La sinovial escapulohumeral es de las más sencillas. Cubre toda la superficie interior de la cápsula y, al llegar a las inserciones superior e inferior de esta cápsula, se dobla sobre sí misma para ir a terminar alrededor de las superficies articulares correspondientes. Envía al exterior dos prolongaciones: 1°, la *bolsa subescapular*, que, saliendo por el foramen oval, va a colocarse debajo del músculo subescapular; 2°, la *bolsa bicipital* que acompaña en la corredera bicipital al tendón de la porción larga del biceps. A veces se encuentra una tercera prolongación muy pequeña, que se introduce en la escotadura glenoidal.

5° **Movimientos.** La articulación del hombro, la más móvil de las enartrosis, presenta los cuatro movimientos fundamentales siguientes: 1°, *abducción y aducción*, movimientos por los cuales el húmero se separa o se acerca al tronco (movimiento de rotación alrededor de un eje anteroposterior que pasara por la parte inferoexterna de la cabeza); 2°, *proyección hacia delante y proyección hacia atrás* (o bien *flexión y extensión*), movimientos de rotación alrededor de un eje transversal que pasara a la vez por el centro del troquíter y por el de la cavidad glenoidea; 3°, *circunducción*; 4°, *rotación hacia dentro y rotación hacia fuera*, alrededor de un eje vertical que pasara a la vez por el centro de la cabeza humeral y por la epitróclea.

3. ARTICULACIÓN DEL CODO

La articulación del codo une el brazo con el antebrazo. Está formada en realidad, por dos articulaciones: la articulación del húmero

con el cubito (trocleartrosis) y la articulación del húmero con el radio (trocoide). Pero como el radio se mueve también por los movimientos de la trocleartrosis y como, por otra parte, no existe más que una sinovial, conviene comprender las dos articulaciones en una sola y única descripción.

1.º Superficies articulares. — Tres piezas óseas: el extremo inferior del húmero, el extremo superior del cúbito y el extremo superior del radio.

a) *Extremidad inferior del húmero* — Presenta: 1.º, por dentro, la *tróclea humeral*, destinada a articularse con el cubito; 2.º, por fuera, el *cóndilo o cabeza menor del húmero*, destinado a articularse con el radio; 3.º, en su parte media, entre la tróclea y el cóndilo, un canal anteroposterior, llamado *canal condilotroclear*, formado por dos planos inclinados, que corresponden uno a la parte interna del cóndilo y otro al borde externo de la tróclea. Estas tres partes están cubiertas, en estado fresco, por una sola y única capa de cartilago diartrodial, cuyo espesor varía de 1 a 1,5 milímetros (2 milímetros en el borde externo de la tróclea). Como partes accesorias, la *fosa olecraneana*, la *fosa coronóidea*, la *fosa supracondílea*, la *epitróclea* y el *epicóndilo*, partes que hemos descrito ya en *Osteología*.

b) *Extremidad superior del cúbito*. — La extremidad superior del cubito, que se articula con la tróclea humeral, presenta para este objeto la *cavidad sigmoidea mayor*, que termina, por arriba, con el *pico del olecranon* y por abajo, con la *apófisis coronóidea* (véase *Osteología*). La superficie sigmoidea está cubierta por una capa de cartilago, de 1 a 1,5 milímetros de espesor.

c) *Extremidad superior del radio* — La extremidad superior del radio, que se articula con el cóndilo humeral, presenta para este objeto, la *cupula radial o cavidad glenóidea del radio*, circunscrita en todo su contorno por un reborde poco saliente, uniforme y liso como la cupula propiamente dicha (es de notar que la porción interna de este reborde corresponde al canal condilotroclear). Como la superficie sigmoidea del cúbito, la superficie sigmoidea del radio está cubierta por una capa de cartilago de 1 a 1,5 milímetros de espesor.

2.º Medios de unión. — Un *ligamento capsular* y cuatro *ligamentos periféricos* (anterior, posterior, interno y externo).

a) *Ligamento capsular* — Especie de manguito fibroso que se inserta: 1.º, por arriba, por su circunferencia superior en la extremidad

inferior del húmero; 2.º, *por abajo*, por su circunferencia inferior, en la extremidad superior del cúbito y en la extremidad superior de radio (alrededor del cuello, a 6 ó 7 milímetros por debajo de la cápsula).

b) *Ligamento anterior* — Relativamente delgado, cubre la cara anterior de la cápsula en toda su extensión. Se inserta: 1.º, *por arriba*, por encima de las dos fositas coronoidea y supracondilea, en la cara anterior de la epitróclea y en la parte externa del cóndilo; 2.º, *por abajo*, en el lado anteroexterno de la apófisis coronoideas y en la parte correspondiente del anillo fibroso que rodea la cabeza del radio (debe tenerse en cuenta que a veces presenta dos manojos oblicuos más o menos diferenciados: el *manejo oblicuo interno* y el *manejo oblicuo externo*).

c) *Ligamento posterior* — Delgado y membranoso como el anterior. Está representado por manojos fibrosos que parten de los lados interno y externo de la fosa olecraniana. De estos manojos, los inferiores terminan en los bordes del olécranon (*fascículos humeroolecranianos*); los superiores, los que se encuentran situados por encima del pico del olécranon, van de uno a otro lado de la fosa olecraniana (*fascículos humerohumerales*).

d) *Ligamento lateral interno* — Difiere de los precedentes por su mucho grosor y resistencia. Está constituido por tres fascículos: 1.º, un *fascículo anterior* (el más débil de los tres), que va de la parte anterointerna de la epitróclea a la parte anterointerna de la apófisis coronoideas; 2.º, un *fascículo medio*, especie de cordón fibroso, que nace del borde inferior de la epitróclea y termina en el lado interno de la apófisis coronoideas (muchas veces en un tubérculo especial); 3.º, un *fascículo posterior* (*ligamento de Burdinet* de los cirujanos), en forma de abanico, que se inserta, por su base semicircular, en el lado interno del olécranon.

e) *Ligamento lateral externo* — Análogo al precedente, comprende tres fascículos: 1.º, un *fascículo anterior*, que nace de la parte anterior e inferior del epicóndilo, y ensanchándose luego en forma de abanico para cubrir la cabeza del radio, va a terminar, parte en el cúbito (por delante de la cavidad sigmoidea menor), parte en el ligamento anular de la articulación radiocubital superior; 2.º, un *fascículo medio* en forma de cinta, que va de la parte inferior del epicóndilo a la parte posterior de la cavidad sigmoidea menor del cúbito y al borde de este hueso; 3.º, un *fascículo posterior*, cuadrilátero, que va desde la parte posterior del epicóndilo hasta el lado externo del olécranon.

3.º **Sinovial.** — La sinovial del codo cubre, en toda su extensión, la cara profunda de la cápsula fibrosa. Al llegar a las líneas de inserción de sus dos circunferencias superior e inferior, se refleja sobre los huesos correspondientes (por arriba, el húmero; por abajo, el cúbito y el radio) y los cubre en sentido recurrente hasta el límite del cartilago de inserción. De este modo la serosa tapiza, por delante, las dos facetas coronoidea y supracondilea (*fondo de saco anterior*); por detrás, la fosa olecrania (*fondo de saco posterior o subtricipital*), por abajo y afuera el cuello del radio, formando alrededor del mismo un tercer fondo de saco, de forma anular, que es el *fondo de saco inferior o fondo de saco perirradial*.

4.º **Movimientos.** — Dos movimientos principales: la flexión y la extensión, y algunos movimientos muy ligeros de inclinación lateral. La *flexión* es el movimiento por el cual la cara anterior del antebrazo se acerca a la cara anterior del brazo hasta tocar con ella. Su extensión es de 140º como término medio. Es de notar que, por la oblicuidad del eje de rotación, el antebrazo, al flexionarse, se dirige un poco dentro del brazo. La *extensión* es el movimiento por el cual el antebrazo se separa del brazo. La oblicuidad del eje de rotación hace también inclinar en este caso el eje del antebrazo sobre el del brazo, de suerte que, una vez efectuada la extensión, los dos ejes, braquial y antebraquial, forman entre sí un ángulo sumamente obtuso, cuya abertura mira hacia fuera. Los *movimientos de inclinación lateral*, hacia dentro o hacia fuera, son muy limitados, las oscilaciones que describe la extremidad inferior del cúbito no exceden, en las condiciones ordinarias, de 8 a 12 milímetros.

4 ARTICULACIONES DE LOS HUESOS DEL ANTEBRAZO ENTRE SÍ

Los dos huesos del antebrazo se articulan por sus dos extremos superior (*articulación radiocubital superior*) e inferior (*articulación radiocubital inferior*). Se unen, además, entre sí por su parte media por un *ligamento interóseo*.

1.º **Articulación radiocubital superior.** — Pertenece al grupo de las articulaciones trocoides o de eje.

a) *Superficies articulares*

a) *Por parte del radio*, una cavidad cilíndroidea, casi plana en sentido vertical, convexa en sentido horizontal, formando como una

orla alrededor de la cabeza del hueso, su altura es de 6 a 7 milímetros en su parte interna y de 2 a 3 solamente en la parte externa.

β) *Por parte del cúbito*, la *cavidad sigmoidea menor* de este hueso, segmento de cilindro hueco que mide 18 milímetros en sentido anterosuperior y 10 milímetros en sentido vertical

b) *Ligamento anular*. — La cavidad sigmoidea menor del cúbito es agrandada hacia fuera por una cinta fibrosa muy resistente que, partiendo de su extremo anterior, termina en su extremo posterior, describiendo un semicírculo, cuya concavidad mira hacia dentro es el *ligamento anular*. Su altura es de 8 a 10 milímetros. Se estudian en él una *cara externa*, convexa, cubierta por los músculos próximos; una *cara interna*, cóncava, lisa y uniforme, que corresponde al radio (está cubierta de una delgada capa de fibrocartilago), un *borde superior*, que se confunde con el aparato ligamentoso del codo; un *borde inferior*, que rodea el cuello del radio (al cual se adapta sin adherirse). Agrandada de este modo y completada por el ligamento anular, la articulación del cúbito forma una especie de anillo *mitad óseo, mitad fibroso* al cual se adapta perfectamente el cilindro radial

c) *Medios de unión*. — El ligamento anular aplica en primer lugar la epífisis radial, contra la epífisis cubital. Por otra parte como su circunferencia inferior, dispuesta alrededor del cuello, tiene un diámetro mucho más estrecho que el de la cabeza radial, impide que esta se escurra por debajo del anillo osteofibroso que la sostiene. Además de este primer medio de unión, se encuentra otro, el *ligamento cuadrado de Denucé*, hoja fibrosa cuadrilátera, que va desde el reborde inferior de la cavidad sigmoidea menor a la parte correspondiente del cuello del radio

d) *Sinovial*. — Es una dependencia de la sinovial del codo. Por su parte inferior rebasa de 4 a 5 milímetros el borde inferior del ligamento anular, formando alrededor del cuello un fondo de saco circular, llamado *fondo de saco perirradial*

e) *Movimientos*. Véase pág. 113.

2.º **Articulación radiocubital inferior.** — Es también una articulación trocoide, pero menos perfecta que la superior.

a) *Superficies articulares*.

α) *Por parte del radio*, la *cavidad sigmoidea* de este hueso, cóncava en sentido anteroposterior y plana en sentido vertical, es un segmento de cilindro hueco que mide de 16 a 18 milímetros de longitud por 6 ó 7 de altura.

b) *Por parte del cúbito*, la cabeza de este hueso, con dos carillas articulares: una *carilla superoexterna*, que ocupa el contorno de la cabeza en sus dos tercios externos y se corresponde (segmento de cilindro macizo) con la cavidad sigmoidea del radio, una *carilla inferior*, que ocupa la parte inferior de la cabeza, plana o ligeramente convexa, y corresponde al carpo, del cual, no obstante, esta separada por un fibrocartilago, llamado *ligamento triangular*.

b) *Ligamento triangular* — Es una hoja triangular que está situada horizontalmente entre los dos huesos: su base se inserta en el reborde inferior de la cavidad sigmoidea del radio; su vértice se fija en la ranura que separa la cabeza del cúbito de su apófisis estiloides. De sus dos caras, la superior, plana o algo excavada, se adapta exactamente a la parte inferior de la cabeza del cúbito, pero sin adherirse a ella, la inferior, cóncava, se adapta al semilunar y al piramidal.

c) *Medios de unión*. Además del ligamento triangular, que une los dos huesos (*ligamento interóseo* de algunos autores) encontramos también como ligamentos: 1º, una *cápsula fibrosa*, 2º, un *ligamento radiocubital anterior*, representado por algunos fascículos transversales u oblicuos que, desde el extremo anterior de la cavidad sigmoidea del radio, se dirigen a la parte correspondiente de la cabeza del cúbito, 3º, un *ligamento radiocubital posterior*, que se extiende transversalmente desde el extremo posterior de la carilla articular del radio a la parte posterior de la cabeza del cúbito y de su apófisis estiloides.

d) *Sinovial* — Es notable por su amplitud y flexibilidad. Por arriba, hasta el ligamento interóseo tiene una pequeña prolongación en fondo de saco, de 5 a 6 milímetros de altura. Por abajo comunica a veces (dos por cinco) con la sinovial de la muñeca por un orificio en forma de hendidura que se halla en la base del ligamento triangular.

e) *Movimientos de las articulaciones radiocubitales*. Las articulaciones radiocubitales ejecutan una sola clase de movimiento: la *rotación*. Este movimiento, según el sentido en el cual se efectúa la rotación, recibe los nombres de *pronación* o *supinación*. *pronación*, cuando la cara palmar de la mano se dirige hacia atrás, *supinación*, cuando la misma cara palmar se dirige hacia delante. Estos dos movimientos de pronación y supinación resultan de un movimiento de rotación ejecutado por el radio alrededor del cúbito, en el cual la mano sigue, como se comprende los movimientos de radio. El cúbito permanece casi completamente inmóvil; ejecuta movimientos de oscilación de algunos milímetros de extensión solamente.

3.º **Ligamento interóseo del antebrazo.** Se designa con este nombre la membrana fibrosa que une entre sí, en su parte media, los huesos del antebrazo. Se inserta, *por dentro* en el borde externo del cúbito, *por fuera* se fija en el borde interno del radio; *por abajo* desciende hasta la articulación radiocubital inferior, y *por arriba* queda a 2 o 3 centímetros por debajo de la tuberosidad bicipital.

Por sus dos caras anterior y posterior el ligamento interóseo presta inserción a algunos músculos. Distribuidos por su superficie se encuentran algunos orificios redondeados o elípticos, a través de los cuales pasan algunas arterias. Muy arriba del espacio interóseo, inmediatamente por encima de la membrana fibrosa radiocubital, se encuentra una cinta fibrosa de dirección oblicua es el *ligamento o cuerda de Weilbrecht*.

Dicho ligamento se inserta por arriba, en la base de la apófisis coronoides, desde este punto se dirige oblicuamente hacia abajo y afuera, para ir a fijarse en la cara anterior del radio, un poco por debajo de la tuberosidad bicipita.

3. ARTICULACIÓN DE LA MUÑECA

La articulación de la muñeca o articulación radiocarpiana une el antebrazo a la mano, y el radio y el cúbito al conjunto óseo del carpo. Es una articulación condílea.

1.º **Superficies articulares.**— Son.

a) *Por el antebrazo*, una especie de cavidad glenoidea, de forma elipsoidal, cuyo eje mayor, dirigido transversalmente, se extiende de una a otra apófisis estiloides (4 ó 5 centímetros de longitud por 1 5 ó 2 centímetros de anchura), está formada, por fuera, por la cara carpiana de la extremidad inferior del radio; por dentro, por la cara inferior de ligamento triangular (pág. 118)

b) *Por la mano*, los tres primeros huesos de la primera fila del carpo (escafoides, semilunar y piramidal), sólidamente unidos entre sí y formando por su conjunto una especie de cóndilo, el *cóndilo carpiano*, el cual se adapta exactamente a la cavidad *glenoidea antebraquial*. Recuérdese: 1.º, que el escafoides y el semilunar corresponden a la vez a la carilla radial, y a la parte lindante del ligamento triangular; 2.º, que el piramidal establece contacto únicamente con la parte externa de este mismo ligamento triangular.

2° Medios de unión.— Las dos superficies articulares están unidas por una cápsula fibrosa, reforzada por cuatro ligamentos (anterior, posterior, interno y externo)

a) *Cápsula fibrosa* — Es un manguito que se inserta: 1.º, por arriba, alrededor de la superficie articular del radio y en los bordes del ligamento triangular; 2.º, por abajo, alrededor de la superficie articular del cóndilo carpiano.

b) *Ligamento anterior* — Se extiende por la cara anterior de la articulación. Comprende dos fascículos: 1.º, un *fascículo externo o radiocarpiano* que nace, por arriba, en el borde anterior de la carilla articular del radio y en la parte anterior de la apófisis estiloides de este hueso, desde este sitio se dirige oblicuamente hacia abajo y adentro para ir a fijarse en los tres huesos semilunar, piramidal y hueso grande; 2.º, un *fascículo interno o cubitocarpiano* que parte, por arriba, de la parte anterior de la fosita rugosa que separa la cabeza del cúbito de su apófisis estiloides; desde este punto se dirige oblicuamente hacia abajo y afuera para ir a terminar, como el precedente, en el semilunar, el piramidal y el hueso grande.

c) *Ligamento posterior*. — Menos fuerte y largo que el anterior, se inserta por arriba en el borde posterior de la carilla articular del radio, se dirige oblicuamente hacia abajo y adentro y va a fijarse, en gran parte, en el piramidal (algunas fibras se detienen en el semilunar).

d) *Ligamento lateral interno*. — De forma triangular, se inserta, por arriba, en el lado interno y en el vértice de la apófisis estiloides del cúbito. Por abajo se divide en dos manojos: uno anterior, para el pisiforme, y otro posterior, para el piramidal.

e) *Ligamento lateral externo* — Tiene como el que acabamos de describir, la forma de un triángulo de base inferior. Se inserta, por arriba, en el vértice de la apófisis estiloides del radio, y por abajo, en el lado anteroexterno del escafoides.

3° Sinovial. — Tapiza la cápsula articular en toda su extensión y termina exactamente, tanto por parte del antebrazo como del carpo, en el límite del revestimiento cartilaginoso. Comunica dos veces de cada cinco con la sinovial radiocubital inferior por un orificio situado en la base del ligamento triangular.

4° Movimientos. — La articulación de la muñeca posee los cinco movimientos que caracterizan a las articulaciones condíleas, a sa-

ber: 1.º, la *flexión* (por la cual la cara palmar de la mano se inclina hacia la cara anterior del antebrazo); 2.º la *extensión* (por la cual la cara dorsal de la mano se inclina hacia la cara posterior del antebrazo); 3.º, la *aducción* (por la cual el borde interno de la mano se inclina hacia el borde interno del antebrazo); 4.º, la *abducción* (por la cual el borde externo de la mano se inclina hacia el borde externo de antebrazo); 5.º, la *circunducción* (resultado de la ejecución sucesiva de los cuatro movimientos precedentes).

6. ARTICULACIONES INTRINSECAS DE LA MANO

Las articulaciones de la mano pueden dividirse en cinco grupos: 1.º, *articulaciones de los huesos del carpo entre sí*; 2.º *articulaciones de carpo con el metacarpo*; 3.º, *articulaciones de los metacarpianos entre sí*; 4.º, *articulaciones de los metacarpianos con las primeras falanges*; 5.º, *articulaciones de las falanges entre sí*.

A. Articulaciones del carpo

Comprenden: 1.º, las articulaciones de los huesos de la primera fila entre sí; 2.º, las articulaciones de los huesos de la segunda fila entre sí; 3.º, la articulación de las dos filas entre sí.

1.º Articulación de los huesos de la primera fila entre sí. Conviene estudiar separadamente las articulaciones de los tres huesos externos, y luego las del piramidal con el pisiforme.

A. ARTICULACIONES DE LOS TRES HUESOS EXTERNOS — El escafoide se articula con el semilunar y éste con el piramidal, formando dos artrodias. Como *superficies articulares*, tienen carillas planas y verticales. Como *medios de unión*: 1.º, *ligamentos interóseos*, en número de dos, uno entre el escafoide y el semilunar y otro entre el semilunar y el piramidal; 2.º, *ligamentos palmares* y *ligamentos dorsales*. Dos *sinoviales* que comunican con la sinovial mediocarpiana.

B. ARTICULACIÓN DEL PIRAMIDAL CON EL PISIFORME. — Es también una artrodia. Como *superficies articulares*: dos carillas ovales, de eje mayor vertical, casi planas (ligeramente convexas para el piramidal y ligeramente cóncavas para el pisiforme). Como *medios de unión*: 1.º, un *ligamento superior*, que va desde el pisiforme a la apófisis estiloides del cúbito; 2.º, un *ligamento palmar*, plano y cuadrilátero, que va desde el pisiforme al hueso ganchoso; 3.º, un *ligamento dorsal*,

que se extiende desde el pisiforme al piramidal, 4.º, dos *ligamentos inferiores* que fijándose por un extremo en la parte inferior del pisiforme, terminan: uno en la apófisis unciforme del hueso ganchoso, y el otro en la extremidad superior del quinto metacarpiano. Una *sinovial*, que comunica muchas veces con la sinovial de la muñeca.

2.º Articulación de los huesos de la segunda fila entre sí.

El trapecio se articula con el trapezoide, el trapezoide con el hueso grande y el hueso grande con el ganchoso, formando tres artrodias. Como *superficies articulares*, carillas planas, verticales, orientadas en sentido sagital. Como *medios de unión*, tres *ligamentos interóseos*, tres *ligamentos palmares* y tres *ligamentos dorsales*. Como *sinoviales*, simples divertículos de la sinovial mediocarpiana.

3.º **Articulación de las dos filas entre sí.**—Une los huesos de la primera fila del carpo (excepto el pisiforme) con los huesos de la segunda fila.

a) *Superficies articulares*.—La interlinea articular, muy irregular, puede dividirse en dos partes: una externa y otra interna. La *parte externa* que constituye la *articulación externa*, corresponde a la articulación del escafoides con el trapecio y el trapezoide. La superficie de contacto es transversal y sensiblemente plana: es una artrodia. La *parte interna* constituye la *articulación interna*. Está formada: 1.º *por arriba*, por el escafoides, el semilunar y el piramidal, que representan en conjunto, una especie de *cavidad glenoidea* de eje mayor transversal, 2.º *por abajo*, por el hueso mayor y el ganchoso, que representan, en conjunto, una especie de *cóndilo* de eje mayor también transversal. Es una condilartrosis.

b) *Medios de unión*.—Tres clases de ligamentos: dorsales, palmares y laterales.

a) *Por parte de la artrodia* encontramos: 1.º, un *ligamento palmar*, que va desde el escafoides al trapecio, 2.º, un *ligamento dorsal*, formado únicamente por algunas fibras que, desde el tubérculo del escafoides, descienden hasta el trapecio y el trapezoide, 3.º, un *ligamento lateral externo*, que va desde el tubérculo del escafoides al trapecio.

β) *Por parte de la condilartrosis*: 1.º, un *ligamento palmar*, en forma de V, cuyo vértice se inserta en el cuello del hueso grande y cuyas dos ramas terminan una en el piramidal y otra en el escafoides, 2.º, un *ligamento dorsal*, que nace en el piramidal y termina

en parte en el trapecio y en parte en el trapezoide 3.º, un *ligamento lateral interno*, que va desde el vértice del piramidal a la apófisis del hueso ganchoso.

c) *Sinovial* — Una sola sinovial (raras veces dos, una para la artrodia y otra para la condilartrosis), más laxa por detrás que por delante, de la cual parten *prolongaciones ascendentes* (para las articulaciones de la primera fila) y *descendentes* (para las articulaciones de la segunda fila).

d) *Movimientos* — Simples movimientos de deslizamiento que, sumados a los de la articulación de la muñeca, resultan, según el sentido en que se ejecutan movimientos de *flexión*, de *extensión*, de *aducción* y de *abducción*.

B Articulaciones carpometacarpianas

Estas articulaciones unen la extremidad superior de los cinco metacarpianos con los huesos de la segunda fila del carpo. La primera es distinta de las demás.

1.º *Articulación carpometacarpiana del pulgar*. — Une el trapecio con el primer metacarpiano (*articulación trapezometacarpiana*). Es una articulación por encaje recíproco.

a) *Superficies articulares*. — Las constituyen: 1.º, *por parte del trapecio*, una carilla cuadrilátera, cóncava en sentido transversal, convexa en sentido anteroposterior; 2.º *por parte del metacarpiano*, una carilla de configuración inversa.

b) *Medios de unión* — Un *manguito fibroso*, muy laxo, más grueso por detrás que por delante, que se inserta alrededor de las dos carillas que hemos indicado más arriba.

c) *Sinovial* — Sinovial notable por su laxitud.

d) *Movimientos*. — Cinco movimientos: *flexión*, *extensión*, *aducción*, *abducción* y *circunducción*.

2.º *Articulación carpometacarpiana de los cuatro últimos dedos*. — Se las considera como pertenecientes a la clase de las artrodias; pero, en realidad, son pequeñas articulaciones por encaje recíproco.

a) *Superficies articulares*. — El *segundo metacarpiano* se articula a la vez con el trapecio, el trapezoide y el hueso grande, formando en conjunto una especie de *mortaja*, en la cual se introduce el meta-

carpiano. El *tercer metacarpiano* se articula con el hueso grande por carillas triangulares. El *cuarto metacarpiano* se articula a la vez con el hueso ganchoso por una ancha carilla y con el hueso grande por una muy pequeña carilla. El *quinto metacarpiano* se articula con el hueso ganchoso.

b) *Medios de unión.* — Un ligamento interóseo, ligamentos palmares y ligamentos dorsales.

a) *Ligamento interóseo* — Se compone de dos manojos, que nacen, por arriba, de las caras contiguas del hueso grande y del hueso ganchoso y terminan, por abajo, en el lado interno de la extremidad superior del tercer metacarpiano, unas veces conservando su independencia y otras fusionándose más o menos pronto (ligamento en V o ligamento en Y).

β) *Ligamentos palmares.* — Son cuatro. Parten de los huesos de la segunda fila (trapecio, hueso mayor y hueso ganchoso) y se dirigen al 2.º, 3.º y 4.º metacarpianos, el 5.º metacarpiano no tiene ligamento palmar (está reemplazado por el *psimetacarpiano*).

γ) *Ligamentos dorsales.* Más fuertes que los palmares, son en número de seis o siete. Dos para el segundo metacarpiano, dos o tres para el tercero, uno para el cuarto y otro para el quinto.

c) *Sinovial.* — Las mas de las veces hay una sola sinovial para las cuatro articulaciones carpo-metacarpianas, que comunica, por arriba, con la sinovial medio-carpiana. Algunas veces hay una sinovial independiente para las dos últimas.

d) *Movimientos.* — Simples movimientos de *deslizamiento*, apenas apreciables en las dos articulaciones externas y un poco más extensos en las demás articulaciones internas.

C. Articulaciones intermetacarpianas

El primer metacarpiano es independiente. Los otros cuatro se articulan entre sí por su extremidad superior y están unidos por medio de ligamentos por su extremidad inferior.

1.º *Articulaciones de las extremidades carpianas.* Son *artrodias* (para algunos autores *simples anfiartrosis*).

a) Como *superficies articulares*, carillas verticales, en parte rugosas, en parte lisas y cubiertas de cartilago.

β) Como *medios de unión* 1.º, *ligamentos interóseos*, en número de tres muy cortos, que van de un metacarpiano al metacarpiano pró-

ximo; 2.^o, *ligamentos palmares*, pequeñas cintas en número de tres, que van transversalmente de uno a otro metacarpiano; 3.^o *ligamentos dorsales*, en número de tres, análogos a los precedentes.

γ) Como *sinoviales*, tres prolongaciones procedentes de la sinovial carpometacarpiana

2.^o **Unión de las extremidades digitales.** Las cabezas de los cuatro últimos metacarpianos están unidas entre sí por una cinta transversal, que va del segundo al quinto metacarpiano, pasando por delante de las articulaciones metacarpofalángicas (véanse estas articulaciones)

D *Articulaciones metacarpofalángicas*

En número de cinco, unen la extremidad inferior del metacarpiano a la primera falange correspondiente. Son articulaciones condíleas.

1.^o **Superficies articulares.** Como superficies articulares existen:

a) *Por parte del metacarpiano*, una cabeza aplanada transversalmente, que se extiende más hacia la región palmar que a la dorsal y presenta a los lados una depresión rugosa, limitada por detrás por un fuerte tubérculo. Debe tenerse en cuenta la disposición especial de la cabeza del primer metacarpiano; delgada, convexa, mayor en sentido transversal que en sentido anteroposterior, ofreciendo la forma de un trapecio si se la mira de frente y que tiene impresiones debidas a los huesos sesamoides.

B) *Por parte de la falange*, una cavidad glenoidea o gleno-falángica, mayor en sentido transversal que en el anteroposterior y, a uno y otro lado de la cavidad glenoidea, dos pequeñas eminencias en forma de tubérculos.

2.^o **Fibrocartilago de ampliación.** — La cavidad glenoideofalángica resulta agrandada por una pequeña lámina fibrocartilaginosa, de forma cuadrilátera, que se implanta en su parte anterior y se dirige luego hacia arriba y adelante. Su cara posterior es cóncava y articular. Su cara anterior presenta, en su parte media, un canal longitudinal para los tendones flexores. Su borde inferior se fija fuertemente en la falange. Su borde superior está en relación con el cóndilo, pero sin adherirse a él. Debe tenerse presente que el fibrocartilago de la

primera falange del pulgar contiene en su interior dos pequeños *sesamoideos*, uno interno y otro externo (véase *Sesamoideos*).

3.° Medios de unión. — Cuatro ligamentos, una cápsula, dos ligamentos laterales y un ligamento transverso.

a) La *cápsula* es un manguito fibroso, delgado y flojo, que se inserta, por arriba alrededor de la cabeza del metacarpiano, y por abajo, alrededor de la cavidad glenoidea. En la cara anterior de la articulación se confunde con el fibrocartilago de ampliación.

b) Los *ligamentos laterales* se distinguen en interno y externo. Cada uno de ellos tiene la forma de un triángulo o de un abanico. Se insertan, por su vértice, en la depresión y en el tubérculo que hay a cada lado del cóndilo. Desde este punto se dirigen oblicuamente hacia abajo y adelante y van a fijarse, por sus fibras posteriores o falángeas, en los tubérculos laterales de las falanges; por sus fibras anteriores o glenoideas, en el fibrocartilago correspondiente.

γ) El *ligamento transverso* es el mismo que hemos indicado al estudiar las articulaciones intermetacarpianas (pág. 114). Fusionándose a nivel de cada una de las cuatro articulaciones metacarpofalángeas externas con el fibrocartilago y con los ligamentos laterales, se convierte en un medio de unión para estas últimas articulaciones.

4.° Sinovial. Una sinovial muy floja, sobre todo por detrás, para cada una de las articulaciones.

5.° Movimientos. — La primera falange posee los más diversos movimientos: 1.°, *flexión y extensión*; 2.°, *inclinación lateral* hacia el eje de la mano (*aducción*) o hacia los bordes de la misma (*abducción*), 3.°, *circunducción*, 4.°, *rotación* (poco apreciable en condiciones normales).

E. *Articulaciones interfalángeas de los dedos*

La primera falange se articula con la segunda y la segunda con la tercera, formando para cada dedo dos trocleartrosis. Están constituidas bajo el mismo tipo.

1.° *Superficies articulares.*

a) En la *parte superior o proximal* (extremidad inferior de la primera falange y extremidad inferior de la segunda), una *polea* de garganta anteroposterior, con dos depresiones rugosas a cada lado.

b) En la *parte inferior o distal* (extremidad superior de la primera falange y extremidad superior de la segunda), una *cresta obtusa*

anteroposterior, que está en relación con la garganta de la polea y dos pequeñas cavidades glenoideas, que se encuentran en las partes laterales de esta misma polea; lateralmente, dos pequeños tubérculos. Como para la articulación metacarpofalángica, la superficie inferior se encuentra agrandada por un fibrocartilago que presenta exactamente la misma disposición.

2.º Medios de unión.

a) Una *capsula*, especie de manguito fibroso, que va desde el contorno de una superficie articular al de la otra.

b) Dos *ligamentos laterales*, uno interno y otro externo, que recuerdan los de las articulaciones metacarpofalángicas.

3.º *Sinovial*. — Una sinovial para cada articulación que presenta también la misma disposición que en las articulaciones metacarpofalángicas.

4.º *Movimientos*. — Movimientos de *flexión* y de *extensión*. No hay movimientos de lateralidad.

ARTÍCULO II

ARTICULACIONES DEL MIEMBRO INFERIOR

El miembro inferior, igual que el superior, ofrece los seis grupos de articulaciones siguientes. 1.º *articulaciones de los huesos coxales o huesos de la pelvis*; 2.º, *articulación del muslo con la pelvis o articulación coxofemoral*; 3.º *articulación de la pierna con el muslo o articulación de la rodilla*, 4.º, *articulaciones de los dos huesos de la pierna entre sí o articulaciones peroneolibiales*; 5.º, *articulación del pie con la pierna o articulación de la garganta del pie*, 6.º, *articulaciones intrínsecas del pie*.

1. ARTICULACIONES DE LOS HUESOS COXALES O HUESOS DE LA PELVIS

Los dos huesos coxales se articulan primeramente con la columna vertebral, cada uno con la porción lateral correspondiente del sacro (*articulación sacroiliaca*). Se articulan también entre sí en la línea media (*sinfisis púbica*).

A. *Articulación sacroiliaca*

Pertenece a la clase de las diartroanfiartrosis.

1.º Superficies articulares. — 1.º. *por parte del sacro*, la carilla auricular de este hueso, en forma de media luna o de escuadra, que corresponde a las dos primeras piezas sacras y a la parte superior de la tercera; 2.º. *por parte del hueso coxal*, una carilla análoga, la carilla auricular del hueso coxal, que ocupa la parte posterior de la cara interna del hueso.

De estas dos superficies, la del hueso coxal es convexa (semicilindro lleno), la del sacro es cóncava (semicilindro hueco).

Por otra parte, la porción inferior de la carilla auricular del hueso coxal se proyecta hacia dentro, de manera que forma una especie de carilla horizontal u oblicua, que sirve de sostén a la parte correspondiente del sacro. Vista de frente, la interlínea articular sacroiliaca se asemeja bastante a una S itálica. En estado fresco, las dos superficies auriculares del sacro y del hueso coxal están cubiertas por una capa de cartilago hialino, la cual se halla cubierta a su vez por una lámina de fibrocartilago.

2.º Medios de unión. — Una *cápsula fibrosa*, dos *ligamentos sacroiliacos* (uno anterior y otro posterior) y cierto número de *formaciones fibrosas* que desempeñan el papel de *ligamentos accesorio*, (como el ligamento iliolumbar y los ligamentos sacrocóccigeos mayor y menor).

a) *Cápsula* — Especie de manguito muy corto, que se inserta por un extremo alrededor de la carilla auricular del hueso coxal y por el otro alrededor de la carilla auricular del sacro.

b) *Ligamento sacroiliaco anterior*. — Está representado por un conjunto de fascículos radiados, que se insertan 1.º, por un extremo, en la base del sacro y cara anterior de este hueso, por fuera de los dos primeros agujeros sacros, 2.º, por el otro extremo, en las partes próximas del hueso coxal.

c) *Ligamento sacroiliaco posterior* — Forma dos planos, uno superficial y otro profundo. El *plano superficial* está representado por fascículos que de la parte más posterior de la cresta ilíaca, se dirigen a los tubérculos situados por fuera de los agujeros sacros posteriores (son los *tubérculos conjugados de Farabeuf y de Pinard*, llamados así porque cada uno de ellos se forma de la unión o *conjugación* de dos

semiapófisis transversa) Se distinguen cuatro fascículos: el primero va de la cresta iliaca a la apófisis transversa del sacro, el segundo, *ligamento vago o ligamento axil*, va de la cresta iliaca al primer tubérculo conjugado, el tercero, *ligamento de Zaglas*, va de la espina iliaca posterosuperior a segundo tubérculo conjugado; el cuarto, *ligamento sacroespinoso*, se extiende desde la espina iliaca poserosuperior y de la escotadura subyacente al tercer tubérculo conjugado. El *piano profundo* está formado por manojos fibrosos, muy cortos y resistentes, que parten de la tuberosidad iliaca y van a fijarse en la parte correspondiente del sacro (*ligamento interoso* de algunos autores, denominación impropia).

d) *Ligamento iliolumbar* — Nace, por dentro, del vértice y borde inferior de la apófisis transversa de la quinta lumbar. Las fibras mas elevadas se condensan en un cordón grueso, el cual, después de un trayecto ligeramente ascendente, va a fijarse en la cresta iliaca, en la unión de su tercio posterior con sus dos tercios anteriores. Las demás fibras, después de un trayecto oblicuamente descendente, van a fijarse en la tuberosidad iliaca. A veces se encuentra un *fascículo descendente* que, partiendo del vértice de la apófisis transversa de la quinta lumbar, va a terminar en la fosa iliaca interna cerca de la línea innominada.

e) *Ligamento sacrocúrtico mayor* — Fascículo fibroso muy resistente, que va desde el isquion a la columna sacrococcigea. Se inserta, por arriba, en las dos espinas iliacas posteriores, en la parte más posterior de la fosa iliaca externa y en el borde de la columna sacrococcigea (desde la tercera vértebra sacra hasta la parte media del coxix). Desde este punto se dirige oblicuamente hacia abajo, adelante y afuera para ir a terminar en la parte postero-interna de la tuberosidad isquiática. Es ancho en sus dos extremos y estrecho en su parte media, que, por esta razón, recibe el nombre de *istmo*.

f) *Ligamento sacrocúrtico menor* — Situado por delante del precedente, tiene la forma de un triángulo, por su base, situada hacia dentro, se inserta en el borde correspondiente del sacro y del cóxix. Desde este punto sus fibras se dirigen, en sentido convergente, hacia la espina ciática, fijándose en su vértice y en sus dos bordes. Hay que tener en cuenta que los dos ligamentos sacrocúrticos llenan en gran parte la vasta escotadura que, en el esqueleto, separa el borde posterior del hueso coxal de la columna sacrococcigea. Es de notar también que dejan dos orificios: uno superior, que corresponde a la escotadura ciática mayor (para el músculo piramidal, los vasos y ner-

vios glúteos superiores, los nervios ciáticos mayor y menor, los vasos isquiáticos y los vasos pudendos internos); el otro es inferior, y corresponde a la escotadura ciática menor (para el músculo obturador interno y los vasos pudendos internos).

3.º Sinovial. — La sinovial, que tapiza la cara interna de la cápsula articular, es poco extensa y está reducida en sus dimensiones casi a las de la interlínea articular. Envía algunas franjas hacia la cavidad articular.

4.º Movimientos. — La articulación sacroilíaca disfruta de movimientos apenas perceptibles. Dos movimientos principales: la *nutación* y la *contranutación*, movimientos de báscula del sacro alrededor de un eje transversal, en virtud del cual las dos extremidades superior e inferior se inclinan en sentido inverso. En la nutación, la base del sacro se inclina hacia abajo y adelante, mientras la punta se dirige hacia arriba y atrás. En la contranutación, al contrario, la base del sacro se inclina hacia arriba mientras la punta se inclina hacia abajo. Es de notar, desde el punto de vista de las dimensiones de la pelvis, que la nutación disminuye el diámetro anteroposterior del estrecho superior de la pelvis, al propio tiempo que agranda el diámetro anteroposterior del estrecho inferior. Naturalmente, sucede lo contrario en la contranutación.

B. *Sínfisis pubiana*

Los dos pubis se unen entre sí en la línea media, formando la sínfisis pubiana. Según los casos, es una anfiartrosis o una diartroanfiartrosis.

1.º Superficies articulares. — En cada pubis se ve una carilla, elíptica u oval (30 milímetros por 10), cuyo eje mayor lleva una dirección oblicua hacia abajo y atrás, siendo de notar que no mira directamente hacia dentro sino hacia dentro y adelante, de suerte que, cuando los dos huesos ocupan su sitio respectivo, las dos carillas se acercan más por su borde posterior que por el anterior. En estado seco, las carillas son irregulares y muy rugosas. En estado fresco, están cubiertas de una capa de cartilago hialino, que en el adulto tiene de 1 a 2 milímetros de espesor.

2.º Medios de unión. — Hay aquí dos órdenes de ligamentos: un ligamento interóseo y ligamentos periféricos.

a) *Ligamento interóseo*. — Llena el intervalo que separa los dos pubis, tiene la forma de una cuña de base anterior y vértice posterior (triangular visto en un corte transversal) Lateralmente está en relación con las carillas articulares del pubis y se adhiere a ellas de un modo muy íntimo. Por todos los demás puntos de su superficie está en relación con los ligamentos periféricos. Histológicamente comprende dos porciones: una porción periférica, muy dura, densa y resistente, y una porción central, más blanda, más friable, que frecuentemente tiene en su centro una hendidura anteroposterior.

b) *Ligamentos periféricos* — Son en número de cuatro: anterior, posterior, superior e inferior. Confundidos por sus bordes, forman en su conjunto como una especie de cápsula articular. El *ligamento anterior* está colocado por delante de la sínfisis pubiana. Va del uno al otro pubis y es reforzado por gran número de haces tendinosos, procedentes de los músculos del muslo y también de los músculos recto mayor y piramidal del abdomen. El *ligamento posterior*, más delgado, está formado, por decirlo así, por el periostio pélvico al pasar de un pubis al otro. El *ligamento superior* es una especie de tirilla fibrosa situada por encima de la articulación, y se extiende horizontalmente de un pubis al otro. El *ligamento inferior* (*ligamento subpubiano*, *ligamento arqueado*, *arcuatum*) está formado por una lámina fibrosa, de 10 a 12 milímetros de altura, situada debajo de la sínfisis. Tiene la forma de media luna, de concavidad inferior; sus dos extremidades se implantan en la rama descendente del pubis; su borde superior es cóncavo y constituye el *arco pubiano* de los tocólogos (más ancho en la mujer que en el hombre).

C. *Membrana obturatriz*

El agujero obturador está ocupado, en gran parte, por una serie de fascículos, más o menos fusionados, cuyo conjunto constituye la *membrana obturatriz*. Estos fascículos se insertan, por fuera, en la semicircunferencia externa del agujero obturador. Desde este punto se dirigen hacia la semicircunferencia interna y terminan en ella sucesivamente: 1.º, el fascículo más elevado, en el labio posterior del canal subpubiano; 2.º, el fascículo subsiguiente, en la cara anterior del cuerpo del pubis; 3.º, los demás fascículos, en la cara posterior de la rama isquiopubiana.

La membrana obturatriz está en relación: por su cara endopelviana, con el músculo obturador interno, por su cara exopelviana, con el obturador externo. En su cara exopelviana se halla reforzada por

una lámina fibrosa, la *tirilla subpubiana*, la cual, partiendo del ligamento transverso del acetábulo, se dirige en seguida hacia dentro para venir a insertarse unas veces en el cuerpo del pubis y otras veces en la misma membrana.

El canal subpubiano por una parte (véase *Osteología*), y la membrana obturatriz y la tirilla subpubiana por otra, forman un conducto osteofibroso que lleva la misma dirección que el canal que pone en comunicación con la región anterointerna del muslo el *conducto subpubiano*. Su longitud es de 20 a 25 milímetros, y da paso al nervio obturador, a la arteria obturatriz y a la vena del mismo nombre.

2 ARTICULACIÓN COXOFEMORAL

La articulación coxofemoral (el tipo más perfecto de enarrosis) es el punto de unión del miembro inferior con la cintura pélvica.

1.º Superficies articulares.— Tiene por caras articulares: 1.º, la *cabeza del fémur*, 2.º, la *cavidad cotiloidea* del hueso coxal.

a) *Cabeza del fémur*.— Eminencia redondeada y lisa que representa aproximadamente los dos tercios de una esfera de 20 a 25 milímetros de radio y mira oblicuamente hacia arriba adentro y un poco hacia delante. Algo más abajo de su centro se ve una pequeña depresión rugosa, llamada *fosita de la cabeza* (para el ligamento redondo). Por fuera de la cabeza, el cuello anatómico, el trocánter mayor, el trocánter menor, el cuello quirúrgico, la cresta intertrocantérea y la línea oblicua del fémur. La cabeza femoral está cubierta, en estado fresco, por una capa cartilaginosa más gruesa en la parte superior que en la inferior (2 ó 3 milímetros por encima de la fosita de la cabeza).

b) *Cavidad cotiloidea*.— La cavidad cotiloidea o *cotilo* (*acetábulo*) representa la mitad de una esfera hueca. Está circunscrita por un reborde delgado, la *ceja cotiloidea*, con sus tres escotaduras: ilio-pubiana, isquiática e isquiopubiana (las dos primeras muy poco marcadas, la última al contrario, muy profunda). Interiormente, en el cotilo, se ve una porción no articular (el *trasfondo*) y otra articular que rodea la precedente a manera de herradura o de media luna, cuyas dos extremidades terminan una y otra en las extremidades correspondientes de la escotadura isquiopubiana. En estado fresco, la media articular está cubierta de una capa de cartilago, cuyo espesor va aumentando del centro a la periferia. El *trasfondo* está cubierto únicamente por el periostio y tejido celuloadiposo.

2.º Rodete cotiloideo. Alrededor de la cavidad cotiloidea se encuentra, a manera de marco, un cordón fibrocartilaginoso, llamado *rodete cotiloideo*. Lo mismo que el rodete glenoideo del hombro, es prismático triangular y presenta, por consiguiente, tres caras: 1.ª, *cara adherente o base*, fusionándose con el contorno del cotilo; 2.ª, *cara externa*, en relación con la cápsula o la sinovial; 3.ª, *cara interna*, lisa y uniforme, continuación de la cara articular del cotilo y en relación con la cabeza femoral. A nivel de las tres escotaduras antes descritas de la ceja cotiloidea, el rodete llena las escotaduras iliopubiana e ilioisquiática. A nivel de la isquiopubiana, al contrario, pasa como un puente de una a otra extremidad de esta escotadura transformándola en un orificio mitad óseo, mitad fibroso (*orificio isquiopubiano*). Esta porción libre del rodete, colocada por encima de la escotadura isquiopubiana, constituye el *ligamento transversal del acetábulo*. El rodete cotiloideo ensancha en la extensión de toda su altura (5 ó 6 milímetros) la superficie interior del cotilo. Es de notar que su circunferencia externa o libre es más pequeña que su circunferencia interna o adherente, de donde resulta que la circunferencia externa estrangula la cabeza femoral y le impide salir del cotilo, de modo que el rodete es a la vez *aparato de ampliación y aparato de contención*.

3.º Medios de unión. Sus ligamentos son: 1.º, un *ligamento capsular*; 2.º, *fascículos de refuerzo* de esta cápsula; 3.º, un ligamento intraarticular, el *ligamento redondo*.

a) *Ligamento capsular o cápsula*. — Lo mismo que en el hombro, está dispuesto en forma de manguito. *Por parte del hueso coxal* se inserta alrededor de la ceja cotiloidea, y también en la cara externa del rodete, en la parte de esta cara más inmediata al hueso. Es de notar que a nivel de la escotadura isquiopubiana, la cápsula respeta esta escotadura en vez de cerrarla y se inserta en la cara externa del ligamento transversal del acetábulo. *Por parte del fémur* se inserta en el cuello anatómico de la manera siguiente: 1.º, por delante en la línea oblicua o cresta intertrocanteriana anterior; 2.º, por detrás, en la cara posterior del cuello, en el punto de unión de su tercio externo con sus dos tercios internos; 3.º por arriba, en la cara superior del cuello, siguiendo una línea oblicua que une la línea de inserción posterior; 4.º por abajo, en la cara inferior del cuello. *Histológicamente*, el ligamento capsular se compone de dos clases de fibras: 1.º, fibras circulares o anulares, especialmente muy visibles en la parte posterior e inferior de la articulación (*ligamento anular de*

Weber), 2.º, fibras longitudinales, que van del hueso coxal al fémur, confundiendo en gran parte con los fascículos siguientes.

b) *Fascículos de refuerzo de la capsula* — Son tres: ligamento iliofemoral, ligamento isquiofemoral y ligamento pubofemoral. El *ligamento iliofemoral* o *ligamento de Bertin*, de forma triangular, se inserta por su vértice debajo de la espina ilíaca antero-inferior. Desde este punto se irradia en forma de abanico y va a insertarse, por una base muy ancha, en la línea oblicua del fémur. Forma dos fascículos, uno superior o *iliopretrocantereo*, y otro inferior o *iliopretrocantíneo*, que están en relación: el primero, con el borde superior del abanico fibroso; el segundo, con su borde inferior. El *ligamento isquiofemoral*, situado en la parte posterior e inferior de la articulación, nace en el canal subcotiloideo y en la porción próxima de la ceja cotiloidea. Desde este punto se dirige hacia arriba y afuera, para fusionarse con los manojos posteriores de la cápsula. El *ligamento pubofemoral* está representado por cierto número de fascículos situados por delante y por dentro de la articulación. Parten de la eminencia iliopectínea, de la cresta pectínea, de la rama horizontal del pubis, del cuerpo del pubis y hasta a veces de la membrana obturatriz, y van a terminar por fuera, parte en la fosita rugosa, que está situada por delante del trocánter, y parte en la porción de la cápsula situada por encima de esta eminencia ósea.

c) *Ligamento redondo*. Cinta fibrosa, situada en el interior de la articulación, de 8 a 10 milímetros de longitud y de 10 a 12 de ancho que se inserta: 1.º, por una parte, en la fosita de la cabeza femoral; 2.º, por otra, en la línea transversal del acetábulo en el extremo anterior de la escotadura isquiopúbica (por un fascículo llamado *pubico*) y en la extremidad posterior de esta misma escotadura (por otro llamado *isquítico*). Muy fuerte en algunos individuos, es en otros muy débil. Puede faltar. Cuando está muy desarrollado sostiene un peso de 7 a 8 kilogramos en el recién nacido, y de 30 a 45 en el adulto. El ligamento redondo representa un resto de tendón que se ha separado de su músculo (músculo análogo al pectíneo) en el curso del desarrollo filogénico. Es, pues, un pseudoligamento.

4.º *Sinoviales*. — Dos sinoviales: la sinovial propiamente dicha y la sinovial del ligamento redondo. La *sinovial propiamente dicha* nace en el borde libre del rodete cotiloideo. Desciende por la cara externa de este rodete; después, al llegar a nivel de la cápsula, se refleja sobre la misma, cubriéndola de un modo regular hasta su in-

serción femoral; reflejándose de nuevo, esta vez de fuera adentro, se extiende sobre el cuello hasta la capa cartilaginosa que cubre la cabeza femoral. Debe tenerse presente la existencia, a nivel del punto en que se refleja de la cápsula al cuello, de un número determinado de pequeños pliegues falciformes, *frenula capsulae*, de los cuales el más importante es el *pliegue pectineofoveal de Amantini* (en la parte inferior del cuello). Hay que notar también que, en la parte anterior de la articulación, la sinovial comunica a veces con la bolsa del psoas. La *sinovial del ligamento redondo* forma una vaina completa para aquel ligamento. Termina 1.º por arriba, alrededor de la fosita de la cabeza femoral; 2.º, por abajo (después de haberse distribuido por el cóndilo adiposo que llena el trasfondo), alrededor de este trasfondo. Esta última sinovia, cierra por dentro la escotadura isquiopubiana, a la cual envía muchas veces uno o dos pequeños fondos de saco.

5.º **Movimientos.** — Todos los movimientos de las enartrosis: 1.º, *flexión* (por el cual el muslo se levanta hacia el abdomen) y *extensión* (por el cual aquél se inclina hacia la nalga); en estos movimientos el fémur se mueve alrededor de un eje transversal que pasa a la vez por la fosita del ligamento redondo y por el vértice del trocánter mayor; 2.º *abducción* (el muslo se aparta de la línea media) y *aducción* (se acerca a la misma línea); en estos movimientos el fémur gira alrededor de un eje anteroposterior que pasa por el centro de la cabeza; 3.º, *circunducción*, que resulta de la ejecución sucesiva de los cuatro movimientos precedentes; 4.º, *rotación*, que puede ser hacia dentro o afuera, el fémur, en estos movimientos, gira alrededor de un eje vertical que pasa también por el centro de la cabeza.

2. ARTICULACIÓN DE LA RODILLA

La articulación de la rodilla, o articulación femorotibial, une la perna con el fémur. Es una articulación troclear.

1.º **Superficies articulares.** — Tres piezas óseas: la *extremidad inferior del fémur*, la *extremidad superior de la tibia* y la *rótula*.

a) *Extremidad inferior del fémur.* — Presenta en su parte anterior una polca, la *tróclea femoral*, con dos carillas laterales inclinadas hacia un surco redondeado y obtuso, que es la garganta de la tróclea. En la parte inferior del hueso, las dos carillas laterales se separan una de otra para dejar sitio a la *escotadura intercondílea*, la cual, como indica su nombre, separa el cóndilo interno del externo. La

carilla articular se extiende, por debajo de la tróclea, por la cara inferior de cada cóndilo y sube luego hasta llegar a la cara posterior del mismo. Con mucha frecuencia se encuentra, en el límite respectivo de las dos superficies condílea y troclear, una línea de separación representada por una cresta obtusa, detrás de la cual se encuentra un surco más o menos profundo. Esta línea, *línea condilo-troclear*, dirigida oblicuamente de fuera adentro (con relación al eje del hueso) y de delante atrás, está en relación, en la situación vertical, con el borde superior de los cartílagos semilunares. En estado fresco, la superficie articular del fémur está cubierta por una capa de cartílago hialino, cuyo grosor es de 2,5 a 3 milímetros.

b) *Extremidad superior de la tibia*. — Presenta, para la articulación de la rodilla, sus dos *cavidades glenoideas* interna y externa, separadas por la *espinia de la tibia* (con sus dos tubérculos), y las dos superficies rugosas *pro* y *retroespinal* (véase *Osteología*). En estado fresco las dos cavidades glenoideas están cubiertas por una capa de cartílago hialino, cuya porción mas gruesa (3 ó 4 milímetros) corresponde a la parte media de cada cavidad glenoidea.

c) *Rótula*. — Presenta, para la articulación de la rodilla, su cara posterior, con una superficie articular prolongada en sentido transversal y dividida por una cresta roma longitudinal en dos carillas laterales una interna y otra externa. Está en relación con la tróclea femoral.

2.º **Fibrocartílagos o meniscos interarticulares.** La concavidad poco acentuada de las cavidades glenoideas tibiales se adapta mal a la convexidad mucho más pronunciada de los cóndilos femorales. Para que haya concordancia entre ambas superficies articulares, existen entre los cóndilos y las cavidades glenoideas dos fibrocartílagos, uno externo y otro interno. Los dos tienen la forma de una lámina aplanada de arriba abajo, de forma semilunar (de aquí su nombre de *cartílagos semilunares* o *falciformes*), cuyo grosor va disminuyendo de la periferia a centro. Presentan: 1.º, una *cara superior*, cóncava (para el cóndilo); 2.º, una *cara inferior*, casi plana (para la tibia); 3.º, una *circunferencia externa* o *borde externo*, convexa, notable por su grosor; 4.º, una *circunferencia interna* o *borde interno*, cóncava, muy delgada, que mira al centro de la cavidad glenoidea; 5.º, dos *extremidades* o *asas* una anterior y otra posterior.

El externo describe un círculo casi completo, en forma de O; el interno no describe más que tres cuartas partes y hasta a veces dos

terceras partes de círculo, formando una C (recuérdese *OeCi*). Los dos quedan interrumpidos por la espina de la tibia.

Ambos cartílagos semilunares se fijan en la tibia por medio de manojos fibrosos que parten de sus astas. El *externo* se fija: 1.º, por su asta anterior, en la superficie triangular preespinal; 2.º, por su asta posterior, en el tubérculo interno de la espina de la tibia. El *interno* se inserta: 1.º, por su asta anterior, en el borde anterior de la meseta glenoidea tibial; 2.º, por su asta posterior, en la superficie retroespinal. Recuérdese que los dos fibrocartílagos semilunares están unidos entre sí, en su parte anterior, por medio de una pequeña cinta transversal: el *ligamento transversal* o *ligamento yugal*.

3.º Medios de unión. — Un ligamento capsular o *cápsula* y seis *ligamentos periféricos* que refuerzan aquella cápsula (ligamentos anteriores, posteriores, laterales y cruzados).

a) *Ligamento capsular o cápsula.* Representa, como siempre, una especie de manguito fibroso, que se inserta: 1.º, *por arriba*, por su circunferencia superior, alrededor de la extremidad inferior del fémur, a cierta distancia (de 5 a 15 milímetros) del revestimiento cartilaginoso; 2.º, *por abajo*, por su circunferencia inferior, alrededor de la extremidad superior de la tibia (2 ó 3 milímetros solamente) del revestimiento cartilaginoso. Este manguito fibroso está interrumpido en dos puntos: en su parte anterior, para contener la rótula (la cápsula se inserta alrededor de la cartila rotuliana, inmediatamente por fuera del cartilago); en su parte posterior, frente a la escotadura intercondilea donde está reemplazado por los dos ligamentos cruzados (por dentro y por fuera se continúa con el lado externo del ligamento cruzado correspondiente). Debe tenerse en cuenta que, a nivel de la interlínea articular femorotibial, la cápsula de la rodilla está íntimamente adherida a la circunferencia externa de los fibrocartílagos semilunares, quedando dividida de esta manera en dos porciones: la una, superior, o *supramenisquea* relativamente muy extensa, y la otra, inferior o *inframenisquea*, muy pequeña.

b) *Ligamento anterior.* — Llamado también *ligamento rotuliano*, está representado por una cinta fibrosa (de 5 a 6 centímetros de longitud por 2 ó 3 de ancho), muy gruesa y resistente, que va desde el vértice de la rótula a la tuberosidad anterior de la tibia. Su cara anterior se halla en relación con la aponeurosis femoral y la piel. Su cara posterior está en relación sucesivamente de abajo arriba: 1.º, con una bolsa serosa, la *bolsa pretibial* que la separa de la tibia; 2.º, con

una masa celuloadiposa, llamada *paquet adiposo anterior*, que la separa de la articulación. Morfológicamente, hay que considerar el ligamento rotuliano como tendón terminal del cuádriceps crural, interrumpido por la rótula (hueso sesamoideo).

c) *Ligamento posterior* Esta constituido por una parte media y dos laterales. Las *partes laterales*, completamente confundidas con la cápsula, forman, por detrás de los cóndilos, dos casquetes fibrosos, uno interno y otro externo, cuya cara anterior, cóncava, se adapta al cóndilo correspondiente. La *parte media* esta en relación con los espacios intercondíleo e intergeroideo. Esta formada por un conjunto bastante irregular de fibras verticales u oblicuas que se entrecruzan en todos sentidos. Estas fibras son de dos clases: 1.º, o proceden de los músculos próximos (es digno de mención, entre estas expansiones fibrosas, el tendón recurrente del semitendinoso, que constituye el *ligamento popliteo oblicuo* de algunos autores), 2.º, o bien son fibras propias (debiéndose señalar entre estas últimas dos fascículos que parten, uno de la tibia y otro del peroné, y, uniéndose por arriba, forman como una especie de arco de concavidad inferior, motivo por el cual algunos autores lo han denominado *ligamento popliteo a quedado*).

d) *Ligamentos laterales* Son en número de dos: uno interno y otro externo. El *ligamento lateral interno*, plano y en forma de cinta (de 9 a 10 centímetros de longitud por una anchura de 15 a 25 milímetros), triangular de base anterior, se inserta: 1.º, por arriba, en la tuberosidad del cóndilo interno; 2.º, por abajo, en la parte más elevada de la cara interna de la tibia y en el borde interno de este hueso. El *ligamento lateral externo* está representado por una especie de cordón redondeado (de 5 a 6 centímetros de longitud por 4 ó 5 milímetros de grosor), que nace por arriba en la tuberosidad del cóndilo externo del fémur y termina por abajo en la parte anterexterna de la cabeza del peroné, a 8 ó 10 milímetros por delante de las apófisis estiloides de este hueso.

e) *Ligamentos cruzados* Situados en la escotadura intercondílea, se distinguen según la situación respectiva a nivel de su inserción lateral, en anterior y posterior. El *ligamento cruzado anterior* se inserta, por abajo, en la parte anterointerna de la espina de la tibia y en la superficie rugosa preespinal. Desde este punto se dirige oblicuamente arriba, atrás y afuera, para ir a terminar en la parte posterior de la cara profunda del cóndilo externo (inserción vertical). El *ligamento cruzado posterior* se inserta, por abajo, en la superficie excavada en forma de escotadura que se encuentra detrás de la espina

de la tibia. De aquí va oblicuamente hacia arriba, adelante y adentro, para terminar en la parte anterior de la cara profunda del cóndilo interno (inserción horizontal.) Como se ve, los dos ligamentos cruzados, orientados en diferente sentido, se entrecruzan doblemente, primero en sentido anteroposterior y después en dirección transversal (de aquí su nombre). A propósito de las inserciones de los ligamentos cruzados, puede retenerse la fórmula **AEPI**: ligamento Anterior en el cóndilo Externo, ligamento Posterior en el cóndilo Interno.

4.° **Sinovial**.— Muy extensa y compleja, la estudiaremos sucesivamente en su parte anterior, su parte posterior y sus partes laterales.

a) *Por delante*, comienza en el borde de la troclea femoral, en el límite del revestimiento cartilaginoso. Desde este punto se dirige hacia arriba y tapiza el hueso supratroclear y la cara anterior del fémur en una extensión vertical de 4 ó 5 centímetros; luego se refleja a lo largo de la cara profunda del cuádriceps y llega hasta el borde superior de la carilla rotuliana, donde queda interrumpida. Después vuelve a partir del borde inferior de esta misma carilla, se extiende de delante atrás sobre el paquete adiposo anterior y llega de este modo hasta la tibia por delante de la inserción inferior del ligamento cruzado anterior. En este trayecto envía una vaina completa a un cordón fibroso que prolonga el paquete adiposo hasta la parte anterior de la escotadura intercondilea (*ligamentos adiposos*). La prolongación que la sinovial de la rodilla envía de este modo por debajo del cuádriceps crural, *fondo de saco subcuadricepsal o subcrural*, se confunde con la serosa articular sin formar ninguna línea de demarcación, o bien está separada de la misma por un tabique transversal que, según los casos, es completo o incompleto. (Téngase en cuenta que esta independencia completa del fondo de saco subcrural se encuentra una vez en quince casos.)

b) *Por detrás* la sinovial articular se aplica contra la cara anterior de los ligamentos cruzados. Luego, reflejándose hacia atrás, cubre las dos caras laterales de los ligamentos cruzados, y llegando hasta el ligamento posterior de la articulación, tapiza completamente en dirección de dentro afuera las partes laterales de este último ligamento y va a continuarse con las porciones laterales de la sinovial.

c) *A los lados*, la serosa articular tapiza de arriba abajo las partes laterales de la cápsula articular hasta el borde superior del fibrocartilago semilunar, donde queda interrumpida. Vuelve a partir del borde inferior de este fibrocartilago, desciende hasta la inserción ti-

bial de la cápsula y vuelve a subir a lo largo de la tibia, para ir a terminar alrededor del revestimiento cartilaginoso de las cavidades glenoides. La sinovial de la rodilla queda, pues, dividida por los cartílagos semilunares en dos porciones: una superior o *supramenisquea* y otra inferior o *inframenisquea*. Además de la prolongación anterior o subcrural, la sinovial de la rodilla envía hacia atrás otras dos prolongaciones: una que pasa por debajo del popliteo y otra por debajo del gemelo interno. Existen asimismo gran número de *frangias sinoviales*, muy especialmente por delante, a derecha e izquierda de la rótula, y también por encima del ligamento adiposo anterior.

5.º Movimientos.— Dos movimientos principales, de flexión y de extensión, a los cuales deben añadirse movimientos de rotación y de inclinación laterales. La *flexión* y la *extensión* son movimientos por los cuales la cara posterior de la pierna se acerca a la cara posterior del muslo, en el primer caso, y se separa de la misma en el segundo. Se efectúan alrededor de un eje transversal que pasaría por las inserciones femorales de los ligamentos laterales y de los ligamentos cruzados. Téngase en cuenta que el eje de rotación no es fijo, sino que varía de posición a medida que se ejecuta el movimiento. Debe tenerse presente también que los cóndilos femorales no solamente ruedan sobre las cavidades glenoides subyacentes, sino que al propio tiempo se deslizan sobre las mismas. El camino recorrido por la pierna para pasar de la extensión a la flexión varía de 130 a 160°. Los ligamentos laterales se ponen tensos a verificarse la extensión y limitan este movimiento. Los movimientos de rotación se ejecutan alrededor de un eje vertical que pasa por el tubérculo interno de la espina de la tibia (de 15 a 25° en la rotación activa o voluntaria, de 35 a 40° en la rotación pasiva). Al ejecutarse este movimiento se distienden los ligamentos cruzados, limitando la rotación. La *inclinación lateral*, hacia dentro o hacia fuera, puede verificarse cuando la pierna está en semiflexión, pero es muy limitada. Las oscilaciones de la extremidad inferior de la tibia no exceden de 2 a 2,5 centímetros. Los movimientos de lateralidad resultan limitados a la vez por los ligamentos laterales y por los ligamentos cruzados. Tienen su mayor amplitud en la semiflexión.

4 ARTICULACIONES DE LOS HUESOS DE LA PIERNA ENTRE SÍ

Los dos huesos de la pierna se articulan entre sí por arriba (*articulación peroneotibial superior*) y por abajo (*articulación peroneo-*

tibial inferior). Se unen, además, en su parte media por medio de un *ligamento interóseo*.

1° Articulación peroneotibial superior. — Pertenecce al género de las artrodias.

a) *Superficies articulares*. — Son, 1°, *por parte de la tibia*, una carilla redondeada, más o menos plana, situada en la parte posterior de la tuberosidad externa; 2°, *por parte del peroné* una carilla semejante, situada en el extremo superior de este hueso.

b) *Medios de unión*. Las dos carillas articulares se mantienen unidas por medio de una cápsula fibrosa reforzada por un *ligamento anterior* (muy resistente) y otro *posterior* (más débil), situados uno en la parte anterior y otro en la posterior de la articulación.

c) *Sinovial*. La sinovial tapiza la cara interna de la cápsula articular. Debe tenerse presente que de cada nueve veces una comunica con la articulación de la rodilla.

d) *Movimientos*. — Deslizamientos poco apreciables.

2° Articulación peroneotibial inferior. — Pertenece, como la anterior, al grupo de las artrodias.

a) *Superficies articulares*. — En ellas se distinguen 1°, *por parte de la tibia*, una carilla triangular de base inferior, cóncava de delante atrás, casi plana en sentido vertical; 2°, *por parte del peroné*, una carilla semejante, pero configurada en sentido inverso.

b) *Medios de unión*. — Las dos superficies están unidas también por una especie de cápsula reforzada por tres ligamentos: 1°, un *ligamento anterior*, que va desde la parte anterior de la tibia al maléolo peroneo; 2°, un *ligamento posterior*, muy resistente, que va desde el borde posterior de la carilla tibial a la parte posterior del maléolo peroneo; 3°, un *ligamento interóseo*, formado por manojos fibrosos muy cortos que están situados en la parte superior de la articulación y se dirigen oblicuamente del peroné a la tibia.

c) *Sinovial*. — Simple prolongación ascendente de la sinovial de la garganta del pie (es de notar la presencia de una gruesa franja sinovial, de color amarillento y rojizo, que está adherida al peroné).

d) *Movimientos*. — Son desviaciones transversales del peroné, el cual alternativamente se separa y se aproxima a la tibia, estas desviaciones son determinadas por el astrágalo mismo (el cual, conviene no olvidarlo, es más ancho por delante que por detrás), que separa los dos huesos cuando el pie se dobla sobre la pierna y los deja aproximar cuando el pie vuelve a su posición de reposo o se coloca en extensión.

3.º **Ligamento interóseo de la pierna.** Se designa con este nombre la membrana fibrosa que une entre sí, en su parte media, los dos huesos de la pierna. Se inserta: por dentro, en el borde externo de la tibia, por fuera, en la cresta longitudinal (cresta interósea), que se ve en la cara interna del peroné. En ambas caras se insertan haces musculares. En su extremidad superior tiene un orificio que da paso a la arteria tibial anterior, y en su extremidad inferior un agujero más pequeño para la arteria peronea anterior. El ligamento interóseo está formado, en su mayor parte, por haces fibrosos que se dirigen oblicuamente de arriba abajo y de dentro afuera y, por consiguiente, de la tibia al peroné.

5 ARTICULACIÓN DE LA GARGANTA DEL PIE

La articulación de la garganta del pie o articulación tibiotalariana une entre sí la pierna y el pie, o sea la tibia y el peroné al astrágalo. Es una articulación troclear.

1.º Superficies articulares.

a) *Por parte del pie*, la polea astragalina (véase *Osteología*), con su garganta anteroposterior y sus dos vertientes. Es de notar que esta polea representa aproximadamente la tercera parte de una circunferencia de 20 a 25 milímetros de radio, que es más larga que ancha, y además su amplitud va en disminución desde la parte anterior a la posterior. También hay que observar que la superficie troclear, a cada lado del hueso, se continúa con otras dos carillas, ambas dispuestas en sentido sagital y que ocupan una la cara interna y otra la cara externa del astrágalo. En estado fresco, la polea y las dos carillas laterales del astrágalo están revestidas por una capa de cartilago hialino, que presenta su mayor espesor (2 milímetros) a nivel de la garganta y en la vertiente interna.

b) *Por parte de la pierna*, una especie de mortaja formada por la cara inferior de la tibia y por los dos maléolos; la cara inferior de la tibia se corresponde con la polea, y cada uno de los dos maléolos se corresponde con la cara lateral correspondiente (véase *Osteología*). En estado fresco, la mortaja tibioperonea está revestida por una capa de cartilago hialino, cuyo espesor es de 2 milímetros en la tibia y de 1,5 milímetros en el peroné.

2.º **Medios de unión.**— Existen tres ligamentos: un *ligamento capsular* y dos *ligamentos laterales*, uno interno y el otro externo.

a) *Capsula fibrosa* Aquí también consiste en un manguito fibroso, que se inserta, 1.º, por arriba, por su circunferencia superior, en el contorno de la cara articular tibio-peronea; 2.º, por abajo, por su circunferencia inferior, en el contorno de la cara articular del astrágalo. Es de notar que, en la parte anterior de la articulación, la inserción de la cápsula se efectúa, lo mismo en la tibia que en el astrágalo, a cierta distancia (de 8 a 10 milímetros) del revestimiento cartilaginoso. La cápsula, muy ajustada por los lados es, por el contrario, muy floja en su parte anterior y posterior.

b) *Ligamento lateral externo* — Comprende tres fascículos enteramente independientes: 1.º un fascículo anterior o *ligamento peroneo-astragalino anterior*, aplanado y cuadrilátero, que va del borde anterior del maléolo externo a la parte anteroexterna del astrágalo; 2.º un fascículo posterior o *ligamento peroneo-astragalino posterior*, en forma de cinta, como el precedente, pero mucho más fuerte, el cual nace en la fosa rugosa que por detrás presenta el maléolo externo y viene a insertarse, por otra parte, en la cara posterior del astrágalo, inmediatamente por debajo de la polea; 3.º un fascículo medio o *ligamento peroneo-calcáneo*, situado entre los dos precedentes, especie de cordón aplanado que se desprende del vértice del maléolo externo y va a terminar en la cara externa del calcáneo, a 15 o 20 milímetros por encima y detrás del tubérculo externo de este hueso; es cruzado superficialmente por los tendones de los peroneos.

c) *Ligamento lateral interno* — Consta de dos capas, superficial y profunda. La *capa superficial* o *ligamento deltoideo* se inserta, por arriba, en todo el borde inferior del maléolo interno, desde donde se esparce en ancho abanico, para venir a insertarse: 1.º, *por sus fibras posteriores*, oblicuas hacia abajo y atrás, en el tubérculo que se ve en la parte más posterior de la cara interna del astrágalo; 2.º, *por sus fibras anteriores*, oblicuas hacia abajo y adelante, en la parte interna del cuello de astrágalo y en la cara superior del escafoide; 3.º, *por sus fibras medias*, verticalmente descendentes, en la apófisis menor del calcáneo y en el ligamento calcaneo-escafoideo inferior. La *capa profunda* está representada por un fascículo voluminoso, pero muy corto, situado por debajo de la capa superficial, insertándose, por arriba, en el vértice del maléolo, y por abajo, en la cara interna del astrágalo, inmediatamente por debajo de la cartila articular.

3.º *Sinovial*. Tapiza regularmente la superficie interior de la cápsula fibrosa y al llegar a las inserciones superior e inferior de

ésta, se refleja sobre el hueso para terminar exactamente en el límite del revestimiento cartilaginoso. Fuertemente sujeta a cada lado por los ligamentos laterales interno y externo, es, al contrario, ancha y fláccida por delante y por detrás, en donde forma dos fondos de saco, *anterior y posterior*.

4° Movimientos.— La articulación tibiotarsiana presenta dos movimientos fundamentales, flexión y extensión, puede efectuar también la aducción y la abducción, la rotación y la circunducción. La *flexión* y la *extensión* son movimientos por los cuales la cara dorsal del pie se aproxima a la cara anterior de la pierna en el primer caso y se aleja de ella en el segundo. Se efectúan alrededor de un eje transversal que pasa por el centro de la curvatura de la polea astragalina, es decir, a 20 ó 25 milímetros por debajo del punto culminante de esta polea. La *aducción* y la *abducción* son movimientos por los cuales la punta del pie (dedo gordo) se dirige hacia dentro en el primer caso y hacia fuera en el segundo. En estos dos movimientos, el pie gira alrededor de un eje vertical que pasa por la cavilla lateral externa del astrágalo. La *rotación* es un movimiento en virtud del cual el borde interno o el borde externo del pie se elevan, en el primer caso hay rotación hacia dentro; en el segundo caso, rotación hacia fuera. Estos movimientos se efectúan alrededor de un eje anteroposterior. La *circunducción* es la resultante aquí, como en las demás diartrosis, de la sucesión de los cuatro movimientos de flexión, aducción, extensión y abducción. (Aun cuando los movimientos de flexión y extensión son muy extensos, los otros son muy limitados, y, por otra parte, se efectúan principalmente en las articulaciones de tarso.)

6 ARTICULACIONES INTRÍNECAS DEL PIE

Las articulaciones del pie pueden dividirse en cinco grupos: 1°, *articulaciones de los huesos del tarso entre sí*; 2°, *articulaciones del tarso con el metatarso*; 3°, *articulaciones de los metatarsianos entre sí*; 4°, *articulaciones de los metatarsianos con las primeras falanges*; 5°, *articulaciones de las falanges entre sí*.

A. Articulaciones tarsianas

Comprenden 1°, la articulación de los dos huesos de la primera fila entre sí o *articulación astragalocalcánea*; 2°, la articulación de la primera fila del tarso con la segunda o *articulación mediotarsiana*; 3°, las articulaciones de los huesos de la segunda fila entre sí.

1.ª **Articulación astragalocalcánea.** — Llamada también *subastragalina*, esta articulación une la cara superior del calcáneo a la cara inferior del astrágalo. Es una doble artrodia.

a) *Superficies articulares.* — Cada uno de los dos huesos presenta dos carillas, una anteropointerna y otra posteroexterna (véase *Osteología*). Estas dos carillas están separadas entre sí por una ranura (*ranura calcánea* y *ranura astragalina*), más ancha en su extremidad externa que en su extremidad interna. Cuando los dos huesos están en su sitio, las dos ranuras, superponiéndose, forman una especie de conducto, llamado *seno del tarso*. En estado fresco, las cuatro carillas articulares están cubiertas por una capa de cartilago hialino, de un espesor medio de 2 milímetros.

b) *Medios de unión.* — Tiene esta articulación tres ligamentos, interóseo externo y posterior. El *ligamento interóseo* o *ligamento en seto* situado en el seno del tarso, es un conjunto de fascículos muy cortos, que se extienden, unos verticalmente y otros oblicuamente, de la ranura astragalina a la ranura calcánea. El *ligamento calcaneoastragalino externo* es un fascículo aplanado o cilíndrico, de ordinario muy débil, que va de la cara externa del astrágalo a la cara externa del calcáneo. El *ligamento calcaneoastragalino posterior*, cuadrilátero y muy delgado, se inserta por arriba en el tubérculo que limita por fuera el canal del flexor largo propio del pulgar, y por abajo en la parte correspondiente de la cara superior del calcáneo.

c) *Sinovial.* — Tiene esta articulación dos sinoviales distintas, una para la artrodia posteroexterna y la otra para la artrodia antero-interna (esta última se continúa con la sinovial de la articulación astragaloescaploidea).

d) *Movimientos.* La articulación astragalocalcánea es el asiento principal de los movimientos de aducción, abducción y rotación del pie sobre la pierna.

2.ª **Articulación mediotarsiana o articulación de Chopart.** Esta articulación une la primera fila del tarso a la segunda fila, o de otro modo, el astrágalo y el calcáneo al escafoide y al cuboide.

a) *Superficies articulares.* — El astrágalo se une al escafoide (*articulación astragaloescaploidea*) por una enartrosis; el calcáneo se une al cuboide (*articulación calcaneocuboides*) formando una articulación por encaje recíproco.

a) *Por parte de la articulación calcaneocuboides* encontramos en la cara anterior del calcáneo y en la posterior de cuboide dos cari-

llas cuadriláteras, más altas que anchas, cóncavas en un sentido, convexas en otro e inversamente configuradas.

β) *Por parte de la articulación astragaloescapóidea encontramos:* 1.º, *en el astrágalo*, una cabeza oblonga que se continúa hacia abajo con la carilla anterointerna de la cara inferior del hueso; 2.º, *en el escapóides*, la cavidad glenóidea de este hueso, agrandada en su parte inferior por un fibrocartilago, el *ligamento calcaneoscapóideo anterior*, extendido hacia atrás hasta la apófisis menor del calcáneo.

b) *Medios de unión.* Existen tres órdenes de ligamentos:

a) *Ligamentos propios de la articulación astragaloescapóidea:* son dos, uno superior, que va del astrágalo al borde superior del escapóides, y otro inferior, que es el fibrocartilago de ensanchamiento.

β) *Ligamentos propios de la articulación calcaneocubóidea* también son dos, uno superior (*ligamento calcaneocubóideo superior*, aplanado y de gado, que va del calcáneo al cubóides) y otro inferior (*ligamento calcaneocubóideo inferior* o *ligamento plantar mayor*), que se inserta, por detrás, en la cara inferior del calcáneo y viene a terminar por delante (formando dos hojas, una superficial y otra profunda), en la cara inferior del cubóides y hasta en la extremidad posterior de los tres o cuatro últimos metatarsianos.

γ) *Ligamento común a ambas articulaciones.* nace, por detrás, en la parte anterior de la cara superior del calcáneo, y después, bifurcándose en Y o en V (ligamento en Y o en V), viene a insertarse hacia delante a la vez en el escapóides y en el cubóides (es la *clave de la articulación mediotalariana* de los cirujanos).

c) *Sinoviales.* Tiene esta articulación dos sinoviales distintas: una *externa*, para la articulación externa, y otra *interna*, para la articulación interna, comunicándose esta última con la articulación astragalocalcánea interna.

d) *Movimientos.* — Disfruta esta articulación de flexión y extensión, aducción y abducción, rotación hacia dentro y rotación hacia fuera.

3.º *Articulación de los huesos de la segunda fila entre sí.* Este grupo comprende: 1.º, la articulación del escapóides con el cubóides (*articulación escapóidocubóidea*), 2.º la articulación del escapóides con los cuneiformes (*articulación escapóidocuneal*). 3.º, las articulaciones de las tres cuñas entre sí (*articulaciones intercuneales*); 4.º, la articulación del cubóides con la tercera cuña (*articulación cubóidocuneal*).

A ARTICULACIÓN ESCAFOIDOCUBOIDEA. — El escafoide se articula con el cuboide formando una artrodia.

a) *Superficies articulares* — Son las siguientes: 1ª *por parte del escafoide*, una carilla plana, situada en la extremidad externa del hueso; 2ª, *por parte del cuboide*, una carilla análoga.

b) *Medios de unión* — Son tres ligamentos: *ligamento dorsal*, *ligamento plantar* y *ligamento interseo*.

c) *Sinovial* — Es muy pequeña: simple prolongación ascendente de la sinovial escafoidecuneal.

B. ARTICULACIÓN ESCAFOCUNEAL. — El escafoide, por su cara anterior se articula con las tres cuñas, formando tres artrodias.

a) *Superficies articulares* — Son tres carillas de forma triangular en el escafoide, y otras tres similares, una en cada una de las tres cuñas.

b) *Medios de unión* — Los ligamentos se distinguen en dorsales y plantares. Los *ligamentos dorsales*, en número de tres, van del borde superior del escafoide a cada una de las tres cuñas. Los *ligamentos plantares* también en número de tres, van de la parte inferior del escafoide a la parte correspondiente de las tres cuñas.

c) *Sinovial*. — Una sinovial sirve para las tres artrodias.

C. ARTICULACIONES INTERCUNEALES — Las tres cuñas se articulan entre sí formando dos artrodias.

a) *Superficies articulares* — Carillas en escuadra entre las cuñas primera y segunda. Carillas planas entre las cuñas segunda y tercera. Es de notar que estas carillas están situadas en la parte posterior de las caras por las cuales las cuñas se corresponden.

b) *Medios de unión* — Dos *ligamentos dorsales*, dos *ligamentos interseos* y un solo *ligamento plantar*, que van de la base de la primera cuña al vértice de la segunda.

c) *Sinovial* — Dos pequeñas sinoviales, simples prolongaciones descendentes de la sinovial escafoidecuneal.

D. ARTICULACIÓN CUBOIDOCUNEAL. — La articulación del cuboide con la tercera cuña es también una artrodia.

a) *Superficies articulares*. — En cada uno de los dos huesos se encuentra una carilla plana, triangular u oval, prolongada en sentido anteroposterior.

b) *Medios de unión* — Hay tres ligamentos: *ligamento dorsal*, *ligamento plantar* y *ligamento interseo*.

c) *Sinovial* — Es una pequeña sinovial, independiente o en comunicación con la sinovial escafoidecuneal.

B Articulación tarsometatarsiana

Llámanse también *articulación de Lufranc*, y une los cinco metatarsianos a las tres cuñas y al cuboides. Nótese que la interlínea articular es una línea curva de concavidad interna y posterior, que va de un borde del pie al otro.

1.º **Superficies articulares.**—Son, en general, planas y constituyen artrodias. El *primer metatarsiano* se articula con la primera cuña por medio de una carilla oblonga, en forma de media luna. El *segundo metatarsiano* se articula con las tres cuñas, que lo reciben como en una especie de mortaja. Presenta a su vez cuatro carillas articulares. El *tercer metatarsiano* se une a la cara anterior de la tercera cuña por medio de una carilla triangular de base superior. Los *metatarsianos cuarto y quinto* se articulan uno y otro con el cuboides.

2.º **Medios de unión.**—Existen en esta articulación tres órdenes de ligamentos: ligamentos interóseos, ligamentos dorsales y ligamentos plantares.

a) **Ligamentos interóseos**—Se encuentran ordinariamente tres: 1.º, *ligamento interóseo interno*, que va de la cara externa de la primera cuña a la cara interna de la base del segundo metatarsiano; 2.º, *ligamento interóseo medio* que va de la segunda y tercera cuñas a la parte externa de la base del segundo metatarsiano; 3.º, *ligamento interóseo externo*, que va de la tercera cuña a la parte externa de la base del tercer metatarsiano.

b) **Ligamentos dorsales.**—Son siete, aplanados en forma de cinta que van de los huesos de la segunda fila del tarso a la extremidad posterior de los cinco metatarsianos. Es de notar: 1.º, que el primer metatarsiano tiene uno para la primera cuña; 2.º, que el segundo metatarsiano tiene tres para las tres cuñas; 3.º, que el tercer metatarsiano tiene tan sólo uno para la tercera cuña; 4.º, que los metatarsianos cuarto y quinto tienen uno cada uno, que se inserta, por otra parte, en el cuboides.

c) **Ligamentos plantares**—Son cinco, que, colocados en la superficie plantar del pie van de la segunda fila del tarso a los metatarsianos correspondientes.

3.º **Sinoviales.**—Son generalmente tres, por efecto de los ligamentos interóseos: una *interna*, para el primer metatarsiano; una se-

gunda, *externa*, para los metatarsianos cuarto y quinto; y la tercera, *media*, para los metatarsianos segundo y tercero.

4° **Movimientos.** Son simples movimientos de deslizamiento

C *Articulaciones intermetatarsianas*

El primer metatarsiano es independiente. Los otros cuatro se articulan entre sí por su extremidad posterior y se unen por medio de un ligamento por su extremidad anterior.

1.° **Articulación de las extremidades tarsianas.** — Estas articulaciones, en número de tres, constituyen otras tantas artrodisias.

a) Sus *superficies articulares* son: carillas verticales, en parte rugosas y en parte lisas y cubiertas de cartilago (véase *Osteología*).

b) Sus *medios de union* son: 1°, *ligamentos interóseos*, en número de tres que se van de un metatarsiano al metatarsiano inmediato; 2°, *ligamentos dorsales*, igualmente en número de tres, que se extienden transversalmente de un metatarsiano a otro; 3°, *ligamentos plantares*, también en número de tres, que presentan la misma disposición que los ligamentos dorsales.

y) Las *sinoviales* son tres prolongaciones de la sinovial tarso-metatarsiana.

2° **Unión de las extremidades digitales.** — Las extremidades digitales de los metatarsianos están unidas entre sí, en su cara plantar, por una cinta fibrosa transversal, llamada *ligamento transversal del metatarso*, el cual se extiende del primer metatarsiano al quinto, pasando por debajo de las articulaciones metatarsofalángeas (véanse estas articulaciones).

D *Articulaciones metatarsofalángeas*

Son cinco y tienen por objeto la unión de las extremidades anteriores de los metatarsianos a la extremidad posterior de la falange correspondiente. Son condilartrosis bastante parecidas a las articulaciones homólogas de la mano.

1° **Superficies articulares.** — Aquí encontramos, como en la mano: 1°, *por parte del metatarsiano*, una cabeza aplanada transversalmente; 2°, *por parte de la falange*, una cavidad glenoidea, que

resulta ensanchada por abajo y atrás por un fibrocartilago llamado *fibrocartilago glenideo*

2.º **Medios de unión.** Tan bién aqui encontramos, como en la mano:

a) Una *cápsula fibrosa*.

B) Dos *ligamentos laterales*, uno interno y otro externo.

γ) Un *ligamento transversal* (ya indicado antes), que consiste en una larga cinta fibrosa que se extiende transversalmente desde el primer metatarsiano al quinto, pasando por debajo de las cinco articulaciones metatarsofalángicas y fusionándose, a nivel de cada una de ellas, de una parte, con el borde posterior del cartilago glenideo, y de otra parte con los dos ligamentos laterales. Es de notar que la articulación metatarsofalángica del dedo gordo difiere de las otras cuatro en que su fibrocartilago glenideo tiene dos *sesamoideos*, los cuales labran sobre la cabeza del primer metatarsiano dos canales anteroposteriores que tienen la forma de una pequeña polea

3.º **Sinovial.** Cada una de estas articulaciones tiene su sinovial, muy laxa, sobre todo en la parte posterior

4.º **Movimientos.** Flexión y extensión, inclinación lateral, circunducción y rotación.

E *Articulaciones interfalángicas de los dedos*

La primera falange se articula con la segunda y la segunda con la tercera excepto en el pulgar que tiene una sola articulación. Estas articulaciones, llamadas *falángicas* o *interfalángicas*, son trocleartrosis. Están exactamente constituidas por el mismo tipo que las articulaciones homónimas de la mano.

LIBRO III

MIOLOGIA

Los músculos son órganos que tienen la propiedad de contraerse. Se dividen en: 1.º, *músculos voluntarios* o *músculos de la vida animal*, 2.º, *músculos viscerales* o *músculos de la vida orgánica*. Los primeros están constituidos por fibras estriadas, los segundos, excepto el corazón, por fibras lisas. Los músculos voluntarios son los únicos que se estudian ordinariamente en miología.

1.º **Consideraciones generales.** Los músculos son *superficiales* (músculos cutáneos) o *profundos* (músculos subaponeuróticos). Son en número de 501 en el organismo, y su peso alcanza unos 30 kilogramos en un sujeto de 70 kilogramos. En general son paralelos al eje del miembro o del cuerpo y más o menos rectilíneos, sin embargo, algunos se reflejan en un punto de su trayecto (*músculos reflejos*).

2.º **Conformación exterior.**—Según su forma, los músculos se dividen en *anchos*, *largos* o *cortos*.

a) **Inserciones.** Los músculos se insertan en la piel, las mucosas, los huesos, las aponeurosis o las sinoviales, cada uno tiene su *punto fijo* y su *punto movable*. La inserción se efectúa, ya directamente, ya por medio de un *tendón*. En el tendón puede hacerse lateralmente o cabo con cabo; a veces el tendón ocupa un punto intermedio (*músculos digástricos*), dividiéndose entonces el músculo en dos vientres.

b) **Relaciones.** Los músculos entran en relación con los huesos, las articulaciones, las aponeurosis, los vasos, los nervios (que unas veces los perforan y otras los acompañan) y con los músculos próximos.

c) **Anomalías.**—Presentan numerosas anomalías en su *forma*, en su *constitución*, en sus *relaciones* con los músculos próximos, en sus *inserciones*, etc.

3.º **Estructura.** — El músculo está esencialmente compuesto de: 1.º, una parte roja, blanda, contráctil, el *músculo propiamente dicho*, formado de fibras estriadas; 2.º, una parte blanda, firme y no contráctil, el *tendón* (véanse los tratados de Histología).

4.º **Anexos de los músculos.** — Considéranse anexos de los músculos las cuatro formaciones siguientes: 1.ª, las *aponeurosis*; 2.ª, las *vainas fibrosas*, 3.ª, las *vainas sinoviales*; 4.ª, las *bolsas serosas*.

a) *Aponeurosis* — Son membranas fibrosas que envuelven los músculos y se oponen a su dislocación lateral a cada contracción. Por esto se encuentran principalmente desarrolladas en los miembros en donde el músculo puede dislocarse al contraerse. Son formaciones blandas gruesas, y su resistencia es tanto mayor cuanto más desarrollado está el sistema muscular.

b) *Vainas fibrosas de los tendones* — Son arcos que, con los canales óseos, forman conductos osteofibrosos que dan paso a los tendones. Ocupan principalmente los extremos de los miembros y tienen por efecto sujetar fuertemente los tendones dentro de sus canales respectivos, al paso que les permiten su fácil deslizamiento.

c) *Vainas sinoviales de los tendones* — Son membranas serosas delgadas, desarrolladas alrededor de los tendones para facilitar sus movimientos. Estas vainas están formadas de una hoja doble, cuya disposición es análoga a la de una serosa; el tendón está rodeado por la serosa en todo su contorno, excepto en un punto, en el cual existen filamentos conjuntivos y vasos que lo unen al plano subyacente. La vaina sinovial se refleja en este punto, formando una especie de *mesotendón*.

d) *Bolsas serosas* — Son una especie de sinoviales, más o menos diferenciadas, situadas en el trayecto de un músculo o de un tendón. Es de notar que, si se encuentran cerca de una articulación, acaban por entrar en relación con ella.

5.º **Nomenclatura.** — Los músculos se dividen comúnmente según las regiones a que pertenecen. En este concepto se distinguen siete grupos musculares: 1.º, *músculos de la cabeza*, 2.º, *músculos del cuello*; 3.º, *músculos de la región posterior del tronco*, 4.º, *músculos del tórax*; 5.º, *músculos del abdomen*; 6.º, *músculos de los miembros superiores*, 7.º, *músculos de los miembros inferiores*.

CAPITULO PRIMERO

MUSCULOS DE LA CABEZA

Los músculos de la cabeza se dividen en dos grupos: 1.º, *músculos masticadores*, 2.º, *músculos cutáneos de la cabeza*

1. MÚSCULOS MASTICADORES

Los músculos masticadores son cuatro: el *temporal*, el *masetero* y los dos *pterigoideos* *externo e interno*

1.º **Temporal.** — Aplanado, triangular o en abanico, ocupa la fosa temporal

INSERCIÓNES. — Por arriba se inserta en la línea curva temporal inferior, la fosa temporal, la aponeurosis temporal y el arco cigomático (fascículo yugal). Desde este punto sus fibras se dirigen hacia la apófisis coronoides y se insertan en su cara interna, su vértice y sus dos bordes

RELACIONES. — Se consideran en él dos caras y tres bordes. La *cara interna* está en relación con la fosa temporal, y por debajo de ella, con los dos músculos pterigoideos y el buccinador. La *cara externa* está en relación con la aponeurosis temporal, el arco cigomático y el masetero. El *borde superior* se corresponde con el ángulo de unión de la aponeurosis temporal con la pared craneal. El *borde posterior* ocupa un canal labrado en la base de la apófisis cigomática. El *borde anterior* está en relación con el canal alveolar.

APONEUROSIS TEMPORAL. — Se extiende desde la línea curva temporal superior al borde superior del arco cigomático. Simple en su origen, al aproximarse al arco cigomático se desdobra en dos hojas, que se insertan cada una en una de las caras del arco cigomático. Directamente en relación con el músculo en su parte superior, está separada de él, en su parte inferior, por tejido celuloadiposo. Está separada de

la piel por una capa de tejido celular y una prolongación lateral de la aponeurosis epicraneal.

INERVACIÓN — Tres nervios temporales profundos: anterior, medio y posterior, ramas del maxilar inferior.

Acción — Elevador del maxilar inferior y retractor del cóndilo (fascículo posterior, cuando este último ha sido conducido hacia delante por el pterigoideo externo).

2.º Masetero. — Es un músculo corto, grueso, adosado a la cara externa de la rama del maxilar inferior.

INSERCIÓNES — Comprende dos fascículos. El *fascículo superficial* se extiende del borde inferior del arco cigomático al ángulo de la mandíbula. El *fascículo profundo* se extiende desde el arco cigomático a la cara externa de la rama ascendente. Estos dos fascículos están separados entre sí por tejido conjuntivo y a veces por una bolsa serosa.

RELACIONES — Se consideran en él dos caras y cuatro bordes. La *cara interna* está en relación con la rama del maxilar inferior, con la escotadura sigmoidea (paquete vasculonervioso maseterino), con la apófisis coronoides y con el buccinador (bola de Bichat). La *cara externa* está cubierta por la aponeurosis maseterina, y, después de ésta, se encuentran los músculos cutáneos de la cara, la arteria transversal de la cara, el conducto de Stenon (con la prolongación maseterina de la parótida) y las ramificaciones del nervio facial. El *borde superior* se corresponde con el arco cigomático. El *borde inferior*, con el ángulo maxilar. El *borde anterior*, con el maxilar superior, con el buccinador y con la arteria facial en su parte más inferior. El *borde posterior*, situado por de ante de la articulación temporomaxilar, está en relación con la rama del maxilar.

APONEUROSIS MASETERINA — Esta aponeurosis tiene la misma forma y las mismas dimensiones que el masetero. Inserta por arriba en el arco cigomático, por abajo en el borde inferior del maxilar y por detrás en el borde parotideo, se fusiona por delante con la aponeurosis buccinadora, formando así para el músculo masetero una especie de vaina, abierta únicamente a nivel de la escotadura sigmoidea.

INERVACIÓN — Nervio maseterino, rama del maxilar inferior.

Acción — Elevador del maxilar inferior.

3.º Pterigoideo interno. — Situado por dentro de la rama del maxilar inferior, tiene la misma disposición que el masetero (*masetero interno* de algunos autores).

INSERCIONES — Por arriba se efectúan en la fosa pterigoidea. Desde este punto el músculo se dirige hacia abajo, atrás y afuera, en busca de la cara interna del ángulo del maxilar, en donde termina enfrente de las inserciones del masetero.

RELACIONES. — *Por dentro* está en relación con la faringe (espacio maxilofaríngeo). *Por fuera*, con el músculo pterigoideo externo (por la aponeurosis interpterigoidea) y se aproxima paulatinamente al maxilar inferior, formando con él un ángulo diedro, en el cual se encuentran el nervio lingual y los vasos y nervios dentarios inferiores.

INERVACIÓN. Rama del maxilar inferior.

ACCIÓN. — Es elevador de la mandíbula.

4.º Pterigoideo externo. Tiene la forma de un cono, cuya base corresponde al cráneo y el vértice al cóndilo. Ocupa la fosa cigomática.

INSERCIONES. — Empieza por dos fascículos que parten de la base del cráneo: el *fascículo superior* (esfenoidal) se inserta en la parte del ala mayor del esfenoides que forma la fosa cigomática, el *fascículo inferior* se inserta en la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoides. Desde este punto los dos fascículos se dirigen hacia atrás en busca de la articulación temporomaxilar, se unen entre sí, y se insertan juntos en el cuello del cóndilo y en el menisco articular.

RELACIONES. — La *cara superior* está en relación con la bóveda de la fosa cigomática (nervios maseterino y temporal profundo medio), siendo de notar que el nervio bucal pasa entre los dos fascículos del músculo. La *cara anteroexterna* está en relación con el masetero por la escotadura sigmoidea, con la apófisis coronoides y con la bolsa de Bichat. La *cara posterointerna* está en relación con el pterigoideo interno, con los nervios lingual, dentario inferior, auriculotemporal y con la arteria maxilar interna, ésta pasa unas veces por debajo del músculo y otras entre sus dos fascículos.

INERVACIÓN — Procede del temporobucal, rama del maxilar inferior.

ACCIONES. — La contracción simultánea de los dos músculos pterigoideos determina la *proyección hacia delante* de, maxilar inferior y la contracción aislada de uno de ellos, movimientos de *lateralidad* o de *diducción*.

2. MÚSCULOS CUTÁNEOS DE LA CABEZA

Son músculos delgados que están en íntima relación con la piel. En el adulto se dividen en cuatro grupos: 1º, *músculos cutáneos del cráneo*; 2º, *músculos de los párpados*; 3º, *músculos de la nariz*; 4º, *músculos de los labios*. Estos dos últimos músculos tienen por función producir la oclusión o la abertura de los orificios alrededor de los cuales se hallan colocados, son, además, músculos de la mímica.

A. *Músculos cutáneos del cráneo*

Los músculos cutáneos del cráneo son dos: el *occipital* y el *frontal*, unidos entre sí por una aponeurosis (*aponeurosis epicraneal*).

1º Occipital. — Es un músculo cuadrilátero, situado en la parte posterior de la cabeza.

INSERCIÓNES. — *Por arriba* se inserta en la línea occipital superior y en la apófisis mastoidea. *Desde este punto* el músculo se dirige hacia arriba y adelante y se inserta en el borde posterior de la aponeurosis epicraneal.

RELACIONES. — Está cubierto por la piel y cubre el pericráneo, del cual está separado por tejido celular laxo.

INERVACIÓN. — Rama auricular posterior del facial.

Acción. — Tensor de la aponeurosis epicraneal.

2º Frontal. — Músculo cuadrilátero, situado en la parte anterior de la cabeza.

INSERCIÓNES. — *Por arriba* se inserta en el borde anterior de la aponeurosis epicraneal por un borde convexo. *Desde este punto* desciende hacia el frontal, donde se confunde con los músculos piramidales y los orbiculares de los párpados.

RELACIONES. Son las mismas que en el músculo precedente.

INERVACIÓN. — Rama temporofacial del facial.

Acción. — Tensor de la aponeurosis epicraneal. Si la aponeurosis permanece fija, determina arrugas transversales en la frente (*músculo de la atención*).

3º Aponeurosis epicraneal. — Es una hoja fibrosa que se extiende desde el músculo frontal al músculo occipital. Está íntimamen-

te adherida a la piel y se desliza sobre el pericráneo. Por detrás envía una prolongación que separa los dos músculos occipitales. Por delante, los músculos frontales están separados únicamente en su parte superior. Por los lados la aponeurosis se corre a la cara externa de la región temporal y se pierde insensiblemente en la piel de la región maseterina.

B. Músculos de los párpados

Hay dos músculos alrededor de los párpados: el *músculo orbicular* y el *músculo ciliar*.

1.º Orbicular de los párpados. Músculo applanado, que rodea el orificio palpebral a manera de anillo. su parte interna corresponde a los párpados (*zona palpebral*), su parte externa sobresale de los párpados y cubre la órbita (*zona orbitaria*).

INSERCIÓNES. — En los ángulos del ojo. *En el ángulo interno*, por medio de un tendón formado de dos partes: una de ellas, el *tendón directo*, se inserta en el labio anterior del canal nasal y la otra, *tendón reflejo*, en el labio posterior del mismo canal. Entre las dos se encuentra el saco lagrimal. *En el ángulo externo*, los fascículos musculares se entrecruzan y terminan en la piel de la región.

RELACIONES. — Cubierto por la piel, el orbicular cubre a su vez el contorno de la órbita (*zona orbitaria*) y, por otra parte, el séptum orbicular y las cintillas de los tarsos (*zona palpebral*).

INERVACIÓN. Rama temporofacial del facial.

ACCIÓN. — Esfínter de los párpados, sirve también para la progresión de las lágrimas.

MÚSCULO DE HORNER. — Es un pequeño fascículo muscular que se inserta en la cara posterior del tendón reflejo del orbicular y se dirige desde este punto hacia la comisura interna de los párpados, para terminar por dos fascículos por detrás de los puntos lagrimales. Sirve para dilatar los puntos lagrimales.

2.º Superciliar. — Es un músculo corto, extendido sobre la parte interna del arco superciliar.

INSERCIÓNES. Nace en la parte interna del arco superciliar, se dirige hacia arriba y afuera, y a nivel del agujero supraorbitario termina en la piel.

RELACIONES. — Cubierto por el orbicular, cubre a su vez el frontal.

INERVACIÓN. — Facial

ACCIÓN. — Atrae hacia dentro y abajo la piel de la ceja.

C. *Músculos de la nariz*

Son cuatro: *piramidal, mirtiforme, transverso y dilatador de las aberturas nasales.*

1.º Piramidal. — Está situado en el dorso de la nariz.

INSERCIÓNES. — Nacido en los cartílagos laterales de la nariz y el borde inferior de los huesos propios de la nariz, se dirige hacia arriba, entra en contacto con el músculo frontal, del que parece continuación (*pilares del frontal*), y termina en la piel.

RELACIONES. — Los dos músculos están yuxtapuestos y descansan directamente sobre los huesos de la nariz

INERVACIÓN. — Filetes infraorbitarios del facial

ACCIÓN. — Atrae hacia abajo la piel de la región ciliar (antagonista del frontal)

2.º Transverso de la nariz. Músculo triangular, adosado sobre el dorso de la nariz

INSERCIÓNES. — Del dorso de la nariz, donde nace, se dirige el músculo abajo hacia el surco de la nariz y termina en la piel y en el músculo mirtiforme

RELACIONES. Descansa directamente sobre el ala de la nariz.

INERVACIÓN. — Como el anterior.

ACCIÓN. Estrecha las aberturas nasales, atrayendo hacia arriba los tegumentos.

3.º Mirtiforme. — Pequeño músculo radiado situado por debajo de las aberturas nasales

INSERCIÓNES. Se inserta, abajo, en la fosita mirtiforme, y de aquí se dirige arriba, para terminar en el subtabique del ala de la nariz.

RELACIONES. — Descansa sobre el maxilar superior y se halla cubierto por el orbicular y la mucosa gingival.

INERVACIÓN. — Como el anterior.

ACCIÓN. — Estrecha las aberturas nasales y hace descender el ala de la nariz

4.º Dilatador propio de las aberturas nasales.— Músculo delgado, situado en la parte inferior del ala de la nariz, que se inserta en el maxilar superior y en el ala de la nariz. Está innervado como el anterior. Dilata las aberturas nasales.

D. Músculos de la boca

Los músculos de la boca son once: uno rodea el orificio bucal, a manera de anillo (*músculo orbicular*), y los otros diez, colocados a los lados, se insertan alrededor del mismo orificio.

1.º Orbicular de los labios.— Músculo elíptico, situado alrededor del orificio bucal.

INSERCIÓNES.— El orbicular se divide en dos mitades distintas: *semiorbicular superior* y *semiorbicular inferior*.

a) El *semiorbicular superior* se extiende de una comisura a la otra y desde el borde libre del labio superior a la base de la nariz. Consta de dos órdenes de fibras. 1.º, unas se extienden en arco de una comisura a la otra (*porción principal*). 2.º, las otras (*porciones accesorias*) comprenden dos fascículos a cada lado, que se desprenden del subtabique de las fosas nasales (*fascículo nasolabial*), después de la fosita mirliforme (*fascículo incisivo superior*), y luego se dirigen a las comisuras, para confundirse con el fascículo principal.

β) El *semiorbicular inferior* ocupa toda la altura del labio inferior; está formado de fibras que van de una comisura a la otra y de un fascículo de refuerzo (*fascículo incisivo inferior*).

RELACIONES.— El orbicular se encuentra más aproximado a la mucosa labial que a la piel; por su cara profunda está en relación con las glándulas de los labios y las arterias coronarias.

INERVACIÓN.— Filletes bucales superiores e inferiores del facial.

Acción.— Constituye el esfínter del orificio bucal. La contracción de las zonas periféricas del orbicular frunce los labios y los proyecta hacia adelante; la de las zonas marginales frunce los labios y los proyecta hacia atrás.

2.º Buccinador.— Músculo plano, situado por detrás del orbicular y por delante del masetero.

INSERCIÓNES.— 1.º *Por detrás* se inserta en el borde alveolar de los maxilares superior e inferior, y entre los dos, en el ligamento pterigomaxilar o aponeurosis buccinatófaringea. 2.º *Por delante* termina, a nivel de las comisuras, en la cara profunda de la mucosa bucal.

RELACIONES.—Se consideran en este músculo dos caras y dos extremidades. *Por detrás* está en relación con el constructor superior de la faringe, del cual está separado por la aponeurosis buccinató-faríngea. *Por delante* está en relación con el orbicular de los labios. La *cara interna* se corresponde con la mucosa bucal. La *cara externa*, con la posterior de la rama ascendente del maxilar, con el músculo masetero, con el conducto de Sténon (que lo perfora a nivel del segundo molar superior), con las glándulas molares, el nervio bucal, la arteria facia, y las ramas del facial. Está separado de estos órganos por la *aponeurosis buccinatrix*.

INERVACIÓN.—Como el anterior.

ACCIÓN. Aumenta el diámetro transversal de los labios tirando la comisura hacia atrás. Hace salir a presión el aire contenido en la cavidad bucal (toque de los instrumentos de viento).

3.º Elevador común del ala de la nariz y del labio superior. Músculo delgado verticalmente extendido desde el ángulo interno del ojo al labio superior.

INSERCIÓNES.—*Por arriba* se inserta en la apófisis ascendente del maxilar superior. *Por abajo*, en el ala de la nariz y en el labio superior.

INERVACIÓN.—Filetes infraorbitarios del facial.

RELACIONES.—Cubierto por la piel, cubre a su vez algunos músculos cutáneos.

4.º Elevador propio del labio superior.—Pequeño músculo en forma de cinta, situado por fuera y debajo del precedente.

INSERCIÓNES.—*Por arriba* se inserta en el maxilar superior, cerca del reborde de la órbita, y *por debajo*, en el labio superior.

RELACIONES.—Está situado entre el músculo precedente y el cigomático menor. Cubre el canino y el orbicular de los labios.

INERVACIÓN.—Como el anterior.

ACCIÓN.—Levanta hacia arriba el labio superior.

5.º Canino.—Músculo aplanado, cuadrilátero, que ocupa la fosa canina.

INSERCIÓN.—*Por arriba* se inserta en la fosa canina, y *por abajo*, en la piel, cerca de la comisura.

RELACIONES.—Está cubierto por el músculo precedente.

INERVACIÓN.—Como el precedente.

ACCIÓN.—Atrae hacia arriba la comisura.

6.º Cigomático menor.—Músculo prolongado que se extiende desde el pómulo a la comisura. Es superficial, únicamente cubierto por la piel. Inervado como el anterior. Atrae hacia arriba y afuera la comisura de los labios.

7.º Cigomático mayor.—Músculo acintado que va desde el pómulo a la comisura, por fuera del precedente. Cruza el masetero y la vena facial. Inervado como el precedente. Atrae hacia arriba y afuera la comisura de los labios.

8.º Risorio de Santerini.—Es un músculo triangular, situado a cada lado de la cara.

INSERCIÓNES. *Por detrás* se inserta en el tejido celular de la región parotídea, y *por delante*, en la comisura.

RELACIONES.—Es un músculo superficial cubierto por la piel, que descansa sobre la parótida, el masetero y el buccinador.

INERVAÇÃO.—Filetes bucales inferiores del facial.

Acción.—Es el músculo de la sonrisa (*risorius*).

9.º Triangular de los labios.—Músculo ancho y delgado, que va de maxilar inferior a la comisura.

INSERCIÓNES.—*Por abajo* se inserta en el tercio interno de la línea oblicua externa del maxilar inferior, y *por arriba*, en la comisura, en donde se entremezcla con los fascículos de los músculos canino y cigomático.

RELACIONES.—Son superficiales; está cubierto el músculo por la piel, y a su vez cubre el buccinador y el orbicular.

INERVAÇÃO.—Filetes mentonianos del facial.

Acción.—Baja la comisura (antagonista de los cigomáticos).

10. Cuadrado del mentón.—Músculo cuadrilátero, aplanado, que va desde el tercio interno de la línea oblicua externa a la comisura de los labios. Inervado como el anterior. Baja la comisura.

11. Músculos borla del mentón o de la barba.—Son dos músculos coroides, derecho e izquierdo comprendidos en el intervalo triangular que dejan los dos músculos precedentes, se extienden desde el maxilar inferior a la piel del mentón. Descansan sobre el hueso y son superficiales. Entre ellos existe algunas veces una depresión media, la *fosita del mentón*. Inervados como el precedente. Aplican la eminencia mentoniana contra la sínfisis.

CAPITULO II

MUSCULOS DEL CUELLO

Los músculos del cuello propiamente dichos están distribuidos en tres regiones: 1.^a, *región lateral del cuello* 2.^a, *región del hueso hioides*, 3.^a, *región prevertebral*. A su estudio va anexo el de las *aponeurosis cervicales*.

1. REGIÓN LATERAL DEL CUELLO

Comprende cinco músculos: 1.^o, dos superficiales, *cutáneo* y *esternocleidomastoideo*, 2.^o, tres profundos, *escaleno anterior*, *escaleno posterior* y *recto lateral de la cabeza*.

1.^o **Cutáneo del cuello.** — Músculo ancho y delgado, situado en la parte lateral del cuello, por debajo de la aponeurosis superficial.

INSERCIÓNES. *Por abajo*, en el tejido celular subcutáneo de la región subclavicular. *Por arriba* en el borde inferior del maxilar; en la línea media los dos músculos se entrecruzan, y por lo demás se mezclan con los fascículos de los músculos cutáneos de la cara.

RELACIONES. Dos caras y dos bordes. La *cara superficial* es subcutánea. La *cara profunda* cubre todos los músculos profundos del cuello. El *borde posterior*, oblicuo hacia abajo y atrás, está en relación por arriba con el risorio. El *borde anterior* forma con el lado opuesto un vasto triángulo, cuyo vértice corresponde a la sínfisis mentoniana y la base al tórax.

INERVACIÓN. - Rama cervicofacial del facial.

ACCIÓN. — Atrae hacia abajo la piel del mentón y el labio inferior (expresión de las pasiones tristes).

2.^o **Eternocleidomastoideo.** — Músculo grueso, que va oblicuamente de la parte superior del tórax a la apófisis mastoideas.

INSERCIÓNES Está formado de dos porciones, el fascículo esternal y el fascículo clavicular. El *fascículo esternal* se desprende de la cara anterior del manubrio por un fuerte tendón; ensanchándose sucesivamente, se dirige hacia arriba y atrás, hasta la cara externa de la apófisis mastoides y la línea curva occipital superior. El *fascículo clavicular* se inserta en el cuarto interno de la clavícula (borde posterior) desde este punto se dirige casi verticalmente hacia arriba y va a insertarse en el borde anterior de la apófisis mastoides y la línea curva occipital superior. Estos dos fascículos distintos en su origen, se confunden mas o menos en su terminación. También admiten algunos que el músculo esternomastoideo está formado de cuatro fascículos, cuya denominación indica el trayecto y las inserciones (*fascículos esternomastoideo, esternooccipital, cleidomastoideo y cleidooccipital*).

RELACIONES — Dos caras y dos bordes. La *cara externa* es superficial, cubierta por el cutáneo, la vena yugular externa y ramas del plexo cervical superficial (rama cervical transversal). La *cara interna* cubre por abajo la articulación esternoclavicular. En su trayecto hasta la apófisis mastoides está en relación con el paquete vasconervioso del cuello (*músculo satélite de la arteria carótida*); el vaso está primeramente colocado en el triángulo que forman, en su parte inferior, los dos fascículos del músculo; luego, siendo el músculo oblicuo hacia arriba y atrás y siendo por otra parte casi vertical la arteria, resulta que esta última se aproxima cada vez más al borde anterior del músculo, y al fin sobresale de éste por encima del borde superior del cartilago tiroideo. El *borde anterior* está en relación, por arriba, con la parótida y el ángulo maxilar (*cintilla esternomaxilar*), y por abajo limita por fuera las regiones supra e infrahioideas. El *borde posterior* constituye, con el borde anterior del trapecio, el límite del triángulo supraclavicular. A nivel de este borde se desprenden las cinco ramas del plexo cervical superficial.

INERVACIÓN — Espina y plexo cervical.

ACCIÓN — Tomando punto fijo en su inserción inferior, el esternomastoideo dobla la cabeza sobre la columna vertebral, la inclina hacia sí y le imprime al propio tiempo un movimiento de rotación (hacia el lado opuesto).

3° Escalenos. — Músculos triangulares, situados profundamente a cada lado del cuello. Son tres.

INSERCIÓNES — *Escaleno anterior*: por arriba se inserta en los tubérculos anteriores de las 3^a, 4^a, 5^a y 6^a vértebras cervicales; por

abajo, por un tendón único, en el tubérculo de Lisfranc de la primera costilla. *Escaleno medio*: arriba, en los tubérculos anteriores de las seis últimas cervicales; abajo, en las dos primeras costillas. *Escaleno posterior*, por arriba se inserta en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las siete vertebrae cervicales, y por abajo, en la primera y segunda costillas (cara externa y borde superior)

RELACIONES. — 1.º El *escaleno anterior* está en relación, por delante, con la vena subclavia, la clavícula y el subclavio, el esterneomastoideo, el omohioideo y el nervio frénico. 2.º El *escaleno medio* corresponde por detrás al escaleno posterior. Entre él y el escaleno anterior existe un espacio triangular de base inferior por donde pasan la arteria subclavia y las ramas del plexo braquial. 3.º El *escaleno posterior* está separado del escaleno medio por un intersticio por el que pasa el nervio del serrato mayor; por detrás corresponde a los músculos de la nuca.

INERVACIÓN. — Ramas anteriores del tercero, cuarto, quinto y sexto nervios cervicales (escaleno anterior). Ramas posteriores de los nervios cervicales (escaleno posterior).

ACCIÓN. — Elevadores de las costillas, si toman por punto fijo la columna cervical. Inclinan o mantienen fija la columna cervical (contracción aislada o simultánea) si toman por punto fijo las costillas.

4.º Recto lateral de la cabeza. — Fascículo carnoso, cilíndrico más bien que aplanado, situado a cada lado del atlas y del axis.

INSERCIÓNES. — En la apófisis transversa del atlas y en la apófisis yugular del occipital (primer intertransverso).

RELACIONES. — Por delante, con la yugular externa; por atrás, con la arteria vertebral.

INERVACIÓN. — Rama anterior del primer par cervical.

ACCIÓN. — (Véase *Intertransversos*, pág. 178).

2. REGIÓN DEL HUESO HIOIDES

Comprende ocho músculos, divididos en dos grupos: 1.º, grupo *infrahioideo*, 2.º, grupo *suprahioideo*.

A. Músculos infrahioideos

Son cuatro: *esternocleidohioideo*, *omohioideo*, *esternotiroideo* y *tirohioideo*.

1.º Esternocleidohioideo. — Músculo en forma de cinta, que va de la extremidad superior del tórax al hueso hioides.

INSERCIÓNES. — *Por abajo*, en la extremidad interna de la clavícula y el esternón; *Por arriba*, en el borde inferior del hioides.

RELACIONES. — Los dos músculos están en contacto, por su extremidad superior, en la línea media, en su parte inferior se separan formando un triángulo de base inferior. En sus orígenes está cubierto por el esternomastoideo, y él a su vez cubre el tirohioideo y el esternotiroides.

INERVACIÓN. — Asa del hipogloso.

Acción. — Baja el hioides.

2.º Omohioideo. Músculo digástrico, que va del hueso hioides al omóplato.

INSERCIÓNES. — *Por detrás*, en el borde superior del omóplato, por dentro de la escotadura coracoidea; *por delante*, en la parte externa del cuerpo del hioides. Describe una curva de concavidad dirigida hacia arriba y afuera; en el punto medio de su trayecto presenta una parte tendinosa (*tendon intermedio*) que lo divide en dos vientres (digástrico).

RELACIONES. — En su origen está en relación con el músculo supraespinoso, primeramente cubierto por el trapecio, sale de este músculo, atraviesa la región supratravicular por debajo de la piel del cutáneo y de la aponeurosis, pasa por debajo del esternomastoideo, cruza por delante del paquete vasculonervioso del cuello, atraviesa la región infrahioidea, y por último, llega hasta el hueso hioides donde termina al lado del esternocleidohioideo.

INERVACIÓN. — Como el anterior.

Acción. — Baja el hueso hioides, inclinandolo hacia atrás.

3.º Esternotiroides. Músculo ancho y acinado, situado debajo del esternocleidohioideo.

INSERCIÓNES. — *Por abajo*, en la cara posterior del esternón y del primer cartilago costal; *por arriba*, en los tubérculos de la cara externa del cartilago tiroides.

RELACIONES. — Cubierto por el esternocleidohioideo, cubre a su vez la tráquea, el cuerpo tiroides, la carótida primitiva y la yugular interna.

INERVACIÓN. — Como el anterior.

Acción. — Baja la laringe y el hioides.

4.º **Tirohloideo.** Es un músculo corto, situado debajo del esternocleidohioideo, que va de los tubérculos tiroideos al borde inferior del hioides. Parece prolongación del esternotiroideo. Está innervado por un ramo del hipogloso. Baja el hioides.

B. Músculos suprahioideos

Son cuatro: *digástrico, estilohioideo, milohioideo y genihioideo*.

1.º **Digástrico.** — Forma un arco largo de concavidad hacia arriba, que va de la base del cráneo a la parte media del maxilar inferior.

INSERCIÓNES. Consiste de dos porciones o vientres:

a) *Ventre posterior.* se inserta en la parte interna de la apófisis mastoideas (*ranura digástrica*), desde este punto se dirige hacia abajo y adelante, forma un tendón que alcanza al músculo estilohioideo en su inserción sobre el hioides, lo atraviesa y llega así a la parte superior del hioides.

b) *Ventre anterior* de nuevo este tendón da origen a un cuerpo muscular, que se dirige hacia arriba y adelante y va a insertarse en la *fosita digástrica*. Al salir del ojal del estilohioideo, los dos tendones intermediarios del músculo digástrico están unidos por una aponeurosis transversal u oblicua, formada de fibras que se entrecruzan en la línea media: la *aponeurosis interdigástrica*.

RELACIONES. — El *ventre posterior* está cubierto en su cara externa, por los músculos que se desprenden de la apófisis mastoideas, cubre, por su cara interna, los músculos estiloideos, el paquete vasculo-nervioso del cuello, la arteria lingual y la arteria facial. También está en relación, por arriba, con la parótida y por abajo con la submaxilar. El *ventre anterior* es superficial; forma con el del lado opuesto un triángulo de base inferior, ocupado por los dos milohioideos. El *tendón intermediario* comprende en su concavidad la glándula submaxilar y forma con el hipogloso mayor un pequeño triángulo que da paso a la arteria lingual.

INERVACIÓN. — *Ventre posterior* por el facial y el glosofaríngeo. *Ventre anterior* por el maxilar inferior (nervio del milohioideo).

ACCIÓN. El vientre anterior, fijándose en el hueso hioides, baja el maxilar, fijándose en el maxilar, eleva el hioides. El vientre posterior arrastra a hioides hacia atrás.

2.º **Estilohioideo.** — Es un músculo delgado, prolongado y fusiforme.

INSERCIÓNES. — *Por arriba* se inserta en la parte externa de la apófisis estiloides, *por abajo* en la cara anterior del cuerpo del hioides.

RELACIONES. — Acompaña al vientre posterior del digástrico, por delante del cual está colocado; se divide, cerca de su inserción, en dos fascículos para dar paso al tendón intermediario de este último músculo.

INERVACIÓN. — Por el facial.

ACCIÓN. — Eleva el hioides.

3.º Milohioideo. — Es un músculo aplanado, delgado, cuadrilátero, que forma el suelo de la boca.

INSERCIÓNES. — *Por arriba* se inserta en la línea oblicua interna del maxilar inferior. *Por abajo*, en el hioides y en la línea blanca suprahioidea.

RELACIONES. — Su cara superficial está cubierta por el cutáneo del cuello y el vientre anterior del digástrico. Su cara profunda hallase en relación con el genihioideo, con los músculos de la lengua, con la glándula sublingual, con el conducto de Wharton y con los nervios lingual e hipogloso mayor.

INERVACIÓN. — Por el maxilar inferior.

ACCIÓN. — Eleva el hueso hioides y la lengua.

4.º Genihioideo. Es un músculo cilíndrico, situado por encima del precedente.

INSERCIÓNES. — *Por una parte* se inserta en las apófisis geniales inferiores del maxilar inferior, y *por otra parte*, en la cara anterior del hioides (inserción en U, en la cual penetra la celina oglosa,

RELACIONES. Los dos músculos están en contacto en la línea media y hallanse cubiertos, inferiormente, por el milohioideo. Su cara superior está en relación con la mucosa sublingual y con la glándula sublingual.

INERVACIÓN. — Por el hipogloso.

ACCIÓN. — Es depresor del maxilar inferior si toma por punto fijo el hioides, y elevador del hioides si se fija en el maxilar inferior.

3. REGIÓN PREVERTEBRAL

Comprende tres músculos a cada lado, que están aplicados contra la columna vertebral; llámanse *recto anterior mayor de la cabeza*, *recto anterior menor de la cabeza* y *largo del cuello*.

1.º Recto anterior mayor de la cabeza. Músculo aplanado y triangular, que va del occipital a las apófisis transversas de la columna cervical.

INSERCIÓNES. — *Por arriba*, en la cara inferior de la apófisis basilar, por delante del agujero occipital. *Por abajo*, en los tubérculos anteriores de la 3.ª, 4.ª, 5.ª y 6.ª vértebras cervicales.

RELACIONES. — Está cubierto por la aponeurosis prevertebral y cubre a su vez los demás músculos prevertebrales.

INERVACIÓN. Por el plexo cervical, profundo.

ACCIÓN. — Flexión de la cabeza, si los dos músculos se contraen; rotación hacia el lado correspondiente, si la contracción es unilateral.

2.º Recto anterior menor de la cabeza. — Músculo cuadrilátero, situado por detrás del precedente, que va de la apófisis basilar a la cara anterior de las masas laterales del atlas. Descansa sobre la articulación atlóidooccipital. Está innervado por el primer nervio cervical y flexiona la cabeza sobre la columna cervical.

3.º Largo del cuello. Es un músculo prolongado y a menudo muy delgado que va del atlas a la 3.ª vértebra dorsal.

INSERCIÓNES. Consta de tres porciones: 1.ª, *porción oblicua descendente*, que va del tubérculo anterior del atlas a los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de las 3.ª, 4.ª, 5.ª y 6.ª vértebras cervicales; 2.ª, *porción oblicua ascendente*, que va de los cuerpos de las vértebras dorsales 2.ª y 3.ª a los tubérculos anteriores de las 4.ª, 5.ª y 6.ª vértebras cervicales; 3.ª, *porción longitudinal*, situada por dentro de las otras dos, que se inserta sucesivamente en las tres primeras vértebras dorsales, las tres últimas vértebras cervicales, la cresta del axis y el tubérculo anterior del atlas.

RELACIONES. — Cubre directamente la columna vertebral y está situado debajo y por dentro de los demás músculos prevertebrales.

INERVACIÓN. — Por los cuatro primeros cervicales.

ACCIÓN. — Flexor de la columna cervical.

4. APONEUROSIS DEL CUELLO

Las aponeurosis del cuello son tres: *aponeurosis superficial*, *media* y *profunda*.

1.º Aponeurosis cervical superficial. — Esta aponeurosis está situada por debajo de la piel y rodea a manera de manguito la región

cervical Parte de la línea media y se desdobra sucesivamente a nivel de los dos músculos esternomastoideo y trapecio, y termina en las apófisis espinosas de las vértebras cervicales. Se estudian en ella dos superficies y dos circunferencias.

a) *Superficie exterior.* — Está separada de la piel por el cutáneo, los nervios subcutáneos y las venas superficiales (yugular externa).

b) *Superficie interior* — Está en relación con los órganos profundos y envía tres prolongaciones.

a) *Prolongación lateral*, que termina en las apófisis transversas de las vértebras cervicales, envolviendo los escalenos, y divide la región cervical en dos partes: región de la nuca y región del cuello propiamente dicha.

b) *Prolongación submaxilar*, con dos hojas que parten del hioides y se insertan, una en el borde inferior del maxilar inferior y la otra en la línea oblicua interna del maxilar, formando un compartimiento prismático triangular que contiene la glándula submaxilar.

γ) *Prolongación parotídea*, formada de dos hojas que se separan en el momento en que la aponeurosis abandona el esternomastoideo para dirigirse al masetero: una se extiende a manera de puente entre los dos músculos, y la otra rodea la cara profunda de la parótida pasando junto a la faringe. Estos dos compartimientos, *submaxilar* y *parotídeo*, están separados por un tabique fibroso que va del borde anterior del esternomastoideo al ángulo del maxilar.

c) *Circunferencia superior.* — Se inserta sucesivamente: 1º, en el borde inferior del maxilar; 2º, en la aponeurosis maseterina; 3º, en el tubérculo zigomático; 4º, en la apófisis mastoidea y en la línea curva superior del occipital.

d) *Circunferencia inferior* — Se inserta en el esternón, la clavícula, el acromion, el borde posterior de la espina del omóplato, y va a confundirse con la aponeurosis del dorsal ancho. Es de notar que a nivel de la horquilla del esternón, la aponeurosis cervical superficial se desdobra en hoja anterior y hoja posterior y forma entre las dos hojas un espacio de sección triangular, el hueco suprasternal, que contiene grasa, las dos yugulares anteriores y ganglios linfáticos.

2º **Aponeurosis cervical media o toracohioidea.** Se extiende por debajo de la precedente en el espacio comprendido entre los dos omóplatos lateralmente entre el hioides por arriba y el esternón y el omóplato por abajo. De forma triangular, con la base inferior, presenta dos caras y tres bordes.

- a) *Cara anterior* — Corresponde a la aponeurosis superficial
- b) *Cara posterior* — Está en relación con los órganos profundos y les envía vainas (faringe, tiroides, tráquea, esófago, paquete vasculonervioso del cuello)
- c) *Bordes laterales* — Están en relación con los dos omohioideos, comprendidos en un desdoblamiento de la aponeurosis.
- d) *Borde inferior*. — En la línea media se fija en el borde posterior de la terquilla esternal, enviando una expansión sobre el tronco venoso braquiocéfálico izquierdo. A nivel de la clavícula se inserta en el borde posterior de ese hueso, enviando expansiones aponeuróticas a los vasos subclavios.

3° **Aponeurosis cervical profunda.** — Está situada delante de los músculos prevertebrales, detrás del paquete vasculonervioso del cuello y de los órganos viscerales. Se inserta, por arriba, en la apófisis basilar del occipital, lateralmente, en las apófisis transversas de las vértebras cervicales; y se confunde, por abajo, con el tejido celular del mediastino posterior.

4° **Espacios interaponeuróticos del cuello.** — Las aponeurosis del cuello circunscriben, por delante de la columna vertebral, cuatro compartimientos: 1°, *primer espacio subcutáneo*, comprendido entre la piel y la aponeurosis superficial, contiene el cutáneo, las venas y los nervios superficiales; 2°, *segundo compartimiento*, comprendido entre las dos aponeurosis media y superficial, contiene los músculos hioideos y la vena yugular anterior; 3°, *tercer compartimiento*, comprendido entre las dos aponeurosis profunda y media; aloja el paquete vasculonervioso y las vísceras cervicales; 4°, *cuarto compartimiento*, comprendido por detrás de la aponeurosis prevertebral, contiene los músculos prevertebrales.

CAPITULO III

MUSCULOS DE LA REGION POSTERIOR DEL TRONCO Y DEL CUELLO

Esta región se extiende, en altura, desde la protuberancia occipital externa hasta el cóccix, y en anchura, de un omóplato al otro. Dividense los músculos que comprende en seis grupos: 1.º, *músculos superficiales*, 2.º, *músculos de la nuca*; 3.º, *músculos de los canales vertebrales*, 4.º, *intertransversos*; 5.º, *espinosos e interespinosos*, 6.º, *coccigeos*.

1. MÚSCULOS SUPERFICIALES DE LA REGIÓN

Estos músculos son seis, dispuestos en tres planos: 1.º, en el plano superficial, los músculos *trapezio* y *dorsal ancho*, 2.º, en el plano medio, los músculos *romboides* y *angular*, 3.º, en el plano profundo, los dos músculos *serratos menores*, *posteriosuperior* y *posteroinferior*.

1.º **Trapezio.** Músculo ancho, superficial, comprendido entre el occipital y la parte inferior de la columna dorsal.

INSERCIÓNES. Tiene dos órdenes de inserciones

a) *Inserciones internas* en la línea curva occipital posterior, en la protuberancia occipital externa, en el ligamento cervical posterior y en el vértice de las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical y de las diez u once primeras vértebras dorsales

b) *Inserciones externas*; se efectúan en los dos huesos del hombro; los *fascículos superiores* se insertan en el borde posterior de la clavícula (tercio externo), los *fascículos medios*, en el borde interno del acromion y en el borde posterior de la espina del omóplato; los *fascículos inferiores*, en la espina del omóplato.

El músculo trapezio presenta, en medio de sus fibras carnosas, tres hojas aponeuróticas: la *primera* lo une a la protuberancia occi-

pital externa: es cuadrilátera, la *segunda* corresponde a las últimas vértebras cervicales y a las primeras vértebras dorsales; y la *tercera*, situada a nivel del ángulo inferior del músculo, continúa la dirección de la aponeurosis lumbar

RELACIONES. — El músculo trapecio está cubierto por la piel. Cubre los demás músculos de la nuca y de la región dorsal. Es de notar que su borde anterosuperior limita, con el esternomastoideo, el triángulo supraclavicular.

INERVACIÓN. — Por el espinal y el plexo cervical profundo.

ACCIÓN. — Tomando por punto fijo la columna vertebral, eleva el manguito del hombro aproximando el omóplato a la misma. Tomando por punto fijo el omóplato, comunica a la cabeza movimientos de inclinación y extensión y de rotación; puede levantar el cuerpo entero, suspendido por los miembros superiores (acción de trepar).

2.º Dorsal ancho. — Músculo delgado, triangular, que va de la columna vertebral a la región axilar.

INSERCCIONES. — 1.º *por dentro* se inserta en las apófisis espinosas de las siete últimas vértebras dorsales y de las cinco lumbares, en la cresta sacra, en el labio externo de la cresta ilíaca (tercio posterior) en la cara externa de las tres últimas costillas (estos fascículos se insertan en la columna vertebral por la *aponeurosis lumbar*). 2.º *por fuera* se inserta en el fondo de la corredera bicipital, por delante del tendón del redondo mayor, por un tendón que resulta de la fusión de todos los fascículos musculares.

RELACIONES. — Cubierto por arriba por el trapecio, está en relación con la piel en el resto de su extensión. Cubre los músculos dorsales profundos. Su borde anterior, vertical, está separado del borde posterior del oblicuo mayor por un espacio triangular, cuya base, dirigida hacia abajo, corresponde a la cresta ilíaca, es el *triángulo de J. L. Petit*.

INERVACIÓN. — Por el quinto cervical.

ACCIÓN. — Tomando por punto fijo la columna, dirige el brazo hacia abajo, adentro y atrás. Tomando por punto fijo el húmero, puede levantar el cuerpo entero (acción de trepar).

3.º Romboideo. — Músculo ancho, delgado, romboideo, intermedio entre la nuca y la región dorsal.

INSERCCIONES. — *Por dentro* se inserta en el ligamento cervical posterior en las apófisis espinosas de la séptima cervical y de las

cuatro o cinco primeras vértebras dorsales; *por fuera*, en el borde espinal del omóplato. Este músculo está a veces dividido en dos fascículos: *romboides inferior* y *romboides superior*.

INERVIACIÓN. — Plexo braquial. (cuarto y quinto cervicales).

RELACIONES. — El romboides está comprendido entre el trapecio y los músculos más profundos de la región dorsal.

Acción. — Lleva el omóplato hacia dentro.

4° Angular del omóplato. — Músculo triangular situado en la parte lateral de la nuca.

INSERCIÓNES. — *De una parte*, por abajo se inserta en el ángulo superior del omóplato; *de otra parte*, por arriba, en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las vértebras cervicales 3°, 4° y 5° y en las apófisis transversas del atlas.

RELACIONES. — Cubierto por el esternomastoideo y el trapecio, cubre los músculos esplenio y serrato menor.

INERVIACIÓN. — Plexo braquial.

Acción. — Lleva hacia arriba el ángulo superior del omóplato o inclina hacia sí la columna cervical.

5° Serrato menor posterosuperior. — Músculo delgado, situado debajo del romboides.

INSERCIÓNES. — Hacia dentro se inserta en la parte inferior del ligamento cervical y en las apófisis espinosas de la 7.ª vértebra cervical y de las dorsales 1.ª, 2.ª y 3.ª. Desde este punto los fascículos musculares se dirigen hacia la cara externa de las costillas 2.ª, 3.ª, 4.ª y 5.ª.

RELACIONES. — Cubierto por el romboides, cubre a su vez el esplenio, las costillas y los músculos intercostales.

INERVIACIÓN. — Primeros intercostales.

Acción. — Elevador de las costillas.

6° Serrato menor posteroinferior. — Músculo delgado, situado en la parte inferior del dorso.

INSERCIÓNES. — *Por dentro* se inserta en las apófisis espinosas de las vértebras 11.ª y 12.ª dorsales y de las lumbares 1.ª, 2.ª y 3.ª. *Por fuera*, en la cara externa de las cuatro últimas costillas.

RELACIONES. — Cubierto por el dorsal ancho, cubre a su vez los músculos de los canales vertebrales y los músculos intercostales.

INERVIACIÓN. — Por los 9.º, 10.º y 11.º nervios intercostales.

Acción — Lleva hacia abajo y afuera las costillas sobre las cuales se inserta, es un músculo inspirador.

7° Aponeurosis lumbar. Es una lámina triangular que forma un rombo con la del lado opuesto, su base corresponde a las apófisis espinosas de las últimas vértebras dorsales y de las cinco lumbares; su borde superior, oblicuo hacia abajo y afuera, presia inserción a los fascículos del dorsal ancho; su borde inferior se inserta en la cresta del hueso coxal y recibe fibras del glúteo mayor. Constituye, en suma, la fusión de los tendones internos de los cuatro músculos dorsal ancho, glúteo mayor, oblicuo menor y transverso del abdomen.

* MÚSCULOS DE LA NUCA

Son ocho: *esplenio complejo mayor, complejo menor, transverso del cuello, recto posterior mayor y recto posterior menor de la cabeza, oblicuo mayor y oblicuo menor de la cabeza*.

1° Esplenio. — Músculo ancho y delgado, está situado inmediatamente debajo del trapecio.

INSERCIÓNES. — Por dentro se inserta en el tercio inferior del ligamento cervical, en las apófisis espinosas de la 7.ª vértebra cervical y de las cuatro o cinco primeras dorsales. Desde aquí, va a insertarse en la línea curva occipital superior, en la cara externa de las mastoides (*splenius capitis*), y en el vertice de las apófisis transversas del atlas y del axis (*splenius servicis*).

RELACIONES. — Dos caras y dos bordes: 1.º, la *cara posterior* está en relación con el esternomastoideo y con el trapecio; 2.º, la *cara anterior* cubre los demás músculos de la nuca; 3.º, el *borde externo* costea el angular del omóplato; 4.º, el *borde interno*, oblicuo hacia arriba y afuera, forma el *triángulo de los esplenios*, dentro del cual se ven los músculos complexus.

INERVACIÓN. — Nervios cervicales. Nervio occipital mayor.

Acción — Imprime a la cabeza movimientos de extensión, de inclinación lateral y de rotación (del lado correspondiente etc.).

2° Complejo mayor. — Músculo ancho, que ocupa toda la altura de la nuca a cada lado de la línea media.

INSERCIÓNES. En la columna cervical se inserta en las apófisis transversas de las cinco primeras vértebras dorsales, en las apófisis ar-

ticulares y en las apófisis transversas de las últimas cuatro o cinco cervicales. Desde este punto va a insertarse entre las dos líneas curvas del occipital. La porción interna de este músculo está a veces dividida en dos fascículos (*biventer cervicis*) por un tendón intermedio.

RELACIONES. Está comprendido entre el esplenio (al que excede a nivel del triángulo de los esplenios) y los músculos subyacentes.

INERVACIÓN. — Nervio occipital mayor. Tercero, cuarto y quinto nervios cervicales.

ACCIÓN. — Extensor de la cabeza.

5.º Complejo menor. Es un músculo prolongado verticalmente situado en la parte lateral de la nuca.

INSERCIÓNES. — *De una parte* se inserta en las apófisis transversas de las vértebras cervicales 4.ª, 5.ª, 6.ª y 7.ª, y *de otra parte*, en el vértice de la apófisis mastoides.

RELACIONES. Está situado entre el complejo mayor por dentro, el angular y el esplenio por fuera.

INERVACIÓN. — Como el anterior.

ACCIÓN. — Dobla la cabeza hacia atrás.

1.º Transverso del cuello. — Músculo delgado, prolongado verticalmente, aplanado en sentido transversal, situado por fuera del precedente.

INSERCIÓNES. *Por una parte*, en las apófisis transversas de las primeras vértebras dorsales, *por otra parte*, en las apófisis transversas de las últimas vértebras cervicales.

RELACIONES. — Está más o menos fusionado con el dorsal largo y el sacrolumbar, que se encuentran a su lado externo.

INERVACIÓN. Últimos nervios cervicales. Primeros nervios dorsales.

ACCIÓN. — Extiende la columna cervical.

5.º Recto posterior mayor de la cabeza. Músculo aplanado que va del axis al occipital.

INSERCIÓNES. — *Por abajo* se inserta en el vértice de la apófisis espinosa del axis, *por arriba*, en la impresión rugosa situada debajo de la línea curva inferior del occipital.

RELACIONES. Está cubierto por los músculos precedentes. Forma, con el del lado opuesto, un triángulo que lo llenan los rectos posteriores menores.

INERVACIÓN. — Primer nervio cervical.

ACCIÓN. — Movimientos de extensión o de inclinación lateral de la cabeza (con rotación hacia el lado correspondiente).

6.º Recto posterior menor de la cabeza. — Músculo aplanado y triangular, situado por dentro del precedente.

INSERCIÓNES. — *Por abajo* se inserta en el tubérculo posterior o apófisis espinosa del atlas, *por arriba*, por dentro del músculo precedente.

RELACIONES. — Está alojado en el triángulo que forman los dos músculos precedentes, como éstos, cubre la articulación occipito-atloidea.

INERVACIÓN. — Como el precedente.

ACCIÓN. — Es extensor de la cabeza.

7.º Oblicuo mayor de la cabeza. — Músculo relativamente voluminoso, que tiene la forma de un cuadrado y va del axis al atlas.

INSERCIÓNES. — *Por una parte*, en la apófisis espinosa del axis, y *por otra*, en la apófisis transversa del atlas.

RELACIONES. — Cubierto por los complexos, cubre a su vez el ligamento atloidoaxoideo posterior y la arteria vertebral. Su cara posterior está cruzada por el gran nervio suboccipital de Arnold.

INERVACIÓN. — Primero y segundo nervios cervicales.

ACCIÓN. — Es rotatorio del atlas y, por consiguiente, de la cabeza.

8.º Oblicuo menor de la cabeza. — Músculo aplanado y triangular, que va del atlas al occipital.

INSERCIÓNES. — *Por una parte* se inserta en la apófisis transversa del atlas, y *por otra*, en el occipital, por fuera de la inserción superior del recto mayor.

RELACIONES. — Situado en el mismo plano que los músculos precedentes, forma, con el oblicuo mayor y el recto mayor, un triángulo que da paso a la rama posterior del primer nervio cervical.

INERVACIÓN. — Primer nervio cervical.

ACCIÓN. — Es extensor de la cabeza.

3. MÚSCULOS DE LOS CANALES VERTEBRALES

Los canales vertebrales, comprendidos entre las apófisis espinosas y las costillas, están ocupados por tres masas musculares: 1.º, el músculo iliocostal, 2.º, el músculo dorsal largo; 3.º, el músculo trans-

verso espinoso. Aislados en la región dorsal, estos músculos se reúnen en la región lumbar para formar la *masa común*.

1.º Masa común. Nace de todos los puntos óseos próximos a la región lumbar: apófisis espinosa, cresta sacra, ligamento sacrocriático, tuberosidad ilíaca. Esta inserción se efectúa por una aponeurosis, la *aponeurosis espinal*. En la región dorsal, la masa común se divide en tres fascículos principales que son los tres músculos señalados anteriormente.

2.º Iliocostal o sacrolumbar. Porción superficial y externa de la masa común, se dirige hacia arriba y termina: 1.º, por doce tendones (*tendones dorsales*), en el ángulo de las doce costillas, 2.º, por cinco tendones (*tendones cervicales*), en las apófisis transversas de las cinco últimas vértebras cervicales. A medida que el músculo se extingue sobre las costillas éstas le envían doce fascículos, llamados *de refuerzo*.

3.º Dorsal largo. Porción superficial e interna de la masa común, parte de las apófisis espinosas de las vértebras lumbares y sigue hacia arriba por dentro del precedente. Cruza *diecisiete vértebras*, con sus costillas y envía fascículos a cada grupo vertebrocostal: 1.º, para la apófisis espinosa (*fascículos espinosos*), estos fascículos se describen a veces como un músculo aparte, el *músculo espiespinoso* o *espinoso largo del dorso*, 2.º, para la apófisis transversa (*fascículo transverso*) de cada vértebra, y 3.º, para la costilla (*fascículo costal*). En la región lumbar, estos tres órdenes de fascículos vienen a insertarse en la apófisis espinosa, en el tubérculo apofisario y en el apéndice costiforme de las vértebras lumbares.

4.º Transverso espinoso. — Situado debajo de los precedentes, se extiende desde el vértice del sacro a la segunda vértebra cervical. Comprende tres grupos de fascículos.

a, *Semiespinoso* — Constituye dos músculos: el *semiespinoso dorsal*, que empieza en las apófisis transversas de las seis últimas dorsales y termina en las apófisis espinosas de las cuatro primeras dorsales y de las dos últimas cervicales, y el *semiespinoso de la nuca*, que comprende también fascículos que se desprenden de las apófisis transversas de las primeras dorsales para terminar en las apófisis espinosas de las primeras vértebras cervicales.

b) *Multífido del raquis*. Se extiende desde el sacro hasta e axis y comprende fascículos que van desde la apófisis transversa de una vértebra a la apófisis espinosa de una vértebra suprayacente.

c) *Rotadores del dorso*. Son pequeños fascículos que van de la apófisis transversa de una vértebra al borde inferior de la lámina de la vértebra suprayacente. Son llamados también, teniendo en cuenta su situación, *submultífidos*.

5° Relaciones, inervación y acción de los músculos espinales.— Los músculos espinales están alojados en los canales vertebrales. Hallanse cubiertos por los músculos de las regiones precedentes y cubren a su vez las vértebras y las costillas. Están contenidos dentro de una especie de compartimiento osteofibroso e inervados por las ramas posteriores de los nervios raquídeos. Desde el punto de vista de su acción, son extensores de la columna vertebral, a la que inclinan lateralmente cuando se contraen de un solo lado.

4. MÚSCULOS INTERTRANSVERSOS

Los intertransversos son músculos que unen entre sí las apófisis transversas de las vértebras. Son diferentes en el cuello, en el dorso y en la región lumbar.

1° Intertransversos del cuello.— En número de dos por cada espacio intertransverso, uno anterior y otro posterior, limitan un espacio por el cual pasan los vasos vertebrales, cruzados en ángulo recto por las ramas anteriores de los nervios cervicales. Inclinan la columna cervical o la fijan firmemente.

2° Intertransversos del dorso.— Son simples lengüetas tendinosas que unen entre sí dos apófisis transversas.

3° Intertransversos de la región lumbar.— Son dobles (internos y externos). Los *intertransversos externos* van de una apófisis transversa a la otra. Los *intertransversos internos* van de un tubérculo mamilar al otro.

Los intertransversos están inervados por ramos de los nervios raquídeos a la salida del agujero de conjunción.

5 MÚSCULOS INTERESPINOSOS Y ESPINOSOS

1.º Interespinosos. Son unas pequeñas cintas musculares dispuestas por pares que unen las apófisis espinosas de dos vértebras inmediatas. *En el cuello hay seis. En el dorso son irregulares. En la región lumbar hay cuatro.* Son extensores de la columna vertebral.

2.º Espinosos.—Son dos: 1.º, uno en la nuca, que va de las apófisis espinosas de las dos primeras vértebras dorsales a las apófisis espinosas del axis y de la tercera vértebra cervical; 2.º, otro en el dorso, que constituye la parte interna del dorsal largo. Son extensores de la columna vertebral.

Es an inervados por ramos posteriores de los nervios raquídeos

6. MÚSCULOS COCCÍGEOS

Los músculos coccígeos son tres en cada lado. Todos son rudimentarios.

1.º Músculo isquiococcígeo.—Véase *Músculos del perineo*.

2.º Sacrococcígeo posterior.—Va de las vértebras sacras al cóccix; inclina el cóccix hacia atrás.

3.º Sacrococcígeo anterior.—Está situado por delante de la articulación sacrococcígea; inclina el cóccix hacia delante.

CAPITULO IV

MUSCULOS DEL TORAX

Se dividen en dos grupos: 1.º, músculos de la *región antero-lateral*; 2.º músculos de la *región cosal*.

1. REGIÓN ANTEROLATERAL

Comprende cuatro músculos: 1.º, el *pectoral mayor*, 2.º, el *pectoral menor*, 3.º, el *subclavio*; 4.º, el *serrato mayor*.

1.º Pectoral mayor. — Músculo ancho, situado en la parte anterior del tórax y del hueco de la axila.

INSERCIÓNES. — *Por la parte del tórax.* 1.º, en el borde anterior de la clavícula, 2.º, en la cara anterior del esternón; 3.º, en los cartílagos de las cinco o seis primeras costillas; 4.º, en la aponeurosis del oblicuo mayor (en total, una línea cóncava hacia fuera mirando el hueco axilar). Todos estos fascículos se reúnen en un tendón que va al húmero. *Por parte del brazo,* por el precitado tendón en forma de U, en el labio externo de la corredera bicipital del húmero.

RELACIONES. Dos caras y tres bordes. La *cara anterior* está cubierta por la piel y la glándula mamaria. La *cara posterior* cubre el esternón y las costillas y forma la pared anterior del hueco axilar. El *borde superoexterno* está separado del deltoides por el espacio deltopectoral (*vena cefálica*). El *borde interno*, curvo, está en relación con el esqueleto que presta inserción al músculo. El *borde infero-externo* constituye el borde anterior del hueco de la axila.

INERVACIÓN. — Plexo braquial, por los nervios de los pectorales mayor y menor.

ACCIÓN. Aproxima el brazo al tronco cuando toma por punto fijo el tórax, y levanta el tórax y las costillas cuando toma por punto fijo el húmero.

2° Pectoral menor.—Músculo triangular, situado por debajo del precedente: va de la apófisis coracoides a las costillas.

INSERCIÓNES — Por un lado se inserta en la apófisis coracoides, por otro, en la cara externa de las costillas 3.^a, 4.^a y 5.^a

RELACIONES — Se consideran en él dos caras y dos bordes. La *cara anterior* está en relación con el pectoral mayor. La *cara posterior*, con las costillas y los órganos del hueco axilar. El *borde superior* está separado del músculo subclavio por el *espacio clavipectoral*, ocupado por la aponeurosis del mismo nombre. El *borde inferior* está unido al hueco axilar por el *ligamento suspensorio de la axila*.

INERVACIÓN — Plexo braquial, por el nervio del pectoral menor.

ACCIÓN — Baja el muñón del hombro o eleva las costillas.

3° Subclavio.—Músculo cilíndrico, que va del primer cartílago costal a la cara inferior de la clavícula. Está en relación con la clavícula por arriba, y por abajo con la primera costilla, de la cual está separado por los vasos subclavios y los nervios del plexo braquial. Inervado por el plexo braquial. Baja la clavícula.

4° Serrato mayor.—Músculo ancho y radiado, que está aplicado contra la pared lateral del tórax.

INSERCIÓNES — Se inserta en las nueve o diez primeras costillas, y va desde este punto al borde espinal del omóplato, formando tres fascículos más o menos distintos.

RELACIONES — Tiene dos caras y dos bordes. La *cara superficial* es convexa y está cubierta por los músculos pectorales, el subescapular y los vasos axilares. La *cara profunda* descansa sobre las costillas y los intercostales. El *borde anterior* está en relación con las costillas. El *borde posterior*, con el borde espinal del omóplato.

INERVACIÓN. Plexo braquial, por el nervio del serrato mayor (nervio de Ch. Bell).

ACCIÓN — 1.º Eleva el omóplato hacia delante y el muñón del hombro hacia arriba, cuando toma el tórax por punto fijo. 2.º Eleva las costillas con sus fascículos superiores y las baja con los fascículos inferiores, tomando por punto fijo el omóplato.

5° Aponeurosis de la región anterolateral.—Cada uno de estos músculos tiene su aponeurosis. El *serrato mayor* y el *subclavio* están cubiertos por una hoja aponeurótica. El *pectoral mayor* está cubierto en sus dos caras por una aponeurosis. El *pectoral menor*

está envuelto en sus dos caras por una hoja doble, que constituye la *vaina del pectoral menor*. Esta vaina, por arriba, se une a la aponeurosis del subclavio por la *aponeurosis clavipectoral*, por abajo se une a la aponeurosis de la base del hueco axilar (aponeurosis que une el borde inferior del pectoral mayor al borde inferior del dorsal ancho) por una hoja aponeurótica llamada *ligamento suspensorio de la axila*. Estas tres aponeurosis (aponeurosis clavipectoral vaina del pectoral menor y ligamento suspensorio de la axila) forman, en su conjunto, la *aponeurosis clavicoracoxilar*.

2. REGIÓN COSTAL

La región costal comprende cuatro órdenes de músculos: 1.º, *intercostales*; 2.º, *supracostales*; 3.º, *infracostales*, 4.º *triangular del esternón*.

1.º Intercostales.— Son músculos anchos que, situados en un espacio intercostal (dos para cada espacio), revisitan la forma de este espacio y se distinguen en *intercostales internos* y *externos*. Algunos autores distinguen un *intercostal medio*.

INSERCIÓNES. Los *intercostales externos* unen entre sí los labios externos de los bordes superior e inferior de las costillas; comienzan por detrás en las articulaciones costotransversas, y se extienden hasta la articulación de la costilla y el cartílago. Los *intercostales internos* reúnen los labios internos de los bordes superior e inferior de las costillas; empiezan, por delante, en el esternón y se detienen, por detrás, en el ángulo de las costillas.

RELACIONES. Los *intercostales externos* están cubiertos por los músculos que se insertan en el tórax. Los *intercostales internos* están en relación con la pleura. Entre ellos se encuentra un espacio, que se atenúa de atrás adelante y en el cual se alojan, en medio del tejido celular, la vena intercostal *por arriba*, el nervio *por abajo* y la arteria *entre las dos*. Es de notar que en su parte media los *intercostales internos* se insertan a la vez en el labio interno y en el labio externo de la costilla que está por encima; a este nivel el paquete vasculo-nervioso se encuentra situado realmente en el espesor mismo del intercostal interno.

INERVIACIÓN.— Nervios intercostales correspondientes.

Acción.— Se consideran como músculos inspiradores y espiradores; pero en realidad son formaciones degeneradas y de escasa acción.

2° Supracostales. — Son formaciones musculares, en número variable, que nacen de una apófisis transversa y van a terminar en la cara externa de la costilla subyacente. Están cubiertos por la masa sacrolumbar y cubren los intercostales externos. Inervados como los anteriores. Elevan las costillas

3° Infracostales. — Son fascículos musculares inconstantes que unen las caras internas de las dos costillas inmediatas. No tienen ninguna acción importante.

4° Triangular del esternón. — Músculo aplanado y triangular situado detrás del esternón.

INSERCIÓNES — *Por dentro* se inserta en el apéndice xifoides y el cuerpo del esternón; *por fuera*, en la cara interna de los cartílagos costales 6.º, 4.º y 3.º

RELACIONES — Está en relación con la pleura parietal y el pericardio y separado de las costillas por los vasos mamarios internos

INERVACIÓN — Nervios intercostales

CAPITULO V

MUSCULOS DEL ABDOMEN

Los músculos del abdomen están repartidos en cuatro regiones: 1.º, *región anterolateral*, 2.º, *región posterior o lumboilíaca*, 3.º, *región superior o diafragmática*, 4.º, *región inferior o perineal* (véase *Organos genitourinarios*).

I REGIÓN ANTEROLATERAL

Esta región comprende dos órdenes de músculos: 1.º, *músculos largos*, 2.º, *músculos anchos*.

A. Músculos largos

Los músculos largos son dos: 1.º, *el músculo recto mayor del abdomen*, 2.º, *el músculo piramidal del abdomen*.

1.º **Recto mayor del abdomen.**—Músculo en forma de cinta que va del pubis a las costillas medias.

INSERCIÓNES. — *Por abajo* se inserta en el cuerpo del pubis por un tendón, *por arriba*, en los bordes inferiores de los cartílagos costales 5.º, 6.º, 7.º y en el apéndice xifoides. En su trayecto presenta inserciones aponeuróticas (metamerias, costillas abdominales).

RELACIONES. — Está cubierto por una vaina aponeurótica (*vaina del recto*) que lo separa, por delante, de la piel; por detrás, de la *fascia transversal*. Su borde interno está separado del delado opuesto por un rafe fibroso, la *línea alba*.

INERVIACIÓN. — Siete últimos nervios intercostales.

ACCIÓN. — Desempeña importante papel en el acto de la micción, la defecación, el vómito, etc.

2.º **Piramidal del abdomen.**—Músculo pequeño, prolongado, situado por encima del pubis y por delante del recto mayor.

INSERCIONES. — Se extiende desde el cuerpo del pubis a la línea alba.

RELACIONES — V2 contenido dentro de la vaina del recto mayor, cuya pared anterior lo separa de la piel, descansa sobre aquel músculo. No se le conoce acción especial (formación rudimentaria).

INERVACIÓN — Abdominogenitales.

B Músculos anchos

Son tres: 1.º, *oblicuo mayor*; 2.º, *oblicuo menor*, 3.º, *transverso*.

1.º Oblicuo mayor del abdomen.—Músculo superficial que, en altura, va de la sexta costilla al pubis, y en anchura, del dorsal ancho a la línea blanca.

INSERCIONES DE ORIGEN — Se insertan en la cara externa y borde inferior de las ocho últimas costillas, por digitaciones que se entrecruzan con las del serrato mayor y del dorsal ancho.

INSERCIONES TERMINALES — Se efectúan por medio de un tendón, impropriamente llamado *aponeurosis del oblicuo mayor*, que se fija, 1.º, en la cresta ilíaca; 2.º, en el borde anterior del hueso coxal, 3.º, en el pubis; 4.º, en la línea blanca.

a) *En la cresta ilíaca.* — Se inserta en el labio externo por fibras aponeuróticas.

b) *En el borde anterior del hueso coxal* — Estas inserciones se efectuarían en el hueso si ningún órgano se encontrase delante de él. Los fascículos tendinosos pasan por encima del psoas, adhiriéndose a la fascia ilíaca; después forman una especie de puente por encima del paquete vasculonervioso. Encontrando luego el pectíneo, suben con la aponeurosis de este músculo hasta la cresta pectínea; esta porción pectínea de la inserción del oblicuo mayor se llama *ligamento de Gimbernat*. La aponeurosis de inserción forma, desde la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis, una cinta resistente, llamada *arco crural*.

c) *En el pubis.* — Las fibras aponeuróticas se dividen en dos fascículos: fibras superficiales y fibras profundas. Las *fibras superficiales* se insertan en la espina del pubis por dos fascículos distintos, que constituyen el *pilar externo* y el *pilar interno* del orificio cutáneo del conducto inguinal; estos dos pilares están unidos por arriba por *fibras arciformes* (entre los dos pilares, el orificio externo del conducto inguinal). Las *fibras profundas* forman el *pilar posterior* o *liga-*

mento de Colles, el cual salva la línea media y se inserta en el pubis del lado opuesto.

d) *En la línea blanca*. — Las fibras aponeuróticas pasan todas por delante del músculo recto mayor y se entrecruzan con las del lado opuesto para formar la línea alba.

RELACIONES — Músculo superficial, cubre los músculos largos del abdomen el oblicuo menor, las ocho últimas costillas y los músculos intercostales.

INERVACIÓN — Nervios intercostales inferiores y abdominogenitales.

ACCIONES — Desciende las costillas (espirador), flexiona el torax y comprime las vísceras abdominales.

2.º Oblicuo menor del abdomen. — Situado debajo de, precedente, este músculo se extiende desde la región lumbar a las últimas costillas, al pubis y a la línea alba.

INSERCIÓNES DE ORIGEN — Tienen efecto: 1.º, en el cuarto externo del arco crural; 2.º, en la espina iliaca anterosuperior; 3.º, en una aponeurosis la *aponeurosis posterior del oblicuo menor*, que se fusiona con la del dorsal ancho.

INSERCIÓNES TERMINALES. — Se efectúan por tres órdenes de fascículos: 1.º *fascículos posteriores*, que van al borde inferior y al vértice de los tres últimos cartílagos costales; 2.º, *fascículos anteriores*, que, dirigiéndose al borde superior del pubis y a la cresta pectínea mediante un tendón membranoso, que se fusiona con los fascículos tendinosos correspondientes al músculo transverso, constituyen el *tendón conjoint* de los autores ingleses, añadiendo que cierto número de fibras de los fascículos anteriores vienen a reforzar el cremáster, 3.º, *fascículos medios*, que vienen a terminar en una ancha aponeurosis de inserción, la *aponeurosis anterior del oblicuo menor*. Esta aponeurosis, al llegar al borde externo del músculo recto mayor del abdomen, se divide, en los tres cuartos superiores de la altura de este músculo, en dos hojas que lo rodean, y en la línea media van a unirse con las del lado opuesto. En el cuarto inferior, la aponeurosis pasa toda entera por delante del músculo, para ganar la línea alba.

RELACIONES — Está comprendido entre el dorsal ancho y el oblicuo mayor (que lo cubren) y el transverso (sobre el cual descansa).

INERVACIÓN. — Como el precedente.

ACCIÓN — La misma que la del oblicuo mayor.

3.º Transverso del abdomen. Este músculo forma como un semicinturón, que a cada lado va de las vértebras a la línea alba.

INSERCIÓNES DE ORIGEN — Se efectúan: 1.º en la cara interna de los seis últimos cartílagos costales; 2.º en la cresta iliaca y cuarto externo del arco crural; 3.º en las apófisis transversas de la columna lumbar, por la *aponeurosis posterior del transverso*.

INSERCIÓNES TERMINALES. — Desde estas tres zonas de inserción el transverso se dirige hacia el borde del recto mayor y termina en una aponeurosis, llamada *aponeurosis anterior del transverso*, cuyo borde externo es designado con el nombre de *línea semilunar de Spiegel*. Esta aponeurosis gana a línea alba; en los tres cuartos superiores del músculo recto mayor pasa por detrás de él, y en su cuarto inferior por delante. El límite de estas dos partes está marcado en la cara posterior del músculo por el *arco de Douglas*. Recordemos que los fascículos más inferiores de la aponeurosis del transverso se fijan en el pubis, formando, con los fascículos correspondientes del oblicuo menor (véase este músculo), el *tendón conjoint* de los autores ingleses.

RELACIONES — Cubierto por los músculos precedentes, está separado del peritoneo por la *fascia transversalis*.

INERVACIÓN. — Como el precedente.

ACCIÓN — Estrecha el tórax, pero principalmente comprime las vísceras abdominales (defecación, micción, vómito).

C. *Aponeurosis de los músculos de la región anterolateral del abdomen*

Los músculos anchos del abdomen presentan: 1.º, *aponeurosis de envoltura*, de escasa importancia, excepto la que reviste la cara posterior del transverso llamada *fascia transversalis*; 2.º, *aponeurosis de inserción*, ya más importantes, que se dividen en aponeurosis posteriores y anteriores.

1.º Aponeurosis abdominales posteriores. — Son dos: la del oblicuo menor y la del transverso (el oblicuo mayor, como es sabido, no tiene ninguna inserción vertebral).

A APONEUROSIS POSTERIOR DEL OBLICUO MENOR. — Se fusiona con la del dorsal ancho, para formar la aponeurosis lumbar.

B APONEUROSIS POSTERIOR DEL TRANSVERSO — Se divide en tres hojas: 1.ª, *hoja anterior*, que cubre la cara anterior del cuadrado

lumbar y se inserta en la cara anterior de los cuerpos vertebrales (forma el *ligamento en arco del diafragma*), 2.ª, *hoja media*, que va a fijarse en las apófisis transversas, ocupa el espacio comprendido entre la duodécima costilla y la cresta iliaca, delgada por debajo, está reforzada en su parte posterior por el *ligamento lumbocostal dx* HENRIE, 3.ª, *hoja posterior*, que se fusiona con la aponeurosis del dorsal ancho. Así quedan formados dos compartimientos, uno posterior, que comprende los músculos de los canales vertebrales, y otro anterior, que contiene el cuadrado de los lomos.

2.º **Aponeurosis abdominales anteriores.**—Han sido descritas al hablar de los músculos del abdomen.

3.º **Formaciones diversas dependientes de las aponeurosis abdominales.**—El estudio de las aponeurosis de los músculos del abdomen comprende cierto número de formaciones, de las que daremos una sencilla definición.

A. **ARCO CRURAL.**—Es una cinta fibrosa, muy resistente, que va de la espina iliaca anterosuperior a la espina del pubis; es una simple dependencia de la aponeurosis del oblicuo mayor. Comprende tres porciones: 1.ª *porción externa*, adherida a la fascia iliaca; 2.ª, *porción media*, libre, que corresponde al anillo crural; 3.ª, *porción interna* (o *pectínea*, o *gimbernática*) que corresponde a la línea sobre la cual se refleja la aponeurosis del oblicuo mayor, para ir a insertarse en la cresta pectínea.

B. **LIGAMENTO DE GIMBERNAT.**—Hoja fibrosa que ocupa el ángulo agudo que forma la porción interna del arco crural con la cresta pectínea es el *fascículo pectíneo* de la aponeurosis del oblicuo mayor. Tiene la forma de un triángulo, cuyo *vértice* corresponde a la espina del pubis, la *base* es libre, cóncava hacia fuera, y mira al anillo crural (cabalgando sobre ella se encuentra el ganglio de Cloquet); la *cara superior* está en relación con las vísceras abdominales, la *cara inferior* mira al muslo; el *borde anterior* se continúa con el arco crural; el *borde posterior* se inserta en la cresta pectínea y en la aponeurosis del pectíneo.

C. **LIGAMENTO DE COOPER.**—Es un cordón fibroso y grueso, que va de la espina del pubis a la eminencia iliopectínea.

D. **CINTILLA ILIOPECTÍNEA.**—Es la porción de la fascia iliaca desprendida del arco crural, que se extiende desde este arco a la eminencia iliopectínea. Forma el lado externo del anillo crural.

E. ANILLO CRURAL. — Es un orificio que da paso a los vasos femorales. Está formado: 1.º, por delante por el arco crural; 2.º, por detrás, por el ligamento de Cooper; 3.º, por fuera, por la cintilla iliopectínea; 4.º, por dentro, por el borde cóncavo del ligamento de Gimbernat.

F. FASCIA TRANSVERSALIS. — Esta formada por la capa conjuntiva que reviste la cara posterior del músculo transverso y tiene las mismas dimensiones que este músculo. Delgada y sencillamente celulosa en su porción supraumbilical es más gruesa por debajo del ombligo.

a) *Cerca de la línea media* cubre la cara posterior de la vaina del recto mayor del abdomen en los tres cuartos superiores del músculo, en su cuarto inferior, después de los arcos de Douglas, está en contacto directo con la cara posterior del músculo.

β) *En su porción crural* termina en el espacio angular que limitan la pared anterior del abdomen y el suelo de la fosa iliaca interna, se fija sucesivamente en la cresta iliaca y en la fascia ilíaca. A nivel del conducto inguinal se introduce en este conducto formando una envoltura común al cordón y al testículo. A nivel del anillo crural encuentra los vasos femorales y, fijándose a su alrededor, cierra el resto del anillo, insertándose en la cresta pectínea; este diafragma del anillo crural, incompleto por efecto de la presencia de los vasos, es el llamado *septum crural*. Por dentro del anillo crural se fija en la cresta pectínea y en la espina del pubis.

G. FASCÍCULOS DE REFORZO DE LA FASCIA TRANSVERSALIS. — A nivel de su porción crural la *fascia transversalis* está reforzada por dos órdenes de fibras, de las que unas son verticales y las otras transversales.

a) *Las fibras verticales* constituyen: 1.º, el *ligamento de Henle*, triangular, su borde interno está en relación con el borde externo del músculo recto mayor del abdomen; su base se fusiona con el ligamento de Cooper; 2.º, el *ligamento de Hesselbach* o *pilar externo del arco de Douglas*, el cual se inserta por arriba, en el arco de Douglas y por abajo, en el arco crural. Entre estos dos ligamentos, por dentro de la arteria epigástrica, se encuentra la fosita inguinal media (*punto débil* de la pared abdominal).

β) *Las fibras transversales* forman la *cintilla iliopubiana de Thompson*, que se extiende de la espina del pubis a la espina ilíaca anterosuperior.

H CONDUCTO INGUINAL. — Es el espacio ocupado por el cordón espermático en el hombre y por el ligamento redondo en la mujer en su trayecto abdominal. Se distinguen en él cuatro paredes y dos orificios.

a) *Paredes* *Pared anterior*: más gruesa hacia fuera, está formada por la aponeurosis del oblicuo mayor. *Pared posterior*: está constituida de fuera adentro: 1.º, por la fascia transversalis, 2.º, por el ligamento de Henle; 3.º, por el tendón conjunto (reunión de las fibras de oblicuo menor y el transverso), 4.º, por el ligamento de Colles. *Pared inferior*, está representada por la arcada femoral (cintilla ilio-púbica). *Pared superior* está representada por el borde inferior del oblicuo menor y el transverso; es más bien un borde que una cara.

b) *Orificios o anillos*: 1.º, el *orificio externo* es oval; resulta de la separación de los fascículos tendinosos del oblicuo mayor, *pilar externo* y *pilar interno*; 2.º el *orificio interno* se abre un dedo por encima de la arcada, a 50 milímetros por fuera de la espina pública. Forma una hendidura vertical, bordeada por el ligamento de Hesselbach. El peritoneo cubre este orificio (fosa inguinal externa).

c) *Contenido*: En el hombre pasa por él el cordón espermático; en la mujer, el ligamento redondo.

d) *Fosillas* Veselas por la cara peritoneal. El peritoneo está levantado por tres cordones ascendentes que de dentro afuera son: el uraco, la arteria umbilical transformada en cordón fibroso y la arteria epigástrica.

Entre estos tres cordones se encuentran las tres fosillas: 1.ª, la *interna*, entre el uraco y la arteria umbilical, 2.ª, la *media*, entre la arteria umbilical y la epigástrica; 3.ª, la *externa*, por fuera de la epigástrica. Estas tres fosillas constituyen los puntos débiles de la pared (hernias inguinales).

I VAINA DEL RECTO MAYOR. — Las paredes están formadas por el entrecruzamiento de las aponeurosis de los músculos laterales. En el cuarto inferior, las aponeurosis del oblicuo menor y el transverso pasan enteras por delante del músculo; la cara posterior del recto no queda ya desde entonces cubierta por la fascia transversalis. El espacio retrómuscular comprendido entre la fascia y el peritoneo se ensancha hacia el pubis y forma el *espacio suprapúbico*, repleto de grasa.

J. LÍNEA ALBA — Es la lámina fibrosa tendida entre los bordes internos de los dos rectos mayores. Se fija al apéndice xifoides por arriba y a la sínfisis púbica por abajo. Tiene 35 centímetros de altura,

de 2 a 3 milímetros de espesor y una anchura de un centímetro por encima del ombligo, y menor por debajo.

K. **OMBLIGO**. - Cicatriz dura, blanqueza, del orificio fetal atravesado durante la vida intrauterina por los vasos umbilicales. Forma una depresión cupuliforme de 8 a 10 milímetros en cuyo fondo sobresale el *mamelón*, rodeado por el *sulco circunferencial umbilical*. A rededor de la cicatriz corre el *rodete umbilical*.

Constitucion — Tres planos 1.º, la *piel*, fina, adherente al contorno del anillo; 2.º el *tejido celular subcutáneo*, variable según el estado de carnes, y que no existe bajo el anillo; 3.º, el *anillo umbilical*, orificio abierto en la línea alba; en sus dos tercios inferiores está lleno de un tejido escleroso en el que se insertan tres cordones fibrosos: el cordón del uraco en la línea media y los cordones umbilicales a los lados. En la parte superior se inserta el *ligamento redondo del hígado* (antigua *vena umbilical*). Por detrás del ligamento el tejido celular está condensado y forma la *fascia umbilicalis*.

1. REGIÓN POSTERIOR O LUMBOSILIACA

La región lumbosiliaca comprende tres músculos: 1.º, el *cuadrado de los lomos*, 2.º, el *psoasiliaco*, 3.º, el *psoas menor*.

1.º **Cuadrado de los lomos**. - Músculo aplanado, que se encuentra a cada lado de la columna lumbar, entre la cresta iliaca y la duodécima costilla.

INSERCCIONES. Por abajo se inserta en el ligamento iliolumbar y en la cresta iliaca, por arriba, en el borde inferior de la duodécima costilla y en las apófisis transversas lumbares. Comprende tres grupos de fascículos: *iliocostales*, *iliotransversos* y *costotransversos*.

RELACIONES. — Está comprendido dentro del compartimiento que forman las dos hojas anterior y media de la aponeurosis del transverso. Está en relación por detrás, con los músculos de los canales vertebrales; por delante, con el psoas, el riñón y el peritoneo.

INERVACIÓN. — Duodécimo nervio intercostal y cuatro primeros nervios lumbares.

Acción — Inclina la columna lumbar y baja las costillas.

2.º **Psoasiliaco**. — Músculo formado por dos porciones (el *psoas* y el *iliaco*) que va de la cavidad abdominal al muslo.

INSERCCIONES. — Las dos porciones tienen orígenes distintos.

a) *Porción psoas* — Se inserta en la duodécima vértebra dorsal y en las vértebras lumbares 1.^a, 2.^a, 3.^a y 4.^a (caras laterales del cuerpo, discos intervertebrales, base de las apófisis transversas). La inserción en los cuerpos vertebrales se efectúa por arcos fibrosos cóncavos hacia dentro, que dan paso a los vasos lumbares y a los ramos comunicantes. Desde aquí los fascículos se unen y constituyen un fascículo único, que cruza el borde anterior del hueso coxal por fuera de la eminencia iliopectínea y va a insertarse en el trocánter menor.

b) *Porción ilíaca* — Nace en la fosa ilíaca interna (dos tercios superiores), la cresta ilíaca la base del sacro y la cápsula de la cadera. Desde aquí estos fascículos convergen hacia el canal comprendido entre la espina ilíaca anteroinferior y la eminencia iliopectínea; después se unen al psoas para ir a insertarse en el trocánter menor por un tendón común.

RELACIONES. Se consideran en él tres porciones:

a) *Dentro del abdomen*, el psoas está en relación, por delante, con el diafragma, el riñón y el uréter y con los porciones verticales del colon. Descansa sobre el cuadrado lumbar y las apófisis transversas de las vértebras. Sobre su borde interno corren los vasos ilíacos externos. Lo atraviesan las ramas del plexo lumbar (femorocutáneo, genitocrural, nervio obturador abdominogenitales mayor y menor). El ilíaco está en relación con el ciego a la derecha y con la S ilíaca a la izquierda. Está separado del psoas por un surco en el que se encuentra el nervio crural.

b) *A nivel del arco crural* está separado el psoasilíaco del anillo crural por la cintilla iliopectínea.

γ) *En el muslo* constituye la parte externa del suelo del triángulo de Scarpa. Descansa sobre la articulación de la cadera, de la cual está separado por una bolsa serosa. Su borde interno forma, con el borde externo del pectíneo, un canal, en el que se alojan los vasos femorales.

INERVACIÓN. — Plexo lumbar y ramos del nervio crural.

ACCIÓN — Dobla el muslo sobre la pelvis, comunicándole un movimiento de rotación hacia fuera. Tomando por punto fijo el fémur, puede doblar la pelvis sobre el muslo.

3.^o **Psoas menor.** — Músculo situado por delante del precedente, que va del cuerpo de la 12.^a vértebra dorsal y de la 1.^a vértebra lumbar a la eminencia iliopectínea. Tiene las mismas relaciones que

el psoas. Inervado por el plexo lumbar. No tiene acción (músculo rudimentario).

4° **Aponeurosis lumbosilíaca o fascia ilíaca.** — Esta aponeurosis ocupa toda la extensión de la fosa ilíaca interna y se extiende sobre toda la cara anterior del músculo psoas, es más gruesa a medida que desciende dentro de la pelvis. Se inserta: 1.°, *por dentro*, en todas las vértebras lumbares (dando paso, por orificios correspondientes a los vasos lumbares), en la base del sacro y en el estrecho superior de la pelvis; 2.°, *por fuera*, en la aponeurosis del cuadrado lumbar y en la cresta ilíaca; 3.° *por arriba*, forma el arco del psoas, 4.°, *por abajo* se adhiere a la mitad externa del arco crural y forma la *cintilla iliopectínea* (pared externa del anillo crural). De esta disposición resulta que existen dos capas de tejido celular, una *profunda*, por detrás de la fascia ilíaca, que se extiende hasta el trocánter menor y otra *superficial* por delante de la misma fascia ilíaca, que termina en el arco crural.

3. REGIÓN DIAFRAGMÁTICA. DIAFRAGMA

La región diafragmática la constituye por sí solo el diafragma. Es éste un tabique en forma de cúpula que separa el tórax del abdomen.

1° **Inserciones.** El diafragma comprende una parte central aponeurótica (*centro frénico*), de cuyo contorno nacen los fascículos musculares.

A **PORCIÓN APONEURÓTICA, CENTRO FRÉNICO** — Es una hoja tendinosa nacarada, cuya forma es parecida a la del trébol. Presenta así tres hojuelas: 1.°, *hojuela anterior*; 2.°, *hojuela derecha*, 3.° *hojuela izquierda* (esta última es más pequeña que las otras dos). El centro frénico es el formado por fascículos tendinosos agrupados en dos cintillas: 1.° *cintilla oblicua*, que nace en la parte posterior de la hojuela derecha y se pierde en la hojuela anterior, pasando por dentro del orificio de la vena cava; 2.°, la *cintilla arciforme*, que nace de la hojuela derecha y pasa por el borde interno de la hojuela izquierda, en la cual se expande.

B **PORCIÓN MUSCULAR** — Del centro frénico parten fascículos musculares, que van en todas direcciones a insertarse en la pared torácica. Forman tres grupos.

1° *Fascículos esternales*, que van de la hojuela media al esternón.

b) *Fascículos costales*, que van de las hojuelas laterales a la cara interna de las seis últimas costillas, se entrecruzan con fascículos del transverso.

c) *Fascículos lumbares*, que salen de la parte posterior del centro frénico y desde este punto van a insertarse a nivel del cuadrado lumbar, del psoas y de la columna vertebral. 1.º, a nivel del cuadrado lumbar terminan en un arco fibroso, llamado *arco del cuadrado lumbar* (h.ato diafragmático). 2.º, a nivel del psoas terminan en un arco similar, llamado *arco del psoas*, fascículo de refuerzo de la parte superior de la fascia iliaca. 3.º, a nivel de la columna vertebral se condensan en dos fascículos, llamados *pilares del diafragma*. El *pilar derecho* se inserta en las vértebras lumbares 2.ª y 3.ª, en la parte externa se encuentra un pilar accesorio, y entre los dos pasan los nervios espláncnicos mayor y menor. El *pilar izquierdo* es más corto y se inserta en la segunda vértebra lumbar; en su parte externa se encuentra un fascículo accesorio y entre los dos pasan los nervios espláncnicos. Los dos pilares diafragmáticos están separados por abajo y unidos por arriba y cada uno de ellos envía a otro un fascículo anastomótico. Los dos fascículos anastomóticos se entrecruzan en la línea media, formando así dos orificios: uno anterior, llamado *orificio esofágico*, y otro posterior, denominado *orificio aortico*.

2.º **Orificios diafragmáticos.** Los principales son tres, pero hay algunos accesorios.

a) *Orificio esofágico* — Situado en la línea media y a nivel de la décima vértebra dorsal, está formado, por arriba, por la parte superior de los pilares, y por abajo, por sus fascículos anastomóticos. Da paso al esófago, al que adhiere íntimamente, enviándole, además, fascículos musculares que forman el llamado *esfínter esofágico* y también pasan por él los dos neumogástricos.

b) *Orificio aortico* — Situado este orificio por debajo del precedente, es, lo mismo que aquél, elíptico, y está formado por los fascículos anastomóticos, por arriba, y lateralmente por los pilares. Da paso a la aorta.

c) *Orificio de la vena cava inferior* — Esta situado en el punto de unión de la hojaleta media con la hojaleta derecha del centro frénico, y es irregularmente cuadrilátero. Da paso a la vena cava inferior a cuya pared el tejido aponeurótico adhiere íntimamente.

d) *Orificios accesorios* — Los nervios espláncnicos mayor y menor pasan, a derecha e izquierda, entre el pilar principal y el pilar

accesorio, a menudo los acompañan las venas ácigos y el gran simpático pasa por fuera de los pilares.

3.º **Relaciones.** — Hemos de considerar en el diafragma dos caras y dos pilares:

a) *Cara convexa*. — Está en relación con el contenido de la cavidad torácica: pericardio y corazón, pleuras (seno costodiafrágico) y pulmones.

b) *Cara concava*. — Cubierta por el peritoneo, hállase en relación a la derecha con el hígado, a la izquierda, con la tuberosidad mayor del estómago y con el bazo, y en la parte más posterior, con los riñones y las cápsulas suprarrenales.

c) *Pilares*. — Cubren la columna vertebral y están separados del estómago por la cavidad posterior de los epiplones. El páncreas y la tercera porción del duodeno los cruzan transversalmente. Los ganglios semilunares descansan cada uno sobre el pilar correspondiente.

INERVIACIÓN — Frénico. Seis últimos nervios intercostales.

4.º **Acción.** — Es músculo inspirador, por su contracción dilata el tórax en los tres diámetros, y al propio tiempo reduce la cavidad abdominal. Los orificios vasculares (vena cava y aorta) no sufren alteración por efecto de estas contracciones. El orificio esofágico, por el contrario, se estrecha a cada inspiración.

CAPITULO VI

MUSCULOS DEL MIEMBRO SUPERIOR

Los musculos del miembro superior podemos dividirlos para su estudio, en cuatro grupos: 1.º, *musculos del hombro*; 2.º, *musculos del brazo*; 3.º, *musculos del antebrazo*; 4.º, *musculos de la mano*.

I. MUSCULOS DEL HOMBRO

Son seis: *deltoides*, *supraespinoso*, *infraespinoso*, *redondo mayor*, *redondo menor*, *subescapular*.

1.º **Deltoides.** — Musculo triangular, voluminoso, que es ovalado en forma de un semicírculo, la parte externa de la articulación del hombro.

INSERCCIONES. — Por arriba se inserta: 1.º, en el tercio externo del borde anterior de la clavícula; 2.º, en el borde externo del acromion; 3.º, en el labio inferior de la espina del omoplato. Desde este punto los fascículos convergen hacia la impresión deltoides del humero.

RELACIONES. — Dos caras dos bordes, vértice y base. La *cara externa* es superficial. La *cara interna* cubre la articulación del hombro y los tendones musculares que la rodean, esta separada del humero por una bolsa serosa llamada *bolsa subdeltoides*. El *vértice* penetra a manera de cuña en el borde superior del músculo braquial anterior. La *base* coincide con la línea de inserción del trapecio. El *borde posterior*, oblicuo hacia abajo y afuera, cruza los musculos infraespinoso redondo menor, porción larga del triceps y vasto externo. El *borde anterior* está separado del pectoral mayor por el *espacio delopectoral*, en el que se alojan la vena cefálica y una rama de la acromiotorácica.

INERCIACIÓN. Nervio circunflejo.

Acción Abductor del brazo, y además accesoriamente dirige el húmero hacia delante y atrás

2.º Supraespinoso. — Músculo piramidal y triangular, alojado en la fosa supraespinosa

INSERCIONES. — *Por dentro* se inserta en la fosa supraespinosa, y *por fuera*, en la carilla superior del troquíter.

RELACIONES. Está cubierto por el trapecio, pasa por debajo de la articulación acromioclavicular y se pone en relación con el deltoides. Cubre a su vez la fosa supraespinosa los nervios y vasos supraescapulares.

INERVACIÓN — Nervio supraescapular, rama del plexo braquial

Acción — Elevador del brazo. Rotación hacia dentro.

3.º Infraespinoso. — Es un músculo aplanado y triangular que ocupa la fosa infraespinosa

INSERCIONES — *Por dentro* se inserta en la fosa infraespinosa y en un tabique fibroso que lo separa del redondo mayor y del redondo menor *Por fuera* se inserta en la carilla media del troquíter

RELACIONES. — Cubierto por el trapecio el deltoides y la piel; cubre la fosa infraespinosa. A lo largo de su borde externo está en relación con el redondo mayor y el redondo menor.

INERVACIÓN — Como el precedente

Acción — Rotación de brazo hacia fuera. Fijador.

4.º Redondo menor. — Músculo cilíndrico, sigue el borde externo del infraespinoso.

INSERCIONES — *Por dentro* se inserta en una carilla situada en el borde axilar del omóplato, como también en un paquete fibroso que lo separa del infraespinoso y del redondo mayor *Por fuera* se inserta en la carilla inferior del troquíter.

RELACIONES. — Cubierto por la piel y el deltoides, cubre a su vez la porción larga del tríceps. Sigue el borde inferior del infraespinoso y se halla contiguo al redondo mayor en su origen, del cual se separa luego, formando un largo triángulo cuya base corresponde al húmero.

INERVACIÓN. — Nervio circunflejo.

Acción — La misma que la del infraespinoso.

5.º Redondo mayor. — Músculo fuerte y grueso, que va del ángulo inferior del omóplato a la corredera bicipital

INSERCIONES. *Por dentro*, en el ángulo inferior de, omóplato, en la carilla situada a lo largo del borde axial de este hueso y en los tabiques que lo separan del redondo menor y del infraespinoso. *Por fuera* se inserta en el labio interno de la corredera bicipital, detrás del dorsal ancho, por medio de un ancho tendón.

RELACIONES. Tiene dos caras y dos bordes. La *cara posterior* está en relación con el dorsal ancho, la piel y la porción larga del tríceps. La *cara anterior* lo está también con el dorsal ancho, que da vuelta al músculo, con el coracobraquial y con los vasos y nervios axilares. El *borde inferior* forma, con el dorsal ancho, el borde posterior del hueco axilar. El *borde superior* está separado del redondo menor por un espacio triangular, de base dirigida hacia el húmero. Este espacio lo atraviesa la porción del tríceps y lo divide en dos regiones: 1.ª, el *cuadrilátero humerotricipital* hacia fuera, formado por el redondo menor, el húmero, el redondo mayor y la porción larga del tríceps (por este espacio pasan los vasos y los nervios circunflejos); 2.ª, el *triángulo omotricipital* hacia dentro, formado por el redondo menor, el redondo mayor y la porción larga del tríceps (da paso a la arteria escapular inferior).

INERVACIÓN.— Nervio del redondo mayor (plexo braquial).

ACCIÓN. Lleva el brazo hacia atrás y adentro.

6.º Subescapular.— Músculo ancho, grueso y triangular, que ocupa la fosa escapular.

INSERCIONES. *Por dentro*, en la fosa subescapular, en el borde espinal y el borde axilar de omóplato. *Por fuera*, en el troquin, con ayuda de un tendón plano.

RELACIONES.— El *cuerpo del músculo*, alojado en la fosa subescapular, está en relación, por delante, con el serrato mayor y con los órganos del hueco de la axila. El *tendón* se desliza por debajo de la apófisis coracoides y está en relación, por detrás, con la *bolsa del subescapular*, que depende de la articulación del hombro, y por delante lo cruzan los músculos coracobraquial y porción corta del bíceps, los cuales descienden de la apófisis coracoides.

INERVACIÓN.— Dos o tres nervios nacidos del plexo braquial.

ACCIÓN.— Rotatorio hacia dentro y aductor del húmero. Sujeta la cabeza del húmero contra la cavidad glenoidea.

7.º Aponeurosis del hombro.— Cada uno de los precitados músculos está rodeado de una hoja aponeurótica. Se distinguen cuatro

aponeurosis: 1.^a, *aponeurosis deltoidea*, doble (hoja superficial y profunda). 2.^a, *aponeurosis supraespinosa*, que se inserta en todo el contorno de la fosa supraespinosa, formando al supraespinoso un compartimiento osteofibroso. 3.^a, *aponeurosis infraespinosa*, que forma un compartimiento análogo al infraespinoso: envía dos tabiques entre el infraespinoso y el redondo menor y entre el redondo menor y el redondo mayor; esta aponeurosis se desdobra para formar la aponeurosis deltoidea; 4.^a, *aponeurosis subescapular*, que forma un compartimiento al músculo subescapular.

2. MÚSCULOS DEL BRAZO

Para su estudio se dividen estos músculos en dos regiones: *región anterior* y *región posterior*.

A. Región anterior del brazo

Contiene tres músculos, situados por delante del húmero: *bíceps braquial coracobraquial* y *braquial anterior*.

1.^o **Bíceps braquial.**—Músculo formado de dos porciones o cabezas que van del omóplato al radio.

INSERCIONES.—Las dos porciones se dividen en corta y larga. La *porción corta* se inserta en la apófisis coracoides por un tendón común con el coracobraquial. La *porción larga* se inserta, por un tendón redondeado, en el borde superior de la cavidad glenoidea; el tendón pasa por dentro de la articulación, da vuelta a la cabeza humeral y desciende a la corredera bicipital; al salir de esta corredera toman origen en él las fibras musculares.

Las dos porciones fusionadas se reúnen en un tendón común, que va a insertarse en la tuberosidad bicipital del radio (bolsa serosa); de la parte interna de este tendón parte una *expansión aponeurótica* que va a cubrir los músculos epitrócleos.

RELACIONES—Las indicaremos en sus tres porciones. *En el tercio superior* se halla dentro del hueco axilar, entre el deltoides y el pectoral mayor por delante, el subescapular, el redondo mayor y el dorsal ancho por detrás. *En la parte media o braquial* es superficial y descansa sobre el músculo braquial anterior; su borde externo está en relación con los músculos deltoides y supinador largo; su borde interno es seguido por los vasos humerales y el nervio mediano. *En*

la flexura penetra en un espacio en forma de V, formado hacia fuera por el supinador y los radiales externos, y hacia dentro por los músculos epitrocéos.

INERVACIÓN. — Nervio musculocutáneo.

Acción. — Dobla el antebrazo sobre el brazo y lo pone en supinación, si el radio está en pronación. Levanta el brazo y lo lleva hacia dentro.

2° **Coracobraquial.** Es un músculo grueso, prismático, situado por dentro de la porción del bíceps.

INSERCIÓNES. — *Por una parte*, en la apófisis coracoides por un tendón que le es común con la porción corta del bíceps, y *por otra parte*, en la cara interna del húmero, por encima de la porción media.

RELACIONES. — Está situado, primeramente, en el hueco de la axila, del cual forma la pared externa; luego ocupa la región del brazo, corriendo a lo largo de la porción corta del bíceps. El nervio musculocutáneo lo atraviesa (músculo perforado).

INERVACIÓN. — Como el precedente.

Acción. — Lleva el brazo hacia arriba, adentro y adelante.

3° **Braquial anterior.** — Músculo ancho, que ocupa la parte inferior del húmero debajo de bíceps.

INSERCIÓNES. — *Por arriba* se inserta en el labio inferior de la impresión deltoidea, en las dos caras (interna y externa) del húmero, en sus tres bordes y en los tabiques fibrosos que lo separan del bíceps. *Por abajo*, en la base de la apófisis coronoidea del cúbito.

RELACIONES. — Dos caras y dos bordes. La *cara anterior* está en relación con el bíceps. La *cara posterior* descansa sobre el húmero y la articulación del codo. El *borde interno* está en relación, por arriba, con el tríceps, y por abajo, con el pronador redondo, con el cual forma un canal en el que se alojan los vasos humerales. El *borde externo* está en relación por arriba, con el tríceps, y por abajo, con el supinador largo, con el cual forma un canal en el que se alojan el nervio radial, la arteria humeral profunda y la arteria recurrente radial anterior.

INERVACIÓN. — Como el precedente.

Acción. — Dobla el antebrazo sobre el brazo.

B *Región posterior del brazo triceps braquial*

El triceps braquial constituye por sí solo la región posterior del brazo. Consta de tres porciones que, distintas en su origen, se unen en su terminación para insertarse en el cúbito. Son el *vaso interno*, el *vaso externo* y la *porción larga del triceps*.

INSERCIÓNES — Por arriba, la *porción larga del triceps* se inserta en una carilla especial situada por debajo de la cavidad glenoidea del omóplato; el *vaso externo*, en la porción del humero situada por encima y por fuera de canal de torsión; el *vaso interno*, en la porción de humero situada por debajo y por dentro del canal. Desde aquí, estos tres fascículos se dirigen hacia abajo y se reúnen en un tendón común, que se inserta en el olécranon (bolsa serosa).

RELACIONES — En su origen, el triceps está cubierto por el deltoides. En el brazo se corresponde con el humero, del que está separado por el nervio radial y la arteria humeral profunda, que siguen el canal de torsión. La cara posterior está en relación con el supinador largo y el braquial anterior. El borde interno es seguido por el nervio cubital.

INERVACIÓN — Radial.

ACCIÓN — Es extensor del antebrazo sobre el brazo; la porción larga aproxima además el miembro superior al tronco.

C *Aponeurosis del brazo*

La aponeurosis del brazo envuelve esta parte a manera de un cilindro. Se continúa por arriba, con las aponeurosis de los músculos de la región; por abajo, con la aponeurosis antebraquial. De su cara profunda se desprenden dos tabiques, uno *interno* y otro *externo* que se insertan en los bordes interno y externo del húmero; son los que limitan los dos compartimientos musculares del brazo.

3. MÚSCULOS DEL ANTEBRAZO

Los músculos del antebrazo están dispuestos en tres regiones: *región anterior*, *región externa* y *región posterior*.

A. Región anterior del antebrazo

Los músculos anteriores del antebrazo son ocho, y están dispuestos en cuatro planos:

Primer plano (cuatro): *pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior.*

Segundo plano (uno solo) *flexor largo común superficial de los dedos*

Tercer plano (dos) *flexor propio del pulgar y flexor común profundo de los dedos.*

Cuarto plano (uno solo). *pronador cuadrado.*

1.º **Pronador redondo.** — Músculo aplanado de delante atrás que va desde la epitroclea al radio.

INSERCIÓNES. — 1.º *Por arriba* se inserta por dos fascículos, uno *epitrocleo* y el otro *coronoides*, en la epitroclea y en el borde interno de la apófisis coronoides. 2.º *Por abajo*, en la parte media de la cara externa del radio.

RELACIONES. — Se consideran en él dos caras y dos bordes. La *cara anterior* es superficial, sin embargo, hacia fuera está cubierta por el supinador largo y los dos radiales externos. La *cara profunda* está en relación con el braquial anterior, el flexor común superficial y el radio. El *borde interno* está en relación, por arriba, con el palmar mayor, y por abajo, con el flexor común superficial. El *borde externo* forma, con el supinador largo, un triángulo, el *triángulo del codo*, que contiene el biceps, el braquial anterior, los vasos humerales y el nervio radial; nótese que el nervio mediano pasa por entre los dos fascículos de este músculo.

INERVIACIÓN. — Mediano.

ACCIÓN. — Es pronador y flexor del radio.

2.º **Palmar mayor.** — Músculo aplanado de delante atrás, carnoso por arriba y tendinoso por abajo, situado por dentro del precedente.

INSERCIÓNES. — *Por arriba*, en la epitroclea, en la aponeurosis antebraquial y en los tabiques fibrosos de los músculos epitrocleos. *Por abajo*, en el segundo metacarpiano.

RELACIONES. — Se le consideran dos porciones. *En el antebrazo* es superficial y está colocado por fuera del palmar menor y encima del

flexor común superficial de los dedos. Su borde externo está en relación con el supinador largo, entre los dos músculos existe un canal (*canal del pulso*), que contiene la arteria radial con sus venas y la rama anterior del nervio radial. En la muñeca pasa por un conducto osteofibroso especial, comprendido entre el escafoide, el trapecio y el ligamento anular anterior del carpo.

INERVACIÓN. — Nervio mediano.

ACCIÓN. — Flexiona a mano sobre el antebrazo y éste sobre el brazo. Accesorariamente es abductor y pronador de la mano.

3.º Palmar menor. — Músculo delgado, situado por dentro del precedente, que va desde la epitróclea a la mano, en donde termina en la aponeurosis palmar y en el abductor del pulgar. Inervado por el mediano. Dobla la mano sobre el antebrazo y tiende la aponeurosis palmar.

4.º Cubital anterior. — Está situado por dentro del precedente y se extiende desde la flexura del codo al carpo.

INSERCIÓNES. — Por arriba se inserta en la epitróclea y en el olécranon por dos fascículos, uno *epitrócleo* y el otro *olecraneano* por entre los cuales pasa el nervio cubital. Por abajo se inserta en el pisiforme.

RELACIONES. — Es superficial y cubre los flexores común, superficial y profundo. A lo largo de su cara externa corre el nervio cubital, pronto acompañado por los vasos cubitales. Su borde posterior está en relación con el cúbito, en el cual se inserta.

INERVACIÓN. — Nervio cubital.

ACCIÓN. — Es flexor y aductor de la mano.

5.º Flexor común superficial de los dedos. — Músculo aplastado muy ancho, situado por debajo de los músculos precedentes; va a terminar en los cuatro últimos dedos.

INSERCIÓNES. — Por arriba se inserta en la epitróclea, en la apófisis coronoides y en el borde anterior del radio. Desde este punto se dirige hacia abajo y se divide en cuatro tendones terminales destinados a los cuatro últimos dedos.

RELACIONES. — Se estudian en cuatro porciones. En el antebrazo está cubierto por los músculos precedentes, y él cubre a su vez el flexor profundo, del cual lo separan el nervio mediano y los vasos cubitales. En la muñeca, los tendones se deslizan dentro del conducto osteofibroso del carpo; el nervio mediano está situado en su parte

externa. *En la palma de la mano*, los tendones están situados por debajo de la aponeurosis palmar y cruzados por el arco palmar. *En los dedos*, cada tendón está colocado por delante del tendón del flexor profundo, el tendón superficial se divide en dos lengüetas, que se insertan a cada lado de la segunda falange, resultando de ello la formación de un ojal que da paso al tendón profundo, y de ahí los nombres de *tendón perforado* (flexor superficial) y de *tendón perforante* (flexor profundo). Cada uno de estos tendones está sujeto a las falanges por *vainas fibrosas*, y además tractos fibrosos adhieren la cara profunda de los tendones a la cara anterior de las falanges (*mesotendones, frenillo de los tendones*).

INERVIACIÓN. — Nervio mediano.

Acción — Dobla la segunda falange sobre la primera. Accesorariamente flexiona la mano sobre el antebrazo.

6° **Flexor común profundo de los dedos.** — Constituye el tercer plano muscular del antebrazo y se extiende desde el antebrazo a la tercera falange de los dedos.

INSERCIÓNES. — *Por arriba* se inserta en la cara anterior del cubito, en la aponeurosis antebraquial, y en el ligamento interóseo un poco por encima del radio y por debajo de la tuberosidad bicipital. Desde este punto se dirige hacia abajo y termina en cuatro tendones, los cuales van a insertarse en la tercera falange de los cuatro últimos dedos.

RELACIONES. Se estudian en cuatro porciones. *En el antebrazo* está cubierto por el flexor superficial, el nervio mediano y los vasos y nervios cubitales; está situado entre el cubital anterior y el flexor propio del pulgar. *En la muñeca y en la mano* sigue el mismo trayecto que el flexor superficial, pero colocado debajo de él. *En los dedos* perfora el flexor superficial y se inserta en la tercera falange.

INERVIACIÓN. — Nervio mediano para dos fascículos externos, nervio cubital para dos fascículos internos.

Acción — Dobla la tercera falange sobre la segunda, y accesorariamente, la mano sobre el antebrazo.

7° **Flexor largo propio del pulgar.** — Situado por fuera del precedente, se extiende desde el radio al pulgar.

INSERCIÓNES. — *Por arriba*, se inserta en la cara anterior del radio y en el ligamento interóseo. *Por abajo* termina por un tendón que pasa por debajo de la eminencia anular anterior del carpo, sigue el

lado interno de la eminencia tenar y termina en la última falange del pulgar.

RELACIONES. — Tres porciones. *En el antebrazo* está cubierto por el flexor superficial y el palmar mayor. Descansa sobre el radio y el pronador cuadrado. Por dentro está en relación con el flexor común profundo. *En la muñeca* se desliza por debajo del ligamento anular del carpo. *En la mano* está colocado entre los dos fascículos del flexor corto.

INERVACIÓN. — Nervio interóseo, rama del mediano.

Acción. — Flexiona la segunda falange del pulgar sobre la primera y accesoriamente la primera sobre el primer metacarpiano.

8.º Pronador cuadrado. — Músculo aplanado, cuadrilátero, situado en la parte inferior del antebrazo y que va del cúbito al radio.

INSERCIÓNES. — *Por una parte* se inserta en el borde anterior y cara anterior del cúbito, y *por otra*, en la cara anterior y borde anterior del radio.

RELACIONES. — Está colocado debajo de todos los demás músculos y en relación directa con el plano óseo.

INERVACIÓN. — Como el precedente.

Acción. — Coloca la mano y el antebrazo en pronación.

B. Región externa del antebrazo

Comprende cuatro músculos: el supinador largo, el primer radial externo, el segundo radial externo y el supinador corto.

1.º Supinador largo. — Músculo largo, que va de la parte inferior del humero al radio.

INSERCIÓNES. — *Por arriba*, en el borde externo del humero, por debajo del canal de torsión. *Por abajo*, por un tendón ancho y fuerte, en la apófisis estiloides del radio.

RELACIONES. — Se le consideran dos caras y dos bordes. La *cara superficial* está en relación con la piel. La *cara interna* está en relación con la extremidad inferior del humero, con los dos radiales y con el radio. El *borde posterior* está en relación con el vasto externo y con el primer radial externo. El *borde anterior* forma, a nivel de la flexura, junto con el biceps un canal oblicuo, a lo largo del cual se hallan el nervio radial y la arteria humeral profunda. En el ante-

brazo está en relación con la aponeurosis radial y con la rama anterior del nervio radial

INERVACIÓN — Nervio radial

ACCIÓN — Flexiona el antebrazo sobre el brazo. Tan sólo es supinador cuando el antebrazo está en pronación forzada

2° Primer radial externo. Músculo plano, carnoso por arriba y tendinoso por abajo, situado debajo del precedente.

INSERCIÓNES — *Por arriba*, en el borde externo del humero, por debajo del supinador largo, *por abajo*, en la cara posterior de la base del segundo metacarpiano

RELACIONES — Cubierto por el supinador largo, cubre a su vez el segundo radial, la articulación del codo y la de la muñeca. Es cruzado por los músculos abductor y extensor del pulgar.

INERVACIÓN — Nervio radial

ACCIÓN — Es extensor y abductor de la mano.

3° Segundo radial externo. — Está situado por debajo del precedente, con el cual presenta grandes analogías.

INSERCIÓNES — *Por arriba*, en el epicóndilo, en el ligamento lateral externo del codo y en los tabiques de los músculos epicondileos, *por abajo*, en la apófisis de la cabeza del tercer metacarpiano (cara posterior).

RELACIONES — Cubierto por el primer radial cubre a su vez la cara externa del radio. Más abajo pasa sobre la cara posterior del radio y de la muñeca. Está envuelto por una vaina sinovial que le es común con el primer radial.

INERVACIÓN — Como el precedente

ACCIÓN — Exclusivamente extensor de la mano

4° Supinador corto. — Es el más profundo de los músculos de la región; está situado en la parte externa del radio, alrededor del cual se artola a manera de un semicilindro hueco.

INSERCIÓNES — *Por detrás*, en el borde externo del cubito y en el ligamento lateral externo del codo. Desde este punto da vuelta al radio y se inserta en su cara anterior, desde el ligamento anular hasta la inserción del pronador redondo.

RELACIONES — Cubre la articulación del codo y está cubierto a su vez por los radiales y algunos músculos posteriores. Es atravesado por la rama posterior del radial

INERVACIÓN Rama de bifurcación posterior del radial

ACCIÓN — Es supinador

C. *Región posterior del antebrazo*

Se compone de ocho músculos, divididos en dos capas

a) *Capa superficial* *extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, cubital posterior y anóreo* (todos músculos epicondileos).

b) *Capa profunda* *abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor propio del índice*

1.º **Extensor común de los dedos.** Músculo carnoso por arriba y tendinoso por abajo, que va desde el epicóndilo a los cuatro últimos dedos.

INSERCIÓNES. — *Por arriba*, en el epicóndilo, en la aponeurosis antebraquial y en los tabiques musculares. De aquí se dirige hacia abajo y se divide en tres fascículos: el *interno*, que da dos tendones para el anular y el meñique; el *medio*, para el dedo medio, y el *externo* para el índice. Cada uno de estos tendones termina por tres lengüetas, una media, para la cara posterior de la segunda falange, y las otras dos laterales, para las caras laterales de la tercera falange.

RELACIONES. Músculo superficial, cubre los músculos de la capa profunda, la muñeca y las falanges. Está situado entre el primer radial (por fuera) y el extensor propio del meñique (por dentro).

INERVACIÓN Rama posterior del radial.

ACCIÓN. — Extiende las falanges sobre la mano y ésta sobre el antebrazo.

2.º **Extensor propio del meñique.** — Músculo largo y delgado, situado por dentro del precedente.

INSERCIÓNES. *Por arriba*, como el precedente en la cara posterior del epicóndilo. *Por abajo*, en las dos falanges del meñique.

RELACIONES. Es superficial y está en relación por fuera, con el extensor común, y por dentro, con el cubital posterior.

INERVACIÓN — Rama posterior del radial.

ACCIÓN — Es extensor del meñique.

3.º **Cubital posterior.** Es un músculo delgado y largo, que parte, como el precedente, del epicóndilo y se inserta en la extremi-

dad superior (lado posterior) del quinto metacarpiano. Está colocado por dentro del precedente. Inervado como el anterior. Es extensor y aductor de la mano.

4.º Anconeo. — Músculo aplanado y corto, situado en la cara posterior del codo.

INSERCIÓNES. — *Por arriba* se inserta en el epicóndilo. *Por abajo* y *por dentro*, en la parte externa del olécranon y en el borde posterior del cúbito.

RELACIONES. Cubierto por la aponeurosis y la piel, cubre a su vez la articulación del codo. Está comprendido entre el cubital posterior por abajo y el vasto externo por arriba.

INERVAÇÃO. — Nervio radial (mismo ramo que el vasto interno)

Acción. — Extiende el antebrazo sobre el brazo

5.º Abductor largo del pulgar. — Es el músculo más considerable y más extenso de la capa profunda

INSERCIÓNES. — *Por arriba*, en la cara posterior del cúbito del ligamento interóseo y del radio. *Por abajo*, su tendón termina, pasa por debajo del ligamento anular posterior del carpo y va a insertarse en la parte externa de la extremidad superior del primer metacarpiano.

RELACIONES. — Cubierto por los músculos superficiales, cubre a su vez el plano óseo subyacente. Cruza los tendones de los radiales.

INERVAÇÃO. — Rama posterior del nervio radial

Acción. Dirige el pulgar hacia fuera y adelante; accesoriamen te coloca la mano en abducción

6.º Extensor corto del pulgar. Situado por dentro del precedente, tiene las mismas inserciones superiores, pero colocadas algo más abajo, y por la parte inferior se inserta en la extremidad posterior de la primera falange del pulgar. Inervado como el precedente. Extiende la primera falange y necesariamente dirige el metacarpiano hacia fuera.

7.º Extensor largo del pulgar. — Situado por dentro del precedente se desprende, como él, de la parte media del esqueleto del antebrazo y se inserta en la segunda falange del pulgar. Sus relaciones e inervación son las mismas del precedente. Extiende la segunda falange sobre la primera y accesoriamen te la primera falange sobre el primer metacarpiano.

Tabaquera anatómica.—Se entiende por tabaquera anatómica una región oval, comprendida en la separación de los tendones del extensor corto y del extensor largo del pulgar, en su parte inferior, en el fondo de esta región se encuentran los tendones de los dos radiales y la arteria radial.

8° Extensor propio del índice.—Músculo delgado, situado por dentro del precedente, que se inserta, como él, en el esqueleto del antebrazo (tercio medio de la cara posterior del cúbito) y va a confundirse con el tendón del extensor común superficial destinado al índice. Sus relaciones e inervación son las mismas del precedente. Es extensor del índice.

D. *Correderas y sinoviales de los tendones y de los músculos del antebrazo*

En este punto conviene estudiar separadamente, 1°, las de los tendones flexores, 2°, las de los tendones extensores.

1° *Correderas y sinoviales de los tendones flexores de la mano:*

A. **CORREDERAS TENDINOSAS DE LOS FLEXORES DE LA MANO.**—Los tendones de los músculos flexores, al llegar a la muñeca, pasan por debajo del *ligamento anular anterior del carpo*, extendido del uno al otro borde del carpo. Existen dos correderas osteofibrosas: una, muy grande, que da paso a todos los tendones flexores y al nervio mediano (*conducto radiocarpiano*), la otra, mas pequeña, da paso al palmar mayor (*conducto del palmar mayor*).

B. **SINOVIALES DE LOS TENDONES FLEXORES.**—Cada tendón flexor está envuelto por una vaina sinovial, esas vainas varían según su extensión y los tendones a los cuales están destinadas. Se distinguen dos clases: 1° *sinoviales digitales*, 2° *sinoviales digitocarpianas*.

a) *Sinoviales digitales.*—Se encuentran alrededor de los tendones destinados a los tres dedos medios: son independientes y se extienden desde la base de la tercera falange hasta la articulación metacarpofalángica correspondiente.

b) *Sinoviales digitocarpianas.*—Son dos: una externa y otra interna.

a) *La sinovial digitocarpiana externa* envuelve el tendón flexor del pulgar desde su inserción terminal y asciende con él hasta por encima del *ligamento anular anterior del carpo*.

B) La *sinovial digitocarpiana interna* rodea los tendones del meñique y permanece cilíndrica hasta su articulación metacarpofalángica. En la región palmar se extiende, envuelve los demás tendones flexores, pasa por debajo del ligamento anular y asciende hasta los dedos por encima del mismo. Ofrece, en conjunto, la forma de un reloj de arena. Todas estas vainas están sujetas a numerosas anomalías.

2.º Correderas y sinoviales de los tendones extensores de la mano:

A CORREDERAS TENDINOSAS. — En la muñeca, los tendones extensores pasan por correderas osteofibrosas, formadas a la vez por los canales de la cara posterior de la extremidad inferior del radio y por el *ligamento anular posterior del carpo*. Son seis: la *primera* da paso a los tendones del abductor largo y del extensor corto del pulgar; la *segunda*, a los tendones de los radiales; la *tercera*, al tendón del extensor largo del pulgar, la *cuarta*, a los cuatro tendones del extensor común y al del extensor propio del índice; la *quinta*, al tendón del extensor del meñique; la *sexta*, al tendón del cubital posterior.

B SINOVIALES TENDINOSAS. — Son seis y envuelven los tendones que pasan por cada una de las correderas precedentes. Son cilíndricas y todas se extienden desde la cara dorsal de la mano hasta los dedos por encima del ligamento anular posterior.

E. Aponeurosis del antebrazo

Tiene la forma de un cilindro hueco, que se continúa, por arriba, con la aponeurosis braquial, y por abajo, con la aponeurosis de la mano, formando los ligamentos anulares de la muñeca. De su superficie interior nacen prolongaciones fibrosas para cada uno de los músculos del antebrazo.

4. MÚSCULOS DE LA MANO

En la mano se encuentran en número de *diecinueve*, situados todos en la cara palmar y distribuidos en tres regiones. 1.º, *región palmar externa*; 2.º, *región palmar interna*; 3.º, *región palmar media*.

A *Región palmar externa eminencia tenar*

Esta región comprende cuatro músculos: *abductor corto del pulgar*, *flexor corto del pulgar*, *oponente del pulgar* y *aductor del pulgar*.

1.º Abductor corto del pulgar. — Es el músculo mas superficial de la eminencia tenar.

INSERCIÓNES — Por arriba, en el carpo, se inserta en el escafoide y en el ligamento anular anterior. Por abajo, en la extremidad superior de la primera falange del pulgar.

RELACIONES — Superficial, situado inmediatamente debajo de la aponeurosis, cubre los demás músculos de la eminencia tenar.

INERVACIÓN — Rama del mediano y rama del radial (inconstante).

ACCIÓN — Lleva el pulgar hacia delante y adentro (abductor hacia fuera).

2.º Flexor corto del pulgar. — Está situado debajo y por dentro del precedente.

INSERCIÓNES — Por arriba se inserta por dos fascículos: uno *superficial*, en el ligamento anular anterior, y otro *profundo*, en el trapecioide, hueso grande y trapecio. El cuerpo muscular que resulta de la fusión de estos dos fascículos de origen se divide de nuevo en dos fascículos terminales, que se insertan a cada lado de la extremidad superior de la primera falange del pulgar y en el sesamoideo correspondiente.

RELACIONES — Cubierto por el aductor corto, por entre los dos fascículos pasa el tendón del flexor largo propio del pulgar.

INERVACIÓN — Mediano para el fascículo superficial; cubital para el fascículo profundo.

ACCIÓN — Llevar el pulgar hacia delante y adentro.

3.º Oponente del pulgar. — Situado debajo del precedente.

INSERCIÓNES — Se inserta en el ligamento anular anterior y en el trapecio. Desde este primer punto sigue ocupando en su totalidad la cara anterior del primer metacarpiano.

RELACIONES — A menudo su borde externo sobresale del abductor corto.

INERVACIÓN — Rama del mediano.

ACCIÓN — Consiste en llevar el primer metacarpiano hacia delante y adentro (oposición).

4° Aductor del pulgar. — Músculo profundo, de forma triangular.

INSERCIÓNES. — Nace por dentro: 1°, por *fascículos carpiianos*, que se desprenden del trapezoide y del hueso grande; 2°, por *fascículos metacarpianos*, que se desprenden del borde anterior del tercer metacarpiano y de la cabeza de los segundo y tercer metacarpianos. Desde estos puntos se dirige el músculo hacia fuera para venir a insertarse en el sesamoideo interno y en la parte interna de la extremidad superior de la primera falange de pulgar.

RELACIONES. — Se consideran en él dos caras y dos bordes. La *cara anterior* está en relación con los tendones flexores de los dedos y con los lumbricales; la *cara posterior* se corresponde con los dos primeros espacios interóseos; el *borde externo*, con el flexor corto, y el *borde inferior*, con el pliegue cutáneo que une el pulgar al índice.

INERVACIÓN. — Rama profunda del cubital.

ACCIÓN. — Es esencialmente aductor.

B. Región palmar interna. eminencia hipotenar

Esta región comprende cuatro músculos: *palmar cutáneo*, *aductor*, *flexor corto* y *oponente del meñique*.

1° Palmar cutáneo. Músculo cuadriátro y subcutáneo.

INSERCIÓNES. — Se inserta en la parte interna de la aponeurosis de la eminencia hipotenar y termina, por una serie de fascículos transversales, en la cara profunda de la piel.

RELACIONES. — Cubre los fascículos cubitales.

INERVACIÓN. — Rama superficial del cubital.

ACCIÓN. — Arruga la piel de la eminencia hipotenar.

2° Aductor del meñique. Situado en la parte interna de la región hipotenar.

INSERCIÓNES. — *Por arriba*, en el pisiforme; *por abajo*, en el tubérculo interno del extremo posterior de la primera falange.

RELACIONES. — Situado debajo de la aponeurosis hipotenar, cubre el músculo siguiente.

INERVACIÓN. — Rama profunda del cubital.

ACCIÓN. Aductor del meñique y, accesoriamente, flexor de la primera falange.

3.º Flexor corto del meñique. Situado por fuera del precedente

INSERCIÓNES. — *Por arriba*, en el hueso ganchoso y en el ligamento anular, *por abajo*, en el lado cubital de la primera falange del meñique

RELACIONES. — Músculo superficial. Su *borde interno* está en relación con el aductor (la arteria cubital los separa) Su *borde externo* lo siguen los tendones flexores del meñique. Por su *cara profunda* cubre el oponente

INERVACIÓN. Como el precedente

ACCIÓN. — Dobla la primera falange sobre el metacarpiano.

4.º Oponente del meñique. — Situado debajo del músculo precedente

INSERCIÓNES. *Por arriba*, en el hueso ganchoso y en el ligamento anular de la muñeca, *por abajo*, en toda la altura del borde interno del quinto metacarpiano.

RELACIONES. — Está situado debajo de todos los músculos de la región hipotenar

INERVACIÓN. — Como el precedente

ACCIÓN. — Lleva el meñique hacia delante y afuera

C. Región palmar media

Comprende dos capas de músculos situados entre la eminencia tenar y la eminencia hipotenar: una superficial, está formada por los *músculos lumbricales* la otra es profunda y la forman los *músculos interseos*

1.º Lumbricales de la mano. — Pequeños músculos fusiformes, en número de cuatro (1.º, 2.º, 3.º, 4.º, de fuera adentro), situados entre los tendones del flexor profundo y en el mismo plano que ellos

INSERCIÓNES. — Se insertan en los dos tendones del flexor profundo entre los cuales están situados, excepto el primero, que se inserta únicamente en el tendón del índice. Desde este punto llegan a la parte externa de la articulación metacarpofalángica y se insertan en el tendón del extensor correspondiente.

RELACIONES. — Cubiertos por los tendones flexores superficiales, los vasos y los nervios superficiales, ellos a su vez cubren los espacios interóseos

INERVACIÓN Los dos externos, por el mediano, los dos internos, por una rama profunda del cubital.

Acción. Flexionan la primera falange y extienden las demás.

2.º Interóseos de la mano. — Estos músculos ocupan los espacios interóseos. Se distinguen en *interóseos palmares* e *interóseos dorsales*.

A. INTERÓSEOS PALMARES — Son *tres*, que ocupan los tres últimos espacios. Sus caracteres son: 1.º, ocupar tan sólo la mitad del espacio interóseo; 2.º insertarse en un solo metacarpiano; 3.º, dirigirse al dedo siguiente a este metacarpiano.

Inserciones Se insertan en la cara del metacarpiano que mira al eje de la mano, es decir, en la cara cubital del segundo metacarpiano (para el primer interóseo), en la cara radial del cuarto metacarpiano (para el segundo interóseo), y en la cara radial del quinto metacarpiano (para el tercer interóseo). Desde estos puntos las fibras carnosas se reúnen y terminan en un tendón que va a unirse al tendón del extensor (Índice, anular y meñique).

Relaciones — Cubren los interóseos dorsales y son a su vez cubiertos por los tendones flexores y por los lumbricales.

B. INTERÓSEOS DORSALES — Son *cuatro* y ocupan los cuatro espacios intermetacarpianos. Sus caracteres comunes son: 1.º ocupar todo el espacio interóseo; 2.º, insertarse en los dos metacarpianos inmediatos; 3.º, dirigirse al dedo correspondiente al metacarpiano, en el cual son más extensas sus inserciones.

Inserciones. Se efectúan en dos metacarpianos, pero de un modo desigual, ocupan toda la extensión de la cara que no mira al eje de la mano y la mitad de la que mira a dicho eje (la otra mitad está ocupada por el interóseo palmar). Así, el *primer interóseo* se inserta en una parte de la cara cubital del primer metacarpiano y en toda la extensión de la cara radial del segundo metacarpiano; termina en el tendón del índice; el *segundo interóseo* se inserta en una parte de la cara cubital del segundo metacarpiano y en toda la extensión de la cara radial del tercero; termina en el extensor del dedo medio; el *tercer interóseo* se inserta en una parte de la cara radial del cuarto metacarpiano y en toda la extensión de la cara cubital del tercero; termina en el extensor del medio; el *cuarto interóseo* se inserta en una parte de la cara radial del quinto metacarpiano y en toda la extensión de la cara cubital del cuarto y termina en el extensor del anular.

Relaciones. — En su cara dorsal están cubiertos por los tendones extensores, la aponeurosis y la piel. En su cara palmar están cubiertos por los interóseos palmares y los órganos de la palma de la mano.

C INERVACIÓN. Todos son innervados por la rama profunda del cubital.

D ACCIÓN DE LOS INTERÓSEOS PALMARES Y DORSALES. Flexionan la primera falange y extienden las otras dos. Además, los interóseos palmares hacen unirse los dedos (aductores con relación al eje de la mano) los interóseos dorsales hacen separar los dedos (abductores).

D. *Aponeurosis de la mano*

Constituyen dos grupos: 1.º, *aponeurosis de la región palmar*; 2.º, *aponeurosis de la región dorsal*. Las aponeurosis se distinguen también en superficial y profunda.

1.º *Aponeurosis palmar de la región.* Se extiende por encima de todos los músculos de la palma de la mano, excepto el palmar cutáneo. Presenta tres porciones distintas: 1.ª, *aponeurosis palmar media*; 2.ª, *aponeurosis de la eminencia tenar*, y 3.ª, *aponeurosis de la eminencia hipotenar*.

A APONEUROSIS PALMAR MEDIA. — Está comprendida entre las eminencias tenar e hipotenar. Es triangular de base redondeada, y se extiende sobre la raíz de los dedos. Se continúa con el ligamento anular y con las aponeurosis tenar e hipotenar.

a) Constitución anatómica. — Presenta dos clases de fibras longitudinales y transversales.

a) Las fibras longitudinales, nacidas del tendón del palmar menor, se extienden en abanico por la palma de la mano. En la parte inferior se dividen en cintillas, *cintillas pretendinosas*, que rodean la raíz de los dedos y se pierden en la cara dorsal de la primera falange. Las fibras que corresponden a los espacios intertendinosos, *fibras intertendinosas*, se extienden hasta la parte inferior de la región palmar y se pierden en la cara profunda de la piel.

B) Las fibras transversales son numerosas, principalmente en la parte inferior de la región. Se dirigen: unas, de un metacarpiano al metacarpiano próximo (*fibras cortas*), y las otras, de un metacarpiano a otro más lejano (*fibras largas*). Forman, con las fibras longitudinales, aberturas en forma de arcos: 1.º, *arcos digitales*, que son cuatro, y dan paso a los tendones flexores; 2.º, *arcos interdigitales*, que son

tres, y dan paso a los tendones de los lumbricales a los vasos y a los nervios colaterales de los dedos. Debajo de estas fibras hay otras que van desde el borde interno de la primera falange del pulgar al borde externo de la primera falange del meñique constituyen la *cintilla transversa subcutánea*.

b) *Relaciones*. Tienen dos caras. La *cara superficial* está en relación con la piel, a la cual está unida por tramos fibrosos *tiengue las cutíneas*. La *cara profunda* cubre los órganos de la palma de la mano. De esta cara parten dos clases de fibras, unas, *tabicantes*, forman vainas tendinosas alrededor de los cuatro tendones flexores, otras, *perforantes*, situadas a nivel de la cabeza de los metacarpianos, se deslizan a cada lado de la articulación metacarpofalángica y van, en la cara dorsal, a fusionarse con la vaina de extensor.

B. *APONEUROSIS PALMAR EXTERNA*. — Es una delgada celulosa que cubre la eminencia tenar. Se inserta en el carpo y se continua con la aponeurosis media.

C. *APONEUROSIS PALMAR INTERNA*. — Es muy delgada, se desprende del pisiforme y del borde externo del quinto metacarpiano y se continúa con la aponeurosis media.

D. *COMPARTIMIENTOS DE LA PALMA DE LA MANO*. — De la línea de unión de las tres aponeurosis palmares se desprenden dos tabiques: uno *interno*, vertical, que se inserta en el borde anterior del quinto metacarpiano y otro *externo*, muy oblicuo, que rodea al aductor del pulgar y se inserta en el borde anterior del tercer metacarpiano. De esto resulta la formación de *tres compartimientos*, ocupado cada uno de ellos por los músculos de las tres regiones anteriormente descritas.

E. *APONEUROSIS PALMAR PROFUNDA*. Cubre los interóseos y se inserta en el borde anterior de todos los metacarpianos, excepto el tercero. Está en relación, por delante, con los órganos de la palma de la mano y con los tabiques fibrosos que nacen de la aponeurosis superficial.

2.º *Aponeurosis de la región dorsal*. — Son dos. 1.º la *aponeurosis dorsal superficial* continuación de la aponeurosis antebraquial, que cubre los tendones extensores; 2.º la *aponeurosis dorsal profunda* que se extiende sobre los espacios interóseos por debajo de los tendones extensores.

CAPITULO VII

MUSCULOS DEL MIEMBRO INFERIOR

Como para el miembro superior, dividiremos los del miembro inferior en cuatro grupos: 1.º, *músculos de la pelvis*; 2.º, *músculos del muslo*; 3.º, *músculos de la pierna*; 4.º, *músculos del pie*.

1. MUSCULOS DE LA PELVIS

La región glútea comprende nueve músculos: *glúteo mayor*, *glúteo mediano*, *glúteo menor*, *piramidal*, *obturador interno*, *obturador externo*, *geminos* y *cuadrado crural*. Todos, excepto el glúteo mayor, van de la pelvis al *trocánter mayor* (músculos *pelvitrocantéreos*).

1.º **Músculo glúteo mayor.** — Músculo aplanado y cuadrilátero y a la vez el más voluminoso y superficial de la nalga.

INSERCIONES. — *Por arriba.* 1.º en el labio externo de la cresta ilíaca (parte posterior). 2.º en la línea curva posterior del hueso coxal y en la superficie ósea situada por detrás de aquélla; 3.º, en el ligamento sacroilíaco posterior; 4.º, en la cresta del sacro y del cóccix, 5.º, en el ligamento sacrociático mayor. Desde este punto, las fibras musculares se dirigen oblicuamente hacia abajo y afuera, para venir a insertarse en la *cresta del glúteo mayor* (bifurcación externa de la línea áspera).

RELACIONES. — Es superficial y está cubierto por la aponeurosis y la piel. Cubre los músculos de la nalga y la inserción superior de algunos músculos de la cara posterior del muslo. Está separado del isquion y de la cara externa del trocánter mayor por una bolsa serosa. El borde inferior del músculo forma, en gran parte, el *pliegue glúteo*.

INERVACIÓN. — Ramos del nervio ciático menor.

ACCIÓN. — Comunica al fémur extensión y rotación hacia fuera. Si se fija en el fémur, endereza la pelvis, papel que desempeña en

la estación bipeda y en el acto de ponerse en pie cuando se está sentado

2.º Glúteo mediano. — Músculo grueso, de forma radiada y situado debajo del precedente

INSERCIONES. *Por arriba*, en el labio externo de la cresta ilíaca (tres cuartos anteriores) en la espina ilíaca anterosuperior y en la porción de la fosa ilíaca externa comprendida entre las dos líneas curvas. Desde aquí, las fibras constitutivas de este músculo convergen hacia la cara externa del trocánter mayor y se insertan en ella siguiendo una línea oblicua hacia abajo y adelante

RELACIONES. — Situado debajo del glúteo mayor, del que sobresale por delante, cubre el glúteo menor. Su borde posterior sigue el borde superior del piramidal, del cual lo separan los vasos y nervios glúteos superiores. Una *bolsa serosa* lo separa de la cara externa del trocánter mayor

INERVACIÓN. — Nervio glúteo superior

ACCIÓN. — Es abductor y rotador del muslo hacia dentro. Si tiene por punto fijo el fémur, endereza la pelvis.

3.º Glúteo menor. — Músculo aplanado y triangular, situado debajo del precedente

INSERCIONES. *Por una parte* se inserta en la porción anterior de la cresta ilíaca y de la fosa ilíaca externa; *por otra parte*, en el borde superior y el borde anterior del trocánter mayor

RELACIONES. — Cubre la fosa ilíaca externa y la cápsula de la cadera

INERVACIÓN. — Como el precedente

ACCIÓN. — La misma que la del glúteo mediano.

4.º Piramidal de la pelvis. — Músculo aplanado y triangular, que va desde el sacro al trocánter mayor.

INSERCIONES. — *Por dentro*, en la cara anterior de las vértebras sacras 2.ª, 3.ª y 4.ª; *por fuera*, en la parte media del borde superior del trocánter mayor

RELACIONES. — Se estudian en las dos porciones siguientes. *Porción intrapelviana.* cubre el sacro y está en relación por delante con el recto y con los vasos hipogástricos. *Porción extrapelviana.* el piramidal sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor; por encima de él se encuentran los vasos y los nervios glúteos superiores, por debajo, los nervios ciático mayor y menor, los vasos isquiáticos y los

vasos y nervios pudendos internos. Corre por debajo del glúteo menor para ir a parar al trocánter mayor.

INERVACIÓN. Rama del plexo sacro.

Acción. Comunica al fémur un movimiento de rotación hacia fuera.

5.º **Géminos pelvianos.** Son dos pequeños músculos aplanados situados por debajo del piramidal. Se distinguen en superior e inferior.

INSERCIÓNES. — *Por dentro*, el superior se inserta en la espina ciática y el inferior en el isquion. *Por fuera* se insertan, por un tendón común, en el obturador interno.

RELACIONES. Descansan sobre la cápsula de la cadera, separados del glúteo mayor por los nervios ciáticos y los vasos isquiáticos.

INERVACIÓN. — Ramos del plexo sacro.

Acción. Ambos son rotadores del muslo hacia fuera.

6.º **Obturador interno.** — Es un músculo aplanado, radiado, que va de la región obturatriz al trocánter mayor.

INSERCIÓNES. *Por dentro*, en la cara interna de la membrana obturatriz y en gran parte del contorno óseo del agujero obturador. Desde estos puntos, los fascículos convergen primeramente hacia la escotadura ciática menor, después cambian de dirección, se dirigen hacia fuera y van a insertarse por un fuerte tendón, en la cara interna del trocánter mayor, algo por encima de la cavidad digital.

RELACIONES. Tres porciones. *Dentro de la pelvis* está en relación por su cara externa con el agujero obturador. La cara interna presta inserción, por medio de una aponeurosis especial, a las fibras medias del elevador del ano. Por encima de éste se halla el *espacio peturrectal superior*, y por debajo el *hueco isquirrectal*. A su salida de la pelvis está en relación con la escotadura ciática menor. El músculo está separado del isquion por una bolsa serosa. *Por fuera de la pelvis*, el tendón pasa por entre los dos géminos.

INERVACIÓN. — Rama del plexo sacro.

Acción. Es rotador del muslo hacia fuera.

7.º **Obturador externo.** Músculo aplanado y radiado, que se extiende sobre la cara externa de la membrana obturatriz.

INSERCIÓNES. *Por una parte* se inserta en la cara externa de la membrana obturatriz y de su contorno óseo, y *por otra*, en la cavidad digital del trocánter mayor.

RELACIONES — Por delante está cubierto por el psoasílico y los aductores mayor y menor. En su tercio externo está en relación con la cápsula fibrosa de la cadera.

INERVACIÓN. — Nervio obturador

ACCIÓN Rotador del muslo hacia fuera

8.º Cuadrado crural. - Músculo cuadrilátero, situado en la parte posterior de la articulación de la cadera

INSERCIÓNES — *Por una parte*, en el borde externo de la tuberosidad isquiática, y, *por otra parte*, en la cresta intertrocantérea, o, mejor, por fuera de ella

RELACIONES Cubierto por el glúteo mayor y el ciático mayor, cubre, por delante la cápsula de la cadera y el tendón del obturador externo. Su borde superior se relaciona con el gémino inferior y su borde inferior con el aductor mayor.

INERVACIÓN. — Ramo del plexo sacro.

ACCIÓN Rotador de' muslo hacia fuera

Aponeurosis de la nalga. - Partiendo de la cresta ilíaca, la aponeurosis glútea cubre primero el glúteo mediano. Al llegar a. borde anterior del glúteo mayor, se divide en tres hojas: 1.ª, *hoja profunda*, que continúa cubriendo el glúteo mediano, 2.ª, *hoja media*, que tapiza la cara profunda del glúteo mayor, 3.ª, *hoja superficial*, que cubre la cara externa de este músculo. Se inserta luego en la cresta sacra y en el ligamento sacrocóccigeo. Se continúa por abajo con la aponeurosis femoral.

2. MÚSCULOS DEL MUSLO

Los músculos del muslo son once, distribuidos en dos regiones: 1.ª, *región anteroexterna*, 2.ª, *región postero-interna*

A. Región anteroexterna

Comprende tres músculos: el tensor de la «fascia lata», el sartorio y el cuádriceps crural

1.º Tensor de la «fascia lata». — Músculo plano, delgado, carnoso por arriba y tendinoso por abajo, que va desde el hueso coxal a la tibia

INSERCIÓNES *Por arriba*, en la espina iliaca anterosuperior, en la cresta iliaca próxima y en la aponeurosis glútea. *Por abajo* los fascículos tendinosos se confunden con la aponeurosis femoral, constituyendo en la parte externa del muslo una cinta longitudinal muy resistente (*ligamento iliotibial de Massiat*), que va a insertarse en la tuberosidad interna de la tibia.

RELACIONES. — Es superficial y cubre la parte externa de la región glútea y del muslo.

INERVIACIÓN Ramo del nervio glúteo superior.

ACCIÓN — Tensor de la aponeurosis femoral. Abductor y rotador del muslo hacia dentro; inclina la pelvis hacia su lado y concurre al equilibrio del cuerpo al descansar sobre un solo pie.

2.º Sartorio. Musculo acintado, que va del ilion a la tibia.

INSERCIÓNES — *Por arriba* se inserta en la espina iliaca anterosuperior y en la escotadura situada por debajo; *por abajo*, en la parte interna de la extremidad superior de la tibia (*pata de gamo*).

RELACIONES — Es superficial y cruza diagonalmente todos los músculos de la cara anterior del muslo. Es atravesado por tres filetes nerviosos (nervios perforantes). La *arteria femoral* (de la que es músculo satélite) está por dentro de él en su parte superior, lo cruza por detrás de su parte media y se coloca por fuera en su terminación.

INERVIACIÓN Ramos del musculocutáneo externo y del crural.

ACCIÓN Dobla la pierna y el muslo, lleva el muslo en abducción y rotación hacia fuera.

3.º Cuadríceps crural. Musculo voluminoso formado por cuatro fascículos distintos (*recto anterior*, *vasto externo*, *vasto interno* y *crural*), que ocupan la parte anterior del muslo.

INSERCIÓNES Las inserciones por la parte superior son distintas en los cuatro fascículos. *Recto anterior* en la espina iliaca antero-inferior (tendón directo) y en la ceja cotiloidea (tendón reflejo). *Vasto externo* en el borde anterior del trocánter mayor y en el labio externo de la línea áspera. *Vasto interno* en el labio interno de la línea áspera y en la línea rugosa que une la línea áspera con el cuello del fémur. *Crural* en la línea áspera (lado externo) y en las caras anterior y externa del fémur. Desde estos puntos, los fascículos se insertan por un tendón común, en la base y bordes laterales de la rótula y también en la tuberosidad de la tibia. Algunos se insertan en el fondo de saco sinovial (*musculo tensor de la sinovial*).

RELACIONES — Cubierto en su parte superior (recto anterior) por el psoasiliaco y el tensor de la fascia lata, forma en el muslo un manguito alrededor del fémur, lateralmente confina con los músculos de la región posterior, por dentro forma, con los aductores, un canal a lo largo del cual corren los vasos femorales.

INERVACIÓN — Nervio del cuádriceps, rama del crural.

ACCIÓN. — Es el extensor de la pierna y tensor de la sinovial de la rodilla.

B. Región posterointerna

Comprende ocho músculos. *recto interno, pectíneo, tres aductores, bíceps crural, semitendinoso y semimembranoso*.

1.º Recto interno. Músculo aciniado, muy delgado, situado en la parte interna del muslo.

INSERCIÓNES — *Por arriba* se inserta a cada lado de la sínfisis pubiana (rama descendente del pubis); *por abajo*, en la parte superior de la cara interna de la tibia (*pata de ganso*).

RELACIONES. — Es un músculo superficial, que por su cara profunda está en relación con el borde interno de los aductores, con el cóndilo interno del fémur y con el ligamento lateral interno de la rodilla.

INERVACIÓN. — Rama del obturador.

ACCIÓN. — Dobla la pierna y la dirige hacia dentro.

2.º Pectíneo. — Músculo aplanado y delgado, que va desde el pubis a la pared superior de la diáfisis femoral.

INSERCIÓNES — *Por arriba* se inserta en la espina del pubis la cresta pectínea y el ligamento de Cooper. *por abajo*, en la cresta del pectíneo (línea rugosa que va de la línea áspera al trocánter menor).

RELACIONES — Forma la parte interna de la base del triángulo de Scarpa. Cubre la cadera y el obturador externo. Su borde interno está en relación con el aductor mediano. Su borde externo forma, con el psoasiliaco, un canal longitudinal que aloja los vasos femorales.

INERVACIÓN. — Nervio musculocutáneo interno (crural) y ramo del obturador.

ACCIÓN — Flexiona el muslo y le comunica rotación hacia fuera.

3.º Aductores del muslo. Son tres y forman una especie de abanico que va desde la rama isquiopubiana a la línea áspera del fémur.

INSERCIÓNES — Varían en cada uno de estos músculos. *Primer aductor* va de cuerpo del pubis a la porción media del intersticio de la línea áspera. *Segundo aductor*, situado por encima y detrás del precedente, va del cuerpo del pubis y de su rama descendente a insertarse en el fémur por dos fascículos, uno inferior, en la línea áspera, y otro superior, en la rama externa de bifurcación de ésta línea. *Tercer aductor* va de la tuberosidad isquiática y de la rama isquiopubiana a insertarse en el fémur en toda la extensión de la línea áspera, en su rama inferior e interna de bifurcación y en el tubérculo del tercer aductor, que está por encima del cóndilo interno; esta inserción se efectúa por una fuerte aponeurosis, que es atravesada por los vasos perforantes.

RELACIONES — El *primer aductor* está en relación, primeramente, con la piel y más abajo, con el vaso interno. Cubre el segundo aductor. Su borde externo sigue el pectíneo y forma el lado interno del triángulo de Scarpa. El *segundo aductor*, cubierto por el primer aductor y el pectíneo, descansa sobre el aductor mayor. Su borde interno está en relación con el recto interno; su borde externo, con el obturador externo y el tendón del psoasiliaco. El *tercer aductor*, cubierto por delante por el pectíneo y los otros dos aductores, está a su vez cubierto por detrás por el glúteo mayor y algunos músculos de la cara posterior del muslo, su borde externo o superior sigue el borde interno del cuadrado crural, su borde interno está en relación con la piel con el recto interno y con el sartorio.

INERVACIÓN. — Obturador y musculocutáneo interno para el primero, obturador solo para el segundo; obturador y ciático mayor para el tercero.

Acción — Aductores del muslo, conducen el muslo hacia dentro, imprimiéndole al propio tiempo un ligero movimiento de rotación hacia fuera.

4° **Bíceps crural.** — Músculo largo, situado en la parte externa de la región, que va del isquion al peroné.

INSERCIÓNES. — Consta de dos porciones (larga y corta): la *porción larga* se inserta en el isquion, la *porción corta* nace en la parte inferior del intersticio de la línea áspera. Las dos porciones se unen y se insertan por un tendón común en la cabeza del peroné (*bolsa serosa*).

RELACIONES — Por arriba está cubierto por el glúteo mayor, pero pronto se hace superficial, cubre los músculos de la región profunda.

Su borde interno está en contacto, en su parte superior, con el borde externo del semitendinoso; pero pronto se separa de él y forma el lado superior y externo del rombo poplíteo; en este punto lo sigue el nervio ciático poplíteo externo.

INERVACIÓN. — Ciático mayor.

Acción. — Flexiona la pierna y le comunica un movimiento de rotación externa, por su porción larga extiende el muslo sobre la pelvis.

5.º Semitendinoso. — Carnoso por arriba y tendinoso por abajo, ocupa la parte superficial e interna de la región.

INSERCIÓNES. — *Por arriba* se inserta en la cara posterior del isquion, y *por abajo*, en la extremidad superior de la tibia (*pata de ganso*).

RELACIONES. — Cubierto por arriba por el glúteo mayor, se desprende luego de él para hacerse superficial. Cubre el tercer aductor y el semimembranoso. Por fuera es contiguo al biceps y se separa de él para formar el lado interno y superior del rombo poplíteo.

INERVACIÓN. — Ciático mayor.

Acción. — Flexiona la pierna sobre el muslo (accesoriamente éste sobre la pierna) y extiende el muslo sobre la pelvis.

6.º Semimembranoso. — Se halla situado debajo del precedente y, al igual que éste, se extiende del isquion a la parte interna de la rodilla.

INSERCIÓNES. — *Por arriba*, en el isquion. *Por abajo*, su tendón se desliza por detrás del condilo interno y se divide en tres fascículos: 1.º, *fascículo descendente*, que va a la tuberosidad interna de la tibia; 2.º, *fascículo recurrente*, que se dirige hacia abajo y afuera para insertarse en la cápsula fibrosa que rodea el condilo externo; 3.º, *fascículo anterior*, que pasa por debajo del ligamento lateral interno y se fija en la parte anteroexterna de la tuberosidad de la tibia.

RELACIONES. — Está cubierto por el glúteo mayor y el semitendinoso. Cubre el cuadrado crural, el segundo aductor y el condilo interno. Su borde interno es a la relación con el recto interno. Su borde externo, seguido por el nervio ciático mayor y la porción larga del biceps, se separa de esta y forma, con el semitendinoso, el lado superior e interno del rombo poplíteo.

INERVACIÓN. — Ciático mayor.

Acción. — La misma que el semitendinoso.

C. *Aponeurosis del muslo*

La aponeurosis femoral rodea el muslo a manera de manguito. *Por arriba* se inserta en el arco crural y en la aponeurosis glútea. *Por abajo*, en la rótula, en los huesos de la pierna y se continúa con la aponeurosis tibial. Su *superficie externa* está en relación con el tejido celular subcutáneo y con la piel. Por su *cara interna* está en relación con los músculos del muslo, y de cada lado, interno y externo, sale un tabique intermuscular, *externo e interno*, que divide el muslo en dos regiones.

Vaina de los vasos femorales. — Es una dependencia directa de la aponeurosis femoral, que rodea los vasos femorales en todo su trayecto. En su *porción superior* forma el *conducto crural*, constituido por la fascia cribiformis por delante, y a cada lado, por una hoja aponeurótica que desciende, por fuera, desde el sartorio al psoas, y por dentro, desde el aductor mediano al pectíneo. En su *porción inferior*, la vaina está reforzada por fibras arciformes resistentes, que van del abigue muscular interno y de los tendones aductores al vasto interno; llámase *conducto de Hunter*.

3. MÚSCULOS DE LA PIERNA

Los músculos de la pierna, en número de catorce, están agrupados en tres regiones: 1.^a, *región anterior*; 2.^a, *región externa*, 3.^a, *región posterior*.

A. *Región anterior*

Comprende cuatro músculos: *tibial anterior*, *extensor común de los dedos*, *extensor propio del dedo gordo* y *peroneo anterior*, agrupados en el espacio que se extiende desde el borde anterior de la tibia al borde anterior del peroné.

1.º **Tibial anterior.** Músculo prismático, que va de la extremidad de la tibia al borde interno del pie.

INSERCIÓNES — *Por arriba* se inserta en la tuberosidad externa de la tibia (tubérculo de Gerdy o del tibial anterior), en la cara externa de la tibia, en el ligamento interóseo y en los tabiques musculares. Desde estos puntos las fibras se dirigen al tendón, que pasa por debajo del ligamento anterior del tarso y va a insertarse en la primera cuña y en la base del primer metatarsiano.

RELACIONES. — Consideráanse dos porciones. *En la pierna* está situado por detrás de la piel y de la aponeurosis tibial, por delante del ligamento interóseo, por fuera de la tibia, por dentro de, extensor común y luego del extensor propio del dedo gordo. Su borde exterior y posterior es seguido por los vasos tibiales anteriores. *En el pie* cruza la articulación tibiotarsiana y el escafoide.

INERVACIÓN. — Nervio tibial anterior.

ACCIÓN. Es flexor, abductor y rotador del pie hacia dentro.

2.º Extensor común de los dedos. — Está situado por fuera del precedente y se extiende desde la extremidad superior de la tibia a los cuatro últimos dedos del pie.

INSERCIÓNES. *Por arriba* se inserta en la tuberosidad externa de la tibia en el peroné, en el ligamento interóseo y en los tabiques musculares. Desde estos puntos va a parar al tendón que corre por debajo del ligamento anular anterior y se divide en cuatro ramas, que van a insertarse: 1.º, en la extremidad posterior de la segunda falange de los cuatro últimos dedos del pie, por una *cinilla media*; y 2.º, en la cara superior de la tercera falange por dos *cinillas laterales*.

RELACIONES. Dos porciones. *En la pierna* está en relación: 1.º, por dentro, con el tibial anterior del cual está separado en la parte inferior por el extensor propio; 2.º, por detrás, es a en relación con el peroné y con el ligamento interóseo. *En el pie*, sus tendones cubren el músculo pedio.

INERVACIÓN. Cático poplíteo externo y tibial anterior.

ACCIÓN. — Extiende los cuatro últimos dedos del pie. Respecto del pie, es flexor y rotador hacia fuera.

3.º Extensor propio del dedo gordo. — Está profundamente situado entre los dos músculos precedentes.

INSERCIÓNES. *Por arriba*, en la cara interna del peroné y en el ligamento interóseo, *por abajo* en el lado dorsal de la base de la segunda falange del dedo gordo.

RELACIONES. — Se consideran en este músculo dos porciones. *En la pierna* está en relación con el tibial anterior y el extensor común, del cual se desprende en la parte inferior para hacerse superficial. *En el pie* sigue el borde interno del pedio, la tibial anterior, que en la pierna está situada en la parte interna, pasa por debajo de él y gana la parte externa de su tendón al llegar a la cara dorsal del pie.

INERVACIÓN. — Tibial anterior.

Acción.— Extensor del dedo gordo. Respeto del pie, es flexor, aductor y rotador hacia dentro.

4° Peroneo anterior.— Músculo delgado, que ocupa la parte inferior y externa de la región.

INSERCIÓNES.— *Por arriba* se inserta en el tercio inferior de la cara interna del peroné, y *por abajo*, en la base del quinto metatarsiano.

RELACIONES.— Dos porciones. *En la pierna* se encuentra por fuera del extensor común y está en relación hacia fuera con los peroneos laterales. *En el pie*, su tendón cubre el músculo pedio.

INERVACIÓN.— Tibial anterior.

Acción — Es auxiliar del extensor común para los movimientos del pie.

B. Región externa

La región externa comprende dos músculos: el *peroneo lateral largo* y el *peroneo lateral corto*.

1° Peroneo lateral largo.— Músculo superficial, que va de la parte superoexterna de la pierna al primer metatarsiano.

INSERCIÓNES.— *Por arriba*, en la cabeza del peroné, en la cara externa de este hueso, en la aponeurosis tibial y en los tabiques musculares. Desde estos puntos va a parar al tendón que rodea de atrás adelante al maléolo externo, se desliza por la cara externa del calcáneo (por debajo del tubérculo externo), y por el canal del cuboide (hueso sesamoideo), atraviesa diagonalmente la planta del pie y, finalmente, va a insertarse en la extremidad posterior del primer metatarsiano.

RELACIONES — Tres porciones. *En la pierna* está en relación: 1.ª por fuera, con la aponeurosis; 2.ª, por dentro, con el peroné y con el peroneo lateral corto; 3.ª por delante, con el extensor común; 4.ª por detrás, con el sóleo y con el peroneo flexor. *En la parte superior* es atravesado por el nervio ciático popliteo externo. *En la garganta del pie* cruza la cara externa de la articulación tibiotarsiana, encerrada en una vaina fibrosa. *En la planta del pie* sigue el plano óseo.

INERVACIÓN — Musculocutáneo, rama del ciático popliteo externo.

Acción — Es extensor, abductor y rotador del pie hacia fuera.

2° Peroneo lateral corto.— Situado por debajo del precedente, pero mucho menos largo que él.

INSERCIONES. — *Por arriba* se inserta a la vez en el perone (tercio medio de la cara externa y en los tabiques musculares *Desde estos puntos* va a parar a un tendón, que se desliza por el canal calcáneo (por encima del tubérculo externo) y va a insertarse en la extremidad posterior del quinto metatarsiano.

RELACIONES. Situado debajo del precedente

INERVACIÓN. — Como el precedente

ACCIÓN. Es aductor y rotador hacia dentro respecto del pie

C. Región posterior

Esta región comprende ocho músculos, dispuestos en dos capas. Capa superficial. *gemelos, sóleo y plantar delgado.* Capa profunda *popliteo, tibial posterior, flexor común de los dedos, flexor propio del dedo gordo*

1.º Gemelos de la pierna. Son dos músculos voluminosos, que van desde los cóndilos del fémur hasta el calcáneo (con el sóleo constituyen el *triceps sural*). Se distinguen en *interno y externo*

INSERCIONES. — *Por arriba*, el *gemelo interno* se inserta en el cóndilo interno (*bolsa serosa*), y el *gemelo externo*, en el cóndilo externo. Desde estos puntos, los dos músculos descienden a la cara posterior de la pierna, se fusionan y forman el *tendon de Aquiles*, que va a insertarse en la cara posterior del calcáneo (*bolsa serosa*)

RELACIONES. — En la parte superior, los gemelos están separados uno de otro por un espacio angular en V, que constituye la mitad inferior del rombo popliteo. Después de su unión, cubren los músculos más profundos de la pierna (el sóleo y el popliteo)

INERVACIÓN. Nervio ciático popliteo interno

ACCIÓN. — Son extensores del pie y a la vez flexores de la pierna después de extendido el pie

2.º Sóleo. — Músculo a la vez muy ancho y muy grueso situado debajo de los gemelos

INSERCIONES. — *Por arriba* se inserta en el peroné (cabeza, borde externo, cara posterior), en la tibia (línea oblicua) y, entre los dos huesos, en un arco fibroso, *arco del sóleo*, por debajo del cual pasan los vasos y nervios tibiales posteriores. La inserción de las fibras musculares se efectúa también en una hoja fibrosa que sale de la tibia y del peroné y se prolonga al interior del músculo (*aponeurosis intra muscular del sóleo*) *Por abajo*, las fibras del sóleo se reúnen en el

tendón de Aquiles. Es de notar que este tendón es común a los tres músculos, gemelo interno, gemelo externo y sóleo (*triceps surae*).

RELACIONES. — Cubierto por detrás por los gemelos y el plantar delgado, cubre a su vez los vasos tibiales posteriores y los músculos profundos. Sus dos bordes, externo e interno, sobresalen de los gemelos, haciéndose superficiales.

INERVACIÓN. — Ramos del ciático poplíteo interno y del tibial posterior.

Acción. — La misma que los gemelos.

3.º **Plantar delgado.** — Músculo delgado que, por arriba, se inserta en el cóndilo interno. Está cubierto en primer lugar por los gemelos. Su tendón, que es muy delgado, se situa en seguida en el lado interno del tendón de Aquiles y termina en el o en el calcáneo. Inervado por el ciático poplíteo interno. Es un débil auxiliar de los gemelos.

4.º **Poplíteo.** — Músculo corto, aplanado y triangular, situado en la parte posterior de la rodilla.

INSERCIÓNES. — *Por arriba*, en el cóndilo externo *por abajo*, en la línea oblicua de la tibia y en la porción de este hueso situada por encima de ella.

RELACIONES. — Cubierto por los gemelos, el plantar delgado, los vasos poplíteos y el nervio ciático poplíteo interno, cubre a su vez la parte posterior de la rodilla (*bursa serosa*).

INERVACIÓN. — Ciático poplíteo interno y tibial posterior.

Acción. — Dobla la pierna sobre el muslo.

5.º **Flexor común de los dedos del pie o flexor tibial.** — Músculo que se extiende desde la tibia a los cuatro últimos dedos del pie.

INSERCIÓNES. — *Por arriba*, en el labio inferior de la línea oblicua de la tibia y en el tercio medio de la cara posterior de este mismo hueso. *Por abajo*, las fibras musculares se reúnen en un tendón que pasa por detrás del maléolo interno, atraviesa el canal calcáneo interno y llega a la región plantar. Desde este punto, cruza en X el tendón del flexor peroneo (anastomosis), recibe el cuadrado carnoso de Silvio y se divide en cuatro tendones, que se insertan en las falanges en la misma forma que en el miembro superior el flexor profundo de los dedos.

RELACIONES. — Tres porciones. *En la pierna*, lo cubre el músculo sóleo y él a su vez cubre la tibia y el tibial posterior. *En la garganta del pie* se desliza, con el paquete vasculonervioso tibial posterior, por el canal calcáneo interno. *En la planta del pie* cubre el abductor del dedo gordo. Presta inserción a los cuatro músculos lambricales.

INERVACIÓN. — Tibial posterior

ACCIÓN. — Flexiona los cuatro últimos dedos del pie y el pie sobre la pierna

6° Flexor propio del dedo gordo o flexor peroneo.—Músculo largo, se extiende desde el peroné al dedo gordo.

INSERCIÓNES. — *Por arriba*, en la cara posterior del peroné y en el agamento interóseo. *Por abajo*, el músculo termina en un tendón que se desliza sucesivamente sobre la cara posterior de la extremidad inferior de la tibia, sobre la cara posterior del astrágalo y por el canal calcáneo interno. Al llegar a la planta del pie, cruza el tendón del flexor tibial (al que envía una anastomosis) y termina en la segunda falange del dedo gordo.

RELACIONES. — Dos porciones. *En la pierna* está cubierto por el sóleo y por el tendón de Aquiles. Cubre el peroné. La arteria peronea posterior, colocada primariamente en su cara posterior, penetra en seguida en el espesor del músculo. *En el pie* se halla dentro de un canal anteroposterior formado por el flexor corto del dedo gordo y el abductor oblicuo.

INERVACIÓN. Tibial posterior.

ACCIÓN. — Dobla las falanges del dedo gordo y las de los demás dedos (por la anastomosis que envía al flexor tibial). Secundariamente extiende el pie sobre la pierna.

7° Tibial posterior. Músculo largo, se extiende desde la cara posterior de la pierna al borde interno del pie.

INSERCIÓNES. *Por arriba*, en la línea oblicua de la tibia, y por debajo de ella, en la cara posterior de la tibia, en el peroné y en el ligamento interóseo. *Por abajo* el músculo va a parar al tendón que rodea el maléolo interno y va al tubérculo del escafoides, en donde termina.

RELACIONES. — Dos porciones. *En la pierna* está situado entre los dos flexores largos y cubierto por ellos, por el sóleo y por los vasos y nervios tibiales posteriores. *En la garganta del pie* corre a lo largo del borde posterior del maléolo interno.

INERVACIÓN. — Tibial posterior.

ACCIÓN. — Extensor, aductor y rotador del pie hacia dentro.

D Correderas y sinoviales de los tendones de los músculos de la pierna

1.º **Correderas tendinosas, ligamentos anulares.** En el tarso, los tendones están aplicados contra el plano osco por tres ligamentos anulares:

a) *Ligamento anular anterior*, que nace en la apófisis mayor del calcáneo y forma dos planos, superficial y profundo. Entre los dos planos existen tres correderas tendinosas, limitadas por prolongaciones fibrosas: la *interna*, para el tibial anterior; la *media*, para el extensor largo propio (el paquete vascularnervioso pasa por debajo); la *externa*, para el extensor común y el peroneo anterior.

b) *Ligamento anular externo*, que va del maléolo externo a la cara externa del calcáneo; existe un tabique que forma dos vainas: la *superior*, para el peroneo lateral corto, y la *inferior*, para el peroneo lateral largo.

c) *Ligamento anular interno*, que va desde el maléolo interno al calcáneo, parten de él dos tabiques, que forman tres correderas: la *primera*, para el tibial posterior; la *segunda*, para el flexor tibial, y la *tercera*, para el flexor peroneo. Los vasos están situados entre estas dos últimas correderas, pero son más superficiales.

2.º **Sinoviales tendinosas.** Cada una de estas correderas está tapizada por una sinovial. Son *tres* en la región anterior; *una* en la región externa, que se desdobra en la parte inferior, y *tres* en la cara interna. Envuelven los tendones de estas correderas en un trayecto más o menos largo, en general no se extienden más allá de los dedos *por arriba* y *por abajo* del ligamento anular.

E. Aponeurosis de la pierna

La aponeurosis tibial forma un manguito alrededor de la pierna. *Por arriba* se inserta en las cabezas de la tibia y del peroné y en la rótula (continuándose sobre la aponeurosis femoral). *Por abajo* forma los ligamentos anulares. Su *superficie externa* está en relación con el tejido celular subcutáneo y con la piel. De su *cara interna* parten dos tabiques llamados *tabiques intermusculares* que dividen la pierna en las tres regiones descritas anteriormente.

4. MÚSCULOS DEL PIE

Son en número de veinte y se hallan repartidos en cuatro regiones: 1.^a, *región dorsal*; 2.^a, *región plantar interna*; 3.^a, *región plantar externa*; 4.^a, *región plantar media*.

A. *Región dorsal*

La región dorsal del pie comprende sólo un músculo, el *músculo pedio* o *extensor corto de los dedos del pie*.

Músculo pedio. — Músculo aplanado y delgado, extendido sobre el dorso del pie.

INSERCIÓNES. *Por detrás* se inserta en la parte anterosuperior del calcáneo. *Por delante* se divide en cuatro tendones, que van a insertarse: el primero, en la base de la primera falange del dedo gordo, los otros tres en los tres dedos siguientes, confundiendo con los tendones extensores procedentes de la pierna.

RELACIONES. — Cubierto por una aponeurosis y por los tendones extensores de los dedos, cubre a su vez al esqueleto. Su borde interno, paralelo al tendón del extensor largo del dedo gordo, está en relación con la arteria pedia. Su borde externo corresponde al cuboide y al quinto metatarsiano.

INERVACIÓN. — Tibial anterior.

ACCIÓN. — Es extensor de los cuatro primeros dedos.

B. *Región plantar interna*

Consta de tres músculos: el *aductor del dedo gordo*, el *flexor corto del dedo gordo* y el *abductor del dedo gordo*.

1.° **Aductor del dedo gordo del pie.** — Músculo superficial que ocupa toda la longitud del pie.

INSERCIÓNES. — *Por detrás*, bajo la tuberosidad interna del calcáneo y en la cara profunda de la aponeurosis plantar; *por delante*, en la parte interna (sesamoides) de la primera falange del dedo gordo.

RELACIONES. — Cubierto por una aponeurosis, cubre a su vez los demás músculos de la región. Por su borde interno está en relación con la pie; por su borde externo, con el flexor corto y con el tendón del flexor largo de los dedos.

INERVACIÓN. Plantar interno.

ACCIÓN — Es flexor y aductor del dedo gordo.

2.º **Flexor corto del dedo gordo.** — Situado debajo del precedente, pero más corto que éste.

INSERCIÓNES — Por detrás, en la cara inferior del cuboide y del tendón del tibial posterior; por delante, se divide en dos fascículos, uno *interno*, que se une al tendón del aductor, y otro *externo*, que se une al músculo abductor y se inserta, como éste, en el sesamoideo externo y en la parte externa de la primera falange.

RELACIONES — Cubierto por el aductor y el tendón del flexor largo, que corre entre sus dos porciones, cubre el primer metatarsiano y el tendón del peroneo lateral largo. Está comprendido entre el abductor y el aductor.

INERVACIÓN — Plantar interno (fascículo interno) Plantar interno o externo (fascículo externo)

ACCIÓN. — Flexiona el dedo gordo.

3.º **Abductor del dedo gordo.** Situado por fuera del precedente, es el homólogo del aductor del pulgar.

INSERCIÓNES — Consta de dos fascículos: el *abductor oblicuo*, que sale de la cara inferior del cuboide y de la extremidad posterior de los metatarsianos tercero y cuarto, y el *abductor transverso*, que se inserta en los tejidos fibrosos de las articulaciones metatarsofalángicas de los tres últimos dedos. Por delante, el abductor oblicuo termina en el sesamoideo externo y el abductor transverso termina en parte en el tendón del extensor largo y en parte en la vaina del flexor largo del dedo gordo.

RELACIONES. — Cubierto por el flexor corto plantar y por los tendones del flexor largo, cubre a su vez el esqueleto.

INERVACIÓN — Plantar externo.

ACCIÓN — Es flexor y abductor del dedo gordo.

C. Región plantar externa

Comprende tres músculos: el *abductor del dedo pequeño*, el *flexor corto del dedo pequeño* y el *oponente del dedo pequeño*.

1.º **Abductor del dedo pequeño.** Es el más superficial y el más largo del grupo externo.

INSERCCIONES — *Por detrás* se inserta en la tuberosidad externa del calcáneo, *por delante*, en la parte externa de la extremidad posterior de la primera falange del dedo pequeño.

RELACIONES — Cubierto por la aponeurosis, cubre a su vez el accesorio del flexor largo y el peroneo lateral largo. Su borde interno está en relación con el flexor corto plantar.

INERVACIÓN. Plantar externo.

ACCIÓN — Es flexor y abductor del dedo pequeño.

2.º Flexor corto del dedo pequeño. — Situado debajo del precedente, es más corto y más delgado que este.

INSERCCIONES. *Por detrás* se inserta en la vaina del peroneo lateral largo y en la extremidad posterior del quinto metatarsiano, y *por delante*, en la extremidad posterior de la primera falange del dedo pequeño.

RELACIONES — Está comprendido entre el músculo precedente y el plano óseo.

INERVACIÓN — Plantar externo.

ACCIÓN — Flexor del dedo pequeño.

3.º Oponente del dedo pequeño. Situado por dentro de precedente, se confunde con él. Inserción inferior, borde externo de quinto metatarsiano. Inervado por el plantar externo.

D. Región plantar media

Comprende: 1.º flexor corto plantar, 2.º accesorio del flexor largo, 3.º, lumbricales, 4.º, interóseos.

1.º Flexor corto plantar. — Músculo aplanado, de forma cuadrilátera, que ocupa el plano superficial de esta región.

INSERCCIONES — *Por detrás* se inserta en el calcáneo (tuberosidad interna) y en la cara profunda de la aponeurosis plantar. *Por delante* termina en cuatro tendones delgados, que se insertan en la extremidad posterior de la segunda falange de los cuatro últimos dedos.

RELACIONES — Separado de la piel solamente por la aponeurosis plantar, cubre los órganos de la planta del pie. A cada lado confina con los bordes de las regiones plantares interna y externa.

INERVACIÓN — Plantar interno.

ACCIÓN — Dobla los cuatro últimos dedos.

2° Accesorio del flexor largo (cuadrado carnoso de Silvio). Músculo muy pequeño, aplanado y cuadrilátero.

INSERCIÓNES. *Por detrás* se inserta por dos fascículos en la tuberosidad interna y en la tuberosidad externa del calcáneo; *por delante*, se fija en el tendón del flexor común de los dedos.

RELACIONES. — Separado del músculo precedente por el nervio y los vasos plantares externos, descansa sobre el calcáneo.

INERVACIÓN. — Plantar externo (fascículo externo). Plantar interno (fascículo interno).

Acción. — Es auxiliar del flexor largo.

3° Lumbricales del pie. — En número de cuatro, son análogos a los de las manos.

INSERCIÓNES. — Todos nacen, *por detrás*, de dos tendones inmediatos al flexor profundo, excepto el primero, que se inserta solamente en el tendón del segundo dedo. *Por delante* se insertan en la extremidad posterior de la primera falange como también en el tendón extensor del dedo correspondiente.

RELACIONES. Cubren el abductor del dedo gordo y los interóseos.

INERVACIÓN. — Plantar interno para los dos lumbricales internos. Plantar externo para los dos lumbricales externos.

Acción. — Flexionan la primera falange y extienden las otras dos.

4° Interóseos del pie. Lo mismo que en la mano, existen siete músculos interóseos, tres *interóseos plantares* y cuatro *interóseos dorsales*. Su disposición es la misma que en la mano, pero en el pie pasa por el segundo dedo en vez de pasar por el dedo medio. (*Observación* el dedo gordo no tiene interóseo, ni plantar, ni dorsal; el segundo dedo no tiene interóseo plantar, pero en cambio tiene dos dorsales, el quinto no tiene interóseo plantar, y ni interóseo dorsal.)

INSERCIÓNES. — Recuerdan las de los interóseos de la mano.

a) *Interóseos plantares.* — El primero se extiende desde el tercer metatarsiano (cara interna) al tercer dedo. El segundo, desde el cuarto metatarsiano (cara interna), al cuarto dedo. El tercero, desde el quinto metatarsiano (cara interna) al quinto dedo.

b) *Interóseos dorsales.* — El primero se inserta en una parte de la cara externa del primer metatarsiano y en la cara interna del segundo, yendo a parar al segundo dedo. El segundo se inserta en una parte de la cara interna del tercer metatarsiano y en la cara externa

del segundo, yendo igualmente a parar al segundo dedo. El *tercero* se inserta en una parte de la cara interna de. cuarto metatarsiano y la cara externa del tercero, yendo a parar al tercer dedo. El *cuarto* se inserta en una parte de la cara interna del quinto metatarsiano y en la cara externa del cuarto, para terminar en el cuarto dedo.

RELACIONES. — Corresponden por su cara dorsal al musculo pedio y por su cara plantar a los órganos de la planta del pie.

INERVACIÓN. — Rama profunda del plantar externo.

ACCIÓN. — Flexionan la primera falange y extienden las otras dos.

E. Aponeurosis del pie

Se dividen, como en la mano, en *aponeurosis de la region plantar* y *aponeurosis de la region dorsal*.

1.º *Aponeurosis de la región plantar.* — Son dos: una *superficial* y la otra *profunda*.

A. APONEUROSIS PLANTAR SUPERFICIAL. — Es análoga a la de la mano y se consideran en ella tres porciones:

a) *Aponeurosis plantar media*. — Tiene forma triangular y se extiende desde las tuberosidades calcáneas a los dedos. A nivel de las extremidades metatarsianas, se divide en *cintulas prehendinosas* análogas a las de la mano. Sus fibras transversales, largas y cortas, forman, como en la mano, 1.º, los *arcos digitales*, para los tendones flexores; 2.º, los *arcos interdigitales*, para los vasos y nervios colaterales. La aponeurosis media, tanto por dentro como por fuera, se fusiona con la aponeurosis interna y externa.

b) *Aponeurosis plantar interna*. — Se extiende de la tuberosidad interna del calcáneo a la raíz del dedo gordo. Delgada en su parte posterior, se vuelve considerablemente gruesa en la parte anterior. Cubre los músculos de la región anterior.

c) *Aponeurosis plantar externa*. — Se extiende desde la tuberosidad externa del calcáneo hasta la raíz del dedo pequeño. Muy gruesa en su parte posterior, se adelgaza en la anterior. Cubre los músculos de la región externa.

d) *Compartimientos aponeuróticos*. — De las líneas de fusión de la aponeurosis media con las aponeurosis laterales se desprenden dos *tabiques fibrosos*, que van a insertarse en el esqueleto; de este modo la planta del pie queda dividida en *tres compartimientos* medio interno y externo.

B APONEUROSIS PLANTAR PROFUNDA. Esta en relación con los músculos interóseos y con los metatarsianos que los separan (*aponeurosis interósea* de algunos autores) Se extiende desde el borde interno del quinto metatarsiano al borde externo del primero.

2.º Aponeurosis de la región dorsal. En número de tres, que, desde la superficie a la profundidad, son:

a) *Aponeurosis dorsal superficial*, prolongación de la aponeurosis tibial. Se pierde, hacia delante, en los metatarsianos y en las falanges, y se fija, por fuera y por dentro, en los bordes interno y externo del pie.

b) *Aponeurosis media*, que cubre el músculo pedio y la arteria pedia; se inserta, por fuera, en el borde externo del pie, y por dentro se fusiona con la aponeurosis precedente, a nivel del tendón del extensor propio del dedo gordo.

c) *Aponeurosis dorsal profunda* que se extiende por delante de los músculos interóseos dorsales.

LIBRO IV

ANGIOLOGIA

La angiología tiene por objeto el estudio de los órganos destinados a la circulación de la *sangre*, del *quilo* y de la *linfa*.

Para la sangre el aparato circulatorio comprende: 1.º, un órgano central de impulsión, el *corazón*, 2.º, un sistema de conductos que, partiendo del corazón vuelven al mismo (circulación mayor y menor), y toman sucesivamente los nombres de *arterias*, *capilares* y *venas*.

Respecto al quilo y la linfa, estos líquidos circulan por un sistema de conductos especiales que se designan con el nombre de *linfáticos*.

En cuatro secciones distintas estudiaremos sucesivamente, 1.º, el *corazón*, 2.º, las *arterias*, 3.º, las *venas*, 4.º, los *linfáticos*. Los *capilares* por ser principalmente del dominio de la histología, serán omitidos.

PRIMERA SECCION

CORAZON

El corazón es un músculo hueco que desempeña las funciones de una bomba aspirante e impelente, atrayendo a sus cavidades la sangre que circula por las venas y lanzándola, por medio de las dos arterias aorta y pulmonar, a todas las redes capilares. Consta de dos partes: 1.º, una masa contráctil, el *corazón* o *miocardio*, cubierta de una membrana, el *endocardio*, 2.ª, una serosa que lo rodea, el *pericardio*.

ARTÍCULO PRIMERO

CORAZON

El corazón se compone de dos partes: *corazón derecho* (sangre venosa) y *corazón izquierdo* (sangre arterial), que se subdividen a su vez en dos cavidades superpuestas (*aurecula* y *ventrículo*). Cada aurecula comunica con el ventrículo correspondiente por el *orificio auriculo-ventricular*. Los dos corazones, derecho e izquierdo, están separados uno de otro por un tabique vertical (*tabique interauricular* por arriba y *tabique interventricular* por abajo).

I. CONSIDERACIONES GENERALES

1.º Situación. — El corazón está situado en la parte media de la cavidad torácica, encima del diafragma, delante de la columna vertebral, detrás del esternón y entre los dos pulmones (*mediastino*). Lo mantienen en su posición: 1.º, los grandes vasos que de él salen; 2.º, el saco fibroso que lo rodea, e. pericardio

2.º Forma, orientación. — El corazón tiene la forma de un cono aplanado de delante atrás, su base mira hacia arriba, a la derecha y atrás; su vértice, hacia abajo, a la izquierda y adelante. Está inclinado sobre el plano medio y forma con el plano horizontal un ángulo de 40°

3.º Coloración. Varía entre el rosa claro y el rojo obscuro, su superficie exterior está sembrada de tejido adiposo.

4.º Volumen, peso. — En el adulto, el corazón pesa 275 gramos; mide 98 milímetros de altura y 105 de amplitud. En la mujer, las dimensiones son algo más reducidas. En los dos sexos las cifras aumentan desde el nacimiento hasta la vejez. La capacidad del corazón derecho siempre es mayor que la del izquierdo

2. CONFIGURACIÓN EXTERIOR Y RELACIONES.

En el corazón pueden considerarse: 1.º, *tres caras*, anterior, posteroinferior e izquierda; 2.º, *tres bordes*, derecho, superior izquierdo e inferior izquierdo; 3.º, *una base*, 4.º, un *vértice* o *punta del corazón*.

1.º Cara anterior o esternocostal. Es convexa, se halla dirigida hacia arriba, adelante y a la derecha. Presenta un surco que va del vértice del corazón al origen de la arteria pulmonar; es el *surco interventricular anterior*, que aloja los vasos coronarios anteriores, nervios y linfáticos. Un surco transversal, el *surco auriculoventricular*, separa la aurícula del ventrículo correspondiente. Se encuentran en esta cara por debajo del surco auriculoventricular: 1.º, la cara anterior del ventrículo derecho; 2.º, una pequeña porción del ventrículo izquierdo. Por encima del surco auriculoventricular: 1.º, el origen de la arteria pulmonar por delante; 2.º, el origen de la aorta; 3.º, más hacia atrás la cara anterior de las aurículas. Por delante y por dentro de las aurículas existen dos prolongaciones huecas o *apéndices auriculares* que rodean la aorta y la arteria pulmonar. Estas arterias se encuentran en una especie de cinturón circular formado por las aurículas y los apéndices auriculares, pero que es incompleto en la parte anterior.

La cara anterior del corazón está en relación con los pulmones, la pleura y la pared anterior del tórax. La parte del tórax que cubre el corazón lleva el nombre de *espacio precordial* y está limitada por una línea que, partiendo del borde superior del tercer cartilago costal derecho (a un centímetro del borde derecho del esternón), gana la articulación condroesternal derecha (quinto cartilago), se dirige al borde superior del quinto cartilago costal izquierdo, a 8 centímetros por fuera de la línea medioesternal (punta del corazón), y luego se dirige hacia arriba, hasta el segundo espacio intercostal izquierdo, a dos centímetros del borde izquierdo del esternón, para volver a su punto de partida.

2.º Cara posteroinferior o diafragmática.—Pertenece casi exclusivamente a la cara inferior de los ventrículos, estando dividida en dos partes por el surco auriculoventricular posterior o coronario, surco transversal que aloja, a la derecha, la arteria coronaria derecha, y a la izquierda, la arteria coronaria izquierda y la gran vena coronaria. Por encima del mismo se halla la parte inferior de las dos aurículas, separadas por el *surco interauricular*. Por debajo, los dos ventrículos están separados el uno del otro por el surco interventricular posterior: el ventrículo izquierdo toma una parte mayor que el ventrículo derecho en la construcción de esta cara. La cara posteroinferior del corazón descansa sobre el diafragma por mediación del pericardio.

3.º **Cara izquierda o pulmonar.**—Esta cara izquierda o pulmonar es convexa en sentido vertical y se halla en relación con la cara interna del pulmón izquierdo que se ahueca para recibirla (lecho del corazón)

4.º **Bordes.**— En número de tres: derecho, superior izquierdo e inferior izquierdo. El *borde derecho* es delgado y descansa sobre el diafragma su extremidad posterior corresponde a la desembocadura de la vena cava inferior; su extremidad anterior corresponde a la punta del corazón. Los dos *bordes izquierdos, inferior y superior*, que están poco marcados, se hallan en relación con el pulmón izquierdo

5.º **Base.**— Formada por la cara posterior de las aurículas, mira hacia atrás, a la derecha y ligeramente hacia arriba. Observamos en ella de derecha a izquierda: 1.º, en la parte alta, la desembocadura de la vena cava inferior; 2.º el surco interauricular, ancho, oculto por la desembocadura de las dos venas pulmonares derechas, 3.º, la cara posterior de la aurícula izquierda en relación con el esófago (impresión); 4.º, la desembocadura de las dos venas pulmonares izquierdas.

6.º **Vértice.** El vértice está dividido en dos partes por los dos surcos interventriculares, siendo la izquierda la más prominente. Corresponde, un poco por debajo y por dentro de la tetilla, al cuarto o quinto espacio intercostal

3 CONFIGURACIÓN INTERIOR

Interiormente se distinguen en el corazón cuatro cavidades: dos superiores, las *aurículas*, y dos inferiores, los *ventrículos*. Aurículas y ventrículos están separados, como hemos dicho ya, por un tabique llamado, respectivamente, *interventricular* e *interauricular*.

A. Ventrículos

Encontramos en ellos *caracteres comunes* y *caracteres particulares* de cada uno, que permiten reconocerlos

1.º **Caracteres comunes a los dos ventrículos.**—Los ventrículos forman dos cavidades conoides de base superior y vértice dirigido hacia la punta del corazón.

A. ORIFICIOS DE LOS VENTRÍCULOS — Los ventrículos se comunican: 1.º, con la aurícula correspondiente por el orificio *auriculo-*

ventricular, 2.º, con la arteria a que de cada uno emana por el *orificio arterial*.

B VÁLVULAS Estos orificios tienen válvulas que en estado normal cierran siempre suficientemente.

a) *Válvulas auriculoventriculares* — Tienen forma de embudo membranoso que penetra en el ventrículo por su vértice y tiene fija la base en el contorno del orificio auriculoventricular. En cada una hay una *cara interna* o auricular, una *cara externa* o ventricular, un *borde adherente* y un *borde libre*, que flota dentro del ventrículo.

b) *Válvulas arteriales o sigmoideas* — Estas forman, en el origen de la aorta o de la pulmonar, tres pliegues membranosos en forma de nido de paloma. En cada una hay que considerar un *borde adherente*, fijo al contorno del orificio arterial; un *borde libre*, una *cara axil* y una *cara parietal*. El borde libre de las válvulas presenta, en su parte media, una pequeña masa fibrosa o nódulo (*nódulo de Arancio* en la aorta y *de Morgagni* en la arteria pulmonar), destinada a hacer más perfecta la oclusión del vaso. Entre la cara parietal de las sigmoideas y la pared del vaso se encuentran cavidades en forma de saco, que se llaman *senos de Valsalva*. Cada válvula sigmoidea está separada de la inmediata por un espacio triangular de base dirigida hacia abajo; el conjunto de estos espacios forma el *conducto valvular*.

C COLUMNAS CARNOSAS DEL CORAZÓN — En el interior de los ventrículos se ve un sistema de eminencias y prolongaciones que le dan un aspecto reticulado: las *columnas carnosas del corazón*. Las hay de tres categorías: 1.º, *columnas carnosas de primer orden*, que se insertan, de una parte en la pared del ventrículo, y de otra parte, en las válvulas auriculoventriculares por una serie de pequeños cordones tendinosos, y se llaman *piñares del corazón*; 2.º, *columnas carnosas de segundo orden*, cuyas dos extremidades se insertan en la pared ventricular, teniendo libre su parte media; 3.º *columnas carnosas de tercer grado*, que forman cuerpo con la pared dentro de la cual parecen esculpidas. Es de notar que las columnas del corazón son más abundantes en la punta.

2.º Caracteres particulares del ventrículo derecho. En el ventrículo derecho hay que considerar, como en toda pirámide triangular, *tres paredes*, *tres ángulos*, *vértice* y *base*.

A. PAREDES Son tres: 1.º, *pared interna*, convexa hacia la cavidad ventricular; 2.º, *pared anterior*, de cada, comprendida entre el surco interventricular y el borde derecho del corazón; 3.º, *pared*

posterior, igualmente delgada y que va del borde derecho del corazón al surco interventricular posterior. Cada una de estas tres paredes tiene la forma de un triángulo, cuya base corresponde a la base del ventrículo, están tapizadas de columnas carnosas, sobre todo en la punta.

B ÁNGULOS. Son tres: anterior, posterior y externo, y corresponden al punto de unión de las paredes entre sí. Como los ángulos anterior y posterior son agudos y el ángulo externo es obtuso, el corte del ventrículo derecho representa una especie de media luna.

C VERTICE. — Corresponde a la parte inferior de los dos surcos interventriculares. Está ocupado por numerosas trabéculas, que le dan un aspecto cavernoso.

D BASE. — Presenta dos orificios: el orificio auriculoventricular y el orificio de la arteria pulmonar.

a) *Orificio auriculoventricular derecho, válvula tricuspidé.* — El orificio auriculoventricular derecho, situado por detrás y a la derecha del orificio aórtico, mide 120 milímetros de circunferencia en el hombre y 105 en la mujer. La válvula, que ofrece todos los caracteres generales indicados anteriormente, está formada de tres valvas, y de ahí su denominación de *válvula tricuspidé*. Estas tres valvas son: una *anterior*, la más extensa, que corresponde a la pared anterior del ventrículo; otra *posterior*, que corresponde a la pared posterior del ventrículo y la otra *interna*, situada entre los dos precedentes, que es la más pequeña. Además, existen dos *lengüetas valvulares accesorias*.

b) *Pilares del ventrículo derecho.* — Tres grupos. *Pilar anterior*, muy voluminoso, que, naciendo aproximadamente en la parte media de la pared anterior del ventrículo, se inserta, por una docena de cordones tendinosos, en la parte externa de la valva anterior de la tricuspidé y también en la parte externa de la valva posterior. De la base del pilar anterior se destaca una columna carnosa de segundo orden: el *fascículo arqueado*, cóncava hacia arriba y atrás. *Pilares posteriores* son tres; se desprenden de la pared posterior del corazón y se insertan en la valva posterior y en la valva interna. *Pilares internos* forman pequeños cordones tendinosos que se desprenden del tabique y van a la valva interna; uno de estos pilares ocupa el *infundíbulo* y se le denomina *músculo papilar del cono arterial*.

c) *Cono pulmonar o infundíbulo.* El orificio de la arteria pulmonar se halla precedido de una región en forma de embudo, el cono pulmonar o infundíbulo. Se observa aquí la cresta supraventricular de His o espolón de Wolf, que lo separa del orificio auriculoventricular. Por debajo de este relieve, la fosilla subinfundibular se prolonga hasta

la parte inferior de la valva interna. La cara interna del cono arterial está constituida por la pared interventricular y la pared anterior por la pared anterior del ventrículo.

d) *Orificio de la arteria pulmonar.* Está situado por delante de la aorta, por delante y un poco por dentro del orificio auriculoventricular derecho, y mide 70 milímetros de circunferencia. Las *tres válvulas sigmoideas* son una anterior y las otras dos posteriores. Su borde libre presenta el llamado *nódulo de Morgagni*. El orificio de la arteria pulmonar y el auriculoventricular no están en un mismo plano; el orificio arterial se halla más elevado, entre ellos se encuentra un fascículo carnoso (*fascículo innominado*), cuya parte media forma prominencia dentro del ventrículo (*espón de Wolf*). La porción del ventrículo comprendida entre ambos orificios tiene forma de embudo y constituye el vestíbulo de la arteria pulmonar, llamado *infundíbulo*.

E. CAVIDAD DEL VENTRÍCULO DERECHO. — Está dividida por la valva anterior de la tricúspide en dos segmentos o cámaras, una de *entrada* y otra de *salida*: 1.º, sobre el corazón mantenido *in situ*, la *cámara de entrada* o cámara venosa es inferior y posterior con relación a la región de salida; se halla por detrás de la tricúspide; su eje es paralelo al del corazón, 2.º, la *región de salida* o cámara pulmonar es anterior y su eje es casi perpendicular al precedente. Las dos cámaras comunican entre sí por un orificio limitado, por arriba, por la cresta supraventricular y la valva anterior; por abajo y por delante por el fascículo arqueado y la pared del tabique.

3.º **Caracteres particulares del ventrículo izquierdo.** Situado a la izquierda y un poco por encima del ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo tiene también la forma de un cono.

A. PAREDES. — Las paredes de este ventrículo son muy gruesas y pueden distinguirse en *interna, externa, anterior y posterior*. Todas son más o menos cóncavas y están cubiertas de columnas carnosas, excepto la parte superior de la pared interna.

B. VÉRTEX. — Corresponde a la punta del corazón y está ocupado por columnas carnosas, pero en menor número que en el ventrículo derecho.

C. BASE. — La base tiene dos orificios, orificio auriculoventricular y orificio de la aorta.

a) *Orificio auriculoventricular izquierdo, válvula mitral.* — Es un poco más estrecho que el orificio del lado derecho (102 milímetros

de circunferencia en el hombre, 90 en la mujer). La válvula se compone de dos valvas y de ahí el nombre de *válvula bicúspide* o *mitral*; la *valva izquierda* corresponde a la pared externa de ventrículo y es cuadrilátera; la *valva derecha* o *valva mayor*, más voluminosa, es triangular y separa el orificio auriculoventricular del orificio aórtico. Estas dos valvas tienen lengüetas accesorias que las completan.

b) *Pilares del ventrículo izquierdo*. — Se ven en el ventrículo izquierdo dos pilares, uno anterior y otro posterior, que se desprenden de las paredes anterior y posterior del ventrículo. El pilar anterior se inserta en la parte anterior de las dos valvas; el pilar posterior, en la parte posterior. En la valva interna se insertan únicamente en su borde inferior; en la valva externa cubren toda la pared externa, lo cual le da un aspecto reticulado.

c) *Orificio aórtico*. — Está situado por delante y por dentro del orificio auriculoventricular, en el mismo plano horizontal. Mide de 65 a 70 milímetros de circunferencia. Tiene tres válvulas sigmoides, resistentes, que presentan en su borde libre el *nódulo de Arancio*. Estas válvulas, por razón de su situación, son una posterior y las otras dos anteriores.

D. *CAVIDAD VENTRICULAR*. — La valva mayor de la mitral divide el ventrículo izquierdo en dos cámaras, una arterial o aórtica y otra venosa o auricular. 1.º, la *cámara auricular*, situada entre la valva mayor de la mitral y la parte externa de ventrículo, es posterior con relación a la cámara arterial; 2.º, la *cámara aórtica* se halla comprendida entre el tabique interventricular por dentro y la valva mayor de la mitral por fuera y continua hacia abajo por el sistema de pilares. Tiene la forma de una canal dirigida en sentido vertical. El orificio aórtico ocupa el vértice de la cámara.

4.º *Tabique interventricular*. — Es una lámina triangular, cuya base corresponde a las aurículas y el vértice a la punta del corazón; es fuertemente convexa hacia la derecha. Su grosor es variable: en su extremidad inferior alcanza su máximo y luego se atenúa a medida que se aproxima al tabique interauricular. Así resultan dos porciones diferentes: 1.ª, una, inferior, gruesa (*porción muscular*); 2.ª, la otra, superior, delgada (*porción membranosa*). Esta última está situada por debajo de las sigmoides aórticas; es triangular, su cara derecha, la superior, es uniforme, presta inserción a la valva interna de la tricúspide, su cara izquierda es cóncava, corresponde a una depresión de la pared y se llama *falta subsigmoidea*. A la izquierda, la porción membranosa del

tabique está comprendida por completo en la pared interna de este ventrículo; a la derecha corresponde al ventrículo derecho y en parte también a la aurícula derecha, de modo que la parte más superior del ventrículo izquierdo está en relación con la aurícula derecha.

B. Aurículas

Las aurículas, lo mismo que los ventrículos, presentan *caracteres comunes y caracteres particulares*.

1.º **Caracteres comunes a las aurículas.** — Las aurículas forman unas cavidades irregularmente cuboideas de paredes delgadas, sin columnas carnosas de primer orden y con orificios de dos órdenes; primeramente el orificio auriculoventricular y luego orificios venosos.

2.º **Caracteres particulares de la aurícula derecha.** — Tiene la forma de un saco cuyo diámetro mayor es vertical. Presenta dos porciones de aspecto distinto: una, lisa y uniforme, se extiende entre la desembocadura de las dos venas cavas; otra, que ocupa el resto de la aurícula, está surcada de numerosos relieves. Están separadas por la *crista terminalis*. Se distinguen en esta aurícula seis paredes:

a) *Pared externa* — Cóncava, ocupada por relieves de los músculos pectíneos.

b) *Pared posterior* — Presenta la *crista terminalis*, que desciende desde la desembocadura de la cava superior a la de la cava inferior. Entre los orificios de las dos venas cavas se halla el *tubérculo de Lower*.

c) *Pared inferior*. Presenta dos orificios: 1.º, el *orificio de la vena cava inferior* (27 a 37 milímetros) está provista de una válvula en forma de semiluna, cuyas extremidades se pierden, la posterior en la *crista terminalis*, la anterior en el anillo de Vieussens; es la *válvula de Eustaquio*, siempre insuficiente; 2.º, el *orificio de la vena coronaria* situado por debajo y un poco por dentro del precedente circular, de 10 a 12 milímetros. Se halla también provisto de una válvula, la *válvula de Thebesio*, siempre insuficiente.

Cerca de la válvula de Eustaquio se ve a menudo un pequeño repliegue que se dirige hacia delante, la *banda del seno*.

d) *Pared superior* — Techo o cúpula de la aurícula presenta el *orificio de la vena cava superior*, orificio circular (18 a 22 milímetros) desprovisto de válvula. Por de ante de este orificio se encuentra el orificio de la aurícula derecha, orificio oval de eje mayor vertical.

e) *Pared anterior*. Corresponde al orificio auriculoven-tricular anillo iso, ligeramente oval, más bajo hacia dentro.

f) *Pared interna*. — Corresponde al tabique interauricular. En su parte media presenta una depresión, la *fosa oval*. A este nivel es una pared muy delgada, semitransparente, formada por adosamiento de dos membranas que tapizan las aurículas (*membrana de la fosa oval*). La fosa está circunscrita por un relieve muscular, el *anillo de Vieussens*, marcado principalmente en su parte anterior. La rama superior del anillo se continua con el tubérculo de Lower, la rama inferior está en conexión con la extremidad anterior de la válvula de Eustaquio. En este punto la membrana de la fosa oval forma con la eminencia muscular, un fondo de saco terminado a veces por un agujero (*agujero interauricular*), que pone en comunicación las dos aurículas. Es reliquia del *agujero de Boial*, que en el feto constituye una más amplia comunicación. En la parte más posterior de la pared interna de la aurícula derecha se encuentra, aunque no siempre, una eminencia muy poco acentuada, el *tubérculo de Lower*, situado entre las dos venas cavas y destinado a dirigir la corriente sanguínea.

3.º **Caracteres particulares de la aurícula izquierda.** — Se estudian en ella *seis paredes*, lisas en toda su extensión, excepto en el apéndice auricular.

a) *Pared inferior*. Se encuentra en ella el orificio auriculoven-tricular izquierdo con la válvula mitral.

b) *Pared superior*. — Se encuentran en esta pared los *cuatro orificios* de las venas pulmonares derechas e izquierdas, dispuestos dos a dos, todos circulares y sin válvulas.

c) *Pared anterior*. — Cóncava, deprimida por los gruesos troncos arteriales que están situados por delante de ella.

d) *Pared posterior*. Casi plana.

e) *Pared externa*. — Se encuentra en ella el orificio que conduce al apéndice auricular, el cual se halla rodeado de algunas cornas carnosas.

f) *Pared interna*. Corresponde al tabique interauricular. Es muy delgada a nivel de la zona que corresponde a la fosa oval. En su parte anterosuperior se ve el agujero interauricular, cuando existe.

4.º **Tabique interauricular.** — Es una lámina irregularmente cuadrilátera que, en la superficie exterior del corazón, corresponde al surco interauricular. Es escaso su espesor (de 1 a 4 mm), particularmente a nivel de la fosa oval. Su morfología la hemos consignado ya

4. CONSTITUCIÓN ANATÓMICA

La constitución del corazón comprende 1.º, formaciones fibrosas dispuestas en forma de anillos, que prestan inserción a un gran número de fibras del miocardio, 2.º, las fibras musculares o miocardio, fibras unidas unas a otras por tejido conjuntivo. Estudiaremos 1.º, las zonas fibrosas del corazón; 2.º, el modo de agrupación de las fibras cardíacas.

1.º Zonas fibrosas del corazón. Hay cuatro *dos zonas auriculoventriculares, y dos zonas arteriales, pulmonar y aórtica*

a) *Zonas fibrosas auriculoventriculares* — Son anillos fibrosos que rodean los orificios auriculoventriculares. El *anillo fibroso derecho* se apoya por delante y por dentro, en el *trígono fibroso derecho*. El resto del contorno es delgado (filo coronario izquierdo y filo coronario derecho).

El *anillo fibroso izquierdo* se apoya por delante y a la izquierda contra el *trígono fibroso izquierdo*. El resto del contorno es delgado y estrecho.

b) *Zonas fibrosas arteriales* — Tienen la forma de un anillo casi circular, constituido por tres arcos que se continúan por sus extremidades y de los que cada uno corresponde a la inserción de una de las válvulas sigmoideas. Estos anillos representan simples engrosamientos fibrosos localizados en los orígenes de la aorta y de la arteria pulmonar.

No son bastante resistentes, no más resistentes que las zonas fibrosas auriculoventriculares, para ofrecer un punto de apoyo particularmente fijo a las fibras cardíacas que terminan en el mismo. El basamento más sólido está constituido por los dos triángulos fibrosos (véase anteriormente), sobre los cuales se apoyan la parte posterior de la aorta y los dos orificios auriculoventriculares.

La cara interna de las zonas fibrosas auriculoventriculares da inserción a las válvulas.

2.º Modo de agrupación de las fibras cardíacas. El miocardio está constituido por una red de fibras, ninguna de las cuales está aislada de otras. No obstante, la musculatura de los ventrículos es independiente de la de las aurículas.

4. FIBRAS DE LOS VENTRÍCULOS — Se distinguen tres clases de fibras: 1.º, las fibras en torbellino; 2.º, las fibras de las paredes; 3.º, las fibras interventriculares.

a) *Fibras en torbellino*. Son al principio superficiales y siguen una dirección espiral, que da a la punta el aspecto de remolino. Se distinguen *fibras posteriores*, que parten de la pared posterior de los dos anillos fibrosos, izquierdo y derecho, y *fibras anteriores*, que parten del anillo fibroso izquierdo, de los trigonos fibrosos y de la parte anterior del anillo fibroso derecho. Llegadas al vértice, las fibras penetran en el ventrículo izquierdo, donde contribuyen a formar la parte interna del tabique interventricular; algunas ascienden hasta el anillo fibroso izquierdo.

b) *Fibras parietales*. Situadas por dentro de las precedentes, forman una capa circular densa que envuelve cada ventrículo. Están sobre todo desarrolladas a nivel del ventrículo izquierdo. Presentan a la sección el aspecto de un esfínter. Constituyen la capa más importante desde el punto de vista fisiológico (aparato de propulsión).

c) *Fibras interventriculares*. Nacen del borde inferior y posterior de la porción membranosa del tabique, descienden verticalmente a la punta y se doblan sobre sí mismas en el ventrículo izquierdo para alcanzar, con las fibras parietales, el músculo papilar.

En resumen, existe a) una *capa superficial* hecha a imagen del movimiento de torsión del corazón del vivo; b) una *capa media*, verdadero esfínter, c) una *capa interna*, a cuya formación concurren las dos capas precedentes y las fibras interventriculares.

B. FIBRAS DE LAS AURÍCULAS. Forman dos grupos: las fibras comunes y las fibras propias.

a) *Fibras comunes*. Forman dos fascículos: 1º, el *fascículo interauricular horizontal*, cinta que, de izquierda a derecha, rodea la aurícula izquierda, pasa por delante del apéndice auricular izquierdo y se divide en dos fascículos secundarios, de los cuales uno pasa por delante y otro por detrás de la aurícula derecha; 2º, el *fascículo interauricular vertical*, que describe una asa sobre la cúpula de la aurícula al pasar entre las venas pulmonares derechas y las venas pulmonares izquierdas.

b) *Fibras propias* — Forman anillos alrededor de los vasos que desembocan en las aurículas. Existen además un fascículo propio de la *crista terminalis* y fascículos que constituyen el anillo de Vieussens.

5. SISTEMA DE REGULACIÓN Y MANEO DEL CORAZÓN

Las conexiones entre las aurículas y los ventrículos están aseguradas por un tejido especial, el *tejido noda*. Este se halla repartido

en dos segmentos distintos, a saber: uno especial de la aurícula derecha, el *nudo sinusal* o *nudo de Keith y Flack*, y el otro común a las aurículas y a los ventrículos, denominado *segmento atrioventricular* o *fascículo de His*.

1.º **Nudo sinusal.** — Tiene la forma de hueso (32 milímetros de largo, 3 a 4 milímetros de ancho, 2 milímetros de grosor) extendido desde el ángulo comprendido entre la vena cava superior y la aurícula en la desembocadura de la vena cava inferior. Está irrigado por la *arteria del nudo sinusal*, que procede o más a menudo de la coronaria derecha.

2.º **Segmento atrioventricular. Fascículo de His.** — Este segmento comprende dos partes, el nudo de Aschoff-Tawara y el fascículo de His.

a) *Nudo de Aschoff-Tawara* — Se halla en la parte inferior de la aurícula derecha, empieza por delante y por debajo del orificio de la vena coronaria mayor y termina a la altura de la inserción de la valva interna de la tricúspide.

b) *Fascículo de His.* — Es continuación del nudo de Aschoff; su forma es la de un cordón aplanado y su longitud es de 10 milímetros. Recorre el espesor del miocardio, por debajo del triángulo fibroso derecho, y luego la parte inferior de la porción membranosa del tabique interventricular, donde se divide en dos ramas, una derecha y otra izquierda.

Rama derecha — Cordón situado en el espesor del miocardio, sigue el fascículo arqueado y termina en el pilar anterior, donde abandona sus ramificaciones terminales.

Rama izquierda — Pasa por el espacio intervalvular, comprendido entre la válvula aórtica derecha y la válvula aórtica posterior. Se hace entonces superficial y se divide en dos pinceiros secundarios, uno anterior (hacia el pilar anterior, y otro posterior (hacia el pilar posterior).

Las terminaciones de este sistema de mando forman las fibras de Purkinje, dispuestas en forma de red bajo el endocardio.

El fascículo de His y sus ramas son irrigadas por las arterias del tabique.

Lo mismo que el nudo sinusal, contiene células nerviosas.

b. VASOS Y NERVIOS

A. Arterias coronarias

Las arterias del corazón proceden de las arterias coronarias. Estas son dos: la arteria coronaria izquierda y la coronaria derecha

1.º Arteria coronaria izquierda o anterior. Nace a la altura del seno de Valsalva izquierdo. El tronco, cuya longitud es de un centímetro, pasa entre la aorta y el lado izquierdo de la arteria pulmonar por una parte, y la aurícula izquierda prolongada por el apéndice auricular izquierdo por otra parte. Se divide en dos ramas, la arteria interventricular anterior y la arteria auriculoventricular izquierda, después de haber proporcionado arteriolas para las aurículas y para los vasos (arterias grasosas).

La *arteria interventricular anterior* recorre el surco interventricular anterior, contornea el borde derecho del corazón, cerca de la punta, y termina en la cara posterior del corazón. Proporciona: 1.º, la arteria grasosa de Vieussens; 2.º, ramas ventriculares para las paredes; 3.º, las arterias anteriores del tabique, destinadas únicamente a los dos tercios anteriores del tabique.

La *arteria auriculoventricular izquierda* o rama circunfleja contornea el borde izquierdo del corazón siguiendo el surco coronario. Emite: 1.º, ramos auriculares; 2.º, ramos ventriculares (arteria del borde izquierdo del corazón).

2.º Arteria coronaria derecha o posterior. — Nace a la derecha de la aorta (seno de Valsalva derecho), se coloca en el surco auriculoventricular derecho, rodea el borde derecho del corazón y recorre el surco interventricular posterior. Proporciona: 1.º, colaterales auriculares (arteria auricular derecha anterior, arteria auricular del borde derecho); 2.º, ramas ventriculares, de las que unas nacen de la porción horizontal (arterias del borde derecho, arterias ventriculares posteriores derechas), mientras las otras nacen de la porción vertical (arterias posteriores del tabique que irrigan el tercio posterior del mismo).

3.º Territorios de las coronarias. — La arteria coronaria izquierda irriga la mayor parte del ventrículo izquierdo, los dos tercios anteriores del tabique interventricular y la parte de la cara anterior del ventrículo derecho adyacente al tabique. Irriga además la mayor

parte del pilar anterior del ventrículo derecho, todo el pilar anterior del ventrículo izquierdo y la mayor parte de su pilar posterior. La *coronaria derecha* irriga el resto del corazón. Los pilares reciben arterias de dos procedencias, una de las cuales prepondera.

4.º **Anastomosis de las arterias coronarias.** — Estas anastomosis existen, pero son fisiológicamente insuficientes en la mayor parte de los casos.

B. Venas cardíacas

Las venas cardíacas forman tres grupos: la *vena coronaria mayor*, las *venas cardíacas accesorias* y las *venas de Thebesio*.

1.º **Vena coronaria mayor.** — Nace de la punta del corazón, sigue el surco interventricular anterior, se dobla a nivel de las aurículas, recorre el surco aurículoventricular izquierdo y, al llegar a la cara posterior del corazón, se abre en la aurícula derecha. Pueden, pues, considerarse en ella dos porciones: una ascendente, dentro del surco interventricular, la otra, transversal, dentro del surco aurículoventricular izquierdo.

a) *Seno de la vena coronaria mayor* — No es más que la porción terminal, dilatada, de la vena coronaria mayor. Descansa en el surco aurículoventricular por debajo de la aurícula. Se abre en la aurícula derecha por debajo de la vena cava inferior; su orificio está provisto de una válvula incompleta, la *válvula de Thebesio*. En su extremidad externa existe, a nivel de la desembocadura de la vena de Marshall, una válvula incompleta, la *válvula de Vieussens*. Este seno es más marcado en el recién nacido que en el adulto.

b) *Afluentes de la vena coronaria mayor* — Recibe: 1.º, en su porción ascendente, venas procedentes del ventrículo; 2.º en su porción transversal, venillas procedentes de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo; una de estas últimas es más voluminosa, corre a lo largo del borde izquierdo del ventrículo izquierdo y se llama *vena marginal izquierda*.

c) *Afluentes del seno.* — El seno recibe cuatro ramas: 1.ª, *vena oblicua de la aurícula izquierda* o *vena de Marshall*, que atraviesa diagonalmente la aurícula izquierda, y se abre en el seno algo por delante de la válvula de Vieussens; está situada por debajo del repliegue vestigial del pericardio; 2.ª, *vena posterior del ventrículo izquierdo*, que pasa por la cara posterior del ventrículo izquierdo y se

abre en la parte posterior del seno, 3.^a, *vena interventricular posterior*, que sigue por el surco interventricular posterior y desemboca en el seno, cerca de su terminación, 4.^a, *vena coronaria menor*, que nace del borde derecho y termina cerca de la embocadura del seno. Ninguna de estas venas tiene válvulas, las que a veces se han encontrado en su desembocadura son insuficientes, como las válvulas de Thebesio y Vieussens.

2.º **Venas cardíacas accesorias.** Son venas que se abren directamente en la aurícula derecha. Se distinguen cuatro principales, situadas en la cara anterior del ventrículo derecho. Una de ellas, más voluminosa que las otras, está situada en el borde derecho del corazón y forma la *vena marginal derecha* o *vena de Galeno*. Se abren en la aurícula derecha por orificios especiales, llamados *foramina*. El foramen de la vena de Galeno se encuentra en la base del apéndice auricular.

3.º **Venas de Thebesio.** Son vasos de pequeño calibre, que se abren en las cavidades del corazón, en las aurículas y en los ventrículos, por orificios especiales, los *foramina*. En las aurículas son numerosos e irregulares, se encuentran también en el tabique interauricular. En los ventrículos existen también, y algunos de ellos comunican con las venas propias del corazón, constituyendo así, para ellas, como unos *conductos de seguridad*.

C. Linfáticos

Muy abundantes en el interior del miocardio (*esponja linfática*), desembocan en dos redes, una *subendocárdica* y la otra *subpericárdica*.

1.º **Red subendocárdica.** — Se resume en dos troncos, uno *inferior* y el otro *superior*, que atraviesan el miocardio y desembocan en la red subpericárdica.

2.º **Red subpericárdica.** — Está situada entre la cara externa del miocardio y la hoja serosa del pericardio, y se reúne en dos troncos principales, uno *anterior* y otro *posterior*.

a) **Tronco linfático anterior.** — Nace en la región del vértice del corazón, recorre el surco interventricular y luego al llegar al surco auriculoventricular pasa entre el apéndice auricular derecho y el lado derecho de la arteria pulmonar, rodea la arteria y va a terminar,

a nivel de la bifurcación de la tráquea, en un ganglio. En su trayecto recibe: 1.º, numerosos linfáticos, procedentes de las caras anteriores de los ventrículos. 2.º, un *tronco auriculoventricular*, situado en el surco auriculoventricular, que conduce la linfa de la cara posterior del ventrículo izquierdo.

b) *Tronco linfático posterior*. — Nace en la punta del corazón, recorre el surco interventricular posterior y gana los ganglios subtraqueales, después de haber seguido el surco auriculoventricular y la cara anterior de la aorta. Recibe linfáticos procedentes de una parte del ventrículo derecho. Es de notar que las redes de origen de los troncos linfáticos anterior y posterior se comunican entre sí en las dos caras de corazón y especialmente en la punta.

D. Nervios

Proceden del *plexo cardíaco*, formado por ramas derivadas del neumogástrico y del simpático cervical. Algunas ramas afluyen directamente a las aurículas (*ramas auriculares*), la mayoría sigue el trayecto de las arterias coronarias derecha e izquierda, formando dos plexos: *plexo coronario derecho* y *plexo coronario izquierdo*.

a) *Modo de distribución de los plexos coronarios*. — Estos plexos proporcionan: 1.º, *ramos superficiales o subpericárdicos*, que van por la cara anterior de corazón, siguiendo el trayecto independiente de los vasos y formando un plexo nuevo en las aurículas y en los ventrículos. 2.º *ramos profundos o subendocárdicos*, que corren por la cara externa del endocardio. Estos dos plexos se distribuyen por el miocardio.

b) *Ganglios del corazón*. — Claramente aislados en los batracios, están formados en el hombre por células diseminadas en el plexo subpericárdico, en la superficie de las aurículas y del tercio superior del ventrículo. Esta capa ganglionar parece, por tanto, condensarse en las venas cavas, en las venas pulmonares y en el surco auriculoventricular: los dos primeros grupos, en las aurículas, forman el *ganglio de Remak* y el *ganglio de Ludwig*, y el tercero, en los ventrículos, forma el *ganglio de Bidder*.

7. ENDOCARDIO

El endocardio o túnica interna del corazón tapiza la superficie interior de este órgano. Existen, pues, dos endocardios, uno para el corazón derecho y otro para el corazón izquierdo.

En cada uno de los dos corazones, el endocardio es continuación, por arriba, de la túnica interna de las venas que desembocan en las aurículas. Tapiza en seguida sucesivamente la aurícula, las dos caras axil y parietal de la válvula auriculoventricular, el ventrículo, y por último se continua, a nivel del orificio arterial de esta última cavidad, con la túnica interna de la arteria correspondiente.

Es una membrana delgada, transparente, fuertemente adherida, mas gruesa en las aurículas que en los ventrículos y más gruesa también en el corazón izquierdo que en el derecho.

ARTÍCULO II

PERICARDIO

Es un saco fibroso que envuelve a la vez el corazón y el origen de los vasos que a éste abocan. Se distinguen en él dos porciones: una externa, fibrosa, el *saco fibroso del pericardio*, otra interna, serosa, el *pericardio seroso*.

A. Pericardio fibroso

Mide 12 centímetros de altura por 14 ó 15 de amplitud y tiene la forma de un cono hueco de base inferior y aplanado en sentido antero-posterior. Consideraremos en él: *base, vértice, dos caras y dos bordes*.

1.º **Base.** — Descansa sobre la convexidad del diafragma al que adhiere (*zona de adherencia frenopericárdica*), formando un óvalo irregular cuyo extremo grueso está a la derecha y cuyo eje mayor se dirige hacia delante y a la izquierda. Esta adherencia no es uniforme: es axa en la parte posterior y, al contrario, íntima en la parte anterior.

2.º **Vértice.** Envuelve los grandes vasos que abocan al corazón. Sube: 1.º *hacia delante*, sobre la aorta y la arteria pulmonar, 2.º *hacia atrás*, sobre la rama derecha de este último vaso, 3.º *lateralmente*, sobre las dos venas cavas y las venas pulmonares. Es de notar que el punto por donde más tarde sube es a lo largo de la aorta (*asta superior del pericardio*).

3.º **Cara anterior.** — Es fuertemente convexa y se consideran en ella dos porciones: 1.ª *porción retrapulmonar*, en relación con los

pulmones derecho e izquierdo, 2.ª, *porción extrapulmonar*, situada en la parte media. Esta porción extrapulmonar, en relación con la pared esternocostal, es triangular. Su *vértice*, dirigido hacia arriba, corresponde al origen del tronco braquiocefálico; la *base*, inferior, coincide con la línea de unión del pericardio con el centro frénico. El *borde derecho* está en relación con el borde anterior del pulmón derecho (es vertical y está situado a 10 milímetros del borde derecho del estómago), el *borde izquierdo* es oblicuo hacia abajo y a la izquierda (se aleja de la línea media a medida que desciende y en su parte inferior dista de ella de 8 a 9 centímetros).

4.ª **Cara posterior.** — Está en relación con los órganos del mediastino posterior (esófago, nervios neumogástricos, aorta, ácigos mayor y conducto torácico).

5.ª **Bordes laterales.** — Están en contacto con la pleura mediastínica, que los separa de los pulmones, con el nervio frénico y con los vasos diafragmáticos superiores.

B. Pericardio seroso

Como todas las demás serosas, se consideran en la pericárdica dos hojas: una *parietal* y otra *visceral*, uniéndose entre sí siguiendo una línea muy irregular.

1.ª **Hoja parietal.** — Tapiza exactamente el pericardio fibroso y está íntimamente adherida a él.

2.ª **Hoja visceral.** — Tapiza exactamente la porción ventricular del corazón. En las aurículas se comporta de otro modo. 1.º, *por detrás* tapiza la cara posterior de las aurículas y se refleja sobre las venas cavas y las venas pulmonares; 2.º, *por los lados* tapiza asimismo las caras laterales de las aurículas, y 3.º, *por delante* reviste la cara anterior de las aurículas y presta una vaina a los troncos arteriales (aorta y arteria pulmonar), de suerte que, entre la pared posterior de estas arterias y la cara anterior de las aurículas y de los apéndices auriculares, existe un conducto transversal, el *seno transverso de Theile*, su orificio izquierdo está situado entre la arteria pulmonar y el apéndice auricular izquierdo, su orificio derecho está limitado por la aorta y el apéndice auricular derecho. La hoja visceral es así en toda su extensión, excepto 1.º, en lo que corresponde a la

aorta (*repliegue preaórtico*), 2°, en la cara posterior de la aurícula izquierda (*repliegue vestigial*).

3° Línea de unión de la hoja visceral con la hoja parietal. La línea que marca la reflexión de la hoja visceral para convertirse en hoja parietal es muy irregular. La estudiaremos sucesivamente en la parte anterior y en la parte posterior.

A. EN LA CARA ANTERIOR. — Siguiendo de izquierda a derecha, recorre: la rama izquierda de la arteria pulmonar, la bifurcación de la arteria pulmonar, la aorta, sube en seguida al origen del tronco braquiocefálico y, por último, desciende otra vez sobre la vena cava superior, contorneándola, y llega a la cara posterior.

B. EN LA CARA POSTERIOR. — Desde la vena cava llega a la vena pulmonar derecha superior, la vena pulmonar derecha inferior y la vena cava inferior; luego sube a lo largo de las dos venas pulmonares derechas, desciende otra vez sobre las venas pulmonares izquierdas (formando el gran divertículo posterior de HALLER) y, a nivel del borde inferior de la vena pulmonar izquierda llega al borde inferior de la rama izquierda de la arteria pulmonar.

C. FONDOS DE SACO DEL PERICARDIO. — En total existen tres pedículos vasculares que atraviesan la serosa pericárdica: 1°, un *pedículo arterial* (aorta y arteria pulmonar); 2°, un *pedículo venoso derecho* (vena cava superior, dos venas pulmonares derechas y vena cava inferior); 3°, un *pedículo venoso izquierdo* (dos venas pulmonares izquierdas). En el momento de reflejarse, la serosa envía, entre los vasos precitados, prolongaciones o *fondos de saco*.

a) En el *pedículo arterial* existen dos: uno entre la bifurcación de la arteria pulmonar y la aorta y otro en la parte posterocexterna del tronco braquiocefálico.

b) En el *pedículo venoso derecho* hay tres: uno entre la vena cava superior y la vena pulmonar derecha superior, otro entre las dos venas pulmonares derechas, y el tercero entre la vena pulmonar derecha inferior y la vena cava inferior.

c) En el *pedículo venoso izquierdo* existen dos: uno de ellos está situado entre las dos venas pulmonares izquierdas, y el otro entre la vena pulmonar izquierda superior y la rama izquierda de la arteria pulmonar.

d) Entre los dos *pedículos venosos* existe un divertículo mas grande, que separa el esfago de la cara posterior de las aurículas, llámase *fondo de saco de Haller*.

C. Medios de fijación del pericardio

El pericardio se mantiene fijo en su sitio por expansiones fibrosas, impropriamente llamadas *ligamentos*. Se describen tres

1.º **Ligamentos vertebropericárdicos.** — Son en su disposición muy variables: están representados por un conjunto de fascículos conjuntivos, a menudo muy mal diferenciados, que parten de la cara anterior de las primeras vértebras dorsales para ir a insertarse en la parte anterior del vértice del pericardio.

2.º **Ligamentos esternopericárdicos.** — Son dos: uno superior y el otro inferior. El *ligamento esternopericárdico superior* se destaca de la parte superior de la cara anterior del pericardio y se inserta en el primer cartílago costal (*fascículos costopericárdicos*) y en el manubrio. El *ligamento esternopericárdico inferior* se extiende de la parte anterior del pericardio al apéndice xifoideo.

3.º **Ligamentos frenopericárdicos.** — Son tres: uno anterior y dos laterales. El *ligamento frenopericárdico anterior* está formado por el conjunto de las fibras que unen el diafragma a la base del pericardio. De los *ligamentos frenopericárdicos laterales*, el del lado derecho va desde el centro frénico, por fuera del orificio de la vena cava inferior a la parte derecha del pericardio, y el del lado izquierdo va desde el centro frénico a la parte izquierda del pericardio.

D. Vasos y nervios

1.º **Arterias.** — Para el *saco fibroso*, vienen de las arterias bronquiales, diafragmáticas superiores, tímicas y esofágicas medias. Para la *hoja visceral*, emanan de las arterias del miocardio.

2.º **Venas.** — Las venas desembocan: 1.º, *por detrás*, en las venas álgos; 2.º, *por delante*, en las venas diafragmáticas superiores.

3.º **Linfáticos.** — Desembocan en la red subpericárdica (véase anteriormente).

4.º **Nervios.** — Los de la hoja parietal vienen del nervio frénico, del neumogástrico y del gran simpático. Los de la hoja serosa vienen del plexo cardíaco.

SEGUNDA SECCION

ARTERIAS

Las arterias son conductos membranosos, elásticos, con ramificaciones divergentes, encargados de distribuir por todo el mecanismo la sangre expulsada a cada sístole de las cavidades ventriculares. Las paredes de algunas de las arterias y arteriolas poseen, además de su túnica elástica, una túnica muscular. La nutrición de estas túncas corre a cargo de los *vasa vasorum*, su innervación, al de los *nervi vasorum* (fenómenos vasomotores).

1° **Disposición general.** A medida que se alejan del corazón, las arterias se subdividen en ramificaciones cada vez más tenues, de modo que el sistema aórtico representa, en su conjunto, un árbol cuyo tronco está implantado en el ventrículo izquierdo y las ramificaciones se extienden por todo el organismo. Las arterias dan *ramas terminales* y *ramas colaterales*. Estas últimas pueden seguir un trayecto recurrente (*arteria recurrente*). A medida que las arterias se dividen, la superficie que representa la suma de las secciones en las ramas de bifurcación es mayor que la del tronco generador; de modo que el sistema aórtico puede compararse a un cono cuyo vértice corresponde al origen de la aorta, y la base está representada por la suma de las áreas de todas las arteriolas del organismo.

2° **Conformación exterior.**— Las arterias son en general, tubos redondeados aun en estado de vacuidad, de diámetro variable (de 1 a 8 milímetros). Su dirección es rectilínea; sin embargo, existen flexuosidades arteriales normales (*arteria esplénica*, *torcedora inferior*) y otras patológicas (en los viejos). Algunas arterias son superficiales o

supraaponeuroticas, pero la mayor parte de ellas son profundas o subaponeuróticas.

Entran en relación 1.º, *con los huesos*, en los cuales dejan a veces huellas (aorta en la columna vertebral); 2.º, *con las articulaciones*, de las cuales ocupan ordinariamente la cara de flexión; 3.º, *con los músculos*, por entre los cuales corren (intersticios musculares, músculos satélites) o a veces los perforan (anillo del sóleo); 4.º, *con la piel*, que a veces levantan (tempora superficial); 5.º, *con las venas* que son ordinariamente en número de dos para cada arteria (*venas satélites*); 6.º, *con los nervios*, que se unen frecuentemente a las arterias y a las venas para formar el *paquete vasculonervioso*.

En el curso de su trayecto las arterias se anastomosan entre sí por *anastomosis* (cubital y radiopalma), por *convergencia* (arterias vertebrales). Hay también la *anastomosis transversal* (comunicante anterior) y la *anastomosis longitudinal* (las aberrantes).

Las arterias pueden presentar anomalías muy numerosas (división muy prematura, división tardía, situación superficial, etc.).

En su terminación se resuelven en capilares que las unen al sistema venoso. A veces se juntan con el sistema venoso por vasos más voluminosos (*conductos derivativos de Sucquet, anastomosis arteriovenosas*).

3.º **Nomenclatura.**— Dos troncos arteriales salen de la base del corazón: 1.º la *arteria pulmonar*, del ventrículo derecho; 2.º, la *arteria aorta*, del ventrículo izquierdo. Estos dos troncos forman cada uno un sistema diferente.

CAPITULO PRIMERO

SISTEMA DE LA ARTERIA PULMONAR

La arteria pulmonar contiene sangre venosa. Es arterial por su origen (venículo derecho) por su modo de distribución y por su estructura.

1.º Origen, trayecto. — Se desprende de la base del corazón (*infundibulo* del ventrículo derecho), se dirige un poco oblicuamente a la izquierda arriba y atrás, en una longitud de 5 centímetros, y se divide en dos ramas.

- a) *Pulmonar derecha*, para el pulmón derecho.
- b) *Pulmonar izquierda*, para el pulmón izquierdo.

2.º Relaciones. — Se distinguen en ella dos porciones: porción intrapericárdica y porción extrapericárdica.

a) *Porción intrapericárdica.* — Tiene una longitud de cincuenta milímetros (punto de reflexión del saco pericárdico). Está en relación: 1.º, *por delante*, con el pericardio y la pared anterior del tórax (segundo y tercer cartílagos costales); 2.º, *por detrás*, con la aurícula izquierda (seno transversal de Theile); 3.º, *a la izquierda*, con el apéndice auricular izquierdo y el origen de la arteria coronaria izquierda; 4.º, *a la derecha*, con la aorta que la rodea en espiral.

b) *Porción extrapericárdica.* — Es muy corta. Está en relación: 1.º, *por detrás*, con la bifurcación de la tráquea; 2.º, *por delante y a la izquierda*, con el pulmón izquierdo; 3.º, *a la derecha*, con el cayado de la aorta.

3.º Ramas terminales. — La arteria pulmonar derecha y la izquierda se comportan de distinta manera.

a) *Arteria pulmonar derecha.* — Esta se dirige horizontalmente a la derecha y un poco hacia atrás, en busca del hilio del pulmón.

derecho. Mide de 5 a 6 centímetros de longitud. Descansa sobre la aurícula derecha (forma la bóveda del seno transversal). Está en relación. 1.º, *por abajo*, con la aurícula derecha, 2.º, *por arriba*, con el cayado de la aorta y con la vena ácigos; 3.º, *por detrás*, con el bronquio derecho; 4.º *por delante*, con la vena cava superior y con la aorta.

b) *Arteria pulmonar izquierda*. - Se dirige horizontalmente a la izquierda y un poco hacia atrás en dirección del hilo del pulmón izquierdo. Mide 3 centímetros de longitud. Está en relación. 1.º *por abajo*, con la aurícula izquierda, 2.º, *por arriba*, con el cayado aórtico (*ligamento arterial* que va de la aorta a la arteria pulmonar, reliquia del *conducto arterial* del feto), 3.º, *por detrás* con el bronquio izquierdo; 4.º, *por delante* con las venas pulmonares izquierdas, que la cruzan oblicuamente para ir hacia la aurícula.

CAPITULO II

SISTEMA DE LA ARTERIA AORTA

La aorta se extiende desde la base del corazón (ventrículo izquierdo) al cuerpo de la cuarta vértebra lumbar, en donde se divide en dos ramas terminales. *las dos ilíacas primitivas*

1.º. Trayecto. — Al principio se dirige oblicuamente hacia arriba, adelante y a la izquierda, en una longitud de 5 centímetros. Después se inclina hacia la tercera vértebra dorsal, formando el *cayado de la aorta*. Luego se hace vertebral, corriendo primero a lo largo de la parte izquierda de la columna vertebral, hasta la octava vértebra dorsal, y luego a lo largo de la línea media. Por último, atraviesa el diafragma y termina a nivel de la cuarta vértebra lumbar.

2.º Forma. Es, en general, cilíndrica. Sin embargo, en su origen existen tres dilataciones en relación con las tres válvulas sigmoides (*senos de Valsalva*). En el adulto se encuentra un seno más desarrollado cerca del cayado.

3.º Divisiones. Se distinguen en la aorta tres porciones: *cayado de la aorta, aorta torácica y aorta abdominal*.

4.º Relaciones. — Varían en cada una de las tres porciones.

a) *Cayado aortico.* En su porción ascendente es casi enteramente intrapericárdico. Está en relación: 1.º, *por delante*, con el pericardio y con el esternón (con el timo en el niño); 2.º, *por detrás*, con la aurícula derecha (seno transversal de Theile) y con la arteria pulmonar derecha; 3.º *a la derecha*, con el apéndice auricular derecho (repliegue preaórtico) y con la vena cava superior; 4.º *a la izquierda*, con la arteria pulmonar, que la rodea. *En su porción horizontal es extrapericárdico.* Está en relación: 1.º *por abajo*, con el nervio re-

corriente izquierdo, que lo rodea formando una asa de concavidad dirigida hacia arriba, y con el bronquio izquierdo; 2.^o *por arriba*, con las ramas que de él salen: tronco braquiocéfálico derecho, carótida primitiva y subclava izquierdas (anastomias frecuentes); 3.^o *por delante*, con el nervio frenico izquierdo, los neumogástricos y la pleura; 4.^o *por detrás*, con la tráquea, el esófago, el conducto torácico y con el cuerpo de la tercera vértebra dorsal.

b) *Porción torácica*. Se extiende desde el cuerpo de la tercera vértebra dorsal al orificio diafragmático. En su mitad superior esta situada a la izquierda de la línea media. Esta en relación: 1.^o *por detrás*, con las costillas y el gran simpático; 2.^o *por delante*, con el pedículo del pulmón izquierdo; 3.^o *a la izquierda*, con la pleura izquierda; 4.^o *a la derecha*, con los cuerpos vertebrales. En su mitad inferior ocupa la línea media. Esta en relación: 1.^o *por delante*, con el esófago, que más arriba se encuentra a la derecha; 2.^o *por detrás*, con la columna vertebral, el conducto torácico y la vena ácigos mayor hasta el cruce diafragmático.

c) *Porción abdominal*. Esta en relación: 1.^o *por detrás*, con la columna lumbar; 2.^o *por delante*, con el páncreas, el duodeno y el mesenterio; 3.^o *a la izquierda*, con el mesenterio; 4.^o *a la derecha*, con la vena cava inferior.

5.^o **Distribución.** En su trayecto la aorta da gran número de ramas que nacen: 1.^o del cayado; 2.^o de la *porción torácica*; 3.^o de la *porción abdominal*.

ARTÍCULO PRIMERO

RAMAS QUE NACEN DEL CAYADO DE LA AORTA

Estas ramas son cuatro: 1.^o, arterias coronarias; 2.^o, tronco braquiocéfálico derecho; 3.^o, arteria carótida primitiva izquierda; 4.^o, arteria subclava izquierda.

Las arterias coronarias han sido ya estudiadas.

1. TRONCO BRAQUIOCÉFÁLICO

Nacido del cayado de la aorta, se dirige oblicuamente hacia arriba, afuera y a la derecha de la parte posterior de la articulación esternoclavicular, en donde termina.

Está en relación: 1°, *por delante*, con el tronco venoso braquiocéfálico izquierdo, con el timo y con el esternón; 2°, *por detrás*, con la tráquea; 3° *por fuera*, con la pleura derecha; 4°, *por dentro*, con la carótida primitiva izquierda.

Se divide en dos ramas terminales, la arteria *carótida primitiva derecha* y la arteria *subclavia derecha*.

2. ARTERIAS CARÓTIDAS PRIMITIVAS

Destinadas a la extremidad cefálica, nacen: la arteria carótida primitiva derecha, del tronco braquiocéfálico; la arteria carótida primitiva izquierda, de la aorta (de ahí que ésta sea más larga).

Sus relaciones son:

a) **En el tórax** (arteria carótida izquierda únicamente): 1°, *por delante*, con el tronco venoso braquiocéfálico izquierdo, y por su mediación, con la arteria lateral izquierda del manubrio; 2°, *por dentro*, con la tráquea, el esófago (un poco más posterior) y el recurrente izquierdo; 3°, *por fuera y adelante*, con el trénico; *por fuera y atrás*, con el neumogástrico y la pleura mediastina; 4°, *por detrás*, con la arteria subclavia izquierda y el conducto torácico.

b) **En el cuello** relaciones comunes a ambas arterias). Ocupan la *región carotídea*, región prismática triangular con una *pared posterior* (plano vertebral), una *pared interna* (visceral) y una *pared anterexterna* (muscular). En esta región se relacionan: 1°, *por detrás*, con las apófisis transversas cervicales, de las que la sexta presenta el tubérculo de Chassaignac, utilizado como punto de referencia para la ligadura; con el ganglio cervical medio del simpático, y con la tiroidea inferior; 2°, *por dentro*, con la tráquea y la laringe y más hacia atrás con el esófago y la faringe y con los nervios recurrentes; 3°, *por delante y afuera*, con el esternocleidomastoideo (músculo satélite), el omohioideo y la cara posterior del tiroides. La carótida primitiva por dentro, la yugular interna por fuera, el neumogástrico en el ángulo posterior derecho formado por el adosamiento de ambos vasos, constituyen el *paquete vasconervoso del cuello*. Una vaina celular engloba los tres órganos. Al llegar al borde superior del cartílago tiroides, la arteria carótida primitiva se divide en dos ramos: 1°, la *carótida externa*, 2°, la *carótida interna*.

3. ARTERIA CARÓTIDA EXTERNA

La carótida externa se extiende desde el borde superior del cartilago tiroideo a. cuello del condilo del maxilar inferior. Desde este punto se divide en dos ramas terminales.

Veamos sus relaciones.

1° **En su porción inferior.** Ocupa la region carotidea, formada: *por detrás*, por el plano vertebral y el escaleno anterior; *por dentro*, por la faringe (constrictor medio) *por delante*, por el músculo esternocleidomastoideo. Está *por dentro* de la *carótida interna* y ocupa un triángulo cuya base está formada por la *yugular interna*; el borde inferior, por el *tronco venoso tirolinguofaríngeo-facial*; el borde superior, por el *nervio hipogloso mayor*. De esta porción se desprenden las ramas de la arteria

2° **En su porción superior.**—Desl zase al principio por entre los músculos estileos, estilogloso por de ante, estiofaringeo por detrás (profundos), estiloideo y digástrico (más superficiales), por dentro está en relación con la pared faríngea (región de la amígdala). Más hacia arriba penetra en el interior de la glándula parotídea, cuyo compartimiento contiene ad mas, aunque más superficialmente, la vena yugular externa y la facial.

La arteria carótida externa da seis ramas colaterales y dos ramas terminales.

A. Ramas colaterales

1° **Arteria tiroidea superior.**—Nace algo por encima de la bifurcación de la carótida primitiva, sigue primero el asta mayor del hioides y luego alcanza el lóbulo lateral del cuerpo tiroideo. Superficial en su origen, está cubierta luego por los músculos infrahioides, que la mantienen aplicada contra la faringe y la laringe.

A. RAMAS COLATERALES. Son las siguientes: 1°, la *arteria esternomastoidea* que se dirige hacia fuera, cruza el paquete vasculo-nervioso del cuello y se distribuye por el músculo esternomastoideo, 2°, la *arteria laringea superior*, que perfora la membrana tiroidea y se distribuye por la epiglotis y la laringe, 3°, la *arteria laringea inferior*, que se dirige a la membrana cricoidea y se distribuye por la laringe (parte inferior).

B RAMAS TERMINALES. Van a parar al cuerpo tiroideo, y son tres: *externa, interna y posterior*. Se anastomosan con las ramas de la tiroidea inferior.

2.º Arteria lingual. — Nace por encima de la precedente y se estudia en tres porciones: 1.ª, *porción retrohioidea*, cubierta por los músculos digástrico y estilogloideo; 2.ª, *porción hioidea*, cubierta por el hiogloso, se encuentra en un triángulo formado por delante de este músculo, por el nervio hipogloso mayor, la vena lingual (base del triángulo) y los dos vientres del digástrico, que se juntan a nivel del hueso hioides (vértice del triángulo); 3.ª, *porción lingual*, entre el geniogloso y el lingual inferior.

A RAMAS COLATERALES — Son tres: 1.ª, *rama hioidea*, para los músculos suprahioideos; 2.ª, *arteria dorsal de la lengua*, que nace a nivel del asta mayor del hioides y va destinada a la parte posterior de la lengua; 3.ª *arteria sublingual*, que sigue el conducto de Wharton y se distribuye por el suelo de la boca.

B RAMA TERMINAL. Recibe el nombre de *arteria ranina* y se distribuye por la parte anterior de la lengua.

3.º Arteria facial. Nace encima de la arteria lingual y se dirige hacia arriba y adelante para alcanzar el borde anterior del masetero, y luego va oblicuamente a surco nasogeniano (*arteria angular*). Se distinguen en ella dos porciones: 1.ª, *porción cervical*, cubierta por los músculos digástrico y estilogloideo y que sigue la cara interna de la glándula submaxilar; 2.ª, *porción facial*, cubierta por los músculos cutáneos de la cara y que pasa sobre el buccinador, el canino y el triangular de la nariz.

A. RAMAS COLATERALES — Unas nacen de la porción cervical de la arteria (primer grupo) y las otras de su porción facial (segundo grupo).

a) *Ramas de la porción cervical* — Son cuatro: 1.ª, *palatina inferior*, para la amígdala; 2.ª, *pterygoidea*, para el músculo pterigoideo interno; 3.ª, *submaxilar*, para la glándula submaxilar; 4.ª, *submentoniana*, para el mentón.

b) *Ramas de la porción facial* — Son cuatro: 1.ª *maseterina inferior*, para el masetero; 2.ª, *coronaria inferior* y *coronaria superior*, formando un círculo alrededor del orificio bucal (*arteria del sublabio*, para el tabique nasal); 3.ª *arteria del ala de la nariz*, para el ala y el dorso de la nariz y el lóbulo.

B. RAMA TERMINAL. Llamada también *arteria angular*, se anastomosa con la arteria nasa, rama de la oftálmica.

4.º Arteria occipital.— Nace de la cara posterior de la carótida externa, sigue el vientre posterior del digástrico, llega al borde posterior de la apófisis mastoides y se pierde en la región occipital.

A. RAMAS COLATERALES.—Son cuatro: 1.ª, *arteria esternomastoidea superior*, para el esternocleidomastoideo; 2.ª, *ramas musculares* para el digástrico; 3.ª, *arteria estilomastoidea*, que sigue el trayecto del nervio facial y se distribuye por el oído medio y el oído interno; 4.ª, *arteria meníngea*, que alcanza las cubiertas del cerebro por el agujero mastoideo.

B. RAMAS TERMINALES.—La arteria occipital envía una *rama externa*, que se anastomosa con la auricular posterior, y una *rama interna*, que se anastomosa con la temporal superficial. Ambas van destinadas a la región occipital.

5.º Arteria auricular posterior. Desde su origen corre por el surco auriculomastoideo.

A. RAMAS COLATERALES.—Ramas parotideas.

B. RAMAS TERMINALES. Son dos: 1.ª, *rama anterior*, para el pabellón de la oreja (ramos perforantes para la cara externa del pabellón); 2.ª *rama mastoidea*, para los tegumentos de la región mastoidea.

6.º Arteria faríngea inferior.—Nace de la parte interna de la carótida externa, al mismo nivel de la arteria lingual. Desde este punto llega a la base del cráneo, corriendo entre la faringe y la carótida interna.

A. RAMAS COLATERALES. Son de dos órdenes: 1.ª *ramas faríngeas*, para la parte superior de la faringe; 2.ª, *ramas prevertebrales*, para los músculos prevertebrales.

B. RAMA TERMINAL. Constituye la *arteria meníngea posterior*, penetra en el cráneo por el agujero rasgado posterior y se distribuye en la porción de la duramadre que reviste las fosas occipitales inferiores.

B. Ramas terminales

Las ramas terminales de la arteria carótida externa son: 1.ª, *arteria temporal superficial*; 2.ª la *arteria maxilar interna*.

1.º Arteria temporal superficial. - Nace a nivel del cuello del cóndilo, en pleno tejido parotídeo, después se dirige hacia el arco cigomático, a este nivel se desprende de la glándula y luego pasa entre el conducto auditivo externo y el tubérculo cigomático, para ir a perderse en la región temporal.

A. RAMAS COLATERALES. — Son cinco: 1.ª, *arteria transversal de la cara*, que sigue el conducto de Sténor y se distribuye por la mejilla; 2.ª, un *ramo articular*, para la articulación temporomaxilar; 3.ª *arteria temporal profunda posterior*, que perfora la aponeurosis y el músculo temporal y se distribuye por la cara profunda del músculo; 4.ª, *ramos auriculares anteriores*, para el pabellón del oído; 5.ª, *ramo orbitario*, para los planos superficiales periorbitarios.

B. RAMAS TERMINALES. Son dos, y se distinguen en *rama anterior o frontal*, muy sinuosa (para la región de la frente), y *rama posterior o parietal* (para la región parietal).

2.º Arteria maxilar interna. - Nace a nivel del cuello del cóndilo, en pleno tejido parotídeo, y se dirige hacia dentro del lado de la fosa prerigomaxilar. Sucesivamente rodea al cuello del cóndilo, cruza el borde inferior del músculo pterigoideo externo (o bien lo perfora), corre entre éste y el músculo temporal (fosa cigomática) y gana la parte más elevada de la fosa pterigomaxilar, en donde termina.

A. RAMAS COLATERALES. — Son catorce, y se distinguen en *ascendentes, descendentes, anteriores y posteriores*.

a) *Ramas colaterales ascendentes.* — Son cinco: 1.ª, *arteria timpánica*, que atraviesa la cisura de Graser y va a parar a la cara interna del tímpano; 2.ª, *arteria meníngea media*, que pasa por el ojal que forma el nervio auriculotemporal, penetra en el cráneo por el agujero redondo menor y se divide en dos ramas: una *anterior* y otra *posterior*, ramificándose ambas en la cara interna (baja de higuera) del parietal y de la concha temporal. Estas diversas ramificaciones se distribuyen por las meninges craneales y los huesos subyacentes. Se anastomosan con la arteria lagrimal (rama de la oftálmica) por la hendidura esfenoidal y con la arteria estomatoidea por el hiato de Falopio; 3.ª, *meníngea menor*, que llega al cráneo por el agujero oval y se distribuye por las meninges; 4.ª y 5.ª, *arterias temporal profunda media y temporal profunda anterior*, que se distribuyen por la cara profunda del músculo temporal.

b) *Ramas colaterales descendentes.* — Son cinco: 1.ª, *arteria dentaria inferior*, que penetra por el conducto dentario, de donde

sale por el agujero mentoniano, por fuera del conducto dentario, da ramos al músculo pterigoideo interno y al músculo milohioideo (por la *arteria milohioidea*, que se aloja en el canal especial de la cara interna del maxilar inferior); en el conducto da ramas para el hueso y para cada una de las piezas dentarias, a nivel del agujero mentoniano, da un *ramo incisivo*, que corre por dentro del hueso y se distribuye por los incisivos, y un *ramo mentoniano*, que sale del agujero mentoniano para distribuirse por la región mentoniana; 2.ª, *arteria maseterina*, para la porción superior del masetero; 3.ª *arteria bucal*, para la región buccinatríz. 4.ª, *arteria pterigoidea*, para el músculo pterigoideo externo y accesoramente para el pterigoideo interno, 5.ª, *arteria palatina superior*, que atraviesa el *conducto palatino posterior* y vasculariza la bóveda palatina

c) *Ramas colaterales anteriores* — Son dos: 1.ª, *arteria alveolar*, que envía ramos que se introducen en los conductos dentarios posteriores de maxilar superior y se distribuyen por los dientes, 2.ª *arteria suorbitaria* que atraviesa la hendidura esfenomaxilar, el conducto infraorbitario y se desparrama por la mejilla, da un *ramo orbitario*, para la parte externa de la órbita, y un *ramo dentario anterior*, que se introduce en los conductos dentarios anteriores y va a distribuirse por los dientes

d) *Ramas colaterales posteriores*. Son dos: 1.ª, *arteria vidiana*, que atraviesa el conducto vidiano y se dirige a la parte posterior de la faringe, 2.ª, *arteria pterigopalatina*, que se introduce en el conducto pterigopalatino y se dirige hacia la parte superior de la faringe.

B. RAMA TERMINAL. Constituye la *arteria esfenopalatina*, que atraviesa el agujero esfenopalatino y se distribuye por el tabique (*rama interna*), como también por los cornetes, los meatos y los senos frontal y maxilar (*rama externa*)

4. ARTERIA CARÓTIDA INTERNA

La arteria carótida interna, segunda rama de bifurcación de la carótida primitiva, se extiende desde el borde superior del cartilago tiroideos a la base del cerebro.

1.º **Trayecto.** A nivel del borde superior del cartilago tiroideo la carótida interna está primeramente situada por fuera de la carótida externa. Después, pasando por detrás de ella, alcanza la faringe, y siguiendo una dirección ascendente llega al cráneo y se in-

introduce en el conducto carotídeo, al que recorre. A su salida de este conducto penetra en el seno cavernoso, lo atraviesa y se divide en dos ramas terminales a nivel de la apófisis clinoides anterior.

2.º Relaciones. — *En el cuello*, al principio es superficial, luego se coloca debajo de los músculos estiloideos y penetra en el espacio maxilofaríngeo. Está en relación: *por delante*, con la glándula parótida, *por detrás*, con la columna vertebral; *por dentro*, con la faringe; *por fuera*, con la vena yugular y con el neumogástrico. *Dentro del conducto carotídeo* forma una doble curva en S itálica. *En el canal cavernoso*, cuyos contornos sigue, atraviesa el seno cavernoso por dentro de los nervios motor ocular común, motor ocular externo, patético y oftálmico. *A nivel de las apófisis clinoides anteriores* se coloca por fuera del nervio óptico.

3.º Distribución. — La carótida interna, lo mismo que la externa, da *ramas colaterales* y *ramas terminales*.

A. RAMAS COLATERALES — La carótida interna da algunos ramos a la caja del tímpano (*arteria caroticotimpánica*) y al ganglio de Gasser, al cuerpo pituitario, a la duramadre; pero son poco importantes si se les compara con la oftálmica.

Arteria oftálmica — Destinada al globo ocular, se desprende de la carótida interna a nivel de la apófisis clinoides anterior y penetra en la órbita por el agujero óptico. Al entrar en la órbita está por fuera del nervio óptico; luego lo cruza oblicuamente, pasando por encima de él, para hacerse interna, y aplastada contra la pared interna de la órbita gana el ángulo interno del ojo, en donde se divide en dos ramas.

a) La arteria oftálmica da *once colaterales*: 1.º, *arteria lagrimal*, que bordea la pared externa de la órbita y se distribuye por la glándula lagrimal; 2.º, *arteria central de la retina*, que se introduce en el nervio óptico y se distribuye por la retina; 3.º, *arteria supraorbitaria*, que sigue la pared superior de la órbita, atraviesa el agujero supraorbitario y se distribuye por la región frontal; 4.º, *arterias ciliares cortas posteriores*, en número de dos primero y luego de seis a ocho, que perforan la esclerótica y se distribuyen por la coroides; 5.º, *arterias ciliares largas posteriores*, en número de dos: una interna o nasal y la otra externa o temporal, que perforan la esclerótica y corren entre la esclerótica y la coroides, contribuyendo a formar el *gran círculo arterial del vis*; 6.º, *arteria muscular superior*, que se distribuye por

los músculos elevadores del párpado, por el recto superior, el recto interno y el oblicuo mayor; 7.^a, *arteria muscular inferior*, que se distribuye por los músculos recto inferior, recto externo y oblicuo menor (notese que da las *arterias ciliares anteriores*, que van a terminar en el gran círculo arterial del iris); 8.^a, *arteria etmoidal posterior* que se introduce en el conducto orbitario interno posterior, llega a la lámina cribosa del etmoides y da ramos a las meninges y la pituitaria; 9.^a, *arteria etmoidal anterior*, que se introduce en el conducto orbitario interno anterior y se distribuye por las meninges y la pituitaria; 10.^a, *arteria palpebral inferior*, que nace a nivel del ángulo interno del ojo, gana la comisura interna y se distribuye por el párpado inferior y la conjuntiva; 11.^a, *arteria palpebral superior*, que forma un arco de convexidad superior, llegando hasta la comisura externa y distribuyéndose por el párpado superior.

c) Al llegar al ángulo interno del ojo la oftálmica termina en dos ramas: 1.^a, la *arteria frontal*, que se dirige hacia arriba, en dirección a la frente; 2.^a, la *arteria nasal*, que se dirige hacia abajo, a la raíz de la nariz, y se anastomosa con la arteria facial.

B RAMAS TERMINALES. Son cuatro: 1.^a, *arteria cerebral anterior*, que se dirige hacia delante y adentro y se anastomosa con la del lado opuesto por la *comunicante anterior*; 2.^a, *arteria cerebral media*, que se dirige hacia fuera y se introduce en la cisura de Silvio; 3.^a, *arteria comunicante posterior*, que se dirige hacia atrás y va a desembocar en la cerebral posterior, rama de la arteria vertebral. Estas tres arterias forman, con la cerebral posterior, el *polígono de Willis*; 4.^a, *arteria coroidea*, que penetra en el ventrículo lateral y termina en el plexo coroideo del mismo.

5 ARTERIA SUBCLAVIA

La subclavia nace: a la derecha del tronco braquiocefálico, y a la izquierda, del cayado de la aorta; por esta razón la subclavia derecha resulta más corta que la subclavia izquierda.

1.º **Relaciones.** Tampoco son iguales en los dos lados las relaciones. En este concepto, podemos considerar la arteria dividida en tres porciones:

a) *Por dentro de los escalenos.* La arteria subclavia derecha está en relación: 1.º, *por delante*, con la articular y esternoclavicular (de la cual está separada por los nervios frénicos); 2.º, *por detrás*, con

el nervio recurrente y la séptima vértebra cervical, 1.º, *por dentro*, con la carótida, 4.º, *por fuera*, con la pleura. La arteria subclavia izquierda tiene, además, las relaciones siguientes: 1.º, *por delante*, con el tronco venoso braquiocéfalico; 2.º, *por detrás*, con la primera vértebra dorsal, 3.º, *por fuera*, las relaciones con el pulmón son más extensas. Por último, el nervio recurrente izquierdo, que da vuelta al cayado de la aorta, está relativamente alejado de la arteria.

b) *Entre los escalenos* — Tanto a la derecha como a la izquierda, la arteria está en relación, 1.º, *por delante*, con el músculo escaleno anterior, que la separa de la vena subclavia y del nervio trónico, 2.º, *por debajo*, con la primera costilla; 3.º, *por detrás*, con el plexo braquial.

c) *Por fuera de los escalenos* — La subclavia ocupa la parte inferior del triángulo subclavio. Descansa sobre el plexo braquial y está en relación, por delante, con la vena subclavia y con el músculo subclavio.

2.º **Distribución.** — La arteria subclavia, en su trayecto, da siete ramas colaterales, que se distinguen en *ascendentes*, *descendentes* y *externas*.

A. *Ramas colaterales ascendentes*

Las ramas colaterales ascendentes son dos: la *vertebral* y la *torácica inferior*.

1.º **Arteria vertebral.** — Nacida profundamente por delante de la séptima vértebra cervical en relación con el ganglio estrillado, sigue un trayecto ascendente y atraviesa, a partir de la sexta vértebra cervical, todos los agujeros de las apófisis transversas. Luego de haber descrito dos curvas, al abandonar el axis, penetra en el cráneo por el agujero occipital, gana la cara anterior del bulbo, rodeándolo y se une con la arteria oclusa para formar el *tronco basilar*. Este, colocado en la línea media, se dirige hacia delante, y al llegar al borde anterior de la protuberancia se divide en dos ramas terminales.

A. **RAMAS COLATERALES** — La arteria vertebral da ramas colaterales, que nacen unas veces de la arteria vertebral, por fuera o por dentro del cráneo, y otras veces del tronco basilar.

a) *Ramas colaterales de la porción cervical* Son: 1.º, *ramas espinales*, para la médula, que se introducen por los agujeros de conjugación; 2.º, *ramas musculares*, para los músculos prevertebrales.

b) *Ramas colaterales de la porción intracraneal.* Son cuatro. 1.^a la *arteria meníngea posterior*, para la duramadre de las fosas occipitales. 2.^a la *espinal posterior*, que sigue el surco medio posterior y se distribuye por la medula cervical; 3.^a la *espinal anterior*, que forma con su homónima el *tronco espinal anterior*, el cual desciende hasta la medula dorsal. 4.^a la *cerebelosa inferior y posterior*, para las partes inferior y posterior del cerebelo.

c) *Ramas colaterales que nacen del tronco basilar.* — Son cuatro. 1.^a *ramas protuberanciales*, para la protuberancia anular, 2.^a la *auricular interna*, que se introduce en el conducto auditivo interno y gana el oído interno, 3.^a la *cerebelosa anterior e inferior*, para las partes correspondientes del cerebelo, 4.^a la *cerebelosa superior* para la cara superior del cerebelo.

d) *RAMAS TERMINALES.* — El tronco basilar se bifurca y forma las *arterias cerebrales posteriores derecha e izquierda*; estas dos arterias forman una curva regular, reciben la *arteria comunicante posterior* (porción de Willis) y termina en el hemisferio cerebral (véase *Cerebro*).

2.^a *Arteria tiroidea inferior.* — Nace algo por fuera de la vértebra, se dirige hacia arriba, comprende, en una primera curva (de concavidad anterior), el gran simpático y el paquete vasculonervioso a la altura del abérculo de la sexta cervical y luego, describiendo una segunda curva (de concavidad superior), llega al cuerpo tiroideo.

a) *Ramas colaterales.* En su trayecto da: 1.^a ramos para el esófago y la tráquea, 2.^a un ramo laríngeo posterior para la parte posterior de la laringe; 3.^a la *arteria cervical ascendente*, que llega al axis y da ramas a los músculos prevertebrales y a la medula (véase *Tiroides*).

b) *Ramas terminales.* Al llegar al ángulo inferior del cuerpo tiroideo da las ramas inferior, posterior y profunda, destinadas a este órgano.

B. *Ramas descendentes*

Las ramas colaterales descendentes son dos: la *mamaria interna* y la *intercostal superior*.

1.^a *Arteria mamaria interna.* — Luego de su nacimiento se situa detrás de la extremidad interna de la clavícula y desciende a lo

largo del borde del esternón, hasta el sexto cartílago costal. Esta situada por delante de la pleura y va acompañada por el frénico, que la cruza para colocarse a su lado interno.

A RAMAS COLATERALES. — Son muy numerosas. Se dirigen 1.º, *por delante*, a los músculos intercostales, a la mama; 2.º, *por detrás*, al timo, al pericardio y al diafragma (*arteria diafragmática superior*); 3.º, *por dentro*, al esternón; 4.º, *por fuera*, forman las *arterias intercostales anteriores* que siguen de delante atrás el borde inferior de las costillas y van a anastomosarse con las intercostales posteriores.

B RAMAS TERMINALES. Son dos: una externa, *musculofrénica*, para el diafragma y los espacios intercostales inferiores, y la otra interna, *abdominal* que penetra en el recto mayor del abdomen y se anastomosa con la arteria epigástrica.

2.º Arteria intercostal superior. Nace en la parte posterior de la subclavia, cruza el cuello de las dos primeras costillas y envía ramas para los dos o tres primeros espacios intercostales. Se comporta como las intercostales nacidas de la aorta.

C. Ramas externas

Las ramas colaterales externas son tres: 1.º *escapular superior*, 2.º *escapular posterior*, y 3.º *cervical profunda*.

1.º Arteria escapular superior. — Luego de su nacimiento, pasa entre el escaleno anterior y el esternocleidomastoideo, atraviesa la base del triángulo supraclavicular y alcanza la escotadura coracoides. En su trayecto da ramos a los músculos vecinos (trapecio, escaleno anterior, subclavio). A nivel de la escotadura coracoides, pasa por encima del ligamento, que convierte la escotadura en agujero y se distribuye por los músculos supra e infraespinoso.

2.º Arteria escapular posterior. — Se llama también *cervical transversa*; atraviesa los cordones del plexo cervical, penetra debajo del trapecio y llega al ángulo posterior y superior del omóplato. En su trayecto da ramos poco importantes a los músculos vecinos (trapecio, esplenio y supraespinoso). Al llegar al omóplato, sigue de arriba abajo al borde espina de este hueso y da dos especies de ramos: 1.º, ramos para el dorsal ancho (*ramos internos*); 2.º, ramos para los músculos supra e infraespinoso (*ramos externos*).

3.ª **Arteria cervical profunda.** — Desde su origen pasa entre la primera costilla y la apófisis transversa de la séptima cervical, se dirige primero *an* ba, luego hacia atrás, llega a la nuca y se divide en *ramos ascendentes*, para el complejo mayor y el transverso espinoso, y *ramos descendentes*, para los músculos de los canales vertebrales.

6. ARTERIA AXILAR

Empieza en el punto medio de la clavícula como continuación de la arteria subclavia. Luego desciende al hueco de la axila y termina en el borde inferior del pectoral mayor, en donde es continuada por la humeral.

1.º **Relaciones.** — En el hueco axilar, la arteria de este nombre pasa por detrás del pectoral menor lo cual permite dividirla en tres porciones:

a) *Primera porción*, que va hasta el borde superior del pectoral menor, está cubierta, por delante, por la aponeurosis clavipectoral y el pectoral mayor, y descansa sobre el serrato mayor. Por delante de ella se encuentra la vena axilar, y por detrás el plexo braquial.

b) *Segunda porción*, comprendida detrás del pectoral menor. La arteria está cubierta por el pectoral mayor, y por detrás descansa sobre el músculo subescapular, en este punto está situada entre las dos raíces del nervio mediano.

c) *Tercera porción*, que va desde el pectoral menor hasta el borde inferior de pectoral mayor, descansa sobre los tendones del dorsal ancho y del redondo mayor. Está en relación, por fuera, con los nervios mediano y musculocutáneo y también con el músculo coracobraquial. Por dentro se relaciona con los nervios cubital y braquial cutáneo interno. Por detrás con los nervios radial y circunflejo.

2.º **Distribución.** Tiene cinco ramas colaterales:

a) *Arteria acromiotorácica.* Atraviesa la aponeurosis clavipectoral y se divide en dos ramas: una interna (*torácica superior*), para los músculos pectorales, y la otra externa (*acromiática*), para el deltoides.

b) *Arteria torácica inferior.* — Llámase también *mamaria externa*; se dirige hacia el tórax y donde se anastomosa con las arterias intercostales. Da ramas a los ganglios axilares, a los músculos pectorales y a la glándula mamaria.

c) *Arteria escapular inferior.* Nace a nivel del borde inferior del subescapular, da algunos ramos a este músculo y se divide en dos

ramas una interna, para el serrato mayor y el dorsal ancho, otra externa que pasa por el triángulo omotricipital, se distribuye por el subescapular y luego se anastomosa con las arterias escapular posterior y escapular superior.

d) *Arteria circunfleja anterior*. Delgada, nace en el mismo nivel que la precedente y se dirige hacia fuera, siguiendo el cuello quirúrgico del húmero. Da: 1.º, un ramo ascendente, que sigue la corredera bicipital para ir a la articulación de hombro; 2.º, ramas al deltoides.

e) *Arteria circunfleja posterior*. Voluminosa da vuelta al cuello quirúrgico del húmero hacia atrás, atraviesa el cuadrilátero humerotricipital y proporciona numerosos ramos al músculo deltoides y a la porción larga del tríceps, y termina anastomosándose con la arteria circunfleja anterior.

7. ARTERIA HUMERAL

La arteria humeral, que es continuación de la axilar, empieza a nivel del borde inferior del pectoral mayor y se extiende desde ese punto hasta la flexura del codo.

1.º **Trayecto.** La arteria humeral desciende por la parte interna del brazo siguiendo un trayecto rectilíneo. Se inclina un poco hacia fuera al llegar al codo para venir a ocupar, en esta última región, la línea axial del miembro.

2.º **Relaciones.** — Está en relación:

a) *En el brazo* por delante, con el músculo coracobraquial y luego con el bíceps; por detrás, con el vasto interno y después con el braquial anterior, por fuera sigue el coracobraquial y luego el canal que forman el bíceps y el braquial anterior, y por dentro es superficial en relación con la aponeurosis y la piel.

b) *En el codo* está colocada entre el pronador redondo por dentro y el bíceps por fuera; descansa sobre el braquial anterior y está cubierta por la expansión aponeurótica del bíceps.

c) *Relaciones con los nervios.* Los nervios del plexo braquial tienen importantes relaciones con la arteria humeral. 1.º, el *braquial cutáneo interno*, situado en la parte interna de la arteria, se hace rápidamente subcutáneo y la abandona, 2.º, el *radial*, situado por detrás de la arteria, se separa de ella para alcanzar el canal de torsión; 3.º, el *cubital*, situado primero por dentro de la arteria, se separa

luego de ella y penetra en el compartimiento muscular posterior, y en lo sucesivo continúa separado de la arteria por un tabique aponeurótico; 4.º, el *mediano*, situado primero por fuera de la arteria, la cruza en X y se coloca a su lado interno, ocupándolo hasta llegar a la flexura del codo.

3.º **Distribución.**— La arteria humeral da cinco ramas colaterales.

1.ª *Ramos musculares*, para los músculos vecinos (biceps braquial anterior)

2.ª *Arteria nutricia del humero*, penetra en el conducto osseo cerca de la inserción coracobraquial

3.ª *Arteria colateral externa*, llamada también *humera profunda* que se coloca en el canal de torsión y lo sigue en compañía del radial, vasculariza el tríceps y, a nivel de epicóndilo, se divide en dos ramos: uno *anterior*, que se anastomosa con la recurrente radial anterior y otro *posterior* que forma anastomosis con la recurrente radial posterior (circulo pericondileo)

4.ª *Arteria colateral interna superior*, que sigue el nervio cubital y el músculo vasto interno, al cual vasculariza, y se anastomosa con la recurrente cubital posterior.

5.ª *Arteria colateral interna inferior*, que se separa de la humeral algo por encima de la flexura, pasa detrás del nervio mediano y se divide en dos ramos: uno *anterior*, que se anastomosa con la arteria recurrente cubital anterior, y otro *posterior*, que se anastomosa con la arteria recurrente cubital posterior (circulo palmar car)

8. ARTERIAS RADIAL Y CUBITAL

Al llegar a la flexura del codo, la arteria humeral se divide en dos ramas: *arteria radial* y *arteria cubital*, que recorren el antebrazo y forman en la mano los *arcos palmares*

1.º **Arteria radial.**— Nace de la humeral en la parte media de la flexura y se dirige primero oblicuamente hacia fuera y abajo, después sigue por la parte externa del antebrazo hasta la apofisis estiloides del radio, da vuelta a esta apofisis y, en el dorso de la mano, llega a la extremidad superior del primer espacio interóseo, al cual perfora para formar, en la palma de la mano, anastomosándose con la cubitopalmar, el arco palmar profundo (vease más adelante)

A. RELACIONES — Recorre el antebrazo y la muñeca.

a) *En el antebrazo* está alojada en el canal muscular formado, por fuera, por el supinador largo; por dentro, por el pronador redondo y el palmar mayor. Descansa sobre el radio, del cual la separan algunos músculos del antebrazo (supinador corto, pronador redondo, flexores comunes y pronador cuadrado). Oculta por arriba por el supinador largo, se hace superficial en su parte inferior. Se aloja en el intersticio que separa el tendón del palmar mayor del supinador largo (*canal del pulso*). La rama anterior del nervio radial sigue su lado externo.

b) *En la muñeca* se apoya sobre el ligamento lateral externo de la muñeca, sobre el escafoides y el trapecio. Atraviesa la parte inferior de la tabaquera anatómica.

B. DISTRIBUCIÓN. — La arteria radial da ocho ramas, de las cuales cuatro nacen en el antebrazo y las otras cuatro en la muñeca:

1.ª *Recurrente radial anterior*, que se dirige hacia arriba y afuera, colocada en un canal formado por el supinador largo y el braquial anterior, y se anastomosa con la colateral externa (rama anterior)

2.ª *Ramos musculares*, para los músculos vecinos.

3.ª *Transversa anterior del carpo*, que sigue el borde inferior del pronador cuadrado y se anastomosa con un ramo de la cubital

4.ª *Radiopalmar*, que nace a nivel de la apófisis estiloides, se dirige hacia abajo (ramos para la eminencia tenar) y forma el arco palmar superficial, anastomosándose con la arteria cubital

5.ª *Dorsal del pulgar*, que nace a nivel de la tabaquera anatómica y sigue el primer metacarpiano

6.ª *Dorsal del carpo*, que se dirige hacia dentro siguiendo la cara dorsal del carpo, se anastomosa con una rama de la arteria cubital y forma el *arco dorsal de la mano*. Este da ramos: unos, *ascendentes*, que se anastomosan con la interósea anterior, y los otros *descendentes*, que forman los *arcos interóseos dorsales*. Estos últimos se anastomosan con el arco palmar profundo, por las arterias *perforantes*

7.ª *Interósea del segundo espacio*, que sigue al segundo espacio y da ramas colaterales para los dedos correspondientes.

8.ª *Interósea del primer espacio*, que bordea el primer espacio y da la colateral interna del pulgar y la colateral externa del índice

1.º Arteria cubital.—La arteria cubital se extiende desde la flexura hasta la parte interna de la región palmar. Inmediatamente después de su nacimiento se dirige oblicuamente abajo y adentro hacia

el borde interno de brazo, que sigue en sentido vertical en toda su extensión

1. RELACIONES — Recorre el antebrazo y la muñeca

a) *En el antebrazo*, está primero situada debajo de una gruesa capa muscular formada por los músculos de la epitroclea y descansa entonces sobre el flexor común de los dedos. Luego se desprende de los músculos, se hace superficial y pasa por entre el tendón del cubital anterior (por dentro) y el flexor común superficial (por fuera); está separada de la piel por la aponeurosis de envoltura del brazo y por la aponeurosis que cubre el flexor común de los dedos. En su origen, el nervio mediano, que al principio está colocado por dentro de ella, la cruza y se coloca a mitad del antebrazo por fuera de la arteria. El nervio cubital, al principio bastante apartado de ella, se le aproxima pronto y sigue su lado interno.

b) *En la muñeca*, la arteria cubital se desliza por fuera del pisiforme y se anastomosa con la radiopalmar, para formar el arco palmar superficial (véase más adelante).

B. DISTRIBUCIÓN. La arteria cubital da seis ramas, de las cuales cinco nacen en el antebrazo y la sexta en la muñeca.

1.^a *Tronco de los recurrentes cubitales*, que se dirige inmediatamente hacia arriba y adentro, se divide y da la *recurrente cubital anterior* y la *recurrente cubital posterior*, que se anastomosan con las ramas anterior y posterior de la colateral interna formando el círculo epitroclear.

2.^a *Tronco de las interóseas*, que se dirige hacia abajo y afuera, hacia el origen del espacio interóseo, y se divide en dos ramas:

1.^a, la *interósea anterior*, que desciende por delante del ligamento interóseo y se distribuye por los músculos anteriores del antebrazo como también por los músculos posteriores, a beneficio de unos ramos llamados *perforantes*, siendo de notar que una rama arterial sigue el nervio mediano, *arteria del nervio mediano*, y termina anastomosándose con la arteria dorsal del carpo; 2.^a, la *interósea posterior*, que perfora el ligamento interóseo para distribuirse en la cara posterior del antebrazo; da una arteria que recorre un canal muscular formado por el cóncavo y el cubital posterior, *arteria recurrente radial posterior*, a cual se anastomosa con la humeral profunda.

3.^a *Ramos musculares*, para los músculos vecinos.

4.^a *Cubitodorsal*, que nace por encima de la muñeca, da la vuelta al cúbito y va a unirse con una rama de la arteria radial para formar el arco dorsal del carpo.

5.ª *Transversa anterior del carpo*, que va a unirse con una rama de la arteria radial, también transversal siguiendo el borde inferior del pronador cuadrado.

6.ª *Cubitopalmar*, que nace a nivel del pisiforme, vasculariza la eminencia hipotenar y forma el arco palmar profundo, anastomosándose con la terminación de la arteria radial.

3.º **Arcos palmares**, — Los arcos palmares son dos: uno *superficial* y el otro *profundo*.

A. **ARCO PALMAR SUPERFICIAL** — Está formado por la anastomosis de la cara cubital con la radiopalmar. Describe una curva regular, cuya concavidad mira hacia arriba, comprendida entre la aponeurosis palmar media por delante y los tendones de los flexores por detrás.

a) *Por su concavidad* no emite ninguna rama

b) *Por su convexidad* da las *arterias digitales*. En número de cuatro, recorren los espacios interóseos correspondientes: la *primera digital* da la colateral interna de meñique, la *segunda digital* da la colateral externa del meñique y la interna del anular, la *tercera digital* da la colateral externa del anular y la interna del medio, la *cuarta digital* da la colateral externa del medio y la interna del índice. Estas arterias recorren los bordes laterales de los dedos, se anastomosan en su extremidad y dan ramas al pulpejo y a la región subungular.

B. **ARCO PALMAR PROFUNDO** — Está formado por la anastomosis de la radial y la cubitopalmar. Está situado detrás de los tendones flexores y delante de los espacios interóseos. También describe una curva de concavidad dirigida hacia arriba.

a) *Por su concavidad* emite ramas delgadas para la cara anterior del carpo.

b) *Por su convexidad* da las *arterias perforantes*, que atraviesan el espacio interóseo correspondiente y terminan en la arteria digital; la del primer espacio, muy voluminosa, forma bifurcándose, la colateral externa del índice y la interna del pulgar.

c) *Por su cara posterior* de las *arterias perforantes*, que atraviesan el espacio interóseo correspondiente y terminan en las interóseas dorsales. Son tres, para el segundo, tercero y cuarto espacios: la del primer espacio es reemplazada por la arteria radial al pasar de la cara dorsal a la palmar.

ARTÍCULO II

RAMAS QUE NACEN DE LA PORCIÓN TORÁCICA DE LA AORTA

La porción torácica de la aorta da diversas ramas destinadas unas a las vísceras y otras a las paredes torácicas. Son cuatro.

1.º Arterias bronquiales. Muy variables, tanto en su origen como en su número: estas arterias se dirigen hacia el hilio del pulmón, siguiendo la cara posterior de los bronquios correspondientes. Son tres para el pulmón derecho y dos para el izquierdo, y están destinadas a la nutrición del parénquima pulmonar (véase *Pulmones*).

2.º Arterias esofágicas medias. — Son cinco o seis y se distribuyen por la porción torácica del esófago.

3.º Arterias mediastínicas posteriores. — Son ramos muy delgados, que se distribuyen por los órganos del mediastino posterior (pleura, pericardio, ganglios).

4.º Arterias intercostales aórticas. La aorta da directamente las nueve o diez últimas arterias intercostales.

Por hallarse el tronco aórtico a la izquierda de la línea media las arterias derechas pasan por detrás del esófago, del conducto torácico y de la vena ácigos mayor para llegar a los espacios intercostales derechos, mientras que las arterias izquierdas, más cortas, cruzan la vena ácigos menor.

La distribución es la misma. Cada arteria, al llegar a los agujeros de conjunción, se divide en dos ramas: 1.ª, *rama posterior o dorso-espal*, que se distribuye por los músculos espinales, como también por la medula y sus cubiertas; 2.ª, *rama anterior*, mas voluminosa, que se coloca en el canal del borde inferior de la costilla (entre la vena (que está *encima*) y el nervio (que está *debajo*), hasta el tercio anterior del espacio intercostal, en donde se anastomosa con las ramas de la arteria mamaria interna: véase que, situada primero entre ambos intercostales, sigue luego por el mismo espesor del intercostal interno). En su trayecto da ramas a los músculos intercostales a la pleura y a la mama.

ARTÍCULO III

RAMAS QUE NACEN DE LA PORCIÓN ABDOMINAL
DE LA AORTA

De la aorta abdominal nacen dos clases de arterias.

1.^a *Ramas parietales*, arterias diafragmáticas inferiores y arterias lumbares.

2.^a *Ramas viscerales*: tronco celiaco, arteria mesentérica superior, arterias capsulares medias, arterias renales, arterias genitales, arteria mesentérica inferior.

1. ARTERIAS DIAFRAGMÁTICAS INFERIORES

Nacen de la aorta por debajo del diafragma, se dirigen hacia fuera y se dividen en dos ramas. 1.^a, *rama interna*, que forma con la del lado opuesto un arco por delante del esófago. 2.^a, *rama externa*, que se anastomosa con las intercostales aórticas. Estas ramas se distribuyen principalmente por el diafragma, y accesoriamente por el esófago, el páncreas y la cápsula suprarenal (*arteria capsular superior*).

2. ARTERIAS LUMBARES

Nacen de la cara posterior de la aorta, son cinco, en relación con el número de espacios intertransversos, la última (y a menudo también la cuarta) procede muchas veces de la arteria sacra media. Su distribución es la misma que la de las arterias intercostales. Luego de su nacimiento se dividen en dos ramas. 1.^a, *rama posterior*, para los músculos de los canales, la médula y sus cubiertas; 2.^a, *rama anterior*, que se dirige hacia abajo y afuera; vasculariza los músculos inmediatos (cuadrado lumbal, psoas y músculos de la pared anterolateral del abdomen) y se anastomosa con las arterias inmediatas (epigástrica, mamaria interna).

3. TRONCO CELÍACO

El tronco celiaco nace de la cara anterior de la aorta, por debajo de las arterias diafragmáticas y por delante del cuerpo de la duodécima vértebra dorsal. Desde este punto se dirige hacia delante y termina, tras un trayecto de 8 a 15 milímetros, dando tres ramas: *arteria hepática*, *arteria esplénica* y *arteria coronaria estomáquica*. En este corto trayecto está en relación: 1.^a, por arriba y a la derecha,

con el lóbulo de Spiegel, 2°, por abajo, con el borde superior del páncreas, 3° a la izquierda, con la porción cardiaca del estómago. Está rodeado por las mallas del plexo solar.

1° **Arteria hepática.**— Se dirige primeramente hacia delante y un poco a la derecha, en dirección al píloro, pasando por debajo del lóbulo de Spiegel. Después se inclina hacia arriba, se hace vertical y camina por el epiplón menor, por delante de la vena porta, a la izquierda del colédoco (borde anterior del hiato de Winslow). Llega al hilio del hígado y termina en él.

A. RAMAS COLATERALES. Son tres.

1ª *Arteria pilórica*, destinada al píloro y que va a anastomosar se con la arteria coronaria estomáquica.

2ª *Arteria gastroepiploica derecha*, que desciende por detrás del duodeno (primera porción) se incurva, sigue la curvatura mayor del estómago y se anastomosa con la arteria gastroepiploica izquierda en su recorrido da ramos al estómago y al epiplón, y una arteria, la *pancreatoduodenal*, que pasa entre el duodeno y la cabeza del páncreas y se distribuye por estos dos órganos.

3ª *Arteria cística*, que nace a nivel del hilio, se dirige al cuello de la vesícula biliar y se divide en dos ramas (superior e inferior), destinadas a la vesícula.

B. RAMAS TERMINALES.— Son dos, derecha e izquierda, que penetran en el hígado (véase *Hígado*).

2° **Arteria esplénica.**— Se dirige a la izquierda, sigue el borde superior del páncreas describiendo flexuosidades penetra en el epiplón gastroesplénico y termina en la cara anteroexterna del bazo.

A. RAMAS COLATERALES.— Da tres colaterales.

1ª *Arterias pancreáticas*, que nacen por encima del páncreas.

2ª *Arteria gastroepiploica izquierda*, que se dirige a la derecha, siguiendo la curvatura mayor del estómago, y se anastomosa con la arteria gastroepiploica derecha, en su trayecto se distribuye por el estómago y por el epiplón mayor.

3ª *Vasos cortos*, que nacen de la arteria esplénica o de una de las ramas terminales y se distribuyen por la porción izquierda de la gran tuberosidad del estómago.

B. RAMAS TERMINALES.— Al llegar al bazo, la esplénica se divide en cuatro o cinco ramas que penetran en el hilio de esta viscera y se ramifican por dentro de este órgano conservando su independencia.

3.º **Arteria coronaria estomáquica.**—Se dirige primeramente hacia arriba en dirección al cardias, luego se dobla bruscamente y desciende a lo largo de la curvatura menor para anastomosarse con la arteria pilórica. Da ramos: 1.º, a la porción abdominal del estofago (*ramos esofágicos*); 2.º, a la región cardiaca del estómago (*ramos cardiacos*), 3.º, a la porción del estómago situada a cada lado de la curvatura menor (*ramos gástricos*), notese que estos ramos gástricos se anastomosan con las ramas de las arterias gastropilóricas y forman así círculos arteriales alrededor del estómago.

4. ARTERIA MESENTÉRICA SUPERIOR

Nace por debajo del tronco celiaco, va por detrás del páncreas, se desprende de esta glándula a nivel de su cuello, cruza la tercera porción del duodeno en su punto de unión con la cuarta, se introduce en seguida en el mesenterio y va a terminar en el intestino delgado. En su trayecto describe una curva de concavidad derecha. Sus ramas colaterales, numerosas, son las siguientes:

- 1.º *Ramas pancreáticas*, para la cara posterior del páncreas.
- 2.º *Ramas duodenales*, para las dos últimas porciones del duodeno.
- 3.º *Arteria pancreatoduodenal*, que si be por el surco duodeno pancreático y va a anastomosarse con una arteria análoga, procedente de la gastropilórica derecha.
- 4.º *Arterias cólicas derechas*, que nacen de la concavidad de la arteria mesentérica y forman tres ramas: una, superior, para la mitad derecha del colon ascendente; las otras dos, media e inferior, para el colon descendente. Cada una de ellas se dirige hacia la porción correspondiente del colon y se divide en dos ramas: ascendente y descendente. De la *cólica derecha superior*, la rama ascendente se anastomosa con un ramo análogo procedente de la arteria cólica izquierda superior y la rama descendente, con la rama ascendente de la cólica derecha media. De la *cólica derecha inferior*, la rama ascendente se anastomosa con la rama descendente de la cólica derecha media y la rama descendente, con la terminación de la arteria mesentérica. De esto resultan arcos vasculares, cuya convexidad mira al colon, y de estos arcos nacen ramos destinados a esta porción del intestino grueso.
- 5.º *Ramas del intestino delgado*, que nacen de la convexidad de la arteria mesentérica y forman una serie de arcos, de cuya convexidad nacen nuevas ramas, formando nuevos arcos, de estos últimos nacen ramas para el intestino delgado.

5. ARTERIAS CAPSULARES MEDIAS

En numero de dos (una *derecha* para la cápsula derecha, otra *izquierda* para la cápsula izquierda), nacen a cada lado de la aorta, por debajo de la arteria mesentérica, y se distribuyen por la parte media de las cápsulas suprarrenales (véase *Cápsulas suprarrenales*).

6. ARTERIAS RENALES

Son dos, *derecha*, para el riñón derecho, e *izquierda*, para el riñón izquierdo, y nacen de cada lado de la aorta, por delante de la primera vertebra lumbar; descansan sobre el psoas. Al llegar al hilio del riñón pasan entre la vena renal, que está por delante, y la pelvis renal, que está por detras, y luego se dividen en tres o cuatro ramas (*ramas terminales*) que penetran en el riñón (véase *Riñón*).

En su trayecto dan ramos a los ganglios vecinos, a los pilares del diafragma, a la pelvis renal, a la porción inicial del uréter y a la cápsula adiposa.

7. ARTERIAS GENITALES

Están destinadas, en el hombre, al testículo (*arterias espermáticas*) y en la mujer al ovario (*arterias uteroováricas*).

1.º **Arterias espermáticas.**—Nacen de la parte anterior de la aorta, cruzan el uréter y el psoas. Al llegar a la pelvis renal, se introducen en el conducto inguinal y lo recorren, descendiendo a las bolsas y terminando en el testículo y en el epidídimo (véase *Testículo*). En su trayecto dan algunas ramas al uréter, a la cápsula adiposa del riñón y a los elementos del cordón.

2.º **Arterias uteroováricas.**—La parte superior de su trayecto es analoga a la de las arterias espermáticas. Al llegar a los lados de la pelvis renal, se dirigen hacia abajo y adentro, penetran en el ligamento ancho y terminan en el ovario a nivel de su ángulo externo. Dan la *arteria tubaria externa*, para la mitad externa de la trompa, y van a anastomosarse con un ramo de la arteria uterina (véase *Ovario* y *Utero*).

8. ARTERIA MESENTÉRICA INFERIOR

Nace de la aorta poco antes de su terminación. Describe una curva de concavidad derecha, atraviesa la fosa ilíaca izquierda y va a

terminar a nivel de la tercera vértebra sacra. Está situada en el espesor del mesocolon iliaco.

De su convexidad nacen las *arterias cólicas izquierdas*, en número de tres (superior, media e inferior), destinadas a la mitad izquierda del colon transversal, al colon descendente y a la S iliaca. Estas arterias cólicas forman, como las cólicas derechas, arcos cuya convexidad mira al colon, y su distribución es análoga.

La *arteria mesentérica inferior* termina a nivel de la tercera vértebra sacra, dando las *arterias hemorroidales superiores*, destinadas a la porción superior del recto, se anastomosan con las otras arterias hemorroidales (véase *Recto*).

ARTICULO IV

RAMAS TERMINALES DE LA AORTA

A nivel de la cuarta vértebra lumbar, la aorta se divide en tres ramas terminales de desigual importancia. la *arteria sacra media* y las dos *iliacas primitivas*. La *arteria sacra media* es la homóloga de la aorta caudal de los mamíferos que tienen cola. En el hombre es completamente rudimentaria, de modo que pueden considerarse las dos *arterias-iliacas primitivas* como verdaderas ramas terminales de la aorta.

1. ARTERIA SACRA MEDIA

La *arteria sacra media* continúa la dirección de la aorta; pasa por delante de la quinta vértebra lumbar y luego por delante del sacro y del cóccix. Da ramas parietales, análogas a las de las *arterias lumbares*; la primera nace a nivel de la quinta vértebra lumbar, las demás son en número igual al de las piezas sacras. Se distribuyen por los huesos y músculos inmediatos. Existen ramas viscerales para la cara posterior del recto y la glándula cocígea de Luschka.

2. ARTERIA ILÍACA PRIMITIVA

Son dos, que se extienden desde la cuarta vértebra lumbar a la sínfisis sacroilíaca. Cubiertas por el peritoneo y el uréter, que las cruza en X, descansan sobre la quinta vértebra lumbar y sobre el borde interno del psoas. Al separarse entre sí forman un ángulo de 65 grados en el hombre y de 75 en la mujer. Las venas ilíacas primi-

tivas están colocadas detrás de la arteria, pero en el lado izquierdo, la vena, que ocupa primeramente la parte posterior de la arteria, pasa luego a su parte interna y se coloca debajo de la arteria iliaca primitiva derecha, para alcanzar la vena cava inferior, situada a la derecha de la línea media. La arteria iliaca primitiva se divide en dos ramas, *arteria iliaca interna* y *arteria iliaca externa*.

3. ARTERIA ILÍACA INTERNA O HIPOGÁSTRICA

Nace a nivel de la sínfisis sacroiliaca, desciende a la pelvis menor, en una longitud de 2 a 4 centímetros, y se divide luego en once ramas. Estas ramas pueden clasificarse en: 1.º, *ramas intrapélvicas parietales*; 2.º, *ramas intrapélvicas viscerales*, 3.º, *ramas extrapélvicas*.

1.º **Ramas intrapélvicas parietales.**—Son dos: la *iliolumbar* y la *sacra lateral*.

A. **ARTERIA ILIOLEUMBAR** Nacida de la parte posterior de la hipogástrica, se dirige hacia arriba, por debajo del músculo psoas, y se divide en dos ramas: 1.ª, *rama ascendente o lumbar*, para los músculos de la pared (psoas y cuadrado lumbar); 2.ª, *rama transversal o iliaca*, para el músculo iliaco.

B. **ARTERIA SACRA LATERAL.**—Existen ordinariamente dos arterias sacras laterales: 1.ª, *arteria sacra lateral superior*, que se dirige hacia arriba, se introduce en el primer agujero sacro anterior y se distribuye por la cola de caballo, como también por los músculos de la parte posterior de la pelvis; 2.ª, *arteria sacra lateral inferior*, que desciende a lo largo del sacro, por delante del músculo piramidal, da ramos para los músculos vecinos y para la cola de caballo. Termina anastomosándose con la arteria sacra media.

2.º **Ramas intrapélvicas viscerales.**—Son tres en el hombre y cinco en la mujer.

A. **ARTERIA UMBILICAL**—Presenta su máximo desarrollo en el feto; sale del abdomen por el ombligo y sigue a lo largo del cordón para ramificarse en la placenta, en donde se opera la hematosi. En los recién nacidos, la circulación cesa por efecto de la ligadura del cordón, la arteria se atrofia y en el adulto no queda más que un cordón fibroso, permeable, sin embargo, en su parte más posterior y que da en este punto algunos ramos a la vejiga.

B. **ARTERIA VESICAL INFERIOR** Nace de la cara anterior de la hipogástrica y se ramifica extensamente por el fondo de la vejiga.

Da la *arteria deferencial*, que acompaña al conducto deferente hasta el interior de las bolsas.

C. **ARTERIA HEMORROIDAL MEDIA.** — Se dirige a los lados del recto, al cual presta algunas ramas, y termina en la cara lateral de la vejiga.

D. **ARTERIA UTERINA.** — Nacida de la hipogástrica, la uterina sigue primeramente la pared lateral de la pelvis, luego, dirigiéndose transversalmente hacia dentro, alcanza el borde del útero. En este punto se incurva, se dirige verticalmente hacia arriba y termina en la base del útero. En su *porción parietal*, descansa sobre el obturador interno. En su *porción transversal*, corresponde a la base de los ligamentos anchos y cruza el uréter, que se encuentra por detrás; en este punto el entrecruzamiento se efectúa a 2 centímetros de la pelvis y del borde del útero. En su *tercera porción*, la arteria se dobla hacia arriba (*cajado uterino*) y se remonta a lo largo de los bordes del útero entre las dos hojas del ligamento ancho.

En su trayecto da ramos al uréter, a la vagina (fondos de saco anterior y posterior), al fondo de la vejiga, a la cara anterior y a la cara posterior del útero. Los ramos del cuello son largos, los del cuerpo son cortos.

Al llegar a la parte superior del útero, se divide en dos ramas: una destinada a la trompa, y se llama *arteria tubárica interna*, y otra que va a unirse con la ovárica (*arteria tubárica externa*).

E. **ARTERIA VAGINAL.** — Esta arteria desciende por los bordes de la vagina y da ramos al uréter y a la vagina.

3.º **Ramas extrapélvicas.** — Son cuatro: una sale de la pelvis por el agujero obturador, la *arteria obturatriz*, y las otras tres, las *arterias glútea, isquiática y pudenda interna*, salen por la escotadura ciática.

A. **ARTERIA OBTURATRIZ.** — Nace de la parte anterior de la arteria hipogástrica, sigue la pared de la excavación pélvica, paralelamente a la línea innominada; pasa entre el nervio, que está por encima, y la vena, que está por debajo; atraviesa el conducto subpubiano y termina en la región anterointerna del muslo.

En su trayecto intrapélvico emite: 1.º, dos *ramos musculares*, uno para el músculo ilíaco y otro para el músculo obturador; 2.º, un *ramo pudendo*, que pasa por detrás de la sínfisis púbica y se anastomosa con un ramo similar del lado opuesto, 3.º, un *ramo vesical*, para la vejiga, 4.º, un *ramo anastomótico* con la epigástrica, tan volumi-

noso a veces, que se puede considerar como el origen de tal obturatriz. A su salida de la pelvis, la arteria obturatriz se divide en dos ramas: una, *interna*, para los músculos aductores, pectíneo, obturador externo, y algunas veces para el escroto y los grandes labios, y la otra, *externa*, que se dirige hacia fuera y se anastomosa con la arteria isquiática.

B. ARTERIA GLÚTEA — Rama voluminosa, que sale de la pelvis por la parte superior de la escotadura ciática, por encima del piramidal, y se divide en dos ramas: una *superficial*, para los glúteos mediano y mayor, la otra, *profunda*, para los glúteos mediano y menor.

C. ARTERIA ISQUIÁTICA — Desciende por delante del plexo sacro y del músculo piramidal, y sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor, por debajo del piramidal y por dentro de la pudenda interna. Al llegar a la región glútea emite: 1.º, *ramas posteriores*, para el glúteo mayor, 2.º, *ramas descendentes*, destinadas a los músculos de la cara posterior del muslo y al nervio ciático mayor (*arterias de nervio ciático*). Es de notar que se anastomosan con las ramas de la arteria femoral, con la arteria circunfleja y con las arterias perforantes.

D. ARTERIA PUDENDA INTERNA — Sigue el mismo trayecto que la precedente, sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor, pero casi en seguida entra de nuevo en ella (o mejor en el perineo) por la escotadura ciática menor. Camina por la cara libre del obturador interno, penetra entre las dos hojas de la aponeurosis perineal media y termina a nivel de la sínfisis púbica bifurcándose.

a) *Ramas colaterales* — Además de ramos viscerales y musculares sin nombre determinado, se encuentran aquí tres arterias colaterales importantes:

1.º *Arterias hemorroidales inferiores*, en número de dos o tres destinadas al ano y anastomosadas con las demás arterias hemorroidales (medias y superiores).

2.º *Arteria perineal superficial* — nace a nivel de la cara externa del isquion, pasa por de rás del transverso, lo sigue y corre entre el isquiocavernoso y el bulbocavernoso. Se distribuye por la piel de perineo y por el escroto.

3.º *Arteria perineal profunda o bulbar* — corre por entre las dos hojas de la aponeurosis perineal media, perfora la hoja inferior de esta aponeurosis, entra en el triángulo isquibulbar y termina distribuyéndose por el bulbo y la uretra.

b) *Ramas terminales* — Son dos: 1.º, *arteria cavernosa*, para el cuerpo cavernoso, en donde da ramos flexuosos (*arterias helicinas*), 2.º, *arteria dorsal del pene*, que atraviesa el ligamento suspensorio del

pene y sigue la cara superior del cuerpo cavernoso del lado correspondiente. después, al llegar a la base del glande, forma una corona arterial, de la que salen ramos que van hasta la extremidad de este organo.

c) *En la mujer* — Las ramas de la arteria pudenda interna se distribuyen, en la mujer, por las partes correspondientes de los órganos genitales: la *perineal superficial* se distribuye por los grandes labios (escroto); la *perineal profunda*, por el bubo de la vagina; la *arteria cavernosa*, por los cuerpos cavernosos del clitoris; y la *dorsal del pene* está representada aquí por la *dorsal del clitoris*.

4. ARTERIA ILÍACA EXTERNA

Esta arteria se extiende desde la sínfisis sacroilíaca hasta el anillo crural, en donde se continúa con el nombre de *arteria femoral*. Pasa por detrás del peritoneo, sobre la parte interna del músculo psoas; la vena ilíaca externa, colocada en su origen por detrás de la arteria, pasa luego a su parte interna. La cruzan el uréter, el nervio genitocrural y la vena circunfleja ilíaca. En el lado derecho, la cubre el segmento terminal del ileon, y a la izquierda, el colon iliopélvico. Emite dos colaterales, la *epigástrica* y la *circunfleja ilíaca*.

1.ª *Arteria epigástrica*.—Nace algo por encima del anillo crural, se dirige horizontalmente hacia dentro, en una longitud de 15 a 20 milímetros; luego se endereza, se dirige oblicuamente hacia arriba y adentro hacia el borde externo del músculo recto mayor, penetra en la vaina de este músculo y lo sigue hasta el ombligo, donde se anastomosa con la mamaria interna.

a) *Relaciones*. La porción horizontal y la porción oblicua forman una curva de concavidad mirando arriba: sobre ella descansan el conducto deferente en el hombre y el ligamento redondo en la mujer. En su trayecto, la arteria es subperitonea, y separa la fosita inguinal externa de la fosita inguinal media. A su entrada en la vaina del recto mayor, la arteria está situada por detrás del músculo; más arriba, penetra en su espesor.

b) *Ramas colaterales* — Son tres: 1.ª, *arteria funicular*, que se introduce en el conducto inguinal, en el punto en que el conducto deferente cruza la arteria, y se distribuye por los elementos del cordón, y en la mujer por los grandes labios, 2.ª, *arteria suprapúbica*, que se dirige hacia dentro, por encima del pubis, y se anastomosa con la del lado opuesto (*arco suprapúbico*), 3.ª, *arteria anastomótica de la ob-*

turatriz, de volumen muy variable, que se dirige hacia abajo en sentido del agujero obturador para desembocar en la arteria obturatriz.

c) *Ramas terminales*.—La epigástrica, después de haber dado las tres colaterales precitadas, se distribuye por el músculo recto mayor, por la parte interna de los dos músculos anchos y por el ombligo.

2.ª *Arteria circunfleja ilíaca*.—Nace en el lado externo de la arteria ilíaca, sigue el arco de Falopio (siendo subperitoneal) y llega hasta la espina l'aca anterosuperior. En su trayecto da ramos a la pared abdominal (*arteria epigástrica externa de Stieda*). A nivel de la espina ilíaca da: una *rama ascendente*, para los músculos del abdomen, una *rama transversa*, que sigue la cresta ilíaca y se distribuye por los músculos del abdomen y además por el músculo ilíaco.

5. ARTERIA FEMORAL

A continuación de la ilíaca externa, se extiende desde el anillo crural, hasta el anillo del tercer aductor, siguiendo una línea que, partiendo del punto medio del arco de Falopio irá a terminar a unos cuatro dedos por encima del cóndilo interno.

1.ª *Relaciones*.—La arteria femoral atraviesa sucesivamente el anillo crural, el triángulo de Scarpa y la parte anterointerna del muslo situado por debajo del triángulo.

a) *En el anillo crural*, la arteria está colocada por dentro de la cinilla iliopectínea y por fuera de la vena. Descansa sobre la eminencia iliopectínea.

b) *En el triángulo de Scarpa*, representa la bisectriz que irá del punto medio de la base del triángulo a su vértice. Corre por dentro del canal formado por el pectíneo y el psoas. La vena ocupa siempre la parte interna de la arteria.

y) *Por debajo del triángulo de Scarpa*, la arteria pasa entre los aductores mayor y mediano por dentro y el vasto interno por fuera. El sartorio, su músculo satélite, la cruza oblicuamente y la separa del plano aponeurótico; la vena rodea la arteria y pasa poco a poco a su parte externa. En todo su trayecto, la arteria femoral está cubierta por una vaina fibrosa que, en el triángulo de Scarpa, forma el *conducto crural* y, más abajo, el *conducto de Hunter*.

2.ª *Distribución*.—La arteria femoral da seis ramas principales, de las cuales las cinco primeras nacen en el triángulo de Scarpa, y la sexta en la parte inferior de la arteria.

a) *Arteria subcutánea abdominal*, que nace de la parte anterior de la arteria, perfora la *fascia cribiforme* y se distribuye por la pared abdominal.

b, *Arteria pudenda externa superior*, que perfora también la *fascia cribiforme*, se dirige hacia dentro y se distribuye por la región pubiana y por el escroto.

c) *Arteria pudenda externa inferior*, que nace un poco por debajo de las precedentes, se dirige hacia dentro, cruza la vena femoral por debajo del cayado de la safena interna, corre sobre el pectíneo, atraviesa la aponeurosis y se distribuye por el escroto, y en la mujer por los labios mayores.

d) *Arteria del cuadriceps*, que nace de la parte externa de la arteria, vasculariza el sartorio y da numerosas ramas al cuadriceps.

e) *Arteria femoral profunda*, que nace a 5 centímetros por debajo del arco de Falopio, se dirige hacia abajo y atrás, entre el vasto interno y el pectíneo, luego desciende sobre el aductor mayor cubierto por los aductores mediano y menor; a nivel del conducto de Hunter, perfora el aductor mayor y termina en la parte superior del rombo popliteo. Da tres ramas colaterales: 1.ª, *arteria circunfleja interna* que da vuelta al cuello del fémur de delante atrás, se distribuye por los músculos inmediatos, por la articulación por el hueso (cuello del fémur), y termina en los músculos peritrocantéreos y en la parte posterior del muslo; 2.ª, *arteria circunfleja externa*, que rodea el cuello de atrás adelante, se distribuye en los músculos inmediatos y va a anastomosarse con la arteria circunfleja interna; 3.ª, *arterias perforantes*, en número de tres, que atraviesan las inserciones del aductor mayor y van a anastomosarse, en la parte posterior del muslo, con la isquiática y la circunfleja interna.

f) *Arteria anastomótica magna*, que nace dentro del conducto de Hunter, del cual sale por un orificio común con el nervio safeno intermedio y se divide en dos ramas: una, *profunda*, para el músculo vasto interno, y la otra, *superficial*, para los tegumentos superficiales de la pared interna de la rodilla (anastomosis con la recurrente tibial anterior).

6. ARTERIA POPLÍTEA

Continuación de la femoral, se extiende desde el conducto de Hunter al anillo del sóleo, atravesando el plano profundo del rombo popliteo. Oblicua hacia abajo y afuera en la primera parte de su trayecto, se hace en seguida vertical.

1.° **Relaciones.** — *Por delante* descansa sobre el ligamento posterior de la articulación de la rodilla y sobre el músculo poplíteo. *Por detrás* está cubierta primeramente por el semimembranoso (en su porción oblicua) y por la aponeurosis poplítea, en seguida se coloca debajo de los dos gemelos. *Por dentro* está en relación con el semimembranoso y el gemelo interno. *Por fuera*, con el bíceps y el gemelo externo. La vena poplítea está situada por fuera y detrás de la arteria, y va unida a ella por un tejido celular bastante apretado. El nervio ciático poplíteo interno está situado por detrás y por fuera de la vena.

2.° **Distribución.** — La arteria poplítea, en el curso de su trayecto, emite siete ramas colaterales:

a) *Arterias gemelas*, que son dos, *interna* y *externa*, destinadas a los músculos gemelos; un ramo procedente de una de ellas sigue el nervio safeno externo.

b) *Arterias articulares superiores*, que son dos: una, la *articular superior interna*, rodea el cóndilo interno, atravesando el aductor mayor, y se distribuye por el músculo vasto interno y por los tegumentos de la parte anterointerna de la rodilla; la otra, la *articular superior externa*, rodea el cóndilo externo, atravesando el bíceps, y se distribuye por el músculo vasto externo y por los tegumentos de la parte anteroexterna de la rodilla.

c) *Arteria articular media*, que nace de la cara anterior de la poplítea, atraviesa el ligamento posterior de la rodilla y se distribuye por los ligamentos cruzados, por la sinovial y el fémur.

d) *Arterias articulares inferiores*, que son dos y nacen por debajo de la interlínea articular: una de ellas, la *articular inferior interna*, pasa por debajo del ligamento lateral interno y se distribuye por la parte anterointerna de la rodilla; la otra, la *articular inferior externa*, pasa por debajo del ligamento lateral externo y se distribuye por la parte anteroexterna de la rodilla.

De las precedentes descripciones resulta que la rodilla está vascularizada por las cuatro arterias articulares (*red rotuliana*), que se anastomosan entre sí y con la anastomótica mayor y la recurrente tibial anterior, que igualmente forman parte de dicha red.

3.° **Terminación.** La arteria poplítea se divide en dos ramas: una, *anterior*, la arteria tibial anterior, y la otra, *posterior*, el tronco tibioperoneo.

7 ARTERIA TIBIAL ANTERIOR

Nacida a nivel del anillo del sóleo, atraviesa de atrás adelante el espacio interóseo y de este modo camina por la cara anterior de la pierna hasta el ligamento anular anterior del tarso, en donde toma el nombre de *arteria pedis*.

1.º Relaciones. — En la parte anterior de la pierna está en relación: 1.º, *por atrás*, con el ligamento interóseo y con la tibia, solamente en su parte inferior, 2.º, *por dentro*, con el músculo tibial anterior, 3.º, *por fuera*, con el extensor común de los dedos, y más abajo, con el extensor propio del dedo gordo; 4.º, *por delante* está cubierta primeramente por la porción carnosa del extensor común de los dedos y del tibial anterior, cuando de estos músculos existen solamente los tendones, entonces la arteria resulta superficial, cruzada únicamente por el tendón del extensor propio del dedo gordo. Acompañan a la arteria dos venas. El nervio tibial anterior, situado primeramente a su lado externo, la cruza en X para hacerse interno a nivel del ligamento anular anterior.

2.º Distribución. — En el curso de su trayecto, la tibial anterior da cuatro ramas:

a) *Arteria recurrente tibial anterior*, que, nacida de la parte superior de la arteria, se dirige hacia arriba y va a anastomosarse, por delante de la rodilla, con las arterias articulares.

b) *Ramos musculares*, para los músculos inmediatos (tibial anterior, músculos extensores).

c) *Arteria maleolar interna*, que, nacida un poco por encima de la interlínea tibiotarsiana, se dirige hacia dentro y da ramos a la articulación y a los tegumentos de la parte interna.

d) *Arteria maleolar externa*, que se dirige hacia fuera, en dirección al maléolo externo, y da ramos a la articulación, al calcáneo y a los tegumentos de la parte externa de la garganta del pie. Es de notar que estas dos arterias maleolares se anastomosan con la arteria peronea y la dorsal del tarso, y forman así una red arterial alrededor de la articulación tibiotarsiana.

8. ARTERIA PEDIA

En el momento de salir la tibial anterior de debajo del ligamento anular anterior para convertirse en arteria pedia, se dirige hacia delante y un poco hacia dentro, llega al primer espacio interóseo y lo perfora luego para anastomosarse en la región plantar con la terminación de la arteria plantar externa.

1.º **Relaciones.** La arteria pedia está en relación *por detrás*, con los ligamentos y el hueso del tarso, *por dentro*, con el tendón del extensor propio del dedo gordo; *por fuera*, con el borde interno del músculo pedio; *por delante*, con la piel, de la cual está separada por dos aponeurosis, la dorsal superficial y la del músculo pedio. Va acompañada por dos venas y por el nervio tibial anterior.

2.º **Distribución.** Da tres ramas principales:

a) *Arteria dorsal del tarso*: se dirige hacia el borde externo del pie, pasa por debajo del músculo pedio, se disirruye por este músculo y por los tendones inmediatos y va a anastomosarse con la arteria maleolar externa.

b) *Arteria dorsal del metatarso*: nace a nivel del primer espacio interóseo y se dirige hacia fuera, formando un arco de concavidad superior. *De su concavidad* nacen algunos ramos, que se anastomosan con la arteria dorsal del tarso. *De su convexidad* se desprenden tres arterias interóseas, que siguen los espacios 2.º, 3.º y 4.º, y se distribuyen de la misma manera que las interóseas dorsales de la mano: al llegar al extremo anterior del espacio interóseo que recorren, dan *arterias colaterales* para los dedos. Comunican con la arteria interósea plantar correspondiente por dos arterias llamadas *perforantes*, una situada en la extremidad posterior del espacio y otra en la parte anterior.

c) *Arteria interósea del primer espacio*: es análoga a las interóseas precedentes: da arterias colaterales y una perforante, en la extremidad anterior del espacio la perforante posterior está representada por la *arteria pedia misma*.

9. TRONCO TIBIOPERONEO

Continúa la dirección de la arteria poplítea. Atraviesa el anillo del sóleo, descansa sobre el tibial posterior y está cubierto por el

sólo, el plantar delgado y los gemelos. Le acompañan dos venas y el nervio tibial posterior colocado por detrás de él. Da algunos ramos a los músculos vecinos, a la tibia (*arteria nutritia* de la tibia), y después de un trayecto de 4 ó 5 centímetros, se divide en dos ramas: la arteria peronea y la arteria tibial posterior.

1.ª Arteria peronea.— Desciende a lo largo de la cara posterior de la pierna, hasta la extremidad inferior del ligamento interóseo, en donde termina.

A RELACIONES.— Está situada entre los músculos de la capa superficial y los de la capa profunda. Descansa primeramente sobre el tibial posterior. Después se coloca debajo del flexor propio de dedo gordo, sigue la parte interna del peroné y se coloca en la cara posterior del ligamento interóseo al cual sigue hasta su terminación.

B DISTRIBUCIÓN.— En su trayecto da ramos a los músculos inmediatos (sóleo y tibial posterior) y al peroné (*arteria nutritia*). Termina por dos ramas: una, la *arteria peronea anterior* que perfora el ligamento interóseo, llega a la cara anterior de la pierna por delante de la articulación tibiotarsiana y se anastomosa con la arteria dorsal de tarso y con la maleolar externa; otra, la *arteria posterior*, que sigue la dirección del tronco principal y se ramifica por la parte externa del talón.

2.ª Arteria tibial posterior.— Más voluminosa que la arteria peronea, sigue el borde interno de la cara posterior de la pierna, hasta el canal del calcáneo, en donde termina.

A RELACIONES.— En la mitad superior de su trayecto, está situada sobre el tibial posterior y cubierta por los gemelos y el sóleo (formado de dos capas carnosas separadas por una aponeurosis). En la mitad inferior, descansa sobre el flexor común de los dedos, por dentro del tendón de Aquiles, que ha reemplazado a las masas musculares de los gemelos y del sóleo. Está separada de la piel únicamente por una aponeurosis doble. En el canal del calcáneo está situada entre el tendón del flexor común, que está por delante, y el tendón del flexor propio del dedo gordo, que está por detrás. Dos venas satélite la acompañan en toda su extensión. El nervio tibial posterior, colocado primeramente entre las dos arterias, se aproxima a la arteria tibial y se coloca a su lado externo desde la mitad de su trayecto.

B DISTRIBUCIÓN.— En su trayecto da ramos a los músculos (sóleo, tibial posterior y flexores) y a los huesos (tibia y calcáneo). Envía

un ramo anastomótico, que se anastomosa con un ramo de la arteria peronea a nivel de maléolo interno. Al llegar al canal del calcáneo, termina en dos ramas divergentes llamadas *arterias plantares*.

3. Arterias plantares.— Son dos: la arteria plantar interna y la arteria plantar externa.

A ARTERIA PLANTAR INTERNA Corte por la planta del pie, entre los músculos de la región interna y los de la región media. Sigue así hasta la cabeza del primer metatarsiano, en donde termina dando la *arteria colateral interna del dedo gordo*, o anastomosándose con ella. En su trayecto da ramos: 1.º, *superiores*, para el abductor oblicuo del dedo gordo y los huesos del tarso; 2.º, *inferiores*, para el abductor del dedo gordo y los tegumentos; 3.º, *externos* para el flexor corto plantar; 4.º, *internos* para el flexor corto del dedo gordo.

B ARTERIA PLANTAR EXTERNA— Mucho más voluminosa que la precedente, sigue una dirección oblicua hacia delante y afuera, hasta la extremidad posterior del quinto metatarsiano, se encuentra entre el flexor plantar y el cuadrado carnoso de Silvio. Después se dirige transversalmente hacia dentro hasta la extremidad posterior del primer metatarsiano, en donde se anastomosa con la arteria pedia, que ha perforado de arriba abajo el primer espacio interóseo.

a) *En su porción oblicua* da ramos: 1.º, *inferiores*, para el flexor corto plantar y para el abductor del dedo pequeño; 2.º *superiores*, para los huesos del tarso; 3.º, *internos*, para los tendones flexores y los lunaticas; 4.º, *externos*, para el flexor corto del dedo pequeño.

b) *En su porción transversal* forma el *arco plantar*, que es análogo al arco palmar profundo. De su *concauidad* nacen ramos para los huesos del tarso. De su *convexidad* nacen: a) *colateral externa del dedo pequeño* y las cuatro *interóseas plantares*, estas pasan por los espacios interóseos y terminan dando las *arterias colaterales de los dedos del pie*, análogas a las colaterales de los dedos de la mano. Además, se anastomosan con la interósea dorsal, por las *arterias perforantes anteriores*. De su *cara superior* nacen las *arterias perforantes posteriores*, que, después de atravesar de abajo arriba el espacio interóseo correspondiente, desembocan en las arterias interóseas dorsales. Son tres, porque la pedia, perforando el primer espacio interóseo, representa la perforante del mismo.

TERCERA SECCION

VENAS

Las venas son conductos membranosos de ramificaciones convergentes, destinadas a conducir la sangre desde los capilares al corazón

1.º Disposición general.— Las venas nacen de los capilares y siguiendo una vía inversa de las arterias, convergen hacia el corazón, uniéndose entre sí y formando troncos cada vez más voluminosos. Existen tres sistemas venosos: 1.º, *sistema pulmonar*, correspondiente al territorio de la arteria pulmonar; 2.º, *sistema venoso general*, correspondiente a la arteria aorta; 3.º, *sistema porta abdominal*, representado por un tronco principal (la vena porta), intermedio entre dos redes capilares, una intestinal y otra hepática. Estos sistemas están unidos entre sí en su periferia.

2.º Conformación exterior.— Las venas son cilindricas en estado de plenitud y aplanadas en estado de vacuidad; presentan en su superficie abolladuras debidas a las válvulas situadas en su interior. Son siempre más numerosas que las arterias.

En general rectilíneas, ocupan dos situaciones principales: 1.ª, *venas superficiales*, que corren por encima de la aponeurosis, inmediatamente debajo de la piel. 2.ª, *venas profundas*, que corren adosadas a las arterias y siguiendo las en todo su trayecto (venas satélites).

En el tronco y en la cabeza, las venas se distinguen preferentemente en *venas viscerales* y *venas parietales*.

En su trayecto, las venas se anastomosan entre sí de diferentes modos (anastomosis longitudinales, oblicuas, transversales anastomosis por intersección, por convergencia, en plexo). De este modo se

explica la existencia de las muy numerosas vías colaterales (*conductos de seguridad*)

3° **Conformación interior, válvulas.** — Las venas presentan en su interior repliegues membranosos o *valvulas*, que se oponen a todo movimiento retrógrado de la sangre. Estas válvulas figuran verdaderos nidos de pichón, suspendidas en la pared del vaso; están situadas en un punto cualquiera de la pared vascular (*válvulas parietales*) o en su terminación (*valvulas ostiales*). Algunas venas no tienen válvulas (*venas avalvulares*) tales son la vena cava superior, la vena porta, la vena rectal. Otras tienen muchas (*venas valvulares*); son las venas en que la circulación se efectúa contrariamente a las leyes de la gravedad y aquellas que pueden ser comprimidas por la acción de los músculos (*venas de los miembros*)

4° **Division.** — Como las arterias, las venas forman dos sistemas: 1.°, *venas que corresponden a la arteria pulmonar*, 2.°, *venas que corresponden a la arteria aorta*

CAPITULO PRIMERO

VENAS PULMONARES

Las venas pulmonares están destinadas a conducir a la aurícula izquierda la sangre llevada al pulmón por las arterias pulmonares.

1.º Origen. — Nacen de los capilares de los lobulillos pulmonares y forman, a nivel del hilio, tres troncos principales para el pulmón derecho y dos solamente para el izquierdo. Estos troncos corresponden a cada uno de los lóbulos. El que proviene del lóbulo superior del pulmón derecho se une con el que emana del lóbulo medio, de manera que en definitiva no existen más que cuatro venas pulmonares: *dos para el pulmón derecho y dos para el izquierdo.*

2.º Trayecto. En cada lado se distinguen una *vena pulmonar superior* y una *vena pulmonar inferior*. Se dirigen hacia dentro y después de un corto trayecto, desembocan en la aurícula izquierda, las venas derechas cerca del tabique interauricular y las venas izquierdas algo por fuera de las venas derechas.

3.º Relaciones. — Ocupan la parte anterior del hilio (las venas derechas son cruzadas por la cava superior y la porción ascendente de la aorta). Al llegar a la aurícula levantan el pericardio.

4.º Calibre. — Las venas superiores son más voluminosas que las inferiores, y las venas derechas lo son más también que las izquierdas.

CAPITULO II

VENAS AORTICAS

La sangre venosa del sistema aórtico es conducida al corazón: 1.º, por venas cortas, que vienen del corazón mismo y se llaman *venas cardíacas* (las hemos estudiado en la pág. 143), 2.º por dos conductos voluminosos que se llaman *venas cavae*.

ARTICULO PRIMERO

VENA CAVA SUPERIOR

La vena cava superior conduce al corazón derecho toda la sangre venosa de la mitad del cuerpo situada por encima del diafragma.

1.º **Trayecto.**—Empieza por arriba, a nivel de la cara posterior de cartilago de la primera costilla derecha, en donde está formada por la unión de los dos troncos venosos braquiocefálicos. Desciende verticalmente a lo largo del borde derecho del esternón y va a abrirse en la aurícula derecha, cerca del apéndice auricular. La vena cava superior tiene una longitud de 6 a 8 centímetros y un diámetro de 20 a 22 milímetros.

2.º **Relaciones.** Respecto de este punto, se consideran en ella dos porciones:

1) *Porción extrapericardica.*—Está en relación: 1.º, *por delante*, con el esternón (y también con el limo), la pleura y los dos primeros cartilagos costales; 2.º *por detrás* con la porción derecha de la tráquea, el bronquio derecho y los ganglios bronquiales; 3.º *por dentro* con la aorta; 4.º, *por fuera*, con el frénulo derecho, la pleura y el pulmón.

b) *Porción intrapericárdica.*— En este punto la vena cava no está enteramente rodeada por el pericardio, sino tan sólo en sus tres cuartos externos y en una altura de 2 ó 3 centímetros. Está en relación: 1º, *por delante*, con el apéndice auricular; 2º, *por detrás*, con las venas y la arteria pulmonar derechas; 3º, *por dentro*, con la aorta; 4º *por fuera*, con la pleura y el pulmón derechos.

3º **Afluentes.** La vena cava superior recibe. 1º, la *vena ácigos mayor*, 2º, en su parte superior, los dos *troncos venosos braquiocefálicos*.

I TRONCOS VENOSOS BRAQUIOCEFÁLICOS

En número de dos, derecho e izquierdo, los troncos braquiocefálicos (que resumen la circulación del miembro superior y de la cabeza) están situados en la parte superior del tórax

1º **Origen.**— Tanto en uno como en otro lado, nacen por detrás de la articulación esternoclavicular, en donde reciben la subclavia y la yugular interna. Desde este punto se dirigen hacia la cara posterior del primer cartilago costal, en donde se reúnen formando la vena cava superior

2º **Paralelo de los dos vasos.** Los dos troncos braquiocefálicos son diferentes por su longitud, dirección y relaciones

a) *Tras de su longitud*, el tronco izquierdo mide 5 centímetros y el derecho 3 centímetros.

b) *Respecto a su dirección*, el izquierdo es casi horizontal y el derecho casi vertical

γ) *Respecto de sus relaciones*, el tronco braquiocefálico derecho está en relación: *por detrás*, con el tronco arterial del mismo nombre; *por delante* con la extremidad interna de la clavícula y con el manubrio del esternón, en el cual se insertan los músculos esternocleidomastoideo y esternotiroideo derechos. El tronco braquiocefálico izquierdo está en relación: *por detrás*, con el cayado aórtico y con las tres arterias que de él nacen, *por delante*, con la articulación esternoclavicular izquierda y con los músculos esternocleidomastoideo y esternotiroideo izquierdos.

3º **Afluentes.**— En los troncos braquiocefálicos terminan seis grupos de venas, *venas del miembro superior, venas de la cabeza, venas de la cara, venas del cuello, venas del tórax y venas del raquis*

II. VENAS DEL MIEMBRO SUPERIOR

Las venas del miembro superior se dividen en dos grupos: *venas profundas* y *venas superficiales*.

A. Venas profundas. - Llámense venas profundas las que corren por debajo de la aponeurosis de cubierta del miembro. Desembocan en la vena axilar y en la subclavia.

1.º **VENAS PROFUNDAS DE LA MANO, DEL ANTEBRAZO Y DEL BRAZO.** Siguen exactamente el trayecto de las arterias y son, en general, dos para cada arteria.

2.º **VENA AXILAR.** Es única, formada por la reunión de las dos venas humerales. Está principalmente colocada en la parte interna de la arteria axilar y después pasa a su parte anterior. Recibe numerosas venas que corresponden exactamente a las ramas colaterales de la arteria axilar.

3.º **VENA SUBCLAVIA.** Se extiende desde la clavícula a la articulación esternoclavicular, en donde forma, reuniéndose con la yugular interna, el tronco braquiocefálico.

En ambos lados se relaciona: 1.º, *por delante*, con el músculo subclavio y con la extremidad interna de la clavícula; 2.º, *por detrás*, con la arteria subclavia, de la cual, en la parte media, está separada por el músculo escaleno anterior; 3.º, *por abajo*, con el vértice del pulmón y la pleura; 4.º, *por arriba*, con la piel, el músculo cutáneo, la aponeurosis cervical superficial y la aponeurosis media, que le forma una vaina.

De las ramas venosas que acompañan a las ramas nacidas de la arteria homónima, recibe solamente las *venas intercostales superiores*. Las demás se abren en las yugulares o en el tronco venoso braquiocefálico. En cada lado recibe las dos venas yugulares externa y anterior.

B. Venas superficiales. Las venas superficiales están situadas en el tejido celular subcutáneo.

1.º **VENAS SUPERFICIALES DE LA MANO.** Las venas están muy desarrolladas en la cara dorsal de la mano. Los dedos presentan cada uno *deveanas colaterales*, se reúnen todas para formar un rico plexo que a menudo reviste la forma de un arco, llamado *arco venoso dorsal*. La colateral interna del dedo meñique ha recibido el nombre de *salto de la* vuelta al borde cubital de la muñeca y llega a la cara

anterior del antebrazo, en donde forma la *cubital superficial*. Las colaterales del pulgar forman la *vena cefálica del pulgar*, que da vuelta al borde radial de la muñeca y forma, en la cara anterior del antebrazo, la *vena mediana*.

2.° VENAS SUPERFICIALES DEL ANTEBRAZO — Son cuatro: tres en la cara anterior (*cubital*, *radial* y *mediana*), y una en la cara posterior (*cubital posterior*).

a) *Vena cubital superficial* — Es continuación de la salvatela del dedo pequeño, sigue el borde cubital del antebrazo y sube hasta la epitróclea, en donde se continua con la vena basilica del brazo.

b) *Vena radial superficial* — Es continuación del arco venoso dorsal y sigue, en la cara anterior del antebrazo, el borde radial, llega al epicóndilo y se continua con la vena cefálica.

c) *Vena mediana* — Es continuación de la cefálica del pulgar, rodea el borde externo de la muñeca, gana la cara anterior del antebrazo y corre entre las dos venas cubital y radial superficiales. Al llegar a la flexura del codo, se divide en dos ramas: una externa, la *mediana cefálica*, que se une a la vena radial superficial para formar la vena cefálica; la otra interna, la *mediana basilica*, que se une a la vena cubital superficial para formar la vena basilica. A nivel de su bifurcación, la vena mediana recibe una anastomosis voluminosa de las venas profundas, que se llama *perforante del codo*.

d) *Vena cubital posterior* — Es inconstante cuando existe, nace del arco dorsal venoso de la mano, sube por la cara posterior del antebrazo y desemboca unas veces en la cubital superficial y otras en la basilica.

3.° VENAS SUPERFICIALES DEL BRAZO — Son dos:

a) *Vena basilica* — Resulta de la unión de la cubital superficial y la mediana basilica. Al principio es subcutánea, sigue el borde interno del músculo y luego perfora la aponeurosis y desemboca en una de las venas humerales o en la vena axilar. Va acompañada del nervio braquial cutáneo interno.

b) *Vena cefálica* — Es resultante de la unión de la radial superficial con la mediana cefálica, sigue primeramente el borde externo del biceps, después el intersticio deltopectoral, para ir a desembocar en la parte superior de la vena axilar.

C. Comunicación de las dos redes. Los dos sistemas venosos, profundo y superficial, no están aislados, sino que se comunican entre sí por numerosas anastomosis. Así la mediana envía ramas

anastomóticas, no sólo a nivel de su bifurcación, sino en todo lo largo de su trayecto, a la vena radial profunda. Asimismo, la cefálica del puñgar se anastomosa con las radiales profundas, y la basilica se comunica con las venas humerales profundas.

3. VENAS DE LA CABEZA

Forma cinco grupos. 1º, *venas encefálicas*; 2º, *senos de la duramadre*; 3º, *venas meníngeas*, 4º, *venas diploicas*, y 5º, *venas tegumentarias*.

A. Venas del encefalo

Se distinguen en *venas superficiales* y *venas profundas* las estadiamos al hablar de los centros nerviosos.

B. Senos de la duramadre

Llama se senos de la duramadre unos conductos venosos, de forma triangular o redondeada, situados en el espesor de la duramadre. Todos ellos están formados de dos túnicas, una externa, que es la misma duramadre, y otra interna que es endotelial. Pueden dividirse en *senos pares* y *senos impares*.

A. **Senos pares.** — Son diez, cinco a cada lado.

1º **SENO LATERAL.** Se extiende desde la protuberancia occipital interna al agujero rasgado posterior, siguiendo el canal lateral (entre las fosas cerebrales y las fosas cerebelosas). Se consideran en él dos porciones: una, *horizontal*, comprendida en la tienda del cerebelo que llega hasta la base del peñasco; la otra, *vertical*, que corresponde al canal petroescamoso y llega hasta el agujero rasgado posterior, donde se convierte en yugular interna. En su trayecto recibe venas cerebrales inferiores y posteriores y venas cerebelosas posteriores.

2º **SENO CAVERNOSO.** Situado a cada lado de la silla turca, se extiende desde la parte más ancha de la hendidura esfenoidal hasta el vórtice del peñasco. Está tabicado por bridas fibrosas y atravesado de abajo arriba por la carótida interna y de atrás adelante por el nervio motor ocular externo, es de notar que estos dos órganos, revestidos de una capa endotelial, no son bañados por la sangre del seno cavernoso. En la pared externa de este seno se encuentran tres nervios que son, contando de arriba a bajo, el motor ocular común, el patético y el oftálmico.

Por su cara superior el seno cavernoso recibe las venas cerebrales anteriores e inferiores: una de ellas mas voluminosa que las otras, sigue las pequeñas alas del esfenoides y toma el nombre de *seno esfenoparietal de Breschet*, que se comunica por fuera con las venas meningeas medias. Por delante recibe las *venas oftálmicas superior e inferior*. Por detrás se continua con el seno petroso inferior, que desemboca en la vena yugular interna. Lateralmente emite la *vena del agujero oval*, que pasa por el agujero oval, con el nervio maxilar inferior y llegada a la base del cráneo, termina en los plexus pterigoideos: es una vena de desagüe.

3.º **SENO PETROSO INFERIOR** — Es continuación del seno cavernoso y se dirige hacia atrás, abajo y afuera. Al llegar al agujero rasgado posterior, se dobla hacia abajo, sale del cráneo, reviste todos los caracteres de una vena ordinaria y desemboca en la yugular interna. Comunica con un paquete venoso que ocupa la fosita condílea anterior, el *confluente condíleo anterior*.

4.º **SENO PETROSO SUPERIOR** — Situado en el foramen superior del peñasco, esta alojado en la mitad anterior de la circunferencia mayor de la tienda del cerebello. Comunica, por delante con el seno cavernoso; por detrás, con el seno lateral: así forma una especie de anastomosis colocada entre los dos senos.

5.º **SENO OCCIPITAL POSTERIOR** — Muy delgado, nace en el contorno del agujero occipital: se dirige hacia atrás y arriba y se abre en el seno lateral a nivel de la protuberancia occipital interna.

B Senos impares. — Ocupan la línea media y son cinco

1.º **SENO LONGITUDINAL SUPERIOR** — Situado en el borde convexo de la hoz del cerebro, se extiende desde la cresta frontal, donde se origina, hasta la protuberancia occipital interna, y desemboca en el seno lateral. Coincide con el canal longitudinal superior que está situado en la cara anterior del cráneo. Es prismático triangular y se encuentra tabicado como el seno cavernoso, por bridas fibrosas y aparece invadido por una especie de prolongaciones de los corpusculos de Pacchioni.

Muy delgado en su origen, recibe gran número de afluentes.

1.º, *venas del cerebro* (proceden es de las caras interna y externa del cerebro); 2.º *anastomótica magna o anterior (vena de Trolard)*, que comunica el seno longitudinal superior con el seno petroso superior; 3.º *anastomótica posterior (vena de Labbe)*, que pone en comunicación el seno longitudinal superior con el seno lateral; 4.º, *venas*

meningéas medias, que atraviesan lagunas sanguíneas antes de desembocar en el seno

2.º **SENO RECTO.** — Ocupa la base de la hoz del cerebro. Recibe hacia delante numerosos afluentes: las *venas cerebrales profundas* (*venas de Galeno*), la *vena cerebelosa superior*, las *venas cerebrales inferiores* y el *seno longitudinal inferior*. Desembocan en el seno lateral a nivel de la protuberancia occipital interna

Prensa de Herófilo — A nivel de la protuberancia occipital interna convergen seis senos: los dos senos laterales, el seno longitudinal superior, el seno recto y los dos senos occipitales posteriores. Esta confluencia ha recibido el nombre de *prensa de Herófilo* o *torcular*. Raras veces existe un reservorio único, más a menudo se reúnen dos senos o más antes de confluir en la protuberancia occipital interna

3.º **SENO LONGITUDINAL INFERIOR.** — Ocupa el borde concavo de la hoz del cerebro en su mitad posterior. Recibe algunas venas de la cara interna del cerebro y desemboca en la extremidad anterior del seno recto

4.º **SENO CORONARIO.** — Situado en el espesor de la tienda de la hipófisis, rodea en forma de corona la base del cuerpo pituitario y está en relación: por delante, con el canal óptico; por detrás, con la lámina cuadrilátera del esfenoides. Por ambos lados se abre en el seno cavernoso

5.º **SENO OCCIPITAL TRANSVERSO.** — Situado por detrás de la lámina cuadrilátera del esfenoides, en el canal basilar, pone en comunicación las extremidades posteriores de los dos senos cavernosos. Está ordinariamente constituido por múltiples conductos.

C. Venas meníngeas

Pasan entre la cara externa de la duramadre y la cara interna del cráneo, dentro de surcos formados en el hueso. Las *venas meníngeas medias*, que son las más importantes, ocupan los surcos cuyo conjunto forma la *hoja de higuera*. Son dos a cada lado. Por encima del pterion reciben venas procedentes de la órbita y de las meninges; existe aquí una encrucijada venosa por la cual pasa la arteria meníngea media. Comunican por arriba con el seno longitudinal superior y por abajo con el plexo pterigoideo pasando por el agujero redondo menor

D. Venas del diploe

La sangre venosa del diploe circula dentro de cavidades y conductos. Las cavidades son muy irregulares y muy desarrolladas en el viejo. Los conductos colectores son cuatro: uno *frontal*, otro *occipital* y dos *parietales*, corriendo todos desde la bóveda del cráneo hacia la base. Estas cavidades y estos conductos están en comunicación: 1.º, con la red venosa intracraneal, por orificios que se abren en las venas meníngicas, en las agunas sanguíneas y en el seno longitudinal superior; 2.º con la red venosa extracraneal por orificios que se abren en la superficie externa del cráneo (fosa temporal, concha occipital).

E. Venas tegumentarias del cráneo

Forman una rica red venosa situada entre el cuero cabelludo y la aponeurosis epicraneal, descienden a la base del cráneo y pueden dividirse en: 1.º, *venas frontales*, que van a parar a las venas faciales. 2.º, *venas occipitales*, que van a parar a la yugular externa. 3.º, *venas parietales*, que van a parar a la vena temporal superficial.

F. Anastomosis entre los senos y la red venosa extracraneal

Los senos comunican con el exterior por numerosos conductos. Los principales son:

- 1.º El golfo de la yugular, que pone en comunicación la circulación del cuello con el seno lateral.
- 2.º La vena oftálmica, que une las venas faciales con el seno cavernoso.
- 3.º La vena del agujero oval, que va del plexo pterigoideo al seno cavernoso.
- 4.º La vena mastoidea, que une el seno lateral con las venas mastoideas.
- 5.º El seno petrosooccipital inferior, que une el seno cavernoso con el confluente condileo anterior.
- 6.º La vena condilea posterior, que va del seno lateral a la vena vertebral por el agujero condileo posterior.
- 7.º La vena emisaria de Santorini, que une las venas parietales con el seno longitudinal superior por el agujero parietal.

4. VENAS DE LA CARA

Las venas de la cara se dividen en dos grupos: *venas superficiales* y *venas profundas*.

A Venas superficiales. Forman dos troncos principales: *a vena facial* y la *vena temporal superficial*

1° VENA FACIAL Nace en la región frontal, cerca de la línea media.

a) *Trayecto* Desciende a la cara, atravesándola oblicuamente, cruza el borde inferior del maxilar inferior y termina en la yugular interna. En el decurso de su trayecto toma diferentes nombres: en la frente se llama *vena prefrontal* y recibe las venas de la nariz y de la órbita; en el surco nasogeniano se llama *vena angular* y recibe la vena oftálmica superior y las venas del ala de la nariz; en la cara toma el nombre de *vena facial*.

b) *Relaciones* Al abandonar el surco del ala de la nariz la vena facial pasa sobre el bucinador, se adosa al borde anterior del masetero y desciende a la región suprahioides. Corre al lado de la arteria hasta la parte media del ala de la nariz; después, al paso que la arteria dirigiéndose hacia la comisura labial, describe una línea curva de concavidad dirigida hacia arriba y afuera la vena sigue un trayecto directo hasta el borde anterior del masetero, en donde se junta de nuevo con la arteria. En este punto la vena está colocada detrás de la arteria; más abajo, en la región suprahioides, la arteria se coloca detrás de la vena. Aboca en la yugular interna por un tronco común con la tiroidea superior y la lingual, el *tronco tirolinguofacial*.

c) *Afluentes* Los afluentes de la vena facial son muy numerosos.

a) *En la cara recibe*: 1°, las *venas nasales laterales, bucales y maseterinas anteriores*, cuyos solos nombres indican su procedencia y cuyo trayecto es idéntico al de las arterias del mismo nombre; 2°, la *vena alveolar*, que se origina del plexo alveolar, situado detrás de la tuberosidad del maxilar superior.

b) *En el cuello recibe las venas submentoniana, palatina inferior y submaxilar* (esta última procede de la glándula del mismo nombre.)

2° VENA TEMPORAL SUPERFICIAL Formada por las venas segmentarias laterales del cuero, desciende como la arteria del mismo

nombre, por delante del pabellón de la oreja y se une a la vena maxilar interna, para formar la vena yugular externa. Recibe *venas auriculares, venas palpebrales y venas faciales*. Estas últimas corresponden a la arteria transversal de la cara.

B Venas profundas. Forman tres troncos principales: *venas oftálmicas, vena maxilar interna y venas inguales*.

1.º **VENAS OFTÁLMICAS** — Las venas oftálmicas son dos: *superior e inferior*

a) *Vena oftálmica superior* — Nace en el ángulo mayor del ojo, formada por la convergencia de las venas procedentes de las regiones vecinas (párpados, nariz, frente). Es continuación de la *angular*. En la órbita sigue el plano superior de la región, gana la parte más elevada de la hendidura esfenoidal y la atraviesa para desembocar en el seno cavernoso. En su trayecto recoge numerosas venas correspondientes a las ramas arteriales de la oftálmica (*venas etmoidales anterior y posterior, venas musculares vena inguinal y las dos vasa vorticosa superiores*)

b) *Vena oftálmica inferior*.—Nace en la parte anterior del suelo de la órbita, se dirige hacia atrás y arriba y va a juntarse con la vena oftálmica superior, para desembocar con ella en el seno cavernoso.

Las dos venas oftálmicas están en amplia comunicación, de una parte, con las venas de la cara, y de otra parte, con el plexo pterigoideo. Según algunos autores, existen válvulas que impiden el reflujó de la sangre de las venas de la cara a las venas oftálmicas.

2.º **VENA MAXILAR INTERNA** — Excepto las venas que rodean la tuberosidad del maxilar superior y forman el *plexo alveolar*, las cuales van a parar a la vena facial, todas las demás se reúnen para formar el *plexo pterigoideo*. son las *venas temporales profundas, pterigoideas, dentarias inferiores, maseterinas y meníngeas medias*. Este plexo está situado detrás de los músculos pterigoideos de él nace la *vena maxilar interna*, la cual, uniéndose con la temporal superficial, forma la vena yugular externa.

3.º **VENAS LINGUALES** — Forman tres grupos: 1.º, las *venas profundas*, que acompañan a la arteria lingual; 2.º, las *venas dorsales*, que vienen a formar, por detrás de la V lingual, un plexo, al cual concurren venas procedentes de la epiglotis y de la amígdala; 3.º, *venas ramitas*, que situadas a cada lado del frenillo de la lengua, cogen al lado del nervio hipogloso mayor, separadas de la arteria por el músculo hiogloso. Estos tres órdenes de venas convergen hacia el bor-

de posterior del hiogloso y forman la *vena lingual*, propiamente dicha, que termina en el tronco común formado por las tres venas tiroidea superior, lingual y facial (*tronco tirolinguofacial*), y va desde este punto a la yugular interna.

5 VENAS DEL CUELLO

Se distinguen seis principales: 1.ª, *cuatro yugulares* (externa, anterior, interna y posterior), 2.ª, la *vena vertebral*, 3.ª, las *venas tiroideas*.

A Vena yugular externa. Nace a nivel del cuello del condilo, en donde está formada por la vena maxilar interna y la vena temporal superficial. Después desciende oblicuamente hacia atrás y abajo (cruzando el esternocleidomastoideo) y viene a terminar en la vena subclavia. Al principio es intraparotídea; después se hace superficial, cubierta únicamente por la piel y el músculo cutáneo, cruzada por las ramas del plexo cervical superficial, a nivel de la clavícula perfora las dos aponeurosis cervicales superficial y media, para desembocar en la subclavia. En su embocadura tiene dos válvulas *insuficientes*. En el curso de su trayecto envía anastomosis a la yugular anterior y a la facial. Como afluentes recibe las *venas occipitales*, las *auriculares posteriores*, las *venas escapulares superiores* y las *escapulares posteriores*. Todas estas venas son correlativas de las arterias homónimas.

B. Vena yugular anterior. Nace en la región suprahioidea, desciende a la cara anterior del cuello, un poco por fuera de la línea media, en un desdoblamiento de la aponeurosis cervical superficial. Al llegar un poco por encima de la horquilla esternal, se curva para dirigirse hacia fuera, perfora la aponeurosis cervical superficial, se coloca debajo del esternocleidomastoideo, perfora la aponeurosis cervical media y termina en la subclavia, cerca de la yugular externa. Recibe venas de la cara anterior del cuello y del tórax. Numerosas anastomosis la unen a la yugular externa y a la yugular anterior del lado opuesto.

C Vena yugular interna. — Es la más voluminosa de las venas yugulares. Continúa el seno lateral a nivel del agujero rasgado posterior (*golfo de la yugular*) y desciende hacia el orificio superior del tórax, siguiendo un trayecto oblicuo hacia abajo y adelante, hasta

su terminación en el tronco venoso braquiocefálico. En su trayecto ocupa la parte anteroexterna de la carótida interna, que más abajo se convierte en carótida primitiva, tiene las mismas relaciones que la arteria. En su parte superior está separada de la arteria por los nervios glosófaringeos, neumogástrico e hipogloso. En su terminación presenta dos válvulas suficientes. Como afluentes recibe el *seno petroso inferior*, después las *venas facial, lingual, tiroidea superior (tronco tirolinguofacial)* y las *venas laríngeas y faríngeas*.

D. Venas yugulares posteriores.—Son dos: una derecha y otra izquierda. Nacen entre el occipital y el atlas, formadas por la reunión de muchas ramas: *venas mastoideas, condileas, occipital profunda*, etc. Descienden a los canales vertebrales y, al llegar a la primera costilla, se doblan hacia delante y terminan en el tronco venoso braquiocefálico correspondiente. En su trayecto reciben las venas de la nuca.

E. Vena vertebral.—Nace (cerca del agujero occipital) del plexo occipitovertebral, que la pone en comunicación, de una parte, con los senos craneales, y de otra, con las venas raquídeas. Después sigue la arteria vertebral (que está por dentro y por delante de ella) dentro de los orificios de las apófisis transversas de las vértebras cervicales. En este trayecto recibe venas procedentes del raquis y de los músculos inmediatos y las *venas cervicales ascendente y profunda*. Finalmente, termina por abrirse en el tronco venoso braquiocefálico.

F. Venas tiroideas.—Son muy numerosas y forman tres grupos: 1.º, *venas tiroideas superiores*, que van a desembocar en la yugular interna por el tronco tirolinguofacial; 2.º, *venas tiroideas inferiores* que descienden por delante de la tráquea para ir a desembocar en los troncos venosos braquiocefálicos; 3.º, *vena tiroidea media*, que nace del cuerpo tiroideo y recibe con bastante frecuencia la *vena faríngea inferior*.

6. VENAS DEL TÓRAX

Las venas del tórax se dividen en dos grupos: *venas parietales* y *venas viscerales*.

A. Venas parietales. Son las *venas mamarias internas, intercostales* (que forman las *dos decimas*) y *diafragmáticas superiores*.

1.º **VENAS MAMARIAS INTERNAS** — Las venas mamarias internas siguen el trayecto de la arteria y se abren en el tronco venoso braquiocéfálico.

2.º **VENAS INTERCOSTALES** — Siguen con toda exactitud el mismo trayecto de las arterias. A la derecha las tres primeras convergen en un tronco común llamado *tronco común de las venas intercostales superiores derechas*; las nueve últimas van a terminar en la *vena ácigos mayor*. A la izquierda, las seis primeras convergen de igual manera a un mismo tronco, denominado *tronco común de las venas intercostales superiores izquierdas*; las demás desemboran en la *ácigos menor*.

a) *Tronco común de las venas intercostales superiores derechas*. Está formado por las dos o tres primeras venas intercostales y termina, según los casos, en la subclavia, el tronco braquiocéfálico o la ácigos mayor.

b) *Acigos mayor* — Es continuación de la lumbar ascendente del lado derecho, penetra en el tórax por el orificio diafragmático que da paso al gran simpático derecho y sigue la parte lateral derecha del cuerpo de las vértebras. Al llegar al nivel del tercer espacio intercostal se curva hacia delante (*gancho de la vena ácigos*), pasa por encima del bronquio derecho, al cual abraza en su concavidad, y desemboca en la parte inferior de la vena cava superior. En el curso de su trayecto recibe las nueve o diez últimas venas intercostales derechas.

c) *Tronco común de las venas intercostales superiores izquierdas* — Lo forman las cinco o seis primeras venas intercostales izquierdas y desemboca, según los casos, una vez en la vena ácigos menor y otras en la mayor.

d) *Acigos menor* — Nace en el abdomen, en donde es continuación de la vena lumbar ascendente del lado izquierdo, penetra en el tórax por el orificio diafragmático que da paso al gran simpático izquierdo y sigue a lo largo del lado izquierdo de la columna vertebral, a nivel de la séptima vértebra dorsal se curva hacia dentro y desemboca en la ácigos mayor. En el curso de su trayecto recibe las cinco o seis últimas venas intercostales izquierdas. Muy frecuentemente recibe también el tronco común de las intercostales superiores izquierdas.

3.º **VENAS DIAFRAGMÁTICAS SUPERIORES**. — Nacen por detrás del esternón, siguen el nervio frénico y desembocan en el tronco venoso braquiocéfálico.

B Venas viscerales. Nacen de tino (*venas timicas*) o del pericardio (*venas pericárdicas*), del esófago (*venas esofágicas*), del mediastino (*venas mediastínicas*). Siempre son delgadas y desembocan en los troncos venosos braquiocéfálicos. Las que vienen del parenquima pulmonar, las *venas bronquiales*, terminan ordinariamente en las venas árgicas.

7 VENAS DEL RAQUIS

Segun su situación, se distinguen cuatro grupos: 1.º, *venas intrarraquídeas*, 2.º, *venas de los cuerpos vertebrales*, 3.º, *venas de la medula*; 4.º, *venas extrarraquídeas*.

A Venas intrarraquídeas. — Siguen la dirección longitudinal, desde el agujero occipital a la base del cóccix. Se distinguen en 1.º, *venas longitudinales anteriores*, situadas en la cara posterior del cuerpo vertebral, cerca de los pedículos; 2.º, *venas longitudinales posteriores*, situadas a lo largo de las láminas vertebrales, a cada lado de la línea media. Estas venas están unidas entre sí por anastomosis transversales u oblicuas de modo que, a nivel de cada vértebra, existe un círculo venoso completo. A nivel de cada agujero de conjunción se desprende de las venas intrarraquídeas una especie de plexo venoso (*plexo de conjunción*), que rodea al nervio y va a desembocar en las venas extrarraquídeas.

B Venas de los cuerpos vertebrales. — Forman éstas, en el interior de los cuerpos vertebrales, cavidades que recuerdan las de diploc, y van a desembocar, por detrás, en las venas intrarraquídeas, y por delante, en las venas extrarraquídeas.

C Venas de la medula. — Forman en conjunto una *red perimedular*, que desemboca en el plexo venoso de conjunción o en las venas extrarraquídeas (véase *Medula*).

D Venas extrarraquídeas. — Estas venas forman, por detrás de la columna vertebral, un rico plexo. Comunican: 1.º, por una parte, con las venas intrarraquídeas posteriores por medio de ramos que atraviesan los ligamentos amarillos; 2.º, por otra parte, con el plexo venoso de conjunción por medio de anastomosis que recuerdan por su trayecto la arteria dorsoespinal. En la región cervical, estas venas forman las venas vagulares posteriores, que van a abrirse en el tronco venoso braquiocéfálico.

En la cara anterior de los cuerpos vertebrales existen algunas venas, poco importantes que desaguan en las venas inmediatas.

ARTÍCULO II

VENA CAVA INFERIOR

La vena cava inferior conduce a la aurícula derecha toda la sangre de la mitad infradiaphragmática del cuerpo.

A Trayecto. - La vena cava inferior nace de la union de las dos venas ilíacas primitivas a nivel de la parte inferior del cuerpo de la cuarta vertebra lumbar. Desde este punto se dirige hacia arriba siguiendo el lado derecho de la columna vertebral. Al llegar debajo del hígado se inclina más hacia la derecha, atraviesa el diafragma y termina en la aurícula derecha. La longitud de la vena cava inferior es de 22 a 25 centímetros su diámetro es de 20 a 22 milímetros. Presenta dos dilataciones: una en el punto en que desembocan las venas renales (*seno renal*), la otra en el punto en que desembocan las venas suprahepáticas (*seno hepático*).

B Relaciones. - Desde el punto de vista de sus relaciones, podemos considerar en ella tres porciones: abdominal, diafragmática y torácica.

a) *Porción abdominal.* Por *detrás* descansa sobre la columna vertebral, de la que está separada, a trechos, por el simpático, los vasos lumbares y el pilar derecho del diafragma. Por *delante* está en relación con el borde posterior del mesenterio con la tercera porción del duodeno, la cabeza del páncreas, con la vena porta (de la que está separada por el hato de Winslow) y con el hígado (canal hepático). Por *encima* sigue la aorta, de la que se aleja a medida que se inclina hacia la derecha hacia la parte superior del abdomen, entre ella y la aorta se encuentran el pilar derecho del diafragma, el ganglio de Wrisberg del lado derecho y el obuso de Spiegel. Por *fuera* está en relación con el psoas, con el ureter con el borde interno del riñon derecho y con la capsula suprarenal derecha.

b) *Porción diafragmática.* La vena cava atraviesa el centro frénico (hojuela derecha), adhiriéndose intimamente al contorno del anillo fibroso.

c) *Porción torácica*. Mide dos centímetros. En su *porción extrapericardica* es vertical y está en relación con el ligamento trefopericardico derecho (ligamento de Teutleben), con la pleura y con la base del pulmón derecho. En su *porción intrapericardica*, la serosa la envuelve por todos lados, excepto en su cara posterior. A nivel de su desembocadura en la aurícula derecha existe una válvula insuficiente, la *válvula de Eustaquio*.

C **Afluentes.** Recibe en su origen las dos *venas ilíacas primitivas*, que resumen la circulación venosa del miembro inferior y de la pelvis. En su trayecto recibe, además, las *venas del abdomen* y las *genitales*.

1 VENAS IÍLICAS

Son seis, tres a cada lado. Son éstas: la *ilíaca primitiva*, la *ilíaca externa* y la *ilíaca interna*.

A **Vena ilíaca primitiva.** Las dos venas (la derecha y la izquierda) nacen a nivel de la sínfisis sacroilíaca, descansan sobre la quinta vértebra lumbar y sobre la base del sacro y se unen, para formar la vena cava inferior.

Correspondiendo su punto de unión a la derecha de la línea media, existen algunas diferencias entre las dos venas. La *longitud* de la vena izquierda es algo mayor que la de la vena derecha. La *dirección* de la vena izquierda es más oblicua hacia arriba y adentro que la de la vena derecha. Las *relaciones* son también distintas: a la *derecha*, la vena está colocada detrás de la arteria, siendo paralela a ésta, a la *izquierda*, la vena está en relación con la parte posterior de la arteria, después con su borde externo, y pasa por debajo de la cara posterior de la arteria ilíaca derecha para unirse a la vena opuesta.

Las venas ilíacas primitivas reciben: 1°, en su trayecto, la *vena sacra media*; 2°, en su origen, las *venas ilíacas externa e interna*.

B **Vena ilíaca externa.**—Nace a nivel del anillo cru. al donde se continúa con la femoral y alcanza la sínfisis sacroilíaca siguiendo el estrecho superior. Corre a lo largo del psoas y por el lado interno de la arteria ilíaca externa; la arteria hipogástrica la cruza en su parte superior. Recibe como afluentes:

1° La *vena circunfleja ilíaca*, que sigue el trayecto de la arteria por debajo de la fascia ilíaca a lo largo de la cresta ilíaca.

2° La *vena epigástrica*, con frecuencia doble que sigue el trayecto de la arteria, recibe las *venas espermáticas posteriores* y las *venillas subpúbicas*, se anastomosa con la mamaria interna (en el músculo recto mayor del abdomen) y con la obturatriz.

C. Vena ilíaca interna.— Forma un tronco muy corto (cerca de cuatro centímetros), que va desde la escotadura ciática mayor a la vena ilíaca primitiva. Sus afluentes forman las *venas de la pelvis* (véase más adelante)

2. VENAS DEL MIEMBRO INFERIOR

Se distinguen, como las del miembro superior en *venas profundas* y *venas superficiales*.

A. Venas profundas. Llámense venas profundas las que corren por debajo de la aponeurosis

1° **VENAS PROFUNDAS DEL PIE Y DE LA PIERNA.**— Son dos y siguen exactamente el trayecto de cada arteria

2° **VENA POPLÍTEA.**— Es única y corre por fuera y un poco por detrás de la arteria, desde el anillo del sóleo hasta el anillo del tercer aductor. Recibe las *venas gemelas*, las *articulaciones* (superiores, medias e inferiores) y la *safena externa*.

3° **VENA FEMORAL.**— Acompaña a la arteria femoral desde el anillo del tercer aductor hasta el anillo crural. Al principio está colocada por fuera de la arteria, luego le da la vuelta, y en el triángulo de Scarpa se coloca en su parte interna, en el anillo crural mira al borde cóncavo del ligamento de Gimbernat, del cual está separada por conductos linfáticos y el ganglio de Cloquet. Recibe ramas correlativas de las de la arteria femoral, excepto las venas subcutáneas abdominales y las pudendas externas, que desaguan en la vena safena interna, la cual desemboca en la vena femoral. Es de notar que la vena femoral tiene, cerca del arco crural, una o dos válvulas suficientes.

B. Venas superficiales.— Lo mismo que en el miembro superior, existe en el inferior una rica red venosa subcutánea.

1° **VENAS DEL PIE.** En la cara plantar son muy numerosas (*suela venosa de Lejars*) y están adheridas al tejido celular subcutáneo, lo cual tiene algo de semejanza con una especie de tejido eréctil. Por delante terminan por arcos que comunican con las venas de la

cara dorsal. Lateralmente van a parar a dos *venas marginales* (externa e interna), que comunican con la red profunda del pie. Por detrás, las venas son muy voluminosas y se continúan con las superficiales de la pierna. En la cara dorsal existe un *arco venoso*, en el cual desaguan las venas de los dedos. De este arco parten dos venas: una es interna, llamada *dorsal interna*, y la otra externa, llamada *dorsal externa*. Costean lateralmente el dorso del pie y se convierten: la primera, en la *vena safena interna*, y la segunda, en la *safena externa*.

2.º VENA SAFENA EXTERNA. Nace de la vena dorsal externa, pasa por detrás del maléolo externo, sigue el borde externo del tendón de Aquiles, se coloca en el surco que separa los dos gemelos (comprendida en un desdoblamiento aponeurótico), sube en esta disposición hasta el hueso poplíteo, se inclina hacia delante, perfora la aponeurosis y desagua en la vena poplítea. En el momento de su desembocadura emite una rama, *conducto anasomótico*, que rodea la cara interna del muslo y se abre en la vena safena interna. En su trayecto va acompañada del nervio safeno externo y recibe numerosas ramas venosas superficiales; tiene de ocho a quince válvulas.

3.º VENA SAFENA INTERNA. Nace de la vena dorsal interna, por delante del maléolo interno, sube verticalmente por la cara interna de la pierna, de la rodilla, del muslo, hasta la parte media del triángulo de Scarpa; es supraaponeurótica en todo su trayecto. Pero en el triángulo de Scarpa, a 9 centímetros por debajo del arco de Falopio, perfora la aponeurosis (*ligamento falciforme de Allan Burns*), formando un gancho o *cayado* por debajo del cual pasa la arteria pudenda externa inferior. En su trayecto recibe venas subcutáneas de la pierna del muslo, una anastomosis de la safena externa, las *venas pudendas externas superficiales* y las *venas subcutáneas abdominales*. Tiene gran número de válvulas que van atrofiándose con la edad.

C. Comunicación de las dos redes. — La vena safena interna se anastomosa con las venas profundas de la garganta del pie, de la pierna y del muslo, lo mismo que la safena externa, de suerte que las dos circulaciones venosas del miembro inferior están anastomosadas entre sí, como en el miembro superior.

3. VENAS DE LA PELVIS

Las venas de la pelvis siguen el trayecto de las ramas arteriales de la arteria hipogástrica, y como ellas, pueden dividirse en tres grupos:

A Venas extrapelvianas.— Son cuatro:

a) *Venas glúteas, isquiáticas y obturatrices* Siguen el trayecto de las arterias homónimas.

b) *Venas pudendas internas.* Conducen la sangre venosa del pene, del perineo y de la parte inferior del recto. Las venas del pene corren por la cara dorsal de este órgano y se distinguen en *vena superficial* (discurriendo por tejido celular subcutáneo) y *vena dorsal profunda* (que va por debajo de la cubierta elástica). La primera, al alcanzar el pubis, se inclina hacia fuera y desemboca en la safena interna. La segunda perfora el ligamento suspensorio del pene y desagua en el *plexo venoso de Santorini*, situado entre la próstata y el pubis. De la parte posterior y externa del plexo nacen las venas pudendas internas, siguen el mismo trayecto que la arteria del mismo nombre. Recogen las *venas perineales y profundas* (perineo y bulbo de la uretra) y las *venas hemorroidales inferiores*, rodean la espina ciática y se unen a la vena ilíaca interna para formar la vena ilíaca primitiva. En la mujer, las venas pudendas internas vienen de los órganos eréctiles de la vulva.

B. Venas intrapelvianas parietales.— Son tres.

a) *Venas iliolumbares y venas sacras laterales.* Siguen el trayecto de sus arterias y desaguan en la ilíaca interna.

b) *Vena sacra media.*— Nace por delante del cóccix por una vena que ocupa la línea media, en la cual desaguan dos venas, procedentes una del plexo vesical y la otra del plexo hemorroidal inferior. Recoge venas procedentes de las sacras laterales (anastomosis) y del sacro y va a desembocar, finalmente, en la vena ilíaca primitiva izquierda.

C. Venas intrapelvianas viscerales.— Comprenden dos grupos de venas en el hombre y cuatro en la mujer.

a) *Venas vesicales.* Van a parar, las anteriores, al plexo de Santorini; las posteriores, al plexo seminal, y las laterales, al plexo vesicoprostático. Estos tres plexos se unen de manera que forman un *plexo pelvivecal*, que desagua en la vena ilíaca interna por dos o tres venas.

b) *Venas hemorroidales medias.*— Nacen de las vesículas seminales, de la vejiga, de la vagina, y sólo indirectamente comunican con las venas del recto.

c) *Venas uterinas.*— Nacen en la parte inferior del plexo uterino y ganan la hipogástrica entre las dos hojas del ligamento ancho.

d) *Venas vaginales*. — Nacen del plexo vaginal y desembocan en la hipogástrica.

4 VENAS DEL ABDOMEN

Correspondientes a la circulación venosa del abdomen, hay. 1.º, *venas parietales*, que son las diafragmáticas inferiores y las venas lumbares. 2.º *venas viscerales*, que son las venas capsulares, las renales, la vena porta, las venas portas accesorias y las suprahepáticas; 3.º, la *vena umbilical* y las *venas espermáticas*, que nacen fuera del abdomen, pero lo recorren en una gran parte de su trayecto.

1.º **Venas diafragmáticas inferiores.** — Son correlativas de las arterias del mismo nombre y desaguan en la vena cava inferior a nivel del orificio diafragmático. Reciben las *venas capsulares superiores*, procedentes de la cápsula suprarrenal.

2.º **Venas lumbares.** — Siguen el trayecto de las arterias lumbares, pero a nivel de las apófisis transversas están unidas entre sí por anastomosis, cuyo conjunto forma una verdadera *vena lumbar ascendente*, esta última comunica por abajo con las venas tributarias de la vena ilíaca, y por arriba da origen a las venas álgigos, creando así una *via colateral*, que puede suplir a la vena cava inferior.

3.º **Venas capsulares principales.** — Salen de la cara anterior de la cápsula suprarrenal y desaguan unas veces en la vena cava y otras en la renal correspondiente.

4.º **Venas renales.** — Nacen a nivel del hilo del riñón por cinco o seis ramas, siguen una dirección transversa hacia dentro y desaguan en la vena cava. Están situadas delante de la arteria. La vena renal derecha, por efecto de la situación a la derecha de la vena cava inferior, es menos larga que la renal izquierda, la cual cruza la aorta. En su trayecto reciben *venas capsulares* procedentes de las cápsulas suprarrenales y *venas adiposas* procedentes de la cápsula adiposa del riñón. Existen muchas anastomosis de las venas renales con las venas inmediatas (vena cava inferior, vena espermática); hay una, más importante que las demás, llamada *vena renoacigolumbar*, que la une a la vez a la vena álgigo y a la vena lumbar.

5.º **Vena porta.** Recoge la sangre venosa de las vísceras abdominales (excepto el hígado y el riñón). luego se dirige hacia el hígado, en donde se capilariza a la manera de una arteria

A. RAMAS DE ORIGEN — Son tres

a) *Vena esplénica* — Sigue el mismo trayecto de la arteria homónima a la cual, acompaña, situada en su parte inferior, sin embargo, la vena es rectilínea, al paso que la arteria es flexuosa. Recibe la *vena gastroepiploica izquierda* (procedente de la curvatura mayor del estómago), *venas gástricas, pancreáticas y duodenales*

b) *Vena mesentérica inferior* — Corresponde a la arteria del mismo nombre, se extiende desde el recto hasta la cara posterior de la cabeza del páncreas describiendo una larga curva de concavidad a la derecha. Desemboca en la vena esplénica. Recibe las *venas cólicas izquierdas*, las cuales proceden de la mitad izquierda del intestino grueso

c) *Vena mesentérica superior.*—Como la arteria del mismo nombre, describe una extensa curva de concavidad a la derecha que va desde la terminación del intestino delgado hasta detrás de la cabeza del páncreas, en la que penetra después de haber cruzado la tercera porción del duodeno. Recibe 1.º, por su concavidad, las tres *venas cólicas derechas*, procedentes de la mitad derecha del intestino grueso, y 2.º, por su convexidad, las *venas del intestino delgado*. Se juntan a tronco común formado por las dos venas precedentes, para constituir el tronco de la vena porta

B. TRONCO DE LA VENA PORTA. — Así formado, el tronco de la vena porta se dirige oblicuamente hacia arriba y a la derecha, en dirección al hilo del hígado; corre por el epiploon menor y constituye el borde anterior del hiato de Winslow. Está en relación sucesivamente: con la cabeza del páncreas, con la segunda porción del duodeno, con la arteria hepática (que ocupa su cara anterior, cerca de su borde izquierdo) con el coledoco (que está situado a la derecha de su cara anterior). Por detrás está separado de la vena cava inferior por el hiato de Winslow. Recibe las *venas gastroepiploicas y coronaria estomacal*, que corresponden a las arterias homónimas y algunas veces la *vena cística*.

C. RAMAS TERMINALES — En el hilo del hígado, el tronco de la vena porta se divide en dos ramas: una, *derecha*, muy voluminosa, para el lóbulo derecho del hígado, y la otra, *izquierda*, para el lóbulo izquierdo. La disposición de estas dos ramas parece formar un vaso único y transversal, llamado *seno de la vena porta*. De estas ramas

nacen ramos secundarios que se capilarizan en el hígado y van a terminar en las venas suprahepáticas.

6.º Venas portas accesorias. — El hígado recibe, además, sangre venosa por otras venas más pequeñas, conocidas con el nombre de *venas portas accesorias*, las cuales forman cinco grupos:

a) *Grupo gastrohepático* Comprende las venillas situadas en el epiplón menor y que van a distribuirse por los lóbulos del hígado que se encuentran en la proximidad de surco transversal.

b) *Grupo cístico* Está formado por venillas procedentes de la mitad inferior de la vesícula biliar y se distribuyen por los lóbulos inmediatos.

c) *Grupo de las venillas nutricias.* — Está formado por venillas que nacen de las paredes de la vena porta, de la arteria hepática y de los conductores biliares y se ramifican en los lóbulos inmediatos.

d) *Grupo del ligamento suspensorio* — Comprende las venas que, nacidas en el diafragma, descienden entre las dos hojas del ligamento suspensorio y terminan en la cara superior del hígado.

e) *Grupo paraumbilical.* Está constituido por una serie de venillas que, nacidas cerca del ombligo, se dirigen hacia el hígado siguiendo el borde inferior del ligamento suspensorio. En su origen comunican con las venas epigástricas y con las mamarias internas.

Estos grupos de venas portas (principalmente los dos últimos, que procedentes de las paredes abdominales, entran en relación con las venas tegumentarias del abdomen) tienen importancia considerable en patología, porque permiten una *circulación colateral activa* en los casos en que la circulación porta esté detenida (cirrosis del hígado).

f) *Otras comunicaciones del sistema porta con el sistema venoso general.* — El sistema porta comunica, por muchas de sus ramificaciones, con venas tributarias del sistema cava.

a) *En el recto*, la vena hemorroidal superior, origen de la vena porta, comunica con las demás venas hemorroidales.

b) *En el cardíaco*, las ramificaciones de la vena coronaria estomacal están en relación con las venas esofágicas.

c) *En las paredes intestinales* existen algunas ramificaciones de las venas mesentéricas que, en lugar de alcanzar la vena porta, desaguan en la vena cava inferior, formando el *sistema de Retzius*. Se han encontrado en la cara posterior del duodeno y del colon transversal, en cuyos puntos se ve a estas venas alcanzar las espermatocáticas, las de las paredes abdominales y las renales (*anastomosis portorreñales directas*).

7.° **Venas suprahepáticas.** — Nacidas de las redes capilares del hígado, se dirigen hacia atrás, en dirección al canal de la vena cava inferior, y terminan en este último vaso. Se dividen en dos grupos.

a) *Grupo superior*, formado por dos grandes venas suprahepáticas, procedentes del lóbulo derecho y del lóbulo izquierdo del hígado.

b) *Grupo inferior*, que está formado por pequeñas venas suprahepáticas, procedentes de una parte del lóbulo de Spiegel y otra parte del lóbulo derecho.

8.° **Venas genitales.** Conducen a la cava inferior la sangre de los órganos genitales.

A **VENAS ESPERMÁTICAS (EN EL HOMBRE)** — Forman alrededor del testículo un plexo, *plexo espermático*, de donde nacen dos grupos de venas, que siguen el conducto deferente.

a) *Grupo anterior*, formado por cinco o seis venas, situadas por delante del conducto deferente y de la arteria espermática: al atravesar la fosa ilíaca interna, forman el *plexo pampiniforme*, que termina en la vena espermática. Esta última sigue a la arteria espermática y desagua, a la derecha, en la vena cava inferior, y a la izquierda, en la vena renal izquierda (por lo cual el varicocele es más frecuente en el lado izquierdo).

b) *Grupo posterior*, menos importante, corre por detrás del conducto deferente; las venas que lo constituyen desaguan en las venas epigástricas.

B **VENAS UTERO-OVÁRICAS (EN LA MUJER).** — Nacen del útero, de las trompas, del ovario, del ligamento redondo y del ligamento ancho. Forman en el interior del ligamento ancho un *plexo pampiniforme*. Llevan el mismo trayecto y tienen la misma terminación que las venas espermáticas.

9.° **Vena umbilical.** — Al igual que la arteria umbilical, la vena del mismo nombre es un órgano fetal.

a) *En el feto* conduce al hígado y a la vena cava inferior la sangre placentaria. Esta vena sigue al cordón, penetra en el abdomen por el ombligo y alcanza la cara inferior del hígado, siguiendo el borde inferior del ligamento suspensorio. Al llegar al surco transversal, se divide en dos ramas: una se continúa con la rama izquierda de la vena porta; la otra continúa la dirección de la vena umbilical, recorre la parte posterior del surco longitudinal y se abre en la vena cava inferior (*conducto venoso*).

B) *Después del nacimiento*, la vena umbilical se oblitera de delante atrás y casi se convierte en un cordón fibroso, que sigue el borde inferior del ligamento suspensorio del hígado (*ligamento redondo del hígado*). El conducto venoso se convierte, pues, en un cordón fibroso, que va desde la rama izquierda de la vena porta a la cara anterior de la vena cava inferior

CUARTA SECCION

LINFATICOS

Los linfáticos son conductos membranosos encargados de recoger y conducir al sistema venoso los líquidos del organismo, la *linfa* y el *quilo*, pues los vasos quilíferos son vasos linfáticos del intestino, que sólo difieren de los linfáticos ordinarios por su contenido. En el curso de su trayecto los vasos linfáticos atraviesan unos órganos globulosos llamados *ganglios*. Considerado en su conjunto, el sistema linfático comprende dos clases de formaciones: *vasos y ganglios*.

a) Como las venas los *vasos linfáticos* son convergentes. Pero, en vez de anastomosarse como aquéllas, corren paralelamente entre sí, conservando su individualidad, sin embargo, cambian algunas anastomosis, oblicuas longitudinales o en V. En el cuello, en la cabeza, en el tronco y en los miembros los hay *superficiales* y *profundos*, siguiendo generalmente adosados a las venas y teniendo las mismas relaciones que ellas. En las vísceras adoptan la misma disposición: unos son superficiales, llegando hasta la cara externa del órgano; los otros son profundos, y salen del mismo con los vasos por el hilio. Los vasos linfáticos son cilíndricos, pero representan una serie de dilataciones y estrangulaciones alternativas que les dan un aspecto nudooso; este aspecto es debido al gran número de *válvulas* que hay en el interior del vaso.

β) Los *ganglios linfáticos* se escalonan en el trayecto de los vasos linfáticos. Reciben un grupo de vasos por uno o muchos puntos, y éstos se llaman *vasos aferentes*, por el punto opuesto salen vasos más voluminosos, que se llaman *vasos eferentes*. Unos son superficiales y otros profundos. Raras veces se encuentran aislados, pues casi siempre forman grupos o verdaderos *rosarios*, comprendiendo tres, diez y hasta quince ganglios. Se encuentran siempre alrededor de los grandes vasos. Exteriormente tienen formas variables (redondeados, ovales reniformes) y también es variable su volumen. Su color es dife-

rente, los subcutáneos tienen un color rosa vivo, los del mesenterio tienen un color rosa pálido; cerca del bazo son oscuros; cerca del pulmón, negros. Están más desarrollados en el niño que en el adulto.

ARTÍCULO PRIMERO

CONDUCTOS COLECTORES LINFÁTICOS

Todos los vasos linfáticos terminan, en definitiva en dos conductos colectores, el *conducto torácico* y la *gran vena linfática*

1.º **Conducto torácico.** — Es el más importante de los dos.

a) *Origen y trayecto* — Nace por delante de la segunda o tercera vértebra lumbar por una dilatación, la *cisterna de Pecquet*. Desde este punto penetra en el tórax por el orificio aórtico del diafragma, y corre por la superficie anterior de la columna vertebral hasta la cuarta vértebra dorsal. Después se desvía hacia arriba y a la izquierda, se dirige hacia la apófisis transversa de la séptima vértebra cervical, forma en este punto un gancho de concavidad inferior y va a desaguar en el ángulo de unión de las *venas subclavia y yugular interna izquierda*.

b) *Relaciones* — Dentro del abdomen, está colocado entre la aorta y el pilar derecho del diafragma. Dentro del tórax corre por detrás de la aorta y de la arteria carótida primitiva izquierda. Su gancho terminal está situado en la parte interna de la arteria subclavia izquierda.

c) *Afluentes*. — Son numerosos.

a) *En su origen* recibe cinco ramas: 1.º, dos *ramas ascendentes*, que resumen la circulación linfática de los miembros inferiores, de la pelvis, de los órganos genitourinarios y del intestino grueso; 2.º, dos *ramas descendentes*, que resumen la circulación linfática de los nueve últimos espacios intercostales; 3.º, una *rama anterior*, que resume los linfáticos del intestino delgado, del estómago, del hígado y del bazo.

B) *Dentro del tórax* recibe algunos vasos procedentes de los primeros espacios intercostales.

γ) Por último *en su terminación*, recibe los linfáticos del miembro superior izquierdo (*tronco subclavio*), de la mitad izquierda de la cabeza y del cuello (*tronco yugular*), del pulmón izquierdo y del corazón (*tronco mediastínico*).

d) *Válvulas*. — Son escasas en el trayecto del conducto torácico; en su terminación existen dos que son *insuficientes*.

1.º **Gran vena linfática.** Recibe todos los linfáticos que no se dirigen al conducto torácico, es decir, los linfáticos del miembro superior derecho, de la mitad derecha de la cabeza y del cuello, del pulmón derecho y de la mitad derecha de las paredes torácicas, excepto los linfáticos intercostales, que van a la cisterna de Pecquet. Su longitud es de 1 a 2 centímetros y está situada entre la yugular interna y la vena subclavia del lado derecho. Desemboca en el ángulo formado por estos dos vasos.

ARTÍCULO II

GRUPOS GANGLIONARES LINFÁTICOS

Excepto algunos ganglios linfáticos aislados, que están situados a lo largo de los miembros, los demás están dispuestos en grupos. Cuentanse *once grupos principales*.

1. GANGLIO TIBIAL

A **Grupo ganglionar.** — Está situado en la cara anterior de la pierna, por delante de la parte superior del ligamento interóseo.

B. **Linfáticos aferentes.** — Son los *vasos linfáticos pedios y tibiales anteriores*; nacen en la parte profunda de la planta del pie y siguen el trayecto de la arteria pedia y de la tibial anterior.

C. **Linfáticos eferentes.** — Forman dos troncos, que atraviesan, con la arteria tibial anterior, el ligamento interóseo y llegan al hueco poplíteo.

2. GANGLIOS POPLÍTEOS

A. **Grupo ganglionar.** — Son cuatro, todos subaponeuróticos: uno está colocado en el punto de convergencia de la safena externa con la vena poplítea; los demás son más profundos y están situados a lo largo de la arteria (dentro o fuera).

B. **Linfáticos aferentes.** — Los ganglios poplíteos reciben 1.º, los *linfáticos eferentes del ganglio tibial anterior*; 2.º, los *linfáticos safenas externos*, que siguen el trayecto de la vena safena externa; 3.º, los *linfáticos tibiales posteriores*, que vienen de la parte profunda

de la pierna, siguiendo los vasos tibiales posteriores; 4.º, los *linfáticos peroneos*, que siguen el trayecto de los vasos peroneos; 5.º, los *linfáticos articulares*, que proceden de la articulación de la rodilla.

C. Linfáticos eferentes. — De los ganglios poplíteos salen *cuatro troncos*, que van a terminar en los ganglios inguinales, siguiendo los vasos femorales.

3. GANGLIOS INGUINALES

A Grupos ganglionares. — Se distinguen los ganglios inguinales en *ganglios superficiales* y *ganglios profundos*.

a) *Ganglios superficiales.* Están situados por encima de la *fascia cruris*; unos son *superiores* y tienen la forma de un elipsoide cuyo eje mayor es paralelo al arco de Galopio; otros son *medios* y de forma esférica, y otros son *inferiores* y de forma elíptica, con el eje mayor en dirección de arriba abajo. Topográficamente se les divide en cuatro grupos (QUÉNU): dos superiores (*superointerno* y *superoexterno*) y dos inferiores (*inferointerno* e *inferoexterno*).

A nivel de la desembocadura de la safena interna, dos líneas rectas — una horizontal y otra vertical, cruzadas, limitan cada uno de esos cuatro grupos.

b) *Ganglios profundos.* — Ocupan el tercio interno del conducto crural por dentro de la vena. Uno de ellos, el *ganglio de Cloquet*, está aplicado contra el borde cóncavo del ligamento de Gimbernat.

B Linfáticos aferentes. — Varían según la situación de los ganglios.

1.º **AFERENTES DE LOS GANGLIOS SUPERFICIALES.** — Son en gran número. Los distinguiremos en *cinco grupos*:

a) *Linfáticos superficiales del miembro inferior* — Excepto los dos o tres troncos que acompañan la safena externa y terminan en los ganglios poplíteos, los demás linfáticos superficiales del miembro inferior terminan en los ganglios inguinales superficiales. Nacen en los dedos del pie y en la planta, y siguen en general el trayecto de la vena safena interna para desembocar en los ganglios inguinales superficiales (en los dos grupos inferointerno e inferoexterno).

b) *Linfáticos superficiales de la nalga.* — Siguen dos direcciones: unos rodean la parte externa de la nalga y terminan en los ganglios inguinales superiores y externos, los otros se mezclan con los linfáticos del perineo y van a terminar en los ganglios superiores e internos.

c) *Linfáticos superficiales del perineo y del ano.* — Terminan en los ganglios superiores e internos.

d) *Linfáticos de los órganos genitales externos.* En el hombre proceden del escroto, de la piel del pene, del prepucio y de la mucosa uretral, en la mujer, de los grandes y pequeños labios, de la mucosa del vestibulo y del clitoris, de la uretra y del cuarto anterior de la vagina. Terminan en los ganglios superointernos.

e) *Linfáticos superficiales de la mitad subumbilical del abdomen.* — Nacen de las regiones lumbar, costoiliaca y subumbilical; convergen hacia el triángulo de Scarpa y terminan en los ganglios superiores.

2.º AFERENTES DE LOS GANGLIOS PROFUNDOS. — Son los siguientes: 1.º, los *vasos eferentes poplíteos*; 2.º, los *linfáticos profundos del miembro inferior*, excepto los de la cara posterior del muslo, que van a los ganglios hipogástricos.

C. *Linfáticos eferentes.* — Los de los ganglios superficiales se distribuyen en tres grupos: 1.º, un grupo externo y un grupo medio, que siguen los vasos femorales y terminan en los ganglios ilíacos; 2.º, un grupo interno, que va a parar a los ganglios inguinales profundos. Los de los ganglios profundos forman dos grupos: 1.º, uno externo, que va a los ganglios ilíacos externos; 2.º, otro interno, que va a los ganglios hipogástricos.

4 GANGLIOS ILÍACOS EXTERNOS O RETROCRURALES

A *Grupos ganglionares.* Son tres: uno externo, que ocupa la parte externa de la arteria ilíaca externa; otro interno, que ocupa la parte interna de la arteria ilíaca externa, y el tercero, medio situado en la cara anterior de estos vasos.

B *Linfáticos aferentes.* — Reciben: 1.º, los *linfáticos eferentes de los ganglios inguinales*, 2.º, los *linfáticos epigástricos* (paredes abdominales). 3.º, los *linfáticos circunflejos ilíacos*, que vienen de los músculos anchos del abdomen.

C *Linfáticos eferentes.* Forman cinco o seis troncos, que terminan en su mayoría en los ganglios lumbares, algunos de ellos van a terminar en los ganglios hipogástricos.

5. GANGLIOS DE LA PELVIS

A. Grupos ganglionares. — Son dos:

- a) *Ganglios hipogástricos.* — Están colocados en las paredes laterales de la pelvis, entre las dos arterias ilíacas
- b) *Ganglios sacros.* Ocupan la cara anterior del sacro, a lo largo de la arteria sacra media.

B. Linfáticos aferentes. — Son de tres orígenes

- a) *Linfáticos glúteos e isquáticos,* que conducen la linfa de la parte posterior del muslo y de la región glútea.
- b) *Linfáticos obturadores,* que proceden de los aductores del muslo y ganan la pelvis por el conducto subpubiano.
- c) *Linfáticos viscerales,* procedentes del recto, de la vejiga, de la próstata de las vesículas seminales en el hombre, y del útero y de los tres cuartos posteriores de la vagina en la mujer.

C. Linfáticos eferentes. — Los vasos eferentes de los ganglios linfáticos terminan en los ganglios lumbares. Los dos ganglios sacros van a parar a los ganglios lumbares y a los preaórticos

6. GANGLIOS LUMBOAÓRTICOS

A. Grupos ganglionares. — Forman tres grupos

- a) *Ganglios lumbares.* — Están escalonados a cada lado de la columna lumbar desde la porción media de la arteria ilíaca primitiva hasta la primera vértebra lumbar
- b) *Ganglios prevasculares.* — Escalonados a los lados de la aorta o de la vena cava inferior, desde la bifurcación de estos vasos al borde superior del páncreas. Llámaseles a veces *ganglios juxtaaórticos*
- c) *Ganglios viscerales.* Están situados en la periferia de las vísceras abdominales o a nivel de su hilio: algunos se encuentran cerca del estómago (curvatura menor), del bazo, del páncreas, del hígado, del mesenterio (en su inserción posterior) y del mesocolon (a lo largo del intestino grueso).

B. Linfáticos aferentes. — En los ganglios abdominales terminan 1.º, los *linfáticos eferentes de los ganglios ilíacos externos perivianos*, 2.º, los *linfáticos espermáticos*, que siguen los vasos espermáticos (en la mujer vienen del útero y del ovario), 3.º, los *linfáticos lumbares* que nacen de las paredes del abdomen; 4.º, los *linfáticos re-*

nales y suprarenales, 4.º, los linfáticos del estómago que siguen el trayecto de las tres principales arterias del estómago; 5.º, los linfáticos del bazo, de páncreas, del hígado, del intestino delgado (vasos quilíferos) y del intestino grueso.

C. **Linfáticos eferentes.** — Forman tres troncos principales, dos ascendentes y uno anterior, abiertos en la cisterna de Pecquet.

7. GANGLIOS DEL TÓRAX

A. **Grupos ganglionares.** — Hemos de dividirlos en ganglios *parietales* y ganglios *viscerales*.

a) **Ganglios parietales.** Consistuyen 1.º, los ganglios *diafragmáticos*, situados en la base del pericardio, 2.º, los ganglios *intercostales*, situados en la parte interna de los espacios intercostales; 3.º, los ganglios *mamarios internos*, situados a lo largo de la arteria homónima.

b) **Ganglios viscerales.** — Se distinguen: 1.º, los ganglios *mediastínicos anteriores*, 2.º, los ganglios *mediastínicos posteriores*; 3.º, los ganglios *traqueobronquiales*, escalonados desde la bifurcación de la tráquea hasta el hilo del pulmón, que se subdividen a su vez en muchos grupos secundarios: *pretraqueobronquiales derechos*, *pretraqueobronquiales izquierdos* e *intertraqueobronquiales*.

B. **Linfáticos aferentes.** — Los ganglios *diafragmáticos* reciben algunos linfáticos del hígado y los del diafragma. Los ganglios *mamarios internos*, los linfáticos de la porción supraumbilical del recto mayor y de la parte anterior de los espacios intercostales. Los ganglios *intercostales*, los linfáticos de los espacios intercostales y del raquis. Los ganglios *mediastínicos*, los de las vísceras inmediatas. Los ganglios *traqueobronquiales*, finalmente, los de la tráquea de los bronquios y del pulmón.

C. **Linfáticos eferentes.** — Los linfáticos intercostales de los ocho o nueve últimos espacios descienden hacia la cisterna de Pecquet. Los demás, los que proceden de los ganglios situados en los dos o tres primeros espacios, van a abrirse en el conducto torácico o en la gran vena linfática.

8. GANGLIOS DE LA CABEZA

A. **Grupos ganglionares.** Son seis. 1.º, ganglios *suboccipitales*, que descansan sobre el complejo mayor, por debajo de la línea

curva superior del occipital; 2.º, ganglios *mastoideos*, situados detrás de la apófisis mastoides y cubiertos por el músculo esternocleidomastoideo; 3.º, ganglios *parotídeos*, situados en la misma glándula (uno de ellos, delante del trago, se llama ganglio *preauricular*); 4.º, ganglios *submaxilares*, situados en la cara interna y borde inferior del maxilar inferior (ganglio de *Stahr*, junto a la arteria facial). 5.º, ganglios *suprahioideos* o *submentonianos*, comprendidos entre los dos vientres anteriores de los digástricos. 6.º, ganglios *retrofaringeos* (uno o dos), situados detrás de la faringe a nivel de las masas laterales de *AZULAS*.

B. Linfáticos aferentes. — Proviene del *cráneo* y de la *cara*.

1.º **LYMFÁTICOS DEL CRÁNEO** — Los *linfáticos extracraneales* nacen en los tegumentos de la bóveda del cráneo por delante, terminan en los ganglios parotídeos (*linfáticos frontales*); por detrás en los ganglios occipitales (*linfáticos occipitales*), por los lados en los ganglios mastoideos (*linfáticos parietales*). Los *linfáticos intracraneales* salen del cráneo por los mismos orificios que los vasos y terminan en los ganglios del cuello.

2.º **LYMFÁTICOS DE LA CARA** — Los *linfáticos superficiales* terminan casi todos en los ganglios suprahioideos y submaxilares. Únicamente los de la región malar van a los ganglios parotídeos. Los *linfáticos profundos* vienen de los órganos de los sentidos (véase más adelante).

C. Linfáticos eferentes. Terminan todos en los ganglios del cuello.

9. GANGLIOS DEL CUELLO

A. Grupos ganglionares. — Ocupan todos la parte anterior del cuello. unos son *superficiales*, están situados en la cara externa del músculo esternocleidomastoideo (pero bajo la aponeurosis) y parecen agruparse alrededor de la yugular externa (*cadena yugular externa*), los otros, *profundos*, más numerosos, están colocados a lo largo de la yugular interna (*cadena yugular interna*). Además de esos ganglios manifiestamente *laterales*, se ven algunos ganglios *medianos* (*prelaringeos*, *pretraqueales*, *pretrócleos*).

B. Linfáticos aferentes. Son los siguientes: 1.º, los *linfáticos eferentes* de los ganglios de la cabeza; 2.º, los *linfáticos* de la nariz, de la bóveda palatina y del velo del paladar; 3.º, los *linfáticos*

de los órganos cervicales (esófago, faringe, laringe, tráquea y cuerpo tiroideos).

C. Linfáticos eferentes. — Se dirigen todos hacia la base del cuello, formando gruesos troncos (*troncos yugulares*), que desembocan a la izquierda, en el conducto torácico, y a la derecha, en la gran vena linfática.

10. GANGLIOS SUPRAEPITROCLEARES

Son dos o tres, situados por delante y algo por encima de la epitróclea, cerca de la vena basilica, son superficiales. Sus vasos aferentes son los linfáticos de la parte interna de la mano y del antebrazo. Sus vasos eferentes van a los ganglios axilares siguiendo la vena basilica.

11. GANGLIOS DE LA AXILA

A. Grupos ganglionares. — Son extremadamente numerosos y forman cinco grupos (OELSENER): 1.º, grupo braquial (cuatro o cinco ganglios) dispuesto en las dos caras anterior e interna del paquete vascular; 2.º, grupo escapular (seis o siete), situado a lo largo de la arteria escapular inferior; 3.º, grupo torácico o mamario externo (cuatro a ocho) dispuesto en la parte interna de la axila, debajo de los pectorales; 4.º, grupo central (tres a cinco), situado entre los tres grupos precedentes, en la parte media de la base de la axila; 5.º grupo infraclavicular (seis a doce), colocado en el vértice del hueco de la axila, en el lado de la vena axilar.

B. Linfáticos aferentes. — Son los siguientes:

a) *Linfáticos superficiales de los ganglios supraepitrocleares*

b) *Linfáticos superficiales del miembro superior* — Nacen, como en el miembro inferior, en todos los puntos de los tegumentos que cubren la mano, el antebrazo y el brazo. Terminan en el grupo externo o braquial.

c) *Linfáticos profundos del miembro superior* — Siguen el trayecto de las arterias para alcanzar la axila. Terminan, como los precedentes, en los ganglios del grupo externo (algunos en el grupo escapular).

d) *Linfáticos superficiales de la mitad supraumbilical del tronco* — Estos forman tres grupos: los vasos anteriores, que dan vuelta al borde inferior del pectoral mayor para llegar a la axila; los vasos

posteriores, que rodean el borde inferior del dorsal ancho, los *vasos laterales*, que llegan a la axila por entre el pectoral mayor y el dorsal ancho. Los primeros desembocan en el grupo mamario externo, y los otros en el grupo escapular.

e) *Linfáticos superficiales de la nuca*. — Estos dan vuelta al borde inferior del dorsal ancho para llegar al hueco de la axila.

f) *Linfáticos de la mama*. — Se unen a los linfáticos anteriores de tórax y dan vuelta al borde inferior del pectoral mayor terminando en los ganglios del grupo torácico. Es de notar que otros linfáticos mamaros perforan los espacios intercostales y llegan a los ganglios mamaros internos. (Véase *Mamas*.)

C **Linfáticos eferentes**. — Se dirigen a los ganglios subclaviculares. De estos ganglios parten en seguida dos troncos voluminosos (*troncos subclavios*), que, pasando por debajo de la clavícula, desembocan en el hueco infraclavicular y terminan *a la izquierda*, en el conducto torácico, y *a la derecha*, en la vena linfática mayor.

LIBRO V

NEUROLOGIA

La neurología es la parte de la anatomía que trata del *sistema nervioso*. El sistema nervioso, considerado en conjunto, comprende dos clases de órganos:

1.º Órganos centrales, alojados en el conducto óseo craneorraquídeo y que constituyen el *sistema nervioso central*

2.º Órganos periféricos situados fuera de este conducto y que constituyen el *sistema nervioso periférico*.

PRIMERA SECCION

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

El sistema nervioso central, llamado también *tronco eje encefalo-medular*, comprende las cinco partes siguientes: 1.º, la *medula espinal*; 2.º, el *bulbo raquídeo*; 3.º, el *cerebelo*; 4.º, el *istmo del encéfalo*; 5.º el *cerebro*. Estudiaremos sucesivamente cada una de estas partes; después describiremos sus envolturas o *meninges*.

CAPITULO PRIMERO

MEDULA ESPINAL

La *medula espinal*, o simplemente *medula*, llamada así en razón de la ligera analogía que presenta con la medula de los huesos largos, es el segmento inferior del neuraxo. Podemos definirla: aquí el a parte del sistema nervioso central que ocupa el conducto raquídeo.

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.º **Forma.** — La medula tiene la forma de un largo tallo cilíndrico, ligeramente aplanado en sentido anteroposterior. Conservando su forma cilíndroide, presenta dos engrosamientos, uno superior (*engrosamiento cervical*) y otro inferior (*engrosamiento lumbar*). Ambos corresponden al origen de los nervios que se dirigen a los miembros: al miembro superior los del engrosamiento cervical; al miembro inferior los del engrosamiento lumbar.

2.º **Límites.** — Por arriba, la medula se fusiona con el bulbo; el límite de separación, aunque convencional, corresponde a la parte inferior del *entrecruzamiento de las pirámides*. Por abajo termina en una porción punteada, el *cono terminal*. El *límite superior* corresponde a un plano horizontal que pasa rasando la articulación del atlas con los cóndilos del occipital, el *límite inferior*, al cuerpo de la segunda vértebra lumbar. Es de notar que el cono se continúa con una prolongación muy delgada, el *filum terminale*. El *filum terminale* (*medula coccígea*), formación rudimentaria, es a la medula lo que el cóccix a la columna vertebral.

3.º **Dimensiones.** — La medula presenta, por término medio, de 43 a 45 centímetros de *longitud*. Su *circunferencia* es de 38 milímetros a nivel del engrosamiento cervical, de 33 milímetros a nivel

del engrosamiento lumbar y de 27 milímetros solamente en la porción intermedia.

4.º **Consistencia y peso.** — La medula tiene mayor consistencia que el cerebro. Su peso es, por término medio, de 26 a 30 gramos en el hombre (1 ó 2 gramos menos en la mujer), o sea la cuatragesima parte del cerebro. Su densidad es de 1,0387.

5.º **Dirección.** — Sigue exactamente las inflexiones de la columna vertebral y, por lo tanto, presenta dos curvaturas anteroposteriores, una *curvatura cervical*, de concavidad posterior, una *curvatura dorsal* de concavidad dirigida hacia delante.

6.º **Relaciones generales.** La medula se encuentra situada en el centro del conducto raquídeo, pero no ocupa más que una parte de ese conducto (el diametro de la medula es al del conducto como 3 es a 5). El intervalo está ocupado primeramente por las meninges y el líquido cefalorraquídeo; además por fuera de las meninges (*espacio epidural*), por una grasa semifluida por plexos venosos y ligamentos.

7.º **Medios de fijación.** — Esta mantenida en posición, 1.º, hacia arriba, por su continuidad con el bulbo; 2.º hacia abajo, por el *ligamento cocigeo*, prolongación de la duramadre, que envuelve el *filum terminale* a manera de vaina y viene a implantarse en la base del cóccix; 3.º, en toda su altura, por prolongaciones de la pia madre, de las que las dos principales son los dos *ligamentos dentados* (véase *Meninges*).

2 CONFORMACIÓN EXTERIOR

En el cilindro medular podemos considerar *cuatro caras*: una anterior, una posterior y dos laterales.

1.º **Cara anterior.** — Esta presenta 1.º, en la línea media, el *surco medio anterior*, de 2 ó 3 milímetros de profundidad, limitado en su parte profunda por una lámina blanquecina, la *comisura blanca de la medula*, 2.º a cada lado del surco medio, la emergencia de las *raíces anteriores* de los nervios raquídeos (es de notar que estas raíces se desprenden de la medula de un modo esencialmente irregular, formando una faja y no siguiendo una línea), 3.º, entre el surco medio y la emergencia de las raíces anteriores, un cordón blanco, el *cordón anterior*.

2.º **Cara posterior.** — Esta presenta 1.º en la línea media, el *surco medio posterior*, muy poco profundo, 2.º, a derecha e izquierda del surco medio y a 3 milímetros por fuera un segundo surco, el *surco colateral posterior*, de donde emergen las *raíces posteriores* de los nervios raquídeos (es de notar que nacen regularmente las unas encima de las otras); 3.º, entre el surco medio y el surco colateral, un cordón blanco, el *cordón posterior*. En la región cervical, este cordón posterior se encuentra subdividido por un surco, llamado *surco intermediario* o *surco paramedio*, en dos fascículos: uno interno o *fascículo de Goll*, y el otro externo o *fascículo de Burdach*.

3.º **Caras laterales.** — Comprendidas entre la emergencia de las raíces anteriores y las de las raíces posteriores, las dos caras laterales de la medula están formadas cada una por un cordón blanco, el *cordón lateral*.

3. CONFORMACIÓN INTERIOR

Desde el punto de vista de la conformación interior, la medula ofrece a nuestra consideración dos elementos, 1.º, un *conducto central*, 2.º, a *substancia nerviosa* que lo rodea.

1.º **Conducto central.** — Llamado también *conducto del epéndimo*, *ventrículo de la medula*, está situado en el centro de la comisura gris y ocupa toda la altura de la medula. Se abre, por arriba, en el cuarto ventrículo. Por abajo se prolonga más o menos en el filum terminal (nótese en la extremidad inferior del cono terminal un pequeño engrosamiento de este canal, ovalado o fusiforme; es el *ventrículo terminal* de KRAUSE). El conducto del epéndimo es extremadamente estrecho (de 2 a 200 μ de diámetro), obliterado lo más a menudo en diversos puntos. Forma muy variable: ova, para la medula cervical, circular para la medula dorsal, triangular o en T para la medula lumbar. Es el vestigio del ancho conducto que presenta la medula en los primeros estadios de su desarrollo embrionario.

2.º **Substancia nerviosa.** — Al observar un corte transversal de la medula hecho a una altura cualquiera, veremos primero examinando sencillamente el contorno del corte, que el cilindro medular está dividido, por los dos surcos medios, en *dos mitades métricas*, y por otra parte, que cada mitad está constituida por *tres cordones*: uno anterior, otro posterior y otro lateral. Veremos en seguida, examinando este corte que la medula se compone de dos substancias: una

substancia gris, que ocupa el centro, y una *substancia blanca*, situada en la periferia.

A) **SUBSTANCIA GRIS** — En cada mitad de la medula, la *substancia gris* tiene la forma de una *media luna*, con la concavidad dirigida hacia fuera, cuyas dos extremidades, llamadas *astas*, se distinguen en anterior y posterior. Cada *media luna* se halla unida a la del lado opuesto por una parte intermedia que les es común, la *comisura gris*.

a) *Asta anterior*. — Voluminosa, mira hacia delante y afuera, terminando por delante a cierta distancia de la superficie exterior de la medula. Su contorno es irregular como festoneado. Se distinguen en ella una porción anterior o *cabeza*, y una porción posterior o *base*. En la parte superior de la medula dorsal y en la parte inferior de la medula cervical el *asta anterior* presenta, en su parte posteroexterna, una prolongación transversal más o menos desarrollada, es el *asta lateral*, denominada también *tracto intermedio lateral*.

b) *Asta posterior*. — Relativamente pequeña, delgada como afilada, de contornos limpios, se dirige oblicuamente hacia atrás y afuera y se extiende hasta el surco colateral posterior, sólo o está separada del fondo del surco por una delgada capa de *substancia blanca*, a la cual se da el nombre de *zona marginal de Lissauer* o, sencillamente, *zona de Lissauer*. Se consideran en ella tres porciones: 1.ª una porción posterior o *cabeza*; 2.ª, una porción anterior o *base* (se continúa con la base del *asta anterior*). 3.ª, una porción media más o menos estrecha, el *cuello*. La *cabeza* no tiene un aspecto homogéneo: constituida hacia delante por la *substancia gris* ordinaria, se halla formada, en su parte posterior, por una *substancia especial* transparente, de aspecto gelatinoso: es la *substancia gelatinosa de Rolando*. Vista en cortes transversales, la *substancia gelatinosa* afecta la forma de una U o de una V, cuya concavidad, dirigida hacia delante, cubre la parte correspondiente de la *cabeza*. Está limitada hacia atrás, del lado del surco colateral posterior, por una delgada capa de *substancia gris* ordinaria, la *capa zonal de Waldeyer*.

c) *Comisura gris*. — Faja de *substancia gris* transversal, que une mutuamente las dos *astas*. Presenta desde luego, en su centro, un conducto longitudinal, que se extiende de un extremo a otro de la medula: *conducto central* o *conducto del epéndimo*. Alrededor del conducto del epéndimo se ve una nueva *substancia gelatinosa*: la *substancia gelatinosa central*. La *comisura gris* está en relación, por delante, con una lámina de *substancia blanca*, la *comisura blanca* de la medula que la separa del surco medio anterior. Por detrás, y en

la línea media, está en relación con un tabique neurológico, el *septum medio posterior*, que va desde este punto al surco medio posterior. A derecha y a izquierda del conducto del epéndimo se encuentran dos venas longitudinales: las *venas de la comisura gris*. El conducto del epéndimo divide la comisura gris en dos porciones: una anterior o *preependimaria*, que se designa también con el nombre de *comisura gris anterior*, y otra posterior o *retroependimaria*, llamada también *comisura gris posterior*.

B SUBSTANCIA BLANCA La sustancia blanca está dispuesta al rededor de la sustancia gris formando el *manto medular*. Se reparte, en cada mitad de la medula, en tres cordones: 1º, un *cordón posterior*, el mejor delimitado de los tres, de forma triangular, comprendido entre el asta posterior, el *septum medio posterior* y el surco medio posterior; 2º, un *cordón anterior*, igualmente triangular, limitado hacia dentro por el surco medio anterior y hacia fuera por el asta anterior y la emergencia de las raíces anteriores (es de notar que los dos cordones anteriores, el derecho y el izquierdo, están unidos entre sí por la *comisura blanca*); 3º, un *cordón lateral*, comprendido entre los otros dos, este cordón se halla íntimamente adosado, por su cara profunda, al lado externo de las dos astas anterior y posterior.

4. CONSTITUCIÓN ANATÓMICA

La medula espinal, aparte de la *neuroglia* (que no haremos más que indicar por pertenecer su descripción a la histología) comprende *elementos nerviosos*, que estudiaremos sucesivamente: 1º, en la *sustancia gris*; 2º, en la *sustancia blanca*.

A Elementos nerviosos de la sustancia gris

La columna gris central presenta dos clases de elementos nerviosos: *fibras nerviosas* y *células nerviosas*.

1º Fibras nerviosas. Las fibras nerviosas de la sustancia gris pertenecen todas, salvo algunas excepciones, a la categoría de fibras amielínicas. Sumamente numerosas y entrecruzadas en todos sentidos, forman en conjunto un retículo muy complicado. Es de observar que, por complicado que sea este retículo, no constituye un plexo, sino un simple fieltro, donde cada fibrilla conserva, hasta su terminación, su independencia anatómica. No existen anastomosis verdaderas entre ellas.

2.º Células nerviosas. — Las células nerviosas de la sustancia gris central, cualesquiera que sean su forma y dimensiones, se distinguen en tres grupos. 1.º, *células de raíces* o *células radiculares*, 2.º *células de cordón* o *células cordonales*, 3.º, *células de cilindroeje corto*.

a) *Células radiculares*. — Las células radiculares son aquellas cuyos cilindroesjes van a las raíces de los nervios raquídeos. Son motorices o vasomotorices. La mayor parte envían su cilindroeje a las raíces anteriores, y son las *células radiculares anteriores*, las otras muy poco numerosas, envían su cilindroeje a las raíces posteriores, y son las *células radiculares posteriores*.

b) *Células cordonales*. — Las células cordonales son las que envían su cilindroeje a los cordones, ya al cordón anterior (*células cordonales anteriores*), ya al cordón posterior (*células cordonales posteriores*), ya al cordón lateral (*células cordonales laterales*). Estas células cordonales se denominan: 1.º, *homolaterales* u *homómeras*, cuando su cilindroeje ingresa en uno de los cordones del lado correspondiente; 2.º, *heterolaterales* o *heterómeras*, cuando envían su cilindroeje a los cordones blancos del lado opuesto, 3.º, *bilaterales* o *dímeras*, cuando envían su cilindroeje, después de bifurcarse, a la vez al lado correspondiente y al lado opuesto. Cualesquiera que sean su dirección y trayecto, los cilindroesjes de las células cordonales, una vez llegados al cordón a que están destinados, se rodean de mielina, y luego se bifurcan en dos ramas, una ascendente y otra descendente, éstas, después de un trayecto variable, pero siempre corto (son *vías cortas*), se inclinan hacia dentro entran de nuevo en la columna gris y allí termina cada una por una arborización libre, que envuelve con sus numerosas fibrillas una célula nerviosa, ya del asta anterior, ya del asta posterior. Son éstas las *fibras de asociación longitudinales* que ponen en comunicación las capas sucesivas de la médula.

c) *Células de cilindroeje corto*. — Estas células (*células de Golgi, tipo II*), presentan como carácter esencial su cilindroeje, muy corto, que termina en la misma sustancia gris cerca del cuerpo celular del que emana. Son las *células* o *neuronas de asociación* que ponen en comunicación las células cuyas arborizaciones terminales reciben y aquellas a las cuales envían las suyas.

3.º Modo de repartición de células nerviosas en la sustancia gris. — Las tres clases de células que acabamos de describir no se hallan repartidas de cualquier modo en la sustancia gris. La mayor

parte de ellas se agrupan sistemáticamente, formando en conjunto lo que se llaman *núcleos* (en cortes transversales) o *columnas* (en cortes longitudinales)

a) *Células nerviosas del asta anterior*. — Forman, en primer término, tres núcleos: 1.º, el *núcleo anterointerno*, situado en el ángulo anterointerno del asta anterior; contiene las células radiculares anteriores (células motrices) y las células cordonales heterolaterales, que pasan al cordón anterior del lado opuesto, 2.º, un *núcleo anteroexterno*, que ocupa el ángulo anteroexterno del asta, está casi exclusivamente constituido por células radiculares motrices que se dirigen a las raíces anteriores, 3.º un *núcleo posteroexterno o lateral*, que ocupa el asta lateral; las células que lo constituyen son, en parte, células radiculares que envían su cilindroeje a la raíz anterior, y en parte, células cordonales que envían su cilindroeje al cordón anterior o al cordón lateral del mismo lado. Además de estos tres núcleos, se encuentran también en todo el territorio del asta anterior *células solitarias*, cuyos cilindroesjes se dirigen unas veces a los cordones (células cordonales) y otras a las raíces posteriores (células radiculares posteriores).

b) *Células nerviosas del asta posterior*. — Constituyen los tres grupos siguientes. 1.º *columna de Clarke*, situada en la parte interna de la base de las astas posteriores; ofrece en cortes transversales una forma redondeada u ovalada; está formada por células cuyos cilindroesjes se dirigen hacia fuera para formar el fascículo cerebeloso directo; la columna de Clarke caracteriza la medula dorsal (en efecto, no existe en la medula cervical ni en la medula lumbar, o con más exactitud, está sólo representada por células diseminadas), 2.º, el *grupo de la sustancia gelatinosa de Rolando*, situado en la sustancia del mismo nombre; se dispone en tres zonas concéntricas; las células constitutivas de estas tres zonas son células cordonales, que envían sus cilindroesjes ya a la parte próxima del cordón lateral, ya al cordón posterior, 3.º, las *células solitarias del asta posterior*, algo diseminadas por todas partes, se distinguen en células de cilindroeje corto y células cordonales (que envían su cilindroeje, ya al lado correspondiente, ya al lado opuesto).

c) *Células nerviosas de la comisura*. — Forman en la sustancia gelatinosa central, el *grupo central perpendiculado*. Son también células cordonales, ya homolaterales, ya heterolaterales.

B Elementos nerviosos de la sustancia blanca

La sustancia blanca está esencialmente constituida por fibras nerviosas mielínicas (sin vaina de Schwann). Estas fibras se agrupan en sistemas autónomos (*sistematización*), que examinaremos sucesivamente: 1° en el *cordón anterior*; 2°, en el *cordón lateral*; 3°, en el *cordón posterior*.

1° *Sistematización del cordón anterior*. — El cordón anterior representa dos fascículos: e. *fascículo piramidal directo* y e. *fascículo fundamental del cordón anterior*.

a) *Fascículo piramidal directo*. — Llamado también *fascículo piramidal anterior* o *fascículo de Furch*, tiene la forma de una cintilla aplanada transversalmente, situada inmediatamente por fuera del surco medio anterior. Está constituido por *fibras descendentes*, que nacen en las células piramidales de la zona motriz de la corteza cerebral (*fibras motrices voluntarias*). A medida que van descendiendo, se entrecruzan en la línea media con las del lado opuesto, para terminar, por arborizaciones terminales libres alrededor de las células motrices de las astas anteriores.

b) *Fascículo fundamental del cordón anterior*. — Llamado también *fascículo restante del cordón anterior*, está situado por fuera del precedente y, como su nombre indica, representa lo que resta del cordón anterior una vez separado el fascículo piramidal directo. Las fibras que lo constituyen provienen de las células cordoneales del asta anterior, ya del lado correspondiente, ya del lado opuesto. Al penetrar en la sustancia blanca, cada una de ellas se divide en dos ramas, una *ascendente* y la otra *descendente* (la descendente es más delgada que la otra), las cuales, después de un trayecto longitudinal siempre muy corto, entran de nuevo en la sustancia gris, para terminar en ella por arborizaciones terminales libres. Son *fibras de asociación longitudinales* entre las diferentes capas de la columna gris central. Además de estas fibras de asociación longitudinales, el fascículo fundamental del cordón anterior contiene también, en su parte externa, cierto número de *fibras radicales* que, desde las células motrices del asta anterior, se dirigen a las raíces anteriores de los nervios raquídeos.

El fascículo restante contiene además fibras pertenecientes a las vías motrices extrapiramidales: 1°, *fascículo tectoespinal*, procedente de los tubérculos cuadratogéminos anteriores; 2° *fascículo reticuloespi-*

nal, procedente del fascículo longitudinal posterior del bulbo; 3° *fi bras vestibuloespinales*, que proceden del núcleo de Deiters. origen de los nervios vestibulares.

2° **Sistematización del cordón lateral.** Comprende cinco sistemas distintos. el *fascículo cerebeloso directo*, el *fascículo piramidal cruzado*, el *fascículo de Gowers*, el *fascículo lateral profundo* y el *fascículo fundamental del cordón lateral*.

a) *Fascículo cerebeloso directo* — Ocupa la parte posterior y superficial del cordón lateral; aparece, en la corteza de la medula, bajo la forma de una cimula aplanada transversalmente y muy de gada. Se extiende, en sentido anteroposterior, desde el surco colateral posterior hasta la proximidad de una línea transversal que pasara por el conducto del epéndimo. Morfológicamente está formado por fibras longitudinales que toman su origen de la columna de Clarke y por las células que, en la medula lumbar y en la medula cervical son as homólogas de esta columna. El fascículo cerebeloso directo remonta directamente hasta el bulbo, donde lo volveremos a encontrar. Las impresiones que transmite pertenecen a la sensibilidad profunda.

b, *Fascículo piramidal cruzado.* Situado por dentro del precedente, se presenta, en los cortes, bajo la forma de un cordón grueso, redondeado u ovalado. Se le denomina *piramidal* porque, a nivel del bulbo, ocupa, como el fascículo piramidal directo, la columna de sustancia blanca que lleva el nombre de *pirámide* (véase *Bulbo*). Por otra parte se le denomina *cruzado* porque ocupa en la medula el lado opuesto al que ocupa en su trayecto encefálico. Está constituido, como el fascículo piramidal directo, por *fibras descendentes* que nacen por arriba en las células piramidales de la zona motriz de la corteza cerebral, y terminan hacia abajo, después de un trayecto variable, alrededor de las células motrices del asta anterior es, pues, también un conducto de intitaciones motrices voluntarias que une los centros motores de la corteza cerebral, *centros de voluntad* a las células motrices de las astas anteriores, *centros de ejecución*.

c) *Fascículo de Gowers* — Situado por delante del fascículo cerebeloso directo, ocupa la parte más superficial de la mitad anterior del cordón lateral. Reviste, en los cortes, la forma de una media luna de concavidad interna. Toma su origen de las células corticales heterómeras del asta posterior. Las fibras nerviosas que emanan de estas células cruzan a línea media a través de la comisura anterior e ingresan en el fascículo de Gowers, siguiendo entonces un trayecto lon

gitudinal y ascendente hasta el bulbo, donde las volveremos a encontrar. Transmite, como el fascículo cerebeloso directo, impresiones a la sensibilidad profunda.

d) *Fascículo lateral profundo* — Este fascículo está aplicado junto a la cara externa de la columna gris central, por dentro del fascículo piramidal cruzado y del fascículo cerebeloso directo. Está constituido por fibras de asociación de trayecto longitudinal, igual que el fascículo fundamental del cordón anterior. *fibras espinoespinales*.

e) *Fascículo fundamental del cordón lateral*. — Llamado también *fascículo restante del cordón lateral*, este fascículo es lo que resta del cordón lateral, excepción hecha de los cuatro fascículos ya estudiados. Tiene exactamente la misma constitución anatómica y la misma significación que el fascículo fundamental del cordón anterior; está formado por fibras de asociación longitudinales. *fibras espinoespinales*.

f) *Fibras de las vías extrapiramidales* — Estas fibras se agrupan en fascículos distintos, o bien en pequeños paquetes que se mezclan con los otros fascículos. Pueden señalarse: 1º, el *fascículo rubroespinal*, que viene del núcleo rojo (véase *Pedúnculo*) y se halla situado por delante del fascículo piramidal; 2º, *fibras vestibuloespinales*, situadas detrás del fascículo de Gowers; 3º, el *fascículo cerebeloso descendente de Marchi*, a menudo mal individuado, situado en la superficie del cordón lateral; 4º, el *fascículo triangular de Hetueg*, que proviene de la región subtalámica y de la oliva bulbar. Las fibras de estos fascículos terminan alrededor de las células motrices de las astas anteriores.

3º **Sistematización del cordón posterior.** — El cordón posterior se subdivide en dos fascículos: uno interno o *fascículo de Goll*, otro externo o *fascículo de Burdach*. Estos dos fascículos, poco diferentes por su naturaleza, contienen uno y otros dos clases de fibras: 1ª, fibras que vienen de fuera de la medula, *fibras exógenas* o *radiculares*; 2ª, fibras procedentes de la sustancia gris de la medula, *fibras endógenas* o *espinales*.

A **FIBRAS EXÓGENAS O RADICULARES.** — Proviene, como su nombre indica, de las raíces posteriores: no son sino estas mismas raíces.

a) *Entrada de las raíces posteriores en la medula.* Las raíces posteriores están constituidas por las prolongaciones cilindroaxiales de las células nerviosas de los ganglios espinales. Penetran en el surco colateral posterior formando dos grupos de haces, uno interno y otro externo: el grupo externo se compone de fibras de gádadas de desarrollo

tardío el grupo interno está formado en gran parte por fibras gruesas y de desarrollo precoz. Las fibras constitutivas de uno y otro grupo, inmediatamente después de su entrada en la medula (en plena zona de Lissauer véase pág. 343) se bifurcan: cada una en una rama ascendente y en una rama descendente: las ramas descendentes, muy delgadas, se doblan hacia delante después de un trayecto muy corto y penetran en el asta posterior, donde terminan por arborizaciones libres; las ramas ascendentes, mucho más importantes, penetran la mayor parte (algunas de ellas procedentes del grupo externo, se dirigen directamente al asta posterior, para terminar allí del mismo modo que las ramas descendentes) en el fascículo de Burdach, formando en su reunión un fascículo voluminoso, que designaremos en adelante con el nombre de *fascículo radicular del cordón posterior*.

b) *Trayecto intramedular del fascículo radicular posterior*

A su entrada en el cordón posterior, el fascículo radicular se coloca primeramente en el lado interno del asta posterior. Después, dirigiéndose de abajo arriba y de fuera adentro, atraviesa oblicuamente el fascículo de Burdach, alcanza el lado externo del fascículo de Goll y penetra en este último fascículo, donde permanecerá hasta su terminación. El fascículo radicular ocupa, pues, sucesivamente en el cordón posterior los tres puntos siguientes: 1.º, el lado interno del asta posterior, en su *primera etapa* (tiene la forma de media luna, cuyo borde cóncavo se amolda exactamente sobre la parte posterointerna del asta, *campo cornu radicular* de P. MARIE); 2.º, la parte media del fascículo de Burdach, en su *segunda etapa* (se ha aplanado en sentido transversal, al mismo tiempo que se ha alargado en sentido anteroposterior, *costilla externa* de PIERRET); 3.º, el fascículo de Goll, en su *tercera etapa* (ofrece en los cortes el aspecto de un triángulo, cuya base, dirigida hacia atrás, corresponde a la periferia de la medula). Recorriendo así sus diversas etapas, el fascículo radicular disminuye poco a poco de volumen. Esto se debe a que, en su camino, manda cierto número de fibras al asta posterior.

c) *Modo de terminación del fascículo radicular.* Las fibras constitutivas del fascículo radicular, aun teniendo el mismo origen y probablemente el mismo valor anatómico, difieren mucho en cuanto a su longitud, y podemos, desde este punto de vista, dividirlos en *fibras cortas*, *fibras medianas* y *fibras largas*.

a) Las *fibras cortas* se separan del fascículo radicular durante su primera etapa. Se dirigen oblicuamente hacia delante y afuera, penetran en la cabeza del asta posterior y allí se resuelven en arboriza-

ciones terminales libres alrededor de los elementos celulares, ya de la sustancia gelatinosa, ya de la sustancia esponjosa.

B) Las *fibras medianas* se separan del fascículo radicular durante su segunda etapa, y vienen a terminar siempre, por arborizaciones libres, en la columna de Clarke

γ) Las *fibras largas* son aquellas que del fascículo radicular pasan al fascículo de Goll; dicho de otro modo, es el mismo fascículo radicular desprovisto, en el curso de sus dos primeras etapas de sus fibras cortas y de sus fibras medianas. Van directamente hasta el bulbo, donde terminan en los núcleos de Goll y de Burdach. Las más largas son, naturalmente, las que proceden de más abajo (nervios sacros); las más cortas, las que vienen de más arriba (nervios cervicales). Es de notar que en un punto cualquiera del fascículo de Goll, las fibras radiculares largas están dispuestas de tal modo (ley de Kahler), *que están tanto más próximas al tabique medio, cuanto más bajo es su punto de entrada en la medula espinal*. Es decir, las fibras más internas son las que vienen de más abajo; las fibras más externas, las que son de adquisición más reciente.

Las fibras de los fascículos de Goll y de Burdach transmiten impresiones de sensibilidad profunda consciente (percepción estereognóstica) e impresiones táctiles.

B FIBRAS ENDÓGENAS O ESPINALES. — Así llamadas porque provienen de la misma medula. Son poco numerosas con relación a las fibras exógenas.

a) *Origen y trayecto*. — Proviene de las células cordonales de las astas posteriores. Llegadas al cordón posterior, cada una de ellas se divide en dos ramas, una *ascendente* y la otra *descendente*, las cuales después de un trayecto muy corto entran de nuevo en el asta posterior y terminan allí por arborizaciones libres.

b, *Fibras ascendentes*. Las fibras endógenas ascendentes (degeneran de abajo arriba) se condensan en la parte anterior de un fascículo más o menos individuado, llamado *fascículo ventral del cordón posterior* *zona cornucomisural de Marie* *campo de Westphal*.

c) *Fibras descendentes*. — Las fibras endógenas descendentes (degeneran de arriba abajo, forman, en la parte poseroexterna del cordón posterior, un fascículo más o menos claramente individuado, que cambia ligeramente de sitio y de aspecto, según los puntos en que se examina. 1º, en el cono terminal y en la medula sacra es un pequeño triángulo cuya base corresponde a la superficie externa de la medula (*triángulo de Gombaul y Philippe*, 2º en la medula lumbar es

una cintilla planoconvexa, situada en la parte media del fascículo de Goll, aplicada contra el tabique medio (*centro oval de Flechsig*), 3.º, en la *medula dorsal inferior* es una cinta alargada en sentido transversal, aplicada contra la superficie externa de la medula (*cinta periférica dorsal*) 4.º, en la *medula dorsal superior* y en la *medula cervical* es un fascículo en forma de virgula (de cola posterior), situado en los dos tercios anteriores del fascículo de Burdach (*fascículo en virgula de Schultze*).

4.º **Resumen.** — En resumen, encontraremos. 1.º, en el *cordón anterior*, dos fascículos: el piramidal directo y el fundamental del cordón anterior. 2.º, en el *cordón lateral*, cinco fascículos: el cerebeloso directo, el piramidal cruzado, el de Gowers, el lateral profundo y el fundamental del cordón lateral; 3.º, en el *cordón posterior*, dos fascículos, el llamado de Goll y el de Burdach. Como los cordones anterior y lateral no están separados uno de otro por ningún límite natural, se les puede reunir en uno solo, el *cordón anterolateral*. Asimismo podemos reunir en uno el fascículo fundamental del cordón anterior y

Cordones	Fascículos	Células de origen	Punto de terminación
I CORDÓN ANTEROLATERAL	1.º F. piramidal directo	Corteza cerebral	Asas anteriores
	2.º F. piramidal cruzado . . .	Corteza cerebral	Asas anteriores
	3.º F. cerebeloso directo . .	Columna de Clarke.	Corteza cerebelosa.
	4.º F. de Gowers	Substancia gris espinal.	Corteza cerebelosa
	5.º F. fundamental anterolateral	Substancia gris espinal.	Substancia gris espinal
II CORDÓN POSTERIOR	1.º F. de Burdach	Ganglio espinal (fibras exógenas) y substancia gris espinal (fibras endógenas)	Substancia gris espinal.
		Ganglio espinal (fibras exógenas) y substancia gris espinal (fibras endógenas) .	Substancia gris espinal.

el fascículo fundamental del cordón lateral, formando el *fascículo fundamental anterolateral*, al que conviene añadir, por tener exactamente la misma significación, el fascículo lateral profundo. Llegamos así, para cada mitad de la medula, a una sistematización más sencilla, que hemos resumido en el cuadro de la página anterior

5. FÍLUM TERMINALE

El *fílum terminale* o *medula coccigea* (véase pág. 340) va del cono terminal a la base del cóccix. Tiene de 22 a 23 centímetros de longitud por 1 a 2 milímetros de diámetro. Desciende primero al fondo de saco dural entre los nervios de la cola de caballo; después, llegado al vértice de este fondo de saco, se coloca en el centro del ligamento coccigeo.

De esta suerte presenta dos partes: 1.ª, una *parte superior*, libre, que corresponde al fondo de saco dural, 2.ª, una *parte inferior*, aprisionada en el centro de ligamento coccigeo.

Histológicamente, el segmento superior (14 centímetros por término medio) posee aun elementos nerviosos. El segmento inferior (5 ó 6 centímetros por término medio) no es más que una formación conjunta.

6. VASOS

1.º **Arterias.** Las arterias destinadas a la medula proceden: 1.º, de las *arterias espinales anteriores*, ramas de las arterias vertebrales; 2.º, de las *arterias espinales posteriores*, ramas también de las vertebrales; 3.º, de las *arterias espinales laterales*, muy numerosas, que penetran por los agujeros de conjunción y nacen en el cuello, de la vertebral y de la cervical ascendente; en el tórax, de las intercostales; en los lomos, de las arterias lumbares, en la pelvis, de las arterias sacras (véase *Angiología*). Estas diferentes arterias espinales, dividiéndose, subdividiéndose y anastomosándose entre sí, forman alrededor de la medula una red muy rica, el *círculo perimedular*.

De esta red parten las arterias destinadas a los elementos constitutivos de la medula. Se dividen en medias, radicales y periféricas. Las *arterias medias* penetran en los surcos medios y se subdividen, naturalmente, en *medias anteriores*, que penetran en el surco medio anterior, y *medias posteriores*, que se introducen en el surco medio posterior. Las *arterias radicales* penetran en la medula siguiendo

el trayecto de las raíces. Se las distingue también en dos grupos: *radiculares anteriores* y *radiculares posteriores*. Las *arterias periféricas* (DURET) son las arterias que penetran en la medula por puntos distintos de los indicados para el paso de las otras arterias.

2° **Venas.**— Las venas, nacidas de diferentes partes de la medula, se dirigen hacia la superficie externa de este órgano y desembocan en seis conductos colectores: *tres anteriores*, uno en la línea media y los otros dos a nivel de la línea media de emergencia de las raíces anteriores, y *tres posteriores*, uno en la línea media y los restantes a lo largo de las raíces posteriores. Estos seis troncos están unidos entre sí por numerosas anastomosis. Las venas que de ellos parten salen por los agujeros de conjunción, para venir a desembocar en los plexos venosos extrarraquídeos.

CAPITULO II

BULBO RAQUIDEO

El bulbo raquideo o medula oblongada es continuación de la medula espinal. Une esta última al istmo del encéfalo y al cerebelo.

I. CONSIDERACIONES GENERALES

1.º **Límites.** — El bulbo está limitado: 1.º, por arriba, *por la protuberancia*, 2.º, por abajo, *por la decusación de las pirámides*. Su límite superior corresponde a la parte media del canal basilar; su límite inferior, al nivel de la articulación que une los cóndilos del occipital a las masas laterales del atlas.

2.º **Forma, dimensión, peso.** — Tiene, como la medula, a forma de un cilindro, e aplanado de delante atrás. Es de notar que va ensanchándose a medida que se eleva (es un *cono truncado* con la base mayor dirigida hacia arriba). Mide 30 milímetros de longitud por 17 milímetros de anchura y 13 de espesor. Su peso es de 6 ó 7 gramos.

3.º **Dirección.** El bulbo, seguido de abajo arriba, es primero vertical, después, al entrar en el cráneo, se inclina ligeramente hacia delante, para ir a tenderse sobre el canal basilar del occipital.

4.º **Relaciones.** — El bulbo ocupa, a la vez, la cavidad raquídea y la cavidad craneal. *Por delante* está sucesivamente en relación 1.º, por arriba, con el occipital del que está separado por la duramadre y por venas de dirección transversal u oblicua, 2.º, por abajo, con la mitad superior de la apófisis odontoides, de la cual está separado por ligamentos. *Por atrás* está recubierto primero con el cerebelo. Más abajo, por debajo del agujero occipital corresponde al espacio que separa el occipital del arco posterior del atlas. *Por los lados* correspon-

de sucesivamente al cerebelo, a los condilos del occipital y a la articulación occipitoatlóidea. Está cruzado oblicuamente por la arteria vertebral.

2. CONFORMACIÓN EXTERIOR

En el bulbo, siendo un cono truncado, aplanado de delante atrás, podemos considerar *cuatro caras* (anterior, posterior y laterales), *base* y *vértice*.

1.º *Cara anterior*. — Presenta 1.º, en la línea media, el *surco medio anterior*, que termina por arriba en el agujero ciego o *foramen caecum*, interrumpido hacia abajo por el *entrecruzamiento* o *decusación de las pirámides*, 2.º, a la derecha e izquierda de la línea media, dos cordones blancos, las *pirámides anteriores*, limitadas hacia fuera por el *surco colateral anterior* o *surco preolivar*. De la parte más superior de la pirámide nace el motor ocular externo, del surco preolivar nacen los filetes radiculares del hipoglosos.

2.º *Cara posterior*. Es muy diferente en su mitad inferior y en su mitad superior.

a) *Mitad inferior*. Presenta los mismos elementos que la médula cervical: 1.º *surco medio posterior* y *surco colateral posterior* (de donde emergen el espinal, el neurogastrico y el glosofaríngeo), 2.º, entre estos dos surcos se encuentra el *cordón posterior*, que el *surco intermedio* o *paramedio* divide en dos fascículos, el *fascículo de Goll* y el *de Burdach*.

b) *Mitad superior*. En la mitad superior, los cordones posteriores se separan uno de otro a la manera de las dos ramas de una V. El surco medio se ensancha en un espacio angular; la comisura gris se adelgaza y se rompe, y al mismo tiempo el conducto del epéndimo se encuentra abierto por su parte posterior. Este conducto, sumamente ensanchado en sentido transversal y desplegado en su periferia, constituye el *cuarto ventrículo*, el cuarto ventrículo, a nivel del bulbo (porque traspasa los límites de éste para pasar a la protuberancia), tiene la forma de un triángulo de vértice inferior. Está limitado por dos cordones juxtapuestos: 1.º, las *pirámides posteriores*, que parecen ser continuación de los fascículos de Goll (es de notar en su parte inferior un abultamiento, el *abultamiento mamelonado del bulbo o maza*), 2.º, los *cuerpos testiformes*, que parecen continuar los fascículos de Burdach y que se introducen, por arriba, en el cerebelo: se les

llama también *pedúnculos inferiores del cerebelo*. Es de notar, a lo largo del borde anterior del cuerpo testiforme y algo por debajo de su parte media, una pequeña prominencia de color grisáceo, el *tubérculo cenicento de Rolando*. La cavidad ventricular presenta, en su suelo, las partes siguientes: 1.ª, un surco medio, el *tallo del cálamus scriptorius*. 2.ª, en el vértice del ventrículo, un pequeño espacio angular, el *pico del cálamus*, cubierto por una pequeña lámina de sustancia gris, resto de la comisura posterior y llamada *obex* o *cerrojo*. 3.ª, a derecha y a izquierda de la línea media, tres regiones de forma triangular, el *ala blanca interna*, el *ala blanca externa* y el *ala gris*, las dos primeras en relieve y la *ala gris* en depresión (*fóvea inferior*); 4.ª, en estas alas, una serie de pequeños filamentos blanquecinos, de dirección transversal, que van a terminar en el tallo del cálamus y son las *barbas del cálamus* o *estrias acústicas*.

3.º **Caras laterales.** — Comprendida entre la cara anterior y la cara posterior, por consiguiente entre los dos surcos colaterales, la cara lateral del bulbo está formada por un cordón blanco, el *cordón lateral*. Este cordón, en su parte anteroposterior, presenta una eminencia prolongada de arriba abajo (15 milímetros de longitud por 5 de anchura), que es el *cuerpo olivar*: limitado por delante por el *surco preolivar*, por detrás por el *surco retroolivar*, está separado por arriba de la protuberancia por una pequeña fosita, la *fosita supraolivar*, de donde emergen el facial y el intermediario de Wrisberg. Esta fosita se continua por detrás con otra fosita, la *fosita lateral del bulbo*, en donde nace el auditivo. Son de notar, en la superficie externa del bulbo, las *fibras arciformes* (más o menos desarrolladas según los individuos), que se desprenden del cuerpo testiforme para dirigirse, describiendo asas, al surco medio anterior.

4.º **Base.** — A nivel de su base, el bulbo se continúa con la protuberancia:

a) *Por delante y por los lados*, los dos órganos están claramente separados por el diferente trayecto de sus fibras, y además por un surco, el *surco bulbo-protuberancial*, constituido (yendo de dentro afuera), por el foramen cecum, el surco de donde emergen el motor ocular externo, la fosita supraolivar y la fosita lateral.

β) *Por detrás*, el límite, puramente convencional, está representado por una línea transversal que une entre sí los dos ángulos laterales del cuarto ventrículo.

5.º **Vértice.** — El vértice del bulbo se continúa con la medula cervical. El punto donde se verifica la unión de estos dos órganos ha recibido el nombre de *cuello del bulbo*.

3. CONFORMACIÓN INTERIOR

Si examinamos un corte transversal que pase por la parte inferior del bulbo, comprobaremos que, como la medula, está constituido por dos mitades simétricas, cada una de ellas con sustancia blanca y sustancia gris, estas sustancias están dispuestas, por lo demás, salvo ligeras modificaciones de detalle, como en la medula. Si examinamos ahora un segundo corte transversal que pase por la parte superior del bulbo, distinguiremos todavía la sustancia blanca y la sustancia gris, pero son muy diferentes del caso anterior, hasta el extremo de que resulta imposible a primera vista reconocer en ésta los elementos de aquélla. Esto es debido: 1.º, a que la sustancia gris espinal sufre en el bulbo *transformaciones profundas*, 2.º, a que a las formaciones de origen especial se añaden *formaciones nuevas*, propias del bulbo.

4. CONSTITUCIÓN ANATÓMICA Y CONEXIONES

El bulbo posee dos clases de elementos: 1.º, *partes transmitidas por la medula*, estas partes se subdividen en partes blancas y partes grises, 2.º, *partes propias del bulbo*.

A. Partes blancas transmitidas al bulbo por la medula. — La medula, como hemos dicho, presenta *siete cordones*, todos los cuales pasan al bulbo, comportándose cada uno de modo peculiar.

1.º *Fascículo piramidal directo* — Pasa de la medula al bulbo sin entrecruzarse (se ha entrecruzado ya en la medula) y va a colocarse en la pirámide anterior, donde ocupa el lado externo.

2.º *Fascículo piramidal cruzado* — Se entrecruza a su entrada en el bulbo con el del lado opuesto (*entrecruzamiento motor*) y va a constituir entonces la pirámide anterior. Allí encuentra el fascículo piramidal directo y se confunde con él.

3.º *Fascículo de Goll y fascículo de Burdach*, origen de la *cinta de Reil* — Las fibras largas de los fascículos de Goll y de Burdach, constituyendo el *fascículo sensitivo posterior*, pasan por el bulbo sin entrecruzarse. Saben a derecha y a izquierda del surco medio posterior, encuentran en la parte media del bulbo dos núcleos de subs-

tancia gris, uno interno (*núcleo de Goll*) y otro externo (*núcleo de Burdach*), y allí termina cada uno por una arborización libre. De las células nerviosas de los núcleos precitados parten nuevas fibras que, fisiológicamente, continúan las precedentes y forman en conjunto la *cinta de Reil*. Esta cinta de Reil, al salir de sus núcleos de origen, se dirige hacia delante y adentro, alcanza la línea media, y en ese punto se entrecruza con la del lado opuesto (*entrecruzamiento sensitivo*); enderezándose entonces, va a aplicarse a la cara profunda del fascículo piramidal para llegar con él al hemisferio cerebral.

4° *Fascículo fundamental o fascículo restante del cordón antero-lateral*. — El fascículo fundamental pasa de la medula al bulbo sin entrecruzarse. Al alcanzar el cuello del bulbo, se dirige a la vez hacia fuera, hacia atrás, y hacia arriba; después, inclinándose hacia dentro, va a colocarse al lado de la línea media. Describe así, en conjunto, una especie de curva de concavidad interna, y, con el del lado opuesto, forma una especie de elipse o de ojal, a través del que pasan (para ir a entrecruzarse en la línea media) el fascículo piramidal y la cinta de Reil. La mayor parte de las fibras constitutivas del fascículo fundamental se disponen en pequeños fascículos irregularmente distribuidos en la formación reticular. Cierta número de ellas, sin embargo, se agrupan en un fascículo relativamente voluminoso: la *cintilla longitudinal posterior*, que volveremos a encontrar al tratar de la protuberancia.

5° *Fascículo de Gowers*. — El fascículo de Gowers, verdadero *fascículo sensitivo lateral*, pasa, sin entrecruzarse, al cordón lateral del bulbo. En la parte superior de la protuberancia contornea los pedúnculos cerebelosos superiores y penetra en el cerebro, donde termina (corteza cerebelosa).

6° *Fascículo cerebeloso directo*. — Pasa, también sin entrecruzarse, al bulbo, donde forma parte del cuerpo restiforme. Continuando su trayecto ascendente, llega al cerebelo, donde termina (probablemente) en la parte dorsal del *vermis superior*. Es de notar la existencia de un pequeño fascículo aberrante, que, según MONAKOW y LÖWENTHAL, llegaría al cerebro pasando de lleno por la protuberancia.

B Partes grises transmitidas al bulbo por la medula. —

La sustancia gris de la medula pasa también al bulbo, pero experimentando, como la sustancia blanca, profundas transformaciones. Las condiciones anatómicas que así modifican la columna gris son en número de cuatro, a saber:

a) *El entrecruzamiento motor*: el fascículo piramidal cruzado, al ganar la línea media para entrecruzarse con el del lado opuesto, atraviesa el asta anterior en su parte media; la *decapita*. Dicha asta se hallará representada en adelante por dos fragmentos o columnas, representando una la región de la base y la otra la región de la cabeza.

b) *El entrecruzamiento sensitivo*. la cinta de Reil *decapita* del mismo modo el asta posterior, que también estará representada en adelante por dos columnas, una figurando la base y otra representando la cabeza.

c) *La aparición del cuarto ventrículo*: por el hecho del ensanchamiento transversal del conducto del epéndimo, y a consecuencia también de la eversión de su pared posterior (siguiendo el desplazamiento del cordón posterior), la base del asta posterior va a colocarse en el suelo ventricular, inmediatamente por fuera de la base del asta anterior. En cuanto a la cabeza de esta misma asta posterior, se desvía hacia las partes laterales del bulbo. La base y a cabeza del asta anterior conservan poco más o menos la situación que tienen en la parte inferior del bulbo.

d) *La aparición de las fibras arciformes*: las fibras arciformes internas (véase más adelante), al ganar la línea media, encuentran aquí y allá las cuatro columnas grises arriba indicadas, las atraviesan y las fraccionan así en cierto número de fragmentos superpuestos en sentido vertical. Estos fragmentos constituyen los núcleos de origen de los nervios bulboprotuberanciales y, como se ve, representan los restos, ya del asta anterior (*base o cabeza*), ya del asta posterior (*base o cabeza*). Los primeros son motores y darán origen (*núcleos de origen*) a nervios motores. Los segundos son sensitivos y serán el término (*núcleos de terminación o núcleos terminales*) de los nervios sensitivos.

C. Partes propias del bulbo. — Además de las formaciones arriba descritas que le son transmitidas por la medula, el bulbo tiene partes que le son propias. Son éstas.

a) *Los núcleos de los cordones posteriores*. — Pequeñas masas de sustancia gris, situadas en el cordón posterior y llamadas, por esta razón, *núcleos de los cordones posteriores*. Son en número de dos: el *núcleo de Goll* (situado en el fascículo de Goll) y el *núcleo de Burdach* (situado en el fascículo de Burdach). Morfológicamente se los puede considerar como una derivación de las astas posteriores de la medula. Su constitución y su significación anatómica es casi la misma

el núcleo de Goll y el núcleo de Burdach son los límites terminales de las fibras largas de las raíces posteriores de los nervios raquídeos (fascículo sensitivo posterior). Sabemos, por otra parte, que dan origen a las fibras de la cinta de Reil. Es de notar además que envían cierto número de fibras al cerebelo.

b) *El cuerpo olivar inferior.* — Ya hemos visto su abultamiento en el plano anterolateral del bulbo. Visto en cortes, está representado por una *delgada capa de substancia gris*, sumamente plegada, aprisionando en su centro una pequeña masa de substancia blanca (*centro medular del cuerpo olivar*). La lámina gris, continua por todas partes, forma una especie de bolsa alargada de arriba abajo y abierta en su parte interna en un punto llamado *hilio*. El cuerpo olivar inferior está en conexión: 1.º con la *medula cervical*, por un *fascículo descendente*, que termina probablemente en el asta anterior es el *fascículo olivar* de BECHTEREW; 2.º, con el *cerebro*, por un pequeño *fascículo ascendente*, que sigue la calota protuberancial y peduncular: es el *fascículo central de la calota* de HELWEG; 3.º, con el *cerebelo*, por fibras llamadas *cerebelo-olivares*, que se entrecruzan en la línea media y se mezclan con las fibras arciformes.

c) *Los núcleos accesorios del cuerpo olivar o paraolivares.* Son en número de dos: uno interno (*cuerpo paraolivar interno*) y otro externo (*cuerpo paraolivar externo*). Ambos están representados por una lámina de substancia gris, que se halla dispuesta en forma de media luna para el cuerpo paraolivar externo y en una especie de cartabón para el cuerpo olivar interno. Tienen igual estructura y la misma significación que el propio cuerpo olivar.

d) *Cuerpos restiformes.* — Los cuerpos restiformes, o pedúnculos cerebelosos inferiores, están situados por encima de los cordones posteriores, a los que parecen continuar. Contienen dos clases de fibras. 1.º, *fibras espinocerebelosas*, que unen el cerebelo a la medula (entre ellas las *fibras descendentes de Marchi*); 2.º, *fibras bulbo-cerebelosas*, que unen el cerebelo con el bulbo. Estas últimas se convierten en fibras arciformes.

e) *Fibras arciformes.* — Las fibras arciformes (llamadas así porque describen curvas de concavidad interna) toman su origen de los cuerpos restiformes o pedúnculos cerebelosos inferiores y se dirigen en seguida hacia la línea media siguiendo unas la cara externa del bulbo (*fibras arciformes externas*) y corpiendo las otras por su espesor (*fibras arciformes internas*). Las *fibras arciformes internas*, después de su entrecruzamiento en la línea media con las del lado opuesto,

van a terminar, en parte, en el cuerpo olivar, y en parte, en el núcleo de Goll y el de Burdach. Las *fibras arciformes externas*, rodeando de atrás adelante la cara anterolateral del bulbo, llegan al surco medio anterior, penetran en el bulbo a nivel de este surco, se entrecruzan con las del lado opuesto y, continuando su camino, van a terminar en los núcleos de Goll y de Burdach. A lo largo de estas fibras, entre el cuerpo testiforme (del que derivan) y el surco medio (donde desaparecen), se disponen pequeños núcleos de sustancia gris, constituyendo los denominados *núcleos arciformes*. Esta sustancia gris es abundante sobre todo en la parte anterior y en la parte interna de la pirámide anterior, donde forman los *núcleos prepiramidales*. Morfológicamente, las fibras arciformes ponen en comunicación el cerebelo con el bulbo. Se las puede dividir en cinco grupos: 1.º, fibras que van del cerebelo al cuerpo olivar (*fascículo cerebelo-olivario*); 2.º, fibras que van del núcleo de Goll y de Burdach al cerebelo; 3.º, fibras que van de los núcleos vestibulares al cerebelo (aparato cerebelo-vestibular); 4.º, fibras que unen los núcleos arciformes con el cerebelo; 5.º, fibras arciformes procedentes de los núcleos de Goll y de Burdach y que luego forman la cinta de Reil (*fibras arciformes interreticulares*).

f) *Formación reticular*. — La formación reticular, llamada así porque reviste en los cortes el aspecto de una rica red, ocupa la parte central del bulbo. Se extiende en anchura desde el cuerpo testiforme hasta el rafe; en sentido anteroposterior, desde la cinta de Reil hasta el suelo ventricular. El fascículo radicular del hipoglosa, atravesándola de atrás adelante la divide en dos partes: una interna (situada por delante del hipoglosa), llamada *formación reticular blanca*, otra externa (situada por fuera del hipoglosa) llamada *formación reticular gris*. Histológicamente, la formación reticular contiene: 1.º, fascículos nerviosos, de valor diverso, entrecruzados en todos sentidos; 2.º, células nerviosas, irregularmente diseminadas en el campo reticular (se han descrito aquí en dos núcleos, por lo demás muy mal diferenciados, el *núcleo de Roller* y el *núcleo lateral*).

5. VASOS

1.º **Arterias**. — Se distinguen en paramedianas, circunferenciales cortas y circunferenciales largas.

a) *Arterias paramedianas*. — Comprenden dos grupos: uno superior y otro inferior.

El *grupo superior, grupo del agujero ciego y del surco mediano*, comprende de tres a cinco ramos nacidos del tronco basilar y de la terminación de las vertebrales. Llega hasta el suelo del cuarto ventrículo. Irriga el fascículo piramidal, parte media del bulbo y el núcleo del hipoglosio.

El *grupo inferior*, emanado de las espinales anteriores, se distribuye por la parte inferior del bulbo (pirámide cinta de Rei.).

b) *Arterias circunferenciales cortas* — Comprenden de arriba abajo: 1.º, la arteria principal de la fosita lateral del bulbo (oliva, emergencia de los nervios mixtos); 2.º, la arteria accesoria de la fosita lateral del bulbo (el mismo territorio que la precedente); 3.º, ramas de la cerebelosa inferior (el mismo territorio que las precedentes y además una zona inferior).

c) *Arterias circunferenciales largas* — Cerebelosas inferiores que irrigan el cuerpo testiforme y la parte posterior del bulbo.

2.º *Venas*. — Forman alrededor del órgano una complicada red, donde se distinguen: 1.º, una *vena media anterior*, que es continuación de la vena homónima de la medula y por arriba desemboca en una de las venas de la protuberancia; 2.º, una *vena media posterior*, que continúa asimismo la vena homónima de la medula y al llegar al ventrículo se encorva, ya a la derecha ya a la izquierda, para terminar en uno de los senos de la base del cráneo; 3.º, *venas radicales*, que siguen de dentro afuera el trayecto de las raíces nerviosas, para terminar en puntos diversos, ya en las venas de la base del cráneo, ya en las venas extrarraqúideas.

CAPITULO III

PROTUBERANCIA ANULAR

La protuberancia anular, llamada también *mesocéfalo* o *punte de Varolio*, es una eminencia de color blanco y forma cuadrilátera que ocupa la parte central del plano inferior del ismo. Mide, por término medio, 27 milímetros en sentido vertical, 38 milímetros en sentido transversal y 25 milímetros en sentido anteroposterior.

1.º Conformación exterior y relaciones. - De forma irregularmente cuboidea, presenta *seis caras*: anterior, posterior, inferior, superior y laterales.

a) La *cara anterior*, convexa, descansa sobre el canal basilar, como ella inclinado de 65 a 70°. En ella observamos: 1.º, en la línea media, el *surco basilar*, en relación con el tronco basilar, 2.º, a cada lado de la línea media, una eminencia longitudinal, redondeada y roma, el *rodete piramidal*, 3.º, más hacia fuera, la *emergencia del trigémino* (dos raíces: una gruesa o sensitiva y otra pequeña o motriz). En esta cara la protuberancia aparece formada por un sistema de fascículos blancos, que se dirigen transversalmente de un pedúnculo cerebeloso medio al otro.

β) La *cara posterior* forma parte del suelo del cuarto ventrículo y está representada por el triángulo superior de este suelo (véase *Cuarto ventrículo*, pag. 375).

γ) La *cara inferior* corresponde al bulbo; *por delante* está claramente separada por el surco bulboprotuberancial (véase *Bulbo*); *por detrás*, protuberancia y bulbo están en íntima continuidad (el límite de separación de estas dos formaciones, puramente convencional, está representado por una línea transversal que une los dos ángulos laterales del ventrículo).

δ) La *cara superior* está en relación con los pedúnculos cerebrales: *por delante*, las dos formaciones están separadas una de otra por

la diferente dirección de sus fibras primero, y además por el *sulco protuberancial superior*, por detrás, ninguna línea de demarcación separa los órganos.

e) Las *caras laterales* (la protuberancia se confunde con los pedúnculos cerebelosos medios) están determinadas artificialmente por una sección vertical y anteroposterior que rasara el lado externo de la raíz del trigémino.

2° **Conformación interior y constitución anatómica.** — Si examinamos un corte frontal, observamos que el órgano no es completamente homogéneo y que se puede, en este concepto, dividirlo en dos capas: una anterior más compacta, más dura y más blanca; otra posterior, más blanda, de coloración menos blanca, de aspecto más complicado: es la *callosa protuberancial*, en la que se continúa, en su desarrollo, la *formación reticular del bulbo*. Ambas capas contienen sustancia blanca y sustancia gris.

A **SUSTANCIA BLANCA** — Esta sustancia comprende fibras miélicas de valor muy diverso, que distinguimos en tres grupos: *fibras transversales*, *fibras longitudinales* y *fibras arciformes*.

a) *Fibras transversales* — Las fibras transversales son de dos clases. Unas, fibras cerebelosas, provienen de los pedúnculos cerebelosos medios. Ocupan toda la altura de la cara anterior y se dividen, desde el punto de vista de su significación, en *fibras intercerebelosas* y *fibras cerebeloprotuberanciales*: las primeras van de un hemisferio cerebeloso al otro; las segundas se detienen en los núcleos del puente, ya del lado correspondiente, ya del lado opuesto. De estos núcleos del puente parten luego nuevas fibras, que, siguiendo un trayecto longitudinal, suben hasta la corteza cerebral, y son las *fibras cortico protuberanciales*, que encontraremos más adelante. Las otras nacen del núcleo anterior de la rama coclear del nervio auditivo, y de allí se dirigen a la oliva superior, ya del lado correspondiente, ya del lado opuesto. Forman, en conjunto, una capa acintada, denominada *cuerpo trapecoidal*, que está completamente cubierto por las fibras transversales cerebelosas.

b) *Fibras longitudinales* — Forman los cinco fascículos siguientes: 1°, el *fascículo piramidal*, 2°, el *fascículo geniculado*, 3°, la *cinta de Retz*, 4°, el *fascículo de asociación longitudinal*, 5°, la *cintilla longitudinal posterior*.

1, El *fascículo piramidal*, continuación de la pirámide del bulbo, ocupa la parte media de la capa anterior de la protuberancia. Es

de notar que en la parte inferior de la protuberancia, este fascículo es único y compacto; que está, al contrario, en la parte superior del órgano, disociado en cierto número de fascículos distintos.

β) El *fascículo geniculado* (llamado así porque a nivel de la cápsula interna ocupa la región llamada *rodilla de la cápsula*, tiene la misma significación que el fascículo piramidal es un fascículo motor voluntario, que se dirige a los núcleos motores bulboprotuberanciales. Es, para los nervios bulboprotuberanciales, lo que el fascículo piramidal, a los nervios raquídeos. Este nuevo fascículo, no representado en la medula, ocupa la cara anterior de la protuberancia, donde se encuentra situado en el lado poserointerno del fascículo piramidal (es de notar que sus fibras se entrecruzan en la línea media, en la parte inferior de la protuberancia, para llegar a los núcleos a que están destinadas)

γ) La *cinta de Reil* (*femurulus o laqueus*), fascículo sensitivo, continuación del fascículo del bulbo, atraviesa la protuberancia para pasar al pedúnculo. La encontramos, en su trayecto protuberancial, en la parte anterior de la calota, bajo la forma de un fascículo aplanado de delante atrás (de aquí su nombre de *cinta*, extendiéndose en anchura desde el lado externo del órgano hasta la línea media)

δ) El *fascículo de asociación longitudinal*, representante del fascículo fundamental anterolateral de la medula (tiene exactamente la misma significación), se halla constituido por una serie de pequeños fascículos que están irregularmente diseminados en la formación reticular. A este sistema pertenece la *cintilla longitudinal posterior*

ε) La *cintilla longitudinal posterior* es un fascículo relativamente voluminoso, situado en la parte más posterior de la calota, a ambos lados de la línea media, por debajo del suelo ventricular. Aparece, en los cortes, en forma de pera con la extremidad más gruesa dirigida hacia dentro. Se extiende, en altura, desde la parte media del bulbo (donde se continúa con el fascículo fundamental anterolateral) hasta el tercer ventrículo (donde termina, según Ebinger, en un pequeño núcleo de sustancia gris, el núcleo de la *cintilla longitudinal* o núcleo de *Darkschewitch*, que se halla situado al lado del orificio anterior del acueducto de Silvio). Contiene dos clases de fibras: 1.ª, *fibras ascendentes*, procedentes de las células cordonales de la medula o de sus equivalentes bulbares y que van a terminar, después de un trayecto variable, en los núcleos motores bulboprotuberanciales, 2.ª, *fibras descendentes*, procedentes de los tubérculos cuadrigéminos anteriores (punto de reunión de las *fibras ópticas* y de algunas fibras

audi vas., que terminan también en los núcleos motores bulboprotuberanciales. Todas ellas se relacionan con la motilidad refleja.

c) *Fibras arciformes.* — Están situadas en la formación reticular. Tienen la misma significación que las del bulbo (véase *Bulbo*).

B SUBSTANCIA GRIS. — La sustancia gris de la protuberancia comprende dos clases de formaciones: 1.ª, formaciones que son prolongación de las del bulbo y de la medula; 2.ª, formaciones propias.

a, *Formaciones grises de origen bulboespinal* — Son núcleos (restos de las astas anteriores o de las astas posteriores) en los cuales terminan o se originan los filotes constitutivos de cierto número de nervios craneales: motor ocular externo, facial, patético, trigémino.

b) *Formaciones grises propias de la protuberancia* — Son las siguientes:

α) *Los núcleos del puente*, islotes de sustancia gris, irregularmente discriminados entre las fibras transversales del estrato anterior (están en relación, por una parte, con el cerebelo por las fibras cerebelosas del pedúnculo cerebeloso medio, y por otra parte, con la corteza cerebral por las fibras corticoprotuberanciales)

β) *La oliva superior u oliva protuberancial*, pequeña lámina de sustancia gris plegada en zigzag, como la oliva inferior o bulbar, situada en el cuerpo trapezoide, algo por delante y por dentro del núcleo facial (está en relación con la vía acústica)

γ) *El núcleo reticulado de la calota y el núcleo central superior*, masas difusas de sustancia gris situadas en la formación reticular

3.º *Vasos.* — Las arterias se dividen en paramedianas y circunferenciales cortas. Las *paramedianas* nacen de la cara posterior del tronco basilar (de cuatro a seis) y penetran de atrás adelante en el espesor de la protuberancia. Las *circunferenciales cortas* (cuatro o cinco) se desprenden de las partes laterales del tronco basilar.

Estas arterias se distribuyen en dos territorios vasculares: 1.º, un territorio paramediano (fascículo piramidal, núcleos grises del puente, parte yuxtamediana de la cinta de Reil); 2.º, un territorio lateral (arteria circunferencial corta) que comprende el pedúnculo cerebeloso medio, la parte lateral de la cinta de Reil y las raíces del trigémino. Las venas se dirigen hacia la cara anterior, donde forman el *plexo venoso protuberancial*, el cual comunica con la red bulbar y la red cerebelosa. Las venas que de él parten se dirigen, en parte (las superiores) a la vena comunicante posterior, en parte (las inferiores y las laterales) a las venas cerebelosas o a los senos petrosos.

CAPITULO IV

CEREBELO

El cerebelo (cerebro pequeño) es la porción de la masa encefálica que ocupa la parte posterior o inferior de la cavidad craneal. Considerado en la serie de los vertebrados, se compone esencialmente de tres partes: una parte impar o media (el *lóbulo mediano* o *lóbulo medio*), dos partes laterales simétricamente dispuestas (los *lobulillos laterales* o *hemisferios cerebelosos*).

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.º **Situación.** — El cerebelo está situado en el compartimiento inferior de la base del cráneo, detrás de la protuberancia y de los tubérculos cuadrigéminos, encima del bulbo y debajo del cerebro. Una línea casi horizontal que continuase el borde superior del arco cigomático y que fuese a parar a la protuberancia occipital externa, nos indicaría bastante bien, en la superficie exocraneal, el límite de separación entre el cerebelo y el cerebro.

2.º **Dimensiones.** — Mide: 1.º, en su diámetro transversal, de 8 a 10 centímetros, 2.º, en su diámetro anterosuperior, de 5 centímetros y medio a 6 y medio, 3.º, en su diámetro vertical (espesor), 5 centímetros.

3.º **Peso.** Pesa, por término medio, 140 gramos, o sea la octava parte del peso del cerebro.

4.º **Consistencia.** — Su consistencia es casi la misma que la del cerebro. Es de notar, sin embargo, que su porción cortical es algo más blanda y se altera con mayor rapidez.

2 CONFORMACIÓN EXTERIOR Y RELACIONES

El cerebelo, visto por arriba, se parece a un corazón de naipe francés, con la escotadura dirigida hacia atrás. Podemos, pues, considerarle una *cara superior*, una *cara inferior* y una *circunferencia*.

1° Cara superior. — Presenta: 1.°, en la línea media, una eminencia longitudinal, el *vermis superior* (representa el lóbulo medio); 2.°, a derecha y a izquierda del vermis, dos superficies planas inclinadas de arriba abajo y de dentro afuera (pertenecen a los lóbulos laterales o hemisferios). Desde el punto de vista de sus relaciones, corresponde a los hemisferios cerebrales, de los cuales, sin embargo, está separada por la tienda del cerebelo.

2° Cara inferior. — Esta presenta: 1.° en la línea media, una gran hendidura, la *cisura media del cerebelo*, en el fondo de la cual se distingue una eminencia longitudinal, el *vermis inferior* (representa, al igual que el superior, el lóbulo medio del cerebelo); 2.°, a ambos lados del vermis, los dos hemisferios cerebelosos, que adoptan en esta cara una forma claramente convexa.

El vermis inferior presenta, en la unión de su tercio posterior con sus dos tercios anteriores un engrosamiento voluminoso, de donde se desprenden dos prolongaciones laterales, que se pierden en los hemisferios: es la *pirámide de Malacarne*, llamada también, en razón de su forma, *eminencia crucial*. La parte anterior del vermis recibe el nombre de *uvula*. A cada lado de la uvula se encuentran dos láminas de sustancia blanca, llamadas *válvulas de Tarin* (*velos medulares posteriores* de los alemanes). Cada una de ellas tiene la forma de media luna y presenta: 1.°, una cara superior, en relación con la cavidad ventricular (está cubierta por el epéndimo), 2.°, una cara inferior, en relación con las amígdalas, 3.°, un borde posterior convexo y adherente, 4.°, un borde anterior, cóncavo y libre, 5.°, una extremidad interna, que se confunde con la uvula; 6.°, una extremidad externa, que llega hasta el lóbulo del neumogástrico.

Desde el punto de vista de sus relaciones, la cara inferior corresponde: 1.°, en la línea media, a la cresta occipital interna, a la hoz del cerebelo y al cuarto ventrículo; 2.° por los lados, a las fosas occipitales inferiores, a la sutura temporooccipital (agujero rasgado posterior y órganos que lo atraviesan) y la cara posterosuperior del peñasco.

3.º **Circunferencia.** — La circunferencia del cerebelo está escotada, *por detrás*, a nivel del borde anterior de la hoz del cerebelo (*incisura marsupialis*), y también, *por delante* (*incisura semilunaris*), en el punto por donde salen los pedúnculos cerebelosos. A cada lado de estas escotaduras medias la circunferencia toma la forma de un borde redondeado romo, sumamente convexo hacia fuera. Su parte más prominente constituye el *ángulo lateral del cerebelo*. La circunferencia del cerebelo corresponde: 1.º, *por detrás* del ángulo lateral, a la porción horizontal del canal latera.; 2.º *por delante* de este ángulo, al canal petroso superior.

3 MODO DE SEGMENTACIÓN PERIFÉRICA

La superficie externa del cerebelo presenta una multitud de surcos, que dan por resultado una descomposición de los lóbulos en segmentos más pequeños. Estas hendiduras son de dos clases:

1.º **Surcos de primer orden: lóbulos.** Estos surcos descienden hasta la masa central de la substancia blanca, de la que quedan separados, sin embargo, por el espesor de la capa gris cortical. Describen, la mayor parte, curvas regulares de concavidad dirigida hacia delante y adentro. Se cuentan, en general, de 12 a 15. El más importante de todos es el *gran surco circunferencial de Vicq-d'Azyr*, que ocupa la circunferencia.

Los surcos de primer orden descomponen el cerebelo en 26 lóbulos, de los cuales 12 pertenecen a la cara superior (4 para el vermis y 4 para cada uno de los hemisferios) y 14 a la cara anterior (4 para el vermis y 5 para cada uno de los hemisferios).

De todos estos lóbulos sólo se describen ordinariamente dos a cada lado: el lóbulo del neumogástrico y el lóbulo del bulbo raquídeo. El *lóbulo del neumogástrico* o *flócculus* está extendido sobre el borde inferior del pedúnculo cerebeloso med.o, por delante y por encima del neumogástrico (de aquí su nombre). Alargado en sentido transversal, mide 18 milímetros por 8. El *lóbulo del bulbo raquídeo* o *lóbulo raquídeo*, llamado también *amígdala* o *tonsila*, está situado por detrás y al lado del bulbo, inmediatamente por debajo de la válvula de Tarin correspondiente: mide 30 milímetros de altura por 18 de anchura. Está situado en parte en la cavidad craneal, en parte en la cavidad raquídea: una especie de estrangulación, correspondiente al contorno del agujero occipital, indica en su superficie externa el límite de separación de estas dos porciones.

Esquema de Boik, con sus aplicaciones fisiológicas y patológicas

Un *surco primario* divide el cerebelo en dos lóbulos, uno anterior y otro posterior. *Lóbulo anterior* (para la cabeza y la laringe). El *lóbulo posterior* comprende: 1.º, *lobulus simplex* (para el cuello); 2.º, *lóbulo medio* (para el tronco); 3.º, *lobulo paramedio* (igualmente para el tronco); 4.º, *lobulo ansiforme* con su surco intercruial y sus dos brazos, anterior y posterior (para los miembros torácicos y los miembros pélvicos); 5.º, *lóbulo vermicular* (para la cola)

2.º **Surcos de segundo orden: láminas y laminillas.** — Menos profundos que los precedentes, los surcos de segundo orden descomponen cada lóbulo en una serie de segmentos más pequeños (aplanados y adosados entre sí como las hojas de un libro), que se designan con el nombre de *láminas* y *laminillas*. Cada una de ellas presenta *dos caras laterales* (en relación con las láminas vecinas) y *dos bordes*, uno superficial o libre, otro profundo o adherente

4 CONFORMACIÓN INTERIOR

Visto en un corte cualquiera, vertical u horizontal, el cerebelo presenta al estudio dos sustancias: una *substancia gris* y una *substancia blanca*.

1.º **Substancia gris.** — Se divide en *substancia gris periférica* y *substancia gris central*

a) *Substancia gris periférica* — Llamada también *corteza* (*cortex*) o *substancia cortical*, se extiende por toda la superficie del cerebelo bajo la forma de una lámina sumamente delgada, que cubre regularmente todas las eminencias y desciende, sin interrumpirse al fondo de los surcos. Forma una envoltura casi continua, únicamente interrumpida a nivel de la parte anterior del cerebelo, en donde nacen los pedunculos.

b) *Substancia gris central* — Está representada por cierto número de formaciones grises situadas en el centro del cerebelo, a cada lado de la línea media. Son en número de seis, tres a cada lado: 1.º, el *cuerpo dentado*, llamado también *cuerpo romboidal* u *oliva cerebelosa*, formado por una lámina de substancia gris relativamente plegada aprisionando en su centro (como la oliva bulbar) una masa homogénea de substancia blanca (25 milímetros de largo por 15 de anchura y 1 de alto) abierta por dentro en un punto llamado *hilus*.

2.º, los *núcleos dentados accesorios*, situados por dentro del precedente, en número de dos, uno externo o *émbolo* (*tapon*), otro interno o *núcleo esférico* (*nucleus globosus*), representado cada uno por una pequeña columna de sustancia gris, dirigida en sentido anteroposterior; 3.º, el *núcleo del techo* (*nucleus fastigi*), situado en pleno vermis (mientras que las formaciones precedentes pertenecen a los hemisferios), masa ovoideca con su eje mayor anteroposterior (6 ó 7 milímetros de largo por 4 ó 5 de ancho), muy próxima a la línea media, que termina por delante por una extremidad redondeada y por detrás por una serie de puntas irregulares.

2.º **Substancia blanca.** — Forma, en el centro del cerebelo, una masa voluminosa, el *centro medular*. De la periferia de este centro medular salen unas prolongaciones radiadas que penetran en los lóbulos y que a su vez envían a las láminas y a las laminillas prolongaciones de segundo y tercer orden. Esta disposición *arborescente* (ramas, ramos, ramitos) del centro celular, especial del cerebelo y absolutamente característica, ha recibido el nombre de *árbol de vida*. Se distinguen naturalmente dos árboles de vida: el *árbol de vida del lóbulo medio* (que pasa por el vermis) y el *árbol de vida de los lóbulos laterales* (que pasa por los hemisféricos).

5. CONSTITUCIÓN ANATÓMICA

El cerebelo comprende las tres partes siguientes: 1.º, la *corteza*; 2.º, los *núcleos centrales*; 3.º, el *centro medular*.

1.º **Corteza.** — La corteza, de 1 a 1,5 milímetros de espesor, presenta dos zonas de aspecto diferente: 1.º, una zona externa o superficial de color gris pálido, la *capa molecular*; 2.º, una zona interna o profunda, de amarillo rojizo, la *capa granulosa*. Entre estas dos capas se extiende una hilera de grandes células nerviosas, ovales o piriformes, las *células de Purkinje*.

2.º **Núcleos centrales.** — Células de tamaño medio

3.º **Centro medular.** — Está constituido por fibras de mielina y por células de neuroglia. Las fibras se dividen en intrínsecas y extrínsecas. Las *fibras intrínsecas* son aquellas que, situadas por completo en el cerebelo, asocian las diferentes partes del órgano. Son

numerosas fibras *comisurales* o en *guarnaldas*, que ponen en conexión células de un lóbulo con células del lóbulo opuesto; fibras *cortico-nucleares*, fibras *semicirculares externas* y *semicirculares internas*, etc.

Las fibras *extrínsecas* establecen las conexiones extrínsecas del cerebelo (véase el párrafo siguiente)

6 CONEXIONES DEL CEREBELO. PEDÚNCULOS CEREBELOSOS

A. Estudio macroscópico

Seis gruesos cordones tres en cada lado, salen de la escotadura anterior del cerebelo los *pedúnculos cerebelosos*. Unen el cerebelo al bulbo, a la protuberancia y a los pedunculos cerebrales. Según su situación, se les denomina inferiores, medios y superiores.

1.º **Pedúnculos cerebelosos inferiores.** — Son dos cordones cilíndricos, que continúan los cordones posteriores de la médula (cuerpos reniformes). Bordan el triángulo inferior del cuarto ventrículo.

2.º **Pedúnculos cerebelosos medios.** — Forman dos cordones blancos aplanados de delante atrás, que unen un lóbulo cerebeloso con el otro. La extremidad *interna* se continúa con la protuberancia, siguiendo un plano sagital que pasa por la emergencia del trigémino. La extremidad *externa* penetra en la escotadura anterior del cerebelo. La cara *anterior*, convexa y libre, descansa sobre la cara posterior del peñasco. Forma con cada lóbulo cerebeloso correspondiente el *ángulo pontocerebeloso*. La cara *posterior*, corta, está cubierta por el cerebelo.

3.º **Pedúnculos cerebelosos superiores.** — Dirigidos oblicuamente hacia arriba, adelante y adentro, se extienden desde la escotadura anterior del cerebelo a la parte inferior de los tubérculos cuadrigéminos posteriores, por debajo de los cuales desaparece. Aplanados de delante atrás, presenta cada uno de ellos dos caras, dos bordes y dos extremidades.

La cara *posterior*, convexa y lisa, cubierta por el cerebelo, está cruzada en su parte superior por fascículos de la cinta de Reil. La cara *anterior* se confunde por fuera con la formación reticular de la protuberancia y del pedúnculo, su parte interna concurre a formar la bóveda del cuarto ventrículo. El *borde externo grueso*, está separado de la protuberancia por el *círculo lateral del istmo*. El *borde interno*, delgado, presta inserción a la válvula de Vieussens. La *extrema-*

dad superior, que penetra por debajo de los tubérculos cuadrigéminos posteriores, no es visible. La *extremidad inferior* desaparece en el centro medular del cerebelo, a nivel de su escotadura anterior.

4° Válvula de Vieussens. Es una lámina nerviosa, tendida transversalmente de un pedúnculo cerebeloso al otro.

a) *Conformación exterior y relaciones* — De forma triangular como el espacio que llena, presenta: 1.°, una *cara posterior* inclinada de arriba abajo y de delante atrás, cubierta por el vermis; 2.°, una *cara anterior* tapizada por el epéndimo, que contribuye a formar la bóveda del cuarto ventrículo, 3.°, dos *bordes laterales* unidos a los pedunculos cerebelosos superiores; 4.° una *base* confundida con el *óbulo medio* del cerebelo, 5.° un *vértice* dirigido hacia delante y del que se desprende un pequeño fascículo, el *frenillo de la válvula de Vieussens*. A cada lado del frenillo emergen los nervios patéticos.

b) *Constitución anatómica*. — La válvula se compone de dos aminas superpuestas: una lámina *blanca* que corresponde a la cara anterior (velo medular anterior); una lámina *gris*, extendida por detrás de la anterior, que no ocupa más que los tres cuartos inferiores de la válvula, presenta pliegues. Su estructura recuerda la disposición de las láminas cerebelosas.

B. Estudio microscópico Vías cerebelosas

Dos clases de fibras unen el cerebelo con el neuroeje, fibras aferentes y fibras eferentes.

1° Fibras aferentes. — Proviene de la medula, del bulbo, de la protuberancia y del cerebelo.

a) *Fibras aferentes de origen medular* — Comprenden: 1.°, el fascículo cerebeloso directo, que termina en la corteza de la parte anterior del vermis superior; 2.°, algunas fibras de los cordones posteriores, que se mezclan con las fibras del fascículo precedente, 3.°, el fascículo de Gowers, que, después de haber contorneado el pedúnculo cerebeloso superior y penetrando en la válvula de Vieussens, termina en la porción anterior e inferior del vermis.

b) *Fibras aferentes de origen bulbar*. — Estas fibras comprenden: 1.°, fibras del núcleo de Monakow (estas fibras parecen tener la misma significación que la del fascículo cerebeloso directo); 2.°, las fibras del cordón lateral (se ignora el lugar de su terminación); 3.°, las fibras olivares, que constituyen el fascículo más importante de

las vías bulbo-cerebelosas. Continúan el cuerpo testiforme y terminan en la corteza cerebelosa y quizá en los núcleos centrales.

c) *Fibras aferentes de origen protuberancial.* — Proviene de los núcleos del puente y terminan en la corteza cerebelosa del lado opuesto.

d) *Fibras vestibulo-cerebelosas.* — Nacen de los núcleos vestibulares y alcanzan los núcleos del techo.

2° **Fibras eferentes.** — Las fibras eferentes van del cerebelo a las otras porciones del neuroeje, comprenden

a) *El fascículo cerebelorrubico y cerebelotatámico* — Nace en el núcleo denticulado, sigue el pedúnculo cerebeloso superior, se encruza con el del lado opuesto en la calota protuberancial (*comisura de Werneckinck*) y termina, parte en el núcleo rojo (véase *Pedúnculos*) y parte en el núcleo externo de la capa óptica.

b) *Fibras cerebelovestibulares* — Nacen de los núcleos del techo y se dirigen a los núcleos vestibulares formando las fibras semicirculares internas, las fibras semicirculares externas y el fascículo en forma de gancho de Russell.

c) *Fibras cerebeloespinales* — Proviene de la corteza de los hemisferios cerebelosos. Descienden a la médula espinal para terminar alrededor de las células radicales anteriores.

d) *Fibras cerebelopónicas.* — Son fibras que unen la corteza del cerebelo con los núcleos del puente.

3° **Topografía de las fibras contenidas en cada pedúnculo.** *El pedúnculo cerebeloso inferior* contiene: 1°, fibras aferentes, el fascículo cerebeloso directo, el fascículo olivocerebeloso y fibras vestibulo-cerebelosas; 2°, fibras eferentes, cerebelobulbares, cerebeloespinales y cerebelovestibulares.

El pedúnculo cerebeloso medio comprende casi exclusivamente fibras pontocerebelosas, y quizá también fibras comisurales largas entre los dos hemisferios cerebelosos.

El pedúnculo cerebeloso superior contiene casi únicamente fibras eferentes que ponen en relación el núcleo dentado con el núcleo rojo y la capa óptica.

7 VASOS

1.° **Arterias.** — Las arterias del cerebelo proceden de seis ramas arteriales, tres a cada lado: 1°, la *cerebelosa inferoposterior*,

rama de la vertebral (se distribuye en la parte posterior de la cara inferior); 2.ª, la *cerebelosa inferoanterior*, rama del tronco basilar (para la parte anterior de la cara inferior); 3.ª, la *cerebelosa superior*, rama del tronco basilar (para la cara superior del órgano) Estas seis arterias se anastomosan desde luego entre sí, y después, fuera del cerebelo, con las arterias del cerebro y las del bulbo.

2.º **Venas.** — Independientes de las arterias, se dividen en medias y laterales. Las *venas medias o vermicianas* son en número de dos, una superior y otra inferior: la *superior* corre de atrás a delante por el vermis superior y va a desembocar en la vena de Galeno; la *inferior* corre de delante atrás por el vermis inferior y desemboca en uno de los senos que se abren en la prensa de Herófilo, casi siempre en el seno recto o en uno de los senos laterales. Las *venas laterales* se distinguen también en superiores e inferiores, según que ocupen la cara superior o la cara inferior del cerebelo. Se dirigen hacia la circunferencia del órgano y terminan en parte en los senos laterales y en parte en los senos petrosos superiores.

CAPITULO V

CUARTO VENTRICULO

El cuarto ventrículo bulbocerbeloso es una cavidad romboide, aplanada de delante atrás, cuyo eje mayor se dirige oblicuamente hacia arriba y adelante, formando con la vertical un ángulo de 10 a 15°. Se le consideran *dos paredes*, anterior y posterior, *cuatro bordes* y *cuatro ángulos*

1.º **Paredes.** — Las dos paredes del cuarto ventrículo se distinguen en *anterior* (o *suelo*) y *posterior* (o *bóveda*)

A. **PARED ANTERIOR** — La pared anterior, o *suelo*, es romboidal como el mismo ventrículo. Una línea transversal que pasa por sus dos ángulos laterales la divide en dos triángulos, uno superior y otro inferior.

a) **Triángulo inferior** — El triángulo inferior o *bulbar* pertenece al bulbo. Presenta, en la línea media, un surco que ocupa toda su altura: es el *tallo del cálamus scriptorius*. A derecha e izquierda de este surco se desprenden tractos blanquecinos, *barbas del cálamus* o *estrias acústicas*, las cuales, dirigiéndose hacia fuera, se reúnen con el tubérculo acústico. Presenta, a cada lado de la línea media y contando de dentro afuera: 1.º, una región blanquecina, de forma triangular de base superior, el ala blanca interna (núcleo del hipogloso); un surco longitudinal la divide en dos segmentos, uno interno o *drea medialis* y otro externo o *drea plumiformis*; 2.º, una segunda región blanquecina, también triangular de base superior, el ala blanca externa, que se divide en dos partes, una infero-interna o ala blanca externa propiamente dicha (núcleo del nervio vestibular) y otra superoexterna o *tubérculo acústico* (núcleo del nervio coclear); 3.º, entre las dos alas blancas, una región grácea, triangular de base inferior, el ala gris (núcleos sensitivos del neumogástrico, del glosofaríngeo y del intermediario). Nótese que las dos alas blancas forman relieve,

mientras que el ala gris está más o menos deprimida en una especie de fosita, la *fóvea inferior* o *fosita inferior*. Debajo del ala gris se ve una pequeña región cuadrilátera, el *área postrema*, separada del ala gris por el *fascículo separans*.

b) *Triángulo superior* — El triángulo superior o *protuberancia* pertenece a la protuberancia. Encontramos en él sucesivamente (además del tallo del cálamus, que recorre todo el suelo del ventrículo): 1.º, hacia abajo y adentro, algo por encima del ala blanca interna, una pequeña eminencia ovoidea, la *eminencia teres* (núcleo del motor ocular externo); 2.º, por encima de esta eminencia y siguiendo a línea media, un fascículo longitudinal redondeado, el *funiculus teres*; 3.º, por fuera de esta eminencia, una depresión poco profunda, la *fóvea superior*; 4.º, en la parte superolateral, una pequeña superficie de un gris apizarrado, el *locus coeruleus* (un núcleo del trigémino).

B. PARED POSTERIOR. — La pared posterior o *bóveda* comprende, como la base, dos partes bien distintas, una superior y otra inferior:

a) *En su parte superior* está formada por la cara anterior de los pedúnculos cerebelosos superiores y de la válvula de Vieussens, revestida en toda su extensión por la membrana endimaria.

b) *En su parte inferior*, la bóveda del ventrículo está constituida por una simple lámina epitelial la *membrana tectoria*, que no es otra cosa que la capa epitelial del epéndimo: de forma triangular, empieza por arriba (por su base), en el vértice de la úvula y en el borde anterior de las válvulas de Tarin; termina, por debajo (por su vértice), continuándose con el revestimiento epitelial del conducto del epéndimo; lateralmente se refleja hacia dentro para fusionarse con el revestimiento epitelial del suelo. La membrana tectoria se encuentra reforzada: 1.º, por abajo, a nivel del ángulo inferior del ventrículo, por una pequeña lámina gris de dirección transversa, llamada *obex* o *cerrojo*; 2.º, por los lados, por una lámina de substancia blanca, llamada *ligula* (vétese en su parte más externa el *cuerno de la abundancia*, de donde sale la extremidad externa de los plexos coroides.) Por último sobre ella se extiende una lámina celulovascular, dependencia de la piamadre, la *tela corioidea del cuarto ventrículo* o *tela corioidea inferior*. Es de notar la existencia, en el borde superior y a lo largo de la porción media de la tela corioidea, de cordones celulovasculares que constituyen los *plexos coroides del cuarto ventrículo*.

1.º **Ángulos.** En número de cuatro, se distinguen en

a) *Superior*, correspondiente al origen del acueducto de Silvio.

β) *Inferior*, correspondiente a la extremidad inferior del tallo del calamus o *pico del cálamus* (a este nivel, el ventrículo se continúa con el conducto central de la medula).

γ) *Laterales*, situados en el punto de convergencia de los tres pedunculos cerebrales (es de notar que, un poco por debajo de los ángulos laterales, el ventrículo se prolonga hacia fuera en dos especies de corredores transversales, los *fossas* o *recessus lateralis* de REICHERT, que van hasta el origen de los dos nervios neumogástrico y glosófaringeo).

3° **Comunicación del cuarto ventrículo con los espacios subaracnoideos.** — La cavidad ventricular comunica con los espacios subaracnoideos merced a *tres orificios*, en los cuales el revestimiento está naturalmente interrumpido: 1°, un orificio medio, el *agujero de Magendie*, de forma redondeada, de bordes irregulares, situado encima del ángulo inferior; 2°, dos orificios laterales, los *agujeros de Luschka*, situados en la extremidad externa de los *recessus lateralis* de REICHERT.

CAPITULO VI

PEDUNCULOS CEREBRALES, TUBERCULOS CUADRIGEMINOS Y ACUEDUCTO DE SILVIO

1. PEDÚNCULOS CEREBRALES

Los pedunculos cerebrales son dos fascículos blancos, uno derecho y otro izquierdo, que unen la parte superior de la protuberancia a los hemisferios cerebrales. Miden de 15 a 18 milímetros de largo por 16 milímetros de ancho; su espesor es de 10 a 22 milímetros.

1.ª **Conformación exterior y relaciones.** -- Vistos exteriormente en la base del encéfalo, se presentan bajo la forma de dos columnas blancas cilindroideas, de trayecto ligeramente divergente. En cada uno de ellos podemos considerar *cuatro caras* (inferior, superior, interna y externa) y dos *extremidades* (posterior y anterior).

a) La *cara inferior*, de coloración blanca, estriada en sentido longitudinal, corresponde sucesivamente a la lámina cuadrilátera del esfenoides y a la silla turca. Está cubierta en gran parte por la circunvolución del hipocampo. Es cruzada sucesivamente, contando de delante atrás, por la arteria cerebelosa superior, por la arteria cerebral posterior y por la cinta óptica.

β) La *cara superior* corresponde a los tubérculos cuadrigéminos. El límite de separación entre las dos formaciones, por lo demás *completamente artificial*, es un plano transversal que pasa por el acueducto de Silvio.

γ) La *cara externa*, oculta en gran parte por la circunvolución del hipocampo, presenta dos partes convexas, una inferior y otra superior, separadas una de otra por un surco longitudinal, el *surco lateral del istmo*. De este surco se desprende una lámina nerviosa de forma triangular, el *fascículo lateral del istmo*, el cual, dirigiéndose hacia arriba, asciende hasta la parte externa del tubérculo cuadrigémino posterior.

δ) La *cara interna* corresponde, en la mayor parte de su extensión, al rafe medio. Solo en la parte inferior se convierte en libre: a este nivel presenta, en el límite respectivo de las dos caras interna e inferior un surco longitudinal, el *surco del motor ocular común*, de donde emergen los filetes radiculares de este último nervio.

ε) La *extremidad posterior o protuberancial* se continúa con la cara superior y la protuberancia.

ζ) La *extremidad anterior o cerebral* se relaciona con el hilo de hemisferio correspondiente a la parte inferior de los núcleos opto-estriados.

2.º **Conformación interior.**—Visto en un corte transversal, el pedunculo cerebral presenta, en su parte media una masa de sustancia negra, el *locus niger* de SOEMMERING; esta masa tiene la forma de una media luna de concavidad superointerna y se extiende desde el surco lateral del istmo hasta el surco del motor ocular común.

El locus niger divide el corte del pedunculo en dos partes o capas: una parte situada por encima, *piso superior o casquete*; otra parte situada por debajo, *piso inferior o pie*. El *casquete* tiene una forma irregularmente cuadrilátera. El *pie* tiene la forma de media luna, cuya concavidad, dirigida hacia arriba, abraza el locus niger: se compone de fascículos longitudinales, aplanados de fuera adentro y adosados unos contra otros como las hojas de un libro (es de notar que, próximos al locus niger, estos fascículos se dividen y subdividen, formando una zona de aspecto algo especial, el *stratum intermedium*).

3.º **Constitución anatómica y conexiones.**—Conviene examinar separadamente cada una de las tres partes del pedunculo cerebral.

A **ESTRUCTURA DEL LOCUS NIGER.**—Las células pigmentadas provistas de dendritas voluminosas se agrupan en una porción compacta. Al lado de éstas existen algunas células aisladas. Recibe fibras aferentes que proceden de la corteza cerebral y del cuerpo estriado, parten del mismo fibras eferentes que parecen dirigirse hacia los núcleos motores del bulbo y de la protuberancia. El locus niger parece formar parte de la vía motriz extrapiramidal.

B **ESTRUCTURA DEL CASQUETE.**—Nos presenta. 1.º, la formación reticular; 2.º, la sustancia gris; 3.º, la sustancia blanca.

a) *Formación reticular.*—La formación reticular forma un campo cuadrilátero en el que se encuentran pequeñas columnas de sustancia grís envueltas por fibras de orígenes múltiples. 1.º, fibras

tectobulbares, que se entrecruzan en la línea media (decusación en forma de fuente); 2.º, *fibras rubroalámicas*; 3.º, *fibras rubroespinales* que se entrecruzan (decusación ventral) del casquete de Forel). Por último, es atravesada por fascículos que encontraremos mas adelante (véase *Substancia blanca*).

b) *Substancia gris* Comprende: 1.º, el *núcleo del patético*; 2.º el *núcleo del motor ocular común* situado por debajo del acueducto de Silvio; 3.º, el *núcleo rojo del casquete*, columna de 6 a 7 milímetros de diámetro, cuyas vías aferentes están en conexión con el cerebelo (pedúnculo cerebeloso superior), con el cuerpo estriado, con la corteza cerebral, mientras que las vías eferentes alcanzan, unas, el *álamo* (véase *Fibras rubroalámicas*), otras, las células anteriores de la medula (fascículo rubroespinal) las últimas, finalmente, la *oliva bulbar*. Este núcleo parece ser uno de los centros importantes de las vías motrices extrapiramidales.

c) *Substancia blanca* — La *substancia blanca* del casquete peduncular comprende, además de las fibras de la formación reticular: 1.º, los *pedunculos cerebelosos superiores* que terminan en los núcleos rojos (comisura de Wernickinck); 2.º, la *cinta de Reil*, fascículo sensitivo, aplanado de arriba abajo, situado en la parte inferior de la formación reticular, inmediatamente por encima del *locus niger*. Hay que notar que la parte externa de esta cinta se ha separado del casquete para formar el fascículo lateral del istmo, y que otra parte menos importante, la *cinta del pie* ha pasado al segmento externo del pie del pedúnculo. Este fascículo contiene las fibras sensitivas de la vía sensitiva principal, que provienen del fascículo anterolateral de la medula y la vía central sensitiva secundaria del trigémino. Las fibras de la parte lateral que forman el fascículo lateral del istmo pertenecen a la vía acústica central y terminan en los tubérculos cuadrigéminos posteriores; 3.º, el *fascículo de asociación longitudinal* (la misma significación que en la protuberancia). 4.º, la *cintilla longitudinal posterior* colocada por detrás de los núcleos rojos y que parece terminar en un núcleo situado en la proximidad anterior del acueducto de Silvio (núcleo de Darkschewitch) (véase pág. 366).

C ESTRUCTURA DEL PIE. — El pie, además de las fibras sensitivas antes indicadas que la cinta de Reil envía a su parte externa, contiene las fibras siguientes, todas longitudinales que desde la protuberancia ascienden hacia el cerebro. 1.º, el *fascículo piramidal*, que ocupa la parte media (los tres quintos medios) del pie del pedúnculo. 2.º, el *fascículo geniculado*, que ocupa la parte interna (el quinto inter

no) del pie, 3.º, las *fibras corticoprotuberanciales*, que unen la corteza cerebral con los núcleos del puente y se dividen en anteriores y posteriores — las *fibras posteriores* se reúnen en un fascículo compacto, que ocupa la parte externa (el quinto externo) del pie del pedúnculo, es el *fascículo corticoprotuberancial posterior* o *fascículo de Türk*, las *fibras anteriores* están íntimamente mezcladas con las fibras constitutivas del fascículo piramidal y del fascículo geniculado, 4.º, el *fascículo aberrante de la vía peduncular*, cuyas fibras motoras, destinadas a los núcleos bulboprotuberanciales, se separan de la vía motriz para alcanzar el casquete al atravesar el locus niger y se incorporan a la cinta de Reil (*pes lemniscus profundo*).

8. TUBÉRCULOS CUADRIGÉMINOS

Se da este nombre a cuatro eminencias en forma de manecón, situadas en la parte posterosuperior de la protuberancia y de los pedúnculos cerebrales. Su conjunto constituye la *lámina cuadrigémina* de algunos anatomistas.

1.º **Confirmación exterior.** — Se dividen en anteriores o *nates* y posteriores o *testes*. Están separados unos de otros por dos surcos dispuestos en cruz, el *sutro cruciforme* de los tubérculos cuadrigéminos. Los *tubérculos anteriores*, de color grisáceo, de forma ovoidea, miden 10 milímetros de largo por 7 milímetros de ancho, los *tubérculos posteriores* difieren de los precedentes en que son más pequeños (8 milímetros por 6), de un gris más claro y de forma algo menos alargada. Cada tubérculo envía hacia fuera una prolongación, que se dirige hacia el lámino óptico. Estas prolongaciones, en número de cuatro, constituyen los *bracos conjuntivos*. Se les distingue en anteriores (que se desprenden de los *nates*) y posteriores (que se desprenden de los *testes*), los anteriores van a terminar en los cuerpos geniculados externos, los posteriores, en los cuerpos geniculados internos (recuérdese AEPI).

2.º **Constitución anatómica y conexiones.** — Los tubérculos cuadrigéminos anteriores y los tubérculos cuadrigéminos posteriores difieren por su significación morfológica más aún que por su configuración exterior.

A **TUBÉRCULOS CUADRIGÉMINOS ANTERIORES** — Corresponden esencialmente a la visión, y de un modo accesorio al sentido del oído.

a) *Histológicamente*, contienen células nerviosas y fibras nerviosas, que se reparten en cuatro capas superpuestas (véanse los tratados de Histología).

β) *Desde el punto de vista de sus relaciones*, reciben fibras (fibras aferentes) y las emiten (fibras eferentes). Las fibras aferentes, que siguen el brazo conjuntival anterior, están constituidas en su mayor parte por fibras ópticas, a las cuales se añaden, según HALL, cierto número de fibras auditivas procedentes de la parte lateral de la cinta de Reil. Las fibras eferentes se reparten en los tres grupos siguientes: 1.º, *fibras comisurales*, dirigiéndose, a través de la línea media, al tubérculo anterior del lado opuesto; 2.º, *fibras ascendentes*, que suben por el brazo conjuntival hasta la corteza cerebral, 3.º, *fibras descendentes*, que se dirigen a la cintilla longitudinal posterior.

B. TUBÉRCULOS CUADRIGÉMINOS POSTERIORES. — Corresponden esencialmente al sentido del oído.

a) *Histológicamente*, están formados por una masa gris central (ganglios de los tubérculos cuadrigéminos posteriores), cubierta en su cara superior por una delgada capa de sustancia blanca (*stratum zonale*).

β) *Desde el punto de vista de sus conexiones*, reciben fibras (fibras aferentes) y las emiten (fibras eferentes). Las fibras aferentes emanan del fascículo acústico, que, como se sabe, forma la parte externa de la cinta de Reil. Las fibras eferentes se dividen aquí en tres grupos: 1.º, *fibras comisurales*, que se dirigen, a través de la línea media, al tubérculo cuadrigémino del lado opuesto, 2.º, *fibras ascendentes*, que van pasando por el brazo conjuntival posterior a la corteza cerebral (corteza del lóbulo temporal); 3.º, *fibras descendentes*, que van a mezclarse, en la calota peduncular, con las fibras de la cinta de Reil.

3. ACUEDUCTO DE SILVIO

El acueducto de Silvio es un conducto longitudinal, que pone en comunicación el cuarto ventrículo con el ventrículo medio.

1.º *Situación y relaciones*. Está situado en la línea media, por encima de la calota protuberancial y peduncular, debajo de los tubérculos cuadrigéminos y de la comisura blanca posterior. Empieza, por abajo, a nivel del ángulo superior del cuarto ventrículo y termina, por arriba, debajo de la comisura blanca, por un orificio relativamente ensanchado que recibe el nombre de *anus*. Mide 15 milíme-

tros de largo. Oblicuo hacia arriba y adelante, forma con el plano horizontal un ángulo de 50 a 55°.

2.º Conformación interior. — El acueducto de Silvio es sumamente estrecho, casi virtual. Reviste, en los cortes transversales, la forma de triángulo curvilíneo de base superior (A algunas veces es una simple hendidura dirigida en sentido sagital.)

3.º Estructura. — Está tapizado internamente, como todas las cavidades ventriculares, por la membrana ependimaria. Está rodeado, además, en todo su trayecto, por un manguito de sustancia gris, la *sustancia gris del acueducto*.

4. VASCULARIZACIÓN DE LOS PEDÚNCULOS CEREBRALES Y DE LOS TUBÉRCULOS CUADRIGÉMINOS

1.º Arterias. — Proviene de las arterias cerebelosas superiores cerebral posterior y de sus ramas; accesoriamente de la coroidea anterior.

a) *Ramas de la arteria cerebelosa superior* — Nacida de la parte terminal del tronco basilar, la cerebelosa superior sigue un trayecto peripeduncular durante el cual proporciona ramitos para el pie del pedúnculo y para la porción posterointerna de los tubérculos cuadrigéminos.

b) *Ramas de la cerebral posterior.* — Nacida por bifurcación del tronco basilar, la cerebral posterior describe un círculo peripeduncular; luego, una vez llegada al surco lateral del pedúnculo, se dirige a la cara inferior del cerebro. Emite: 1.º, el *pedículo retromamilar*, cuyas arteriolas posteriores forman las arterias paramedianas pedunculares (porción interna del pie), 2.º, la *arteria cuadrigémica*, destinada a los dos tubérculos cuadrigéminos. 3.º, las *coracoides posteriores*, que, al contornear el pedúnculo, abandonan ramos que irrigan el pie y la porción lateral. Accesoriamente, la coroidea anterior emite algunas ramas.

2.º Venas. — Las venas del pedúnculo desembocan en parte en las venas basilares, en parte en la vena comunicante posterior. Las venas de los tubérculos cuadrigéminos desembocan en su mayoría en las venas de Galeno.

CAPITULO VII

CEREBRO

El cerebro constituye la parte anterior y superior del encefalo. De todos los segmentos del neuroeje, es el más voluminoso y el más importante

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.º **Situación.**— El cerebro ocupa la casi totalidad de la caja craneal. Mientras que su parte superior, convexa (*convexidad del cerebro*), corresponde al casquete óseo, su parte inferior (*base*) corresponde a la vez al departamento anterior, al departamento medio y a la tienda del cerebelo.

2.º **Forma y dimensiones.**— Puede compararse a un ovoide cuyo eje mayor estuviese dirigido en sentido anteroposterior y con la extremidad más gruesa hacia atrás. Su longitud, en el hombre, es de 17 centímetros, su anchura, de 14 centímetros, su altura, de 13 centímetros (un centímetro menos, en la mujer, para cada uno de estos diámetros).

3.º **Volumen y peso.** El hombre es, de todos los mamíferos, aquel cuyo cerebro alcanza mayor grado de desarrollo. Su peso es, en números redondos, de 1.160 gramos para el cerebro del hombre, y de 1.000 gramos para el cerebro de la mujer. Su peso específico es de 1.030.

2. CONFORMACIÓN EXTERIOR

Visto por su convexidad, el cerebro presenta en la línea media, una cisura profunda, que divide el órgano en dos mitades llamadas *hemisferios*. La cisura, por este hecho, toma el nombre de *cisura interhemisférica*. Los dos hemisferios están unidos entre sí en la línea

medir por cierto número de formaciones, que designaremos con el nombre de *formaciones interhemisféricas*. Estudiarémoslas sucesivamente: 1°, los *hemisferios*, 2°, las *formaciones interhemisféricas*.

A. Hemisferios

Los hemisferios se distinguen en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Cada uno de ellos reviste la forma de un prisma triangular y presenta *dos extremidades, tres caras y tres bordes*.

1° **Extremidades.** — De las dos extremidades una es anterior o *frontal* y la otra posterior u *occipital*. Se las llama también, en razón de su forma, *cuerno frontal* y *cuerno occipital*. A su parte más prominente se le da el nombre de polo: *polo frontal* y *polo occipital*.

2° **Caras.** Se distinguen, según su orientación, en interna, externa e inferior.

a) *Cara interna.* — La cara interna, plana y vertical, limita a cada lado la gran cisura interhemisférica. Está en relación con la hoz del cerebro.

b) *Cara externa.* — La cara externa, convexa en todos sentidos, corresponde al casquete craneal.

c) *Cara inferior.* — La cara inferior mucho más irregular que las dos precedentes, presenta primeramente, en la unión de su cuarto anterior con sus tres cuartos posteriores, una profunda cisura curva, de concavidad posterior, que es la porción inicial de la *cisura de Silvio*. Por delante de esta cisura, la cara inferior del hemisferio presenta, en su tercio interno, la *crista olfatoria* que termina, por delante, en el *bulbo olfatorio*, y por detrás, por dos raíces divergentes, la *raíz blanca interna* y la *raíz blanca externa*, que se dirigen, la primera hacia la línea media y la segunda hacia la circunvolución del hipocampo. Por detrás de la cisura de Silvio, la cara inferior del hemisferio se parece bastante a un riñón cuyo hilio estuviera dirigido hacia dentro; su porción anterior descende al departamento medio de la base del cráneo, formando el *cuerno esfenoidal* o *cuerno temporal*.

3° **Bordes.** Los tres bordes se distinguen en superior, interno y externo. El *borde superior*, convexo, separa la cara externa de la cara interna. Corresponde al borde convexo de la hoz del cerebro y al seno longitudinal superior. El *borde externo* separa la cara externa de la cara anterior. Seguido de delante atrás, es horizontal hasta la

cisura de Silvio, después sumamente curvilíneo con la cavidad posterior, luego ligeramente ascendente y, por último, algo descendente. El *borde interno* imita hacia dentro la cara inferior del hemisferio. Rectilíneo en su parte anterior, lo es también en la posterior y está, en su parte media, oblicuamente dirigido de delante atrás y de fuera a dentro.

B. Formaciones interhemisféricas

Entre los dos hemisferios, y uniéndose entre sí, se encuentran numerosas formaciones, de valor muy distinto. *Por arriba*, del lado de la convexidad, una lámina blanca, el *cuerpo calloso*. *Hacia abajo*, del lado de la base, encontramos primero el *quiasma óptico* y, al lado del quiasma, el *espacio profundo anterior*, después, por detrás del quiasma, una región romboidal, el *rombo optopeduncular*, en el cual se encuentran el *túber cinéreo*, el *tallo pituitario*, el *cuerpo pituitario*, los *tubérculos mamilares* y el *espacio perforado posterior*.

1.º **Cuerpo calloso.** — Lo estudiaremos más adelante (véase página 400)

2.º **Quiasma óptico.** — Pequeña lámina de substancia blanca de forma cuadrilátera, situada inmediatamente por detrás de la rodilla del cuerpo caloso. Alargada en sentido transversal, mide 14 milímetros por 6. Su *cara inferior* descansa sobre la parte anterior de la tienda de la hipófisis. Su *cara superior* está unida a la base del cerebro por una lámina muy delgada de substancia gr's, la *lámina supraóptica*. De sus *cuatro ángulos*, los dos anteriores dan origen a los nervios ópticos, los dos posteriores, a las cintas ópticas. Las *cintas ópticas*, dirigiéndose oblicuamente hacia fuera y atrás, rodean los pedúnculos cerebrales y se dividen después en dos ramas, una interna y otra externa, las cuales terminan en los cuerpos geniculados interno y externo del tálamo óptico.

3.º **Espacio perforado interior.** — Situado por fuera del quiasma, tiene la forma romboidal con: 1.º, un *lado anteroexterno* formado por la raíz blanca externa del nervio olfatorio; 2.º, un *lado antero-interno*, formado por la raíz blanca interna del olfatorio y por el nervio óptico; 3.º, un *lado postero-interno*, representado por la cintilla óptica; 4.º, un *lado posteroexterno*, formado por la punta del lóbulo temporooccipital (es de notar que de su ángulo externo arranca la

cisura de Silvio) Está constituido por una capa de substancia gris que presenta numerosos agujeros para el paso de los vasos arteriales y venosos.

Es recorrido, en su parte posterior y paralelamente a la cintilla óptica, por un fascículo blanco, la *cintilla diagonal* que prolonga el pedunculo del cuerpo calloso hasta la circunvolución del hipocampo.

4.º Túbér cinéreo.— Hoja de substancia gris, convexa hacia abajo (de aquí su nombre de *tuber*), que ocupa todo el espacio comprendido entre el quiasma, las cintas ópticas y los tubérculos mamilares. Su cara superior, cóncava, forma parte del ventrículo medio y por eso está cubierta por el epéndimo.

5.º Tallo pituitario. Pequeña columna de substancia gris, de 4 a 6 milímetros de largo, que va de la parte más prominente del túbér cinéreo al cuerpo pituitario. Más ancho en su extremidad superior (*base*) que en su extremidad inferior (*vértice*), tiene en su centro una pequeña cavidad en forma de embudo, que prolonga por abajo la cavidad del tercer ventrículo, del que constituye la parte más inclinada.

6.º Hipofisis o cuerpo pituitario. Pequeña masa elíptica suspendida en el extremo inferior del tallo pituitario. (Véase libro X, *Glándulas de secreción interna*)

7.º Tubérculos mamilares.— En número de dos, uno derecho y uno izquierdo, se presentan bajo la forma de dos eminencias blancas, casi regularmente hemisféricas de 4 a 6 milímetros de diámetro, situadas en la parte interna de los pedúnculos cerebrales, por detrás del túbér cinéreo y por delante del espacio perforado posterior. Se componen de una capa blanca periférica que aprisiona en su centro un núcleo de substancia gris que continúa por arriba con la del ventrículo medio. Cada tubérculo mamilar está en conexión; 1.º con el *triángulo cerebral*; 2.º, con el *tálamo óptico*, y 3.º, con el *pedúnculo cerebral*.

8.º Espacio perforado posterior.— Llamado también *espacio interpeduncular*, tiene la forma de un pequeño triángulo isósceles, cuya base dirigida hacia delante está adosada a los tubérculos mamilares, y cuyo vértice corresponde al ángulo de separación de los dos pedúnculos cerebrales. Está constituido por una lámina de substan-

cia gris, acribillada de agujeros para el paso de vasos arteriales o venosos. En el vértice del espacio perforado, GUDDEN y FOREL han descrito un pequeño *ganglio interpeduncular*.

C. Hendidura cerebral de Bichat

BICHAT ha designado con el nombre de *gran hendidura cerebral* un surco profundo, impar y simétrico, situado en la base del cerebro y a lo largo del cual la piamadre se insinúa en el espesor de la masa hemisférica para formar la *tela coroidea superior* y los *plexos coroides de los ventrículos laterales*.

Tiene la forma de una herradura, con la concavidad dirigida hacia delante, y cuyas dos extremidades corresponden, a cada lado, al espacio perforado anterior. Se le consideran una porción media y dos porciones laterales. La *porción media*, impar, está situada en la línea media por debajo del rodete del cuerpo calloso (que constituye el *labio superior* de la hendidura) y encima de los tubérculos cuadrigéminos (que forman su *labio inferior*). Está ocupada por la base de la *tela coroidea superior*. Las *porciones laterales* se dirigen de atrás adelante, describiendo una ligera curva de concavidad interna. La hendidura a este nivel tiene: 1.º, por *labio superior*, el tálamo óptico, reforzado por el pedúnculo cerebral; 2.º, por *labio inferior*, la circunvolución del hipocampo.

La hendidura cerebral de Bichat nos conduce al ventrículo medio por su porción media y a la prolongación esfenoidal de los ventrículos laterales por sus porciones laterales. Es de notar que dicha hendidura no comunica por ningún punto con la propia cavidad ventricular, sino que está siempre separada de ella por la membrana epéndimar a

3. CISURAS Y CIRCUNVOLUCIONES CEREBRALES

La superficie de los hemisferios, conocida con el nombre de *coriza* o *mantio* (*pallium*), presenta un sistema de eminencias sumamente irregulares, que circunscriben depresiones más o menos profundas y más o menos anfractuosas. Estas eminencias reciben el nombre de *circunvoluciones*, y se llaman *cisuras* o *surcos* las anfractuosidades que las separan y limitan. Estudiaremos estas circunvoluciones y estas cisuras en cada una de las tres caras de los hemisferios.

A. Circunvoluciones de la cara externa

1.º **Cisuras interlobulares.** — La cara externa de los hemisferios presenta *tres* cisuras de primer orden: la cisura de Silvio, la cisura de Rolando y la cisura perpendicular externa.

a) **Cisura de Silvio.** — La cisura de Silvio nace, como ya hemos visto, en la cara inferior del cerebro, en la parte externa del espacio perforado anterior. De ahí se dirige hacia fuera, alcanza el borde externo del hemisferio, lo contornea y pasa a la cara externa. Cambiando entonces de dirección, se dirige hacia atrás y algo hacia arriba, y termina (ya en punta, ya por una pequeña bifurcación), después de haber recorrido en la cara externa del hemisferio cerebral un trayecto de 8 o 9 centímetros. Comprende, pues, dos porciones: una porción inferior, que corresponde a la base del cráneo, muy ancha, el *valle silviano* de Broca, una porción superior, que corresponde a la cara externa del hemisferio, más estrecha, pero muy profunda, *fosa silviana* que constituye la cisura silviana propiamente dicha; entre las dos porciones y limítandolas, el *pliegue falcaforme*, que va del lóbulo temporal al lóbulo orbitario. Al llegar a la cara externa del hemisferio, la cisura de Silvio envía arriba y hacia delante, en el lóbulo frontal, dos pequeñas *prolongaciones*: una anterior u *horizontal* y otra posterior o *ascendente*.

b) **Cisura de Rolando.** — Comienza en el ángulo que forma la cisura precedente con su prolongación ascendente. Desde este punto se dirige oblicuamente hacia arriba y va a terminar en el borde superior del hemisferio por una muesca más o menos profunda, que invade ligeramente la cara interna. La cisura de Rolando casi nunca es rectilínea, en general se dobla tres veces sobre sí misma (presentando *tres rodillas*, BROCA), de tal modo que es cóncava hacia atrás en su parte superior, cóncava hacia delante en su parte media y otra vez cóncava hacia atrás en su parte inferior. Su longitud total es de 9 a 11 centímetros.

c) **Cisura perpendicular externa.** — Esta cisura es muy visible en los monos, por lo que se la denomina *hendidura simiana*. Situada en la parte posterior del hemisferio, se prende del borde superior del cerebro, sobre el que cae *perpendicularmente* (de aquí su nombre), y desde este punto se dirige oblicuamente hacia abajo y adelante, para terminar algo por encima del borde externo del hemisferio. En el hombre, esta cisura no existe o, con más exactitud, está reducida a su extremidad superior, formando como una simple muesca en el

borde superior del hemisferio. El resto está borrado por pliegues de paso. Para trazarla de nuevo en la cara externa, basta prolongar hacia abajo y adelante la muesca en cuestión, siguiendo en los pliegues de paso citados un trayecto exactamente paralelo a la cisura perpendicular interna, que está situada en la cara interna del hemisferio y es siempre claramente visible.

2.º **Lóbulos y circunvoluciones.** - Las tres cisuras, silviana, rolándica y perpendicular externa dividen la cara externa del hemisferio en cuatro lóbulos: *lóbulo frontal*, *lóbulo occipital*, *lóbulo temporal* y *lóbulo parietal*. A éstos se añade el *lóbulo de la insula*.

A. **LÓBULO FRONTAL.** El lóbulo frontal comprende toda la porción de la cara externa del hemisferio que se halla situada por delante de la cisura de Rolando. Presenta dos surcos longitudinales, ambos paralelos al borde superior del hemisferio: son el *surco frontal superior* y el *surco frontal inferior*. En su extremidad posterior cada uno de estos surcos se bifurca en una rama ascendente y otra descendente, estas ramas ascendente y descendente forman, en su conjunción, un tercer surco completo o interrumpido que, dada su situación, ha recibido el nombre de *surco prerrolándico*. Estos tres surcos limitan cuatro circunvoluciones llamadas *frontales*, a saber: 1.º, circunvoluciones longitudinales o anteroposteriores, que se designan, contando de arriba abajo con los nombres de *primera*, *segunda* y *tercera*; 2.º, una circunvolución transversal o ascendente, la *cuarta frontal*, más conocida con el nombre de *frontal ascendente*.

a) *Primera frontal.* — Está comprendida entre el borde superior del hemisferio y el surco frontal superior. Presenta tres porciones: 1.º, extremidad anterior o *cabeza*; 2.º, porción media; 3.º, extremidad posterior o *pie*, que corresponde a la frontal ascendente.

b) *Segunda frontal.* — Está comprendida entre los dos surcos frontales. Se describen en ella, como en la precedente, *cabeza*, *parte media* y *pie*.

c) *Tercera frontal.* — Llamada también *circunvolución de Broca*, está perfectamente limitada: *por arriba*, por el surco frontal inferior; *por abajo*, por el borde externo del hemisferio en primer término, y luego por la cisura de Silvio. Su longitud es de 4 ó 5 centímetros; su altura de 2 a 2,5 centímetros. Se consideran en ella tres porciones: 1.º, *porción anterior* o *cabeza*, que se halla situada por delante de la prolongación anterior de la cisura de Silvio; 2.º, *porción media*, llamada *cabo*, comprendida entre las dos prolongaciones de la

cisura de Silvio (pequeña masa triangular de base superior, con frecuencia dividida en dos partes por un surco descendente, la *incisura del cabo*), 3.ª, *porción posterior o pie*, de forma cuadrilátera, limitada por delante por la prolongación ascendente de la cisura de Silvio (que la separa del cabo) y por detrás por el surco prerrolándico (que la separa de la frontal ascendente). El pie de la tercera frontal está casi siempre dividido en dos mitades por un surco oblicuo, el *surco diagonal* (en el pie localizó Broca la función del *lenguaje articulado*).

d) *Frontal ascendente*. - Llamada también *cuarta frontal* o *circunvolución prerrolándica*, está comprendida entre la cisura de Rolando y el surco prerrolándico. Su extremidad inferior o *pie* está en comunicación con el labio superior de la cisura de Silvio, a este nivel se une con la parietal ascendente, merced a un pliegue de paso transversal, el *pliegue de paso frontoparietal inferior* u *operculo rolandico*. Su extremidad superior o cabeza se une asimismo, más al á del borde superior del hemisferio (y por consiguiente en la cara interna), con la parietal ascendente, merced a un segundo pliegue de paso que cierra la cisura de Rolando en su parte superior, el *pliegue de paso frontoparietal superior* (está situado en el lóbulo paracentral).

B LÓBULO OCCIPITAL. - El lóbulo occipital, situado en la parte posterior del hemisferio, comprende toda la porción de la cara externa que se halla colocada por detrás de la cisura perpendicular externa.

Presenta dos surcos longitudinales, que se distinguen, según su situación, en *surco occipital superior* y *surco occipital inferior*.

Estos dos surcos dividen el lóbulo occipital en tres circunvoluciones superpuestas: 1.ª, la *primera occipital*, situada entre el borde superior del hemisferio y el surco occipital superior; 2.ª, la *segunda occipital*, comprendida entre los dos surcos occipitales; 3.ª, la *tercera occipital*, situada entre el surco occipital inferior y el borde externo del hemisferio.

C LÓBULO TEMPORAL. -- El lóbulo temporal, situado en la parte media e inferior del hemisferio, está limitado: *por detrás*, por la línea ficticia que representa la cisura perpendicular externa desaparecida; *por delante* y *arriba*, por la cisura de Silvio; *por abajo*, por el borde externo del hemisferio.

Presenta dos surcos: el *surco temporal superior* y el *surco temporal inferior*. Los dos se dirigen de una a otra de las dos extremidades del lóbulo, paralelamente a la cisura de Silvio (es de notar que el surco superior, siempre muy manifiesto, se llama también *surco paralelo*).

Estos dos surcos circunscriben, en el lóbulo temporal, tres circunvoluciones superpuestas de arriba abajo: 1.^a, la *primera temporal*, que sigue la cisura de Silvio, limitada hacia arriba por esta cisura, y hacia abajo por el surco paralelo; 2.^a, la *segunda temporal*, paralela a la precedente, comprendida entre el surco temporal superior y el surco temporal inferior; 3.^a, la *tercera temporal*, situada por debajo del surco temporal inferior (se continúa, por detrás, con la tercera occipital)

D. **LÓBULO PARIETAL.** — El lóbulo parietal ocupa la parte media y superior del hemisferio. Está claramente limitado: *por detrás*, por la cisura perpendicular externa; *por delante*, por la cisura de Rolando; *por debajo*, por la cisura de Silvio; *por arriba*, por el borde superior del hemisferio. Es recorrido en toda su extensión por un largo surco dispuesto diagonalmente, el *surco interparietal*. Este surco empieza, hacia delante, en el ángulo que forman las dos cisuras silviana y rolándica; desde este punto se dirige primero hacia arriba y después se dobla hacia atrás, para dirigirse hacia la cisura perpendicular externa. Es de notar que en el momento en que cambia de dirección, el surco interparietal emite una *prolongación ascendente*, que se dirige hacia el borde superior del hemisferio.

El surco interparietal y su prolongación ascendente descomponen el lóbulo parietal en tres circunvoluciones: 1.^a, la *parietal ascendente*, o *postrolándica*, que forma el borde posterior de la cisura de Rolando y se une por ambas extremidades, como ya hemos visto, con la frontal ascendente; 2.^a, la *parietal superior* (o *lóbulo parietal superior*), comprendida entre la porción horizontal del surco interparietal y el borde superior del hemisferio; 3.^a, la *parietal inferior* (o *lóbulo parietal inferior* o también *lóbulo del pliegue curvo*), claramente limitada hacia abajo por la cisura de Silvio; hacia delante, por la porción ascendente del surco interparietal; hacia arriba, por la porción horizontal de este mismo surco. Se da el nombre de *pliegue curvo* a una circunvolución que, partiendo de la extremidad posterior de la circunvolución parietal inferior, contornea en U la extremidad posterior del surco paralelo, para venir a continuarse con la segunda temporal. De su parte media se desprende una prolongación posterior, que va a perderse en el lóbulo occipital. De aquí resulta que el pliegue curvo, con su prolongación posterior, es una línea de unión entre los tres lóbulos parietal, occipital y temporal.

E. **LÓBULO DE LA ÍNSULA.** — El lóbulo de la ínsula está situado en el fondo de la cisura de Silvio, donde se le ve claramente

a) *Forma y límites* — Visto por su cara externa tiene el aspecto de una eminencia triangular, cuya *base*, situada hacia arriba, corresponde a los lóbulos frontal y parietal y cuyo *vertice*, dirigido hacia abajo, cae perpendicularmente sobre un relieve blanquecino, que Broca ha señalado en la porción inferior de la cisura de Silvio con el nombre de *pliegue falciforme*. Está limitado con bastante claridad en su contorno por surcos o canales, en número de tres. 1.º, un *surco anterior*, de dirección vertical, que separa el borde anterior de la insula de la parte anterior de la tercera frontal; 2.º, un *surco superior*, horizontal, que separa la base de la insula de la parte posterior de la tercera frontal del pie de la frontal ascendente y del pliegue de paso frontoparieta inferior; 3.º, un *surco posteroinferior* oblicuo hacia abajo y adelante, que separa a la insula de la primera temporal. Estos surcos preinsulares aislan completamente la insula, excepto en un punto, cerca de su vertice, donde se ve el *lobulo insular* unirse a la vez al *lobulo frontal* y al *lobulo temporal*, mediante dos pliegues de paso, uno anterior o *frontoinsular* y otro posterior o *temporoinsular*.

b) *Circunvoluciones de la insula* — Un surco oblicuo hacia abajo y adelante, el *gran surco de la insula* divide la insula en dos *lobulillos* uno anterior y otro posterior. El *lobulillo anterior*, de forma triangular como la misma insula, se encuentra subdividido por dos surcos secundarios en tres circunvoluciones, a las cuales distingue en *anterior*, *media* y *posterior*. Estas tres circunvoluciones, cuya base está dirigida hacia arriba, se fusionan por abajo en un vértice común, que es el *polo de la insula*. El *lobulillo posterior*, a su vez, se divide en dos circunvoluciones, una *anterior* y otra *posterior*.

c) *Antemuro* — Se da este nombre a una lámina de sustancia gris de 1 a 2 milímetros de espesor, situada de cauto sobre la cara profunda del *lobulo de la insula*. Se le ve en los cortes frontales de la región. El *antemuro*, considerado una dependencia de la corteza, está separado por dentro de los núcleos optoestriados por una lámina blanca, que es la *capsula externa*, por la cara externa, es a separado de las circunvoluciones insulares por una segunda lámina blanca la *capsula extrema*.

d) *Regiones preinsular y retroinsular* — El *lobulo de la insula* no ocupa más que una parte la parte media de la cisura de Silvio. La parte de cisura situada por debajo de la insula, o *region preinsular* de la cisura, presenta el *pliegue falciforme* de Broca, va mas arriba indicado que se extiende oblicuamente del *lobulo frontal* al *lobulo temporal*. La porción de cisura situada por detrás de la insula, o *re-*

gión retromsular, es el *pliegue de paso temporooccipital* de Broca, que une la primera temporal a la parietal inferior.

B. Circunvoluciones de la cara interna

1.º **Cisuras interlobulares.** — La cara interna del hemisferio presenta *tres cisuras*: la cisura callosomarginal, 1.ª cisura calcarina y la cisura perpendicular interna.

a) *Cisura callosomarginal.* — Empieza debajo de la rodilla del cuerpo caloso, rodea sucesivamente la rodilla y la cara superior de este órgano, y al llegar encima del rodete se dobla hacia arriba, para venir a terminar en el borde superior del hemisferio. Dos veces doblada sobre sí misma, tiene exactamente la forma de una S itálica. Por detrás emite una prolongación posterior, la *cisura infraparietal de Broca*, que el *pliegue de paso parietolimbico posterior* separa de la cisura perpendicular interna.

b) *Cisura calcarina.* — Situada en la parte más posterior de la cara interna del hemisferio su *porción posterior* se dirige oblicuamente hacia arriba hasta el nivel de la cisura perpendicular interna. Aquí tuerce hacia abajo y su *porción anterior*, más corta, se dirige hacia el rodete del cuerpo caloso. Situada profundamente, determina en la porción occipital del ventrículo lateral una eminencia conoidea, el *espólón de Morand*.

c) *Cisura perpendicular interna.* — Nace en el codo de la cisura calcarina. Desde este punto se dirige hacia arriba y atrás, y va a terminar en el borde superior del hemisferio por una muesca, que se confunde con la cisura perpendicular externa. Es de notar que las dos cisuras calcarina y perpendicular interna forman, en conjunto, una especie de Y tendida (\gg).

2.º **Lóbulos y circunvoluciones.** — Las tres cisuras que acabamos de describir descomponen la cara interna en *dos circunvoluciones y dos lobulillos*: 1.º, *circunvolución frontal interna*; 2.º, *circunvolución del cuerpo caloso*, 3.º, *cuña*, y 4.º, *lóbullo cuadrilátero*.

A. **CIRCUNVOLUCIÓN FRONTAL INTERNA.** — La circunvolución frontal interna está exactamente comprendida entre el borde superior del hemisferio y la cisura callosomarginal. Su parte media es la parte interna de la primera frontal, que ya hemos estudiado en la cara externa del hemisferio. La parte más posterior de la frontal interna constituye el *lobulillo paracentral*, separado del resto de la circunvolución por un pequeño surco que desciende del borde superior del hemisferio, el

surco paracentral: Es de notar que en el lobulillo paracentral termina la cisura de Rolando, y por debajo de él se unen reciprocamente las dos circunvoluciones frontal ascendente y parietal ascendente.

B. CIRCUNVOLUCIÓN DEL CUERPO CALLOSO. — Pasa por encima del cuerpo calloso. Esta claramente limitada: 1°, a lo largo de su borde cóncavo, por el seno del cuerpo calloso, que la separa del cuerpo calloso; 2°, a lo largo de su borde convexo, por la cisura callosomarginal y su prolongación posterior que la separan de la frontal interna y del lóbulo cuadrilátero.

C. CUÑA. — La cuna o *cuneus* es un pequeño lóbulo de forma triangular, situado entre la cisura perpendicular interna y la porción ascendente de la cisura calcarina. Por detrás está limitada por el borde superior del hemisferio que la separa del lóbulo occipital.

D. LÓBULO CUADRILÁTERO. — Está situado delante de la cuña y detrás de la frontal interna. Está claramente limitado: *hacia delante*, por la porción terminal de la cisura callosomarginal, *hacia arriba*, por el borde superior del hemisferio, *hacia abajo*, por la prolongación posterior de la cisura callosomarginal.

C. Circunvoluciones de la cara inferior

1° Cisura interlobular. — La cara inferior del hemisferio sólo presenta una cisura: la *porción inicial de la cisura de Silvio*. Como sabemos es curvilínea con la concavidad dirigida hacia atrás.

2° Lóbulos y circunvoluciones. — Esta cisura divide la cara inferior en dos lóbulos: uno anterior o *lóbulo orbitario*; otro posterior o *lóbulo temporooccipital*.

A. LÓBULO ORBITARIO. — Tiene la forma de un triángulo, cuya base, dirigida hacia atrás, está en relación con la cisura silviana.

Presenta tres surcos: 1°, el *surco orbitario interno* u *olfatorio*, que se halla situado hacia dentro, en dirección anteroposterior; 2°, el *surco orbitario externo*, situado hacia fuera, orientado también en dirección anteroposterior; 3°, el *surco en H*, impropriamente llamado *surco cruciforme*, situado entre los dos precedentes y de forma esencialmente variable.

Estos diferentes surcos limitan en el lóbulo orbitario, las circunvoluciones siguientes: 1°, *circunvolución olfatoria interna* o *gyrus recusus*, situada entre el surco olfatorio y la cisura interhemisférica; 2°, la *circunvolución olfatoria externa* situada por fuera del surco olfatorio, con la misma dirección que la precedente; 3°, la *circun-*

volución orbitaria externa, situada por fuera del surco orbitario externo no es otra cosa que la cara inferior de la tercera frontal; 4.ª las *circunvoluciones orbitarias medias*, en las cuales se hallan comprendidas todas las *circunvoluciones* (esencialmente irregulares) que se disponen alrededor del surco en H.

B LÓBULO TEMPOROOCIPITAL. — Se extiende desde la cisura de Silvio a la extremidad posterior del hemisferio cerebral. Dos surcos longitudinales, el *surco temporooccipital externo* y el *surco temporooccipital interno*, forman dos circunvoluciones de dirección anteroposterior, llamadas *circunvoluciones temporooccipitales*, y se distinguen en *primera* y *segunda* (contando de fuera adentro).

a) *Temporooccipital primera.* Está comprendida entre los dos surcos temporooccipitales. Más ancha en su parte media que en sus dos extremidades, ha sido comparada a un huso, de donde el nombre de *lóbulo fusiforme* que le dan algunos autores.

b) *Temporooccipital segunda.* — Está situada por dentro de la precedente entre el surco temporooccipital interno y el borde interno del hemisferio.

a) Su *parte posterior o lóbulo lingual*, que comienza por debajo de la cisura calcarina, invade ligeramente la cara interna del hemisferio.

β) Su *parte anterior*, más conocida con el nombre de *circunvolución del hipocampo*, se encorva en su extremidad anterior, formando una especie de gancho, el *gancho* o *uncus* del hipocampo. En su extremidad posterior, por detrás del rodete del cuerpo calloso, la circunvolución del hipocampo se continúa mediante un pliegue de paso ascendente, el *pliegue de paso temporolímbico*, con la extremidad posterior de la circunvolución del cuerpo calloso. Merced a esta unión, las dos circunvoluciones del hipocampo y del cuerpo calloso no forman más que una sola, de forma semicircular, que rodea a manera de un limbo, el hilio del hemisferio y es la *gran circunvolución límbica* de BROCA; se observan en ella tres partes: 1.ª, por arriba, la circunvolución del cuerpo calloso, 2.ª, por debajo, la circunvolución del hipocampo, 3.ª, por detrás, el pliegue de paso temporolímbico. La circunvolución límbica está en relación con la función olfatoria. Es de notar que la circunvolución del hipocampo contiene, en su extremidad anterior, un núcleo de sustancia gris dependiente de la corteza, el *núcleo amigdalino*.

4 CORTEZA CEREBRAL. LOCALIZACIONES

La corteza cerebral es una *lamina plegada*, lo que aumenta su superficie, *estratificada* y *delgada* (de 1.4 milímetros como mínimo a 4.5 milímetros de espesor como máximo). La superficie total es aproximadamente de 120 000 milímetros cuadrados, el peso de la corteza se ha evaluado en 581 gramos. Está constituida por una cantidad considerable de células (se ha calculado que su número es de catorce mil mil millones) y por fibras nerviosas.

La corteza comprende seis capas, llamada cada una de ellas según la clase de células que predominan en su estructura. Enumeradas desde la superficie a la profundidad, son: *capa molecular*, *capa externa de los granos*, *capa de las células piramidales*, *capa interna de los granos*, *capa ganglionar*; *capa de las células fusiformes*.

Existen numerosas variaciones regionales de la estructura de la corteza cerebral, lo que ha permitido dividirla en una serie de campos corticales. Ha podido establecerse así un mapa citológico de la corteza cerebral, donde llegan a distinguirse más de un centenar de campos. Por otra parte, la fisiología y la patología han determinado a nivel de la corteza cerebral una serie de localizaciones funcionales, entre las cuales las más importantes son:

1° *Zona motora*. — Se extiende a la circunvolución frontal ascendente, a la parte posterior del pie de las dos primeras circunvoluciones frontales y al lobulillo paracentral. Los centros se disponen escalonadamente de abajo arriba, los centros de la cara están situados en la parte más baja de la porción inferior de la frontal ascendente, los del miembro inferior rebasan el borde superior del hemisferio y se extienden a la cara interna (lobulillo paracentral).

2° *Area psicomotora*. — Se extiende a la parte convexa del lobulo frontal.

3° *Localizaciones sensitivas*. — Toda la región parietal y, en particular, la parietal ascendente.

4° *Localizaciones sensoriales*. — 1° *Olfacción*: gran lobulillo límbico de Broca pero más especialmente la parte posterior de la circunvolución del cuerpo calloso y el polo anterior del gancho del hipocampo. 2° *Gustación*: probablemente la circunvolución del hipocampo. 3° *Audición*: primera circunvolución temporal en el fondo de la cisura de Silvio. 4° *Visión*: cisura calcarina y sus dos lóbulos.

5° *Centros del lenguaje*. — Estos centros comprenden: 1° el centro de las imágenes motrices de la articulación de las palabras (pie

de la III circunvolución frontal izquierda); 2°, el centro de las imágenes gráficas (pie de la II circunvolución frontal izquierda); 3°, centro de las imágenes auditivas (región media de las dos circunvoluciones temporales); 4°, centro de las imágenes visuales (nivel del pliegue curvo).

6.° Centro del sistema simpático. — Todavía mal limitado.

5. CONFORMACIÓN INTERIOR DEL CEREBRO

Si practicamos en el cerebro una serie de cortes metódicos, desde la convexidad hacia la base, encontraremos sucesivamente: 1°, en la línea media, el *cuerpo calloso* y el *trígono cerebral*, unidos entre sí por el *septum lucidum*, después, por debajo del trígono, la *tela coróidea* y el *ventrículo medio*, por detrás del cual se ve la *glandula pineal*, 2° a cada lado de la línea media, los *ventrículos laterales*, con sus *plexos coróideos*, y los *núcleos optoestrados*, que atraviesan de abajo arriba la *capsula interna*. Todas estas formaciones están separadas de la corteza por una masa de sustancia blanca, que recibe el nombre de *cono oval*. Estudiemos separadamente cada una de estas partes.

A. Cuerpo calloso

El cuerpo calloso es una lámina de sustancia blanca, más larga que ancha, que se ve en el fondo de la cisura interhemisférica, uniendo entre sí los dos hemisferios cerebrales.

1.° **Dimensiones.** — Mide de 8 a 10 centímetros de longitud. Su anchura es de 18 milímetros en la cara superior y de 30 a 40 milímetros en la cara inferior, y su espesor, de 10 a 15 milímetros, según los puntos.

2.° **Conformación exterior.** — En el cuerpo calloso, de forma cuadrilátera, podemos considerar dos caras, dos bordes, dos extremidades y cuatro ángulos.

A. CARAS. — Las dos caras se distinguen en superior e inferior. La *cara superior*, convexa de delante atrás, plana o ligeramente cóncava en sentido transversal, está en relación con la hoz del cerebro, la arteria frontal interna y posterior y la circunvolución del cuerpo calloso (de la que está separada por el *seno del cuerpo calloso*). Presenta: 1°, en la línea media, el *rafe*, 2°, a ambos lados de la línea media, los *trazos blancos de Lancisi* (se continúan por delante con

los pedúnculos del cuerpo calloso) y los *tractos grises* o *tænia tector* (se detienen por lo común en la parte media del órgano). Es de notar que los tractos blancos y los tractos grises se continúan hacia atrás, por debajo del rodete del cuerpo calloso, con el cuerpo abollonado. Por los tractos precitados se extienden hileras irregulares de una sustancia grisácea dependiente de la corteza, el *indusium griseum*. La *cara inferior* corresponde, en la línea media, al trigono cerebral y al séptum lúcidum. A derecha e izquierda de la línea media forma la bóveda de los ventrículos laterales.

B BORDES En número de dos, uno derecho y otro izquierdo, los bordes son puramente convencionales, confundiéndose el cuerpo calloso, por los lados, con el centro oval. Está en relación: 1.º, del lado de la cara superior, con el seno del cuerpo calloso; 2.º, del lado de la cara inferior, con la parte externa del ventrículo lateral.

C EXTREMIDADES.—Se distinguen en anterior y posterior. La *extremidad posterior*, libre, redondeada y roma constituye el *rodete del cuerpo calloso*. La *extremidad anterior* se encorva hacia delante formando la *rodilla del cuerpo calloso*, que termina en la base del cerebro por una extremidad estrecha y delgada llamada *pico*. La cara inferior de la rodilla es seguida, a cada lado de la línea media, por dos pequeños tractos blancos, los *pedunculos del cuerpo calloso*. Se continúan, por arriba, con los tractos blancos de Lancisi y, por abajo, con la cintilla diagonal.

D ANGULOS.—En número de cuatro: dos anteriores y dos posteriores. Los *angulos anteriores* corresponden a la extremidad anterior del ventrículo lateral: son los *cuernos frontales* del cuerpo calloso. Por delante del ventrículo, las fibras callosas que forman estos ángulos se irradian en el lóbulo frontal, constituyendo un ancho fascículo cuyo borde interno es cóncavo (*fórcex minor*). Los *angulos posteriores* forman dos prolongaciones similares, que, inmediatamente después de su origen, se subdividen en dos porciones: 1.º, una porción superior, que constituye la bóveda de la prolongación occipital del ventrículo: es el *cuerno occipital* del cuerpo calloso o *fórcex major*, 2.º, una porción inferior y externa, situada por fuera de la precedente, que cubre, en su parte postero-interna, la prolongación occipital y la prolongación esfenoidal del ventrículo lateral: es el *cuerno esfenoidal* del cuerpo calloso o *lappetum*.

3.º Constitución anatómica y conexiones.—El cuerpo calloso está compuesto esencialmente por fibras nerviosas de dirección

transversal, que, partiendo de un punto determinado de uno de los hemisferios, tienen su terminación en un punto simétrico del hemisferio del lado opuesto. Todas las regiones del hemisferio se encuentran así unidas por fibras callosas a la región homóloga del hemisferio opuesto (excepto la punta del lóbulo temporal y la región ammonoiana). El cuerpo calloso tiene la significación de una vasta *comisura interhemisférica*. Es irrigado por ramas de la arteria cerebral anterior.

B Trígono cerebral o bóveda de cuatro pilares

Es una lámina de sustancia blanca, impar y media, situada inmediatamente debajo del cuerpo calloso.

1° **Dimensiones.** — Mide por término medio 40 milímetros de longitud por 38 milímetros de anchura en la base; su grosor es de 3 ó 4 milímetros.

2° **Conformación exterior.** — Situado en sentido horizontal, el trígono cerebral, visto por arriba, toma la forma de un triángulo de base posterior. Podemos, pues, considerar en él *dos caras, tres bordes y tres ángulos*.

A. **CARAS.** — Las dos caras se distinguen en superior e inferior. La *cara superior*, sumamente convexa en sentido anteroposterior, plana o ligeramente cóncava en sentido transversal, está intimamente fusionada, en su tercio posterior, con el cuerpo calloso. Por delante de esta zona, el trígono y el cuerpo calloso están unidos (aunque sólo en la línea media) por una lámina nerviosa dispuesta en sentido sagital, el *septum lúcidum*. A cada lado del *septum lúcidum*, la cara superior del trígono forma parte del suelo del ventrículo lateral. La *cara inferior* descansa en toda su extensión sobre la tela coroidea, que la separa del tálamo óptico y del ventrículo medio.

B. **BORDES.** — Son laterales. La *base* se confunde con el rodete del cuerpo calloso. Los *bordes laterales*, delgados y cortantes, oblicuamente dirigidos hacia delante y adentro, son recorridos por los plexos coroideos de los ventrículos laterales. En su parte más anterior, cerca del vértice del trígono, los bordes laterales ascienden por encima del tálamo óptico, para limitar en él un orificio redondeado que pone en comunicación el ventrículo lateral con el ventrículo medio: es el *agujero de Monro*.

C. **ÁNGULOS.** — En número de tres, uno anterior y los otros dos posteriores. El *ángulo anterior* se bifurca y da origen a dos fascículos

divergentes que son los *pilares anteriores del trigono*. Cada uno de ellos se dirige hacia abajo, afuera y atrás, alcanza el tubérculo mamilar, le da la vuelta a manera de la cifra ocho y asciende entonces al talamo óptico (*fascicula de Vicq d'Azyr*), para terminar a nivel del tubérculo anterior. Los *ángulos posteriores* se encorvan hacia abajo, formando dos cintillas que son los cuatro *pilares posteriores del trigono* (el trigono tiene, pues, cuatro pilares *bóveda de cuatro pilares*). Estos pilares posteriores descienden a la prolongación esferoidal del ventriculo lateral, donde se fusionan en parte con el asta de Ammón y en parte con el cuerpo franjeado.

3.º **Constitución anatómica y conexiones.** — El trigono cerebral contiene *fibras longitudinales y fibras transversales*.

a) *Fibras longitudinales*. — En parte nacen en el asta de Ammón, en parte en la extremidad anterior de la circunvolución del hipocampo, contorneando el talamo óptico, terminan en el núcleo externo del tubérculo mamilar. Algunas fibras longitudinales abandonan el pilar anterior para alcanzar la base del cerebro y terminar, unas en la cintilla olfatoria, y otras, por la cintilla longitudinal, en la circunvolución del hipocampo.

b) *Fibras transversales*. — Constituyen la *línea*, se extienden de una asta de Ammón a la otra constituyendo una *comisura interhemisférica*.

C. *Septum lúcidum*

El séptum lúcidum o *tabique transparente* es una lámina de sustancia nerviosa, impar y media, dispuesta en sentido sagital entre el cuerpo calloso y el trigono.

1.º **Conformación exterior.** — Adopta la forma de un triángulo curvilíneo y presenta, por consiguiente, *dos caras, tres bordes y tres ángulos*.

a) *Caras*. — Una derecha y otra izquierda, son planas, lisas, y contribuyen a formar la pared interna de los ventrículos laterales.

b) *Bordes*. — Se distinguen en, 1.º *borde superior*, convexo, unido al cuerpo calloso; 2.º *borde anterior*, igualmente convexo, que corresponde a la rodilla de este mismo cuerpo calloso. 3.º *borde inferior*, o, mejor, *posteroinferior*, cóncavo y en relación con el trigono.

c) *Ángulos*. — Se distinguen en, 1.º *anterior*, redondeado y como correspondiente a la rodilla del cuerpo calloso. 2.º *posterior*, que se insinúa (con el nombre de *cola del septum*) en el ángulo agudo

que forman, al separarse, el cuerpo calloso y el trigono (termina a veces por una especie de dilatación, el *ventriculo de Verga*, 3.º, inferior, que corresponde al borde superior de la comisura anterior.

2.º **Significación morfológica.**— El *septum lúcidum*, a pesar de su delgadez, contiene en su centro una cavidad, la *cavidad del septum*, que se ha considerado por mucho tiempo como un ventriculo (el *quinto ventriculo* o *ventriculo del tab. que*). La embriología demuestra que por el contrario, la cavidad en cuestión no es otra cosa que un resto de la cisura interhemisférica primitiva (la porción inferior), que ha sido separada del resto de la cisura por efecto del desarrollo del cuerpo calloso y del trigono.

3.º **Constitución anatómica.**— Por este hecho, el *septum lúcidum* se compone de *dos hojuelas*, separadas una de otra por la *cavidad central*, y cada una representa una porción de la pared cerebral primitiva. Se compone, pues: 1.º, de una *porción nerviosa*, formada por una hoja gris (que representa la corteza) y por una lámina blanca (que representa el centro oval); 2.º, de un *revestimiento interno*, que no es más que una membrana celu-vascular, dependiente de la pia-madre; 3.º, de un *revestimiento externo*, que no es más que el epéndimo.

D. *Ventriculos laterales*

En número de dos, uno derecho y otro izquierdo, los ventriculos laterales son cavidades anfractuosas, situadas a cada lado de la línea media, extendidas en longitud desde el lobo o frontal al lóbulo occipital. En cada uno podemos considerar tres porciones: 1.º, una *porción anterior* o *frontal*; 2.º, una *porción posterior* u *occipital*, 3.º, una *porción inferior* o *esfenoidal*.

1.º **Porción frontal.**— Dirigida de delante atrás, de 7 centímetros de largo, aplanada de arriba abajo, presenta *dos paredes*, *dos bordes* y *dos extremidades*.

a) *Paredes.*— Se distinguen en superior e inferior. La *pared superior* o *bóveda*, ligeramente cóncava, está formada por el cuerpo calloso. La *pared inferior* o *suelo* está formada sucesivamente, contando de fuera adentro, por el núcleo caudal, el tálamo óptico y la cara superior del trigono. Entre el núcleo caudal y el tálamo óptico se halla un surco, el *surco optoestriado*; se encuentran en él, contando

de arriba abajo, la lámina córnea, la vena del cuerpo estriado y la tenia semicircular (pequeña cinta de fibras nerviosas que, partiendo de la parte anterior del talamo óptico, termina en el núcleo amigdalino). Asimismo, entre el talamo óptico y el trigono se encuentra el plexo coroides del ventrículo lateral.

b) *Bordes*. — De los bordes de la porción frontal del ventrículo, uno es externo y otro interno. El *borde externo*, ligeramente curvo, está formado por la unión del cuerpo calloso con el núcleo caudal. El *borde interno* está formado por la línea de unión del cuerpo calloso con el trigono y, principalmente, por el séptum lucidum (es de notar que, en su parte anterior, el borde interno adquiere las dimensiones de una verdadera cara).

c) *Extremidades*. Se distinguen en *anterior* que está en comunicación con la rodilla del cuerpo calloso (a 3 centímetros del polo frontal) y *posterior*, que está en relación con la extremidad posterior del talamo óptico. Es de notar que, en este mismo punto, convergen las otras dos porciones: este punto constituye así la llamada *encrucijada ventricular*.

2.° **Porción occipital.** — Llamada también *cavidad digital* o *aneroide*, parte de la encrucijada ventricular y desde este punto se dirige horizontalmente hacia atrás, describiendo una curva de concavidad interna. Se le consideran, como a la precedente, *dos paredes, dos bordes y dos extremidades*.

a) *Paredes*. — Se distinguen en *superoexterna* e *inferointerna*. La *pared superoexterna* o *bóveda* está formada por el cuerpo calloso (*fórcex mayor* y *tapetum*). La *pared inferointerna* o *suelo* presenta dos eminencias longitudinales: el *bulbo* del asta posterior hacia arriba y el *espolón de Morand* hacia abajo (es de notar que este último resulta del rechazo de la pared cerebral por la cisura calcarina).

b) *Bordes*. — Se distinguen en *superior* e *inferior*. Uno y otro son simples ángulos diedros.

c) *Extremidades*. — De las dos extremidades, la *anterior* corresponde a la encrucijada, y la *posterior*, afilada en punta, se extiende hasta 20 ó 25 milímetros del polo occipital.

3.° **Porción esfenoidal.** — La porción inferior del ventrículo, partiendo de la encrucijada, se dirige hacia abajo, adelante y adentro, describiendo en conjunto una larga curva, cuya concavidad, dirigida hacia arriba y adelante, abraza el pedúnculo cerebral y el talamo

óptico. Aplanada de arriba abajo, presenta, al igual que las dos porciones anteriores, *dos paredes, dos bordes y dos extremidades*.

a) *Paredes*. — Se distinguen, como en las otras porciones del ventrículo, en superior e inferior

a) La *pared superior* o *bóveda* está formada por las partes siguientes, contando de fuera adentro: 1.ª, el tapétum; 2.ª, la porción refleja de la cola del núcleo caudal; 3.ª, la porción de la tenia semi-circular; 4.ª, la cara inferior del tálamo óptico, reforzada por el pedúnculo cerebral.

3) La *pared inferior* o *suelo* está ocupada por tres eminencias longitudinales curvilíneas y concéntricas entre sí; son éstas, contando de fuera adentro: el asta de Ammón, el cuerpo franjeado y el cuerpo abollonado. El *asta de Ammón* o *hipocampo mayor* es una eminencia cilíndroidea de color blanco, más gruesa por delante que por detrás, que mide 45 milímetros de longitud. Es resultado de la introducción de la pared cerebral en el ventrículo por un surco del lóbulo temporo-occipital, llamado *surco del hipocampo*. El *cuerpo franjeado* es una cintilla de substancia blanca, aplanada de arriba abajo, que sigue el borde interno del asta de Ammón. Por detrás se continua con el pilar posterior del trigono. Por delante termina en el gancho de la circunvolución del hipocampo. Nótese en la cara superior una cresta longitudinal, *cresta epéndimaria*, a nivel de la cual se refleja el epéndimo para ascender a la bóveda. El *cuerpo abollonado* es un pequeño cordón de substancia gris irregularmente abollonado (de ahí su nombre), situado entre el cuerpo franjeado y la circunvolución del hipocampo. Un surco estrecho y profundo, el *surco del hipocampo*, lo separa de esta última circunvolución. Por delante el cuerpo abollonado se continúa con la *cintilla de Giacomini*, que rodea de abajo arriba el gancho del hipocampo. Por atrás, la prolonga la *fasciola cinérea*, la cual, a nivel del rodete del cuerpo caloso, se continua a la vez con los tractos blancos y los tractos grises. Es de notar que la cintilla de Giacomini, el cuerpo abollonado, la fasciola cinérea, los tractos de Lancisi y los pedunculos del cuerpo caloso constituyen una *circunvolución rudimentaria*, incluida en la gran circunvolución límbica y que representa una segunda circunvolución límbica, pero incompletamente diferenciada.

b) *Bordes*. — De los bordes de la porción esfenoidal del ventrículo, el *externo* está formado por el tapétum; el *interno* corresponde a la pared lateral de la hendidura cerebral de Bichat (de la que el ventrículo está separado siempre por el epéndimo).

c) *Extremidades.* — De las dos extremidades, la *posterior* corresponde a la encrucijada y la *anterior* a la punta del lóbulo temporal, separada solo por una distancia de 15 a 20 milímetros.

E *Ventriculo medio*

El ventriculo medio es una cavidad impar y media, situada entre los tálamos ópticos. Tiene la forma de un embudo de base superior, sumamente aplanado en sentido transversal. Se le consideran dos *paredes laterales*, un *borde anterior*, un *borde posterior*, *base* y *vértice*.

1.º **Paredes laterales.** Son dos, una derecha y otra izquierda, de forma triangular y base superior. Están constituidas: 1.º, por arriba, por la cara interna del tálamo óptico; 2.º, por abajo, por la substancia gris de la base. En la parte media se ve un surco curvo, el *surco de Monro*, que va desde el agujero de Monro al acueducto de Silvio. El tálamo óptico se halla unido al del lado opuesto por una lámina de substancia gris, llamada *comisura gris*, que atraviesa el ventriculo de un lado a otro. Es de notar que las fibras nerviosas que constituyen esta comisura gris, al llegar a la línea media, se doblan sobre si mismas para entrar de nuevo en el tálamo óptico de que proceden (formando así asas o U tendidas \sqcap \sqsupset).

2.º **Borde posterior.** — El borde posterior se dirige oblicuamente hacia abajo y adelante. En él encontramos sucesivamente, contando de arriba abajo: 1.º, la base de la glándula pineal; 2.º, un cordón blanco transversal, que es la *comisura blanca posterior*, constituida por fibras que provienen del tálamo óptico y se dirigen, después de entrecruzarse en la línea media, las unas al tálamo óptico opuesto (*fibras interpulvinares*), otras a los tubérculos cuadrigéminos anteriores (*fibras optopulvinares*), y otras, finalmente, al pedúnculo (*fibras optopedunculares*); 3.º, el orificio anterior del acueducto de Silvio, o ano; 4.º, una porción blanca perteneciente al pedúnculo cerebral; 5.º, una lámina gris, que pertenece primeramente al espacio perforado posterior y después al túbere cinéreo.

3.º **Borde anterior.** — Es casi vertical. En él encontramos sucesivamente, yendo de arriba abajo: 1.º, los dos pilares anteriores del triángulo, separándose uno de otro; 2.º, por delante de los pilares, un cordón blanco transversalmente dirigido, llamado *comisura blanca*

anterior (nótese que las fibras que la constituyen terminan, a derecha e izquierda, en las circunvoluciones temporales), asociando los dos lóbulos temporales por una parte, y por otra, los centros olfatorios (comisura del rinencéfalo); 3°, entre los pilares del trigono y la comisura blanca anterior, una depresión triangular llamada *vulva*; 4°, la *lámina supraóptica*; 5°, el *quiasma óptico* y, encima de él (formado por su cara superior y la lámina supraóptica), el *recessus opticus*; 6°, debajo del quiasma, el *túber cinereum*, que nos conduce hasta el vértice.

^ **Vértice.** Formado por la unión de los dos bordes se encuentra situado en la mitad superior del tallo pituitario.

3° **Base.**—La base, de forma cuadrilátera, está limitada 1°, por delante, por el ángulo anterior del trigono; 2°, por detrás, por la glándula pineal; 3°, lateralmente, por el borde superointerno del tálamo óptico. En este punto el ventrículo está cerrado por el epéndimo (*membrana tectoria*), al que recubren la tela coroidea y el trigono (es de notar que, en la parte anterior de esta base, el ventrículo medio comunica, por el *agujero de Monro*, con el ventrículo lateral correspondiente).

F Formaciones coroides

Insinuándose en el espesor del cerebro a nivel de la hendidura cerebral de Bichat, la piamadre forma: 1°, los *plexos coroides de los ventrículos laterales*, 2°, la *tela coroidea superior*

1° **Plexos coroides de los ventrículos laterales.**—Son unos cordones rojizos, de aspecto granuloso, que ocupan sucesivamente las dos porciones, frontal y esfenoidal, de los ventrículos laterales.

Partidos de la extremidad anterior de la hendidura cerebral de BICHAT (donde se continúan con la piamadre), recorren de delante atrás la porción esfenoidal del ventrículo y, siguiendo a lo largo del asta de Ammón, llegan a la encrucijada, se dirigen hacia arriba, rodean la extremidad posterior del tálamo óptico y corren oblicuamente por su cara superior hasta el agujero de Monro. En este punto, los plexos coroides se continúan con el vértice de la tela coroidea.

Cada plexo coroidal reviste, pues, en conjunto, la forma de una U, cuya parte media abrazara la extremidad posterior del tálamo óptico y cuyas dos ramas estuvieran colocadas, una en la porción

esfenooidal, y la otra en la porción frontal del ventrículo lateral. Es de notar que los plexos coroides no están situados en plena cavidad ventricular, sino que, en realidad, es an separados de esta cavidad por el epéndimo son, por consiguiente, extraventriculares.

2.º **Tela corioidea superior.**—Situada inmediatamente por debajo del trigono, en sentido horizontal, tiene una forma triangular de base posterior.

a) *Conformacion exterior y relaciones* —Se le consideran dos caras (superior e inferior), dos bordes laterales, una base y un vértice. La *cara superior* está en relación con el trigono cerebral. La *cara inferior* descansa: 1.º, por sus partes laterales sobre el tálamo óptico; 2.º, por su parte media, sobre la membrana tectoria, que la separa del ventrículo medio. Se observan en esta cara, a cada lado de la línea, dos hileras longitudinales de granulaciones rojizas, que son los *plexos coroides del ventrículo medio*. Los *bordes laterales* se fusionan con los plexos coroides de los ventrículos laterales. La *base* corresponde a la parte media de la hendidura cerebral; en este punto se continúa con la pia madre externa. El *vértice* corresponde al ángulo anterior del trigono.

b) *Constitución anatomica* — La tela corioidea superior se compone, al igual que la inferior, de dos hojas: una superior y otra inferior. Estas dos hojas, fusionadas a nivel del vértice de la tela, se separan a nivel de la base para continuarse, la primera, en la pia madre cerebral, y la segunda, en la pia madre del istmo y del cerebelo. Entre las dos hojas se insinúa el tejido conjuntivo de los espacios subaracnoideos. Es de notar que entre las dos hojas precitadas corren las *venas de Galeno* y sus afluentes.

G. Glándula pineal o epífisis

Es un pequeño cuerpo grisáceo, impar y medía, situado en la parte posterior y superior del tercer ventrículo. Es del tamaño de un guisante ordinario; mide 8 milímetros de largo por 3 centímetros de ancho y pesa 25 centigramos.

1.º *Conformación exterior y relaciones.* — Tiene la forma de una piña o de un cono de base anterior. Se le consideran, por lo tanto, un *cuerpo*, una *base* (dividida por un surco transversal en dos láminas, una superior y otra inferior) y un *vértice* (unas veces puntiagudo, otras redondeado y romo). Por abajo descansa sobre el

surco que separa los tubérculos cuadrigéminos anteriores (*lecho de la glándula pineal*). Por arriba está en relación con la hoja inferior de la tela coroidca. Lateralmente está en comunicación con los plexos coroides del ventrículo medio.

2° **Conexiones.** — Seis fascículos, llamados *pedunculos de la glándula pineal*, unen este pequeño cuerpo al neuroeje. Se distinguen en anteriores medios e inferiores. Los *pedunculos anteriores* o *habenæ* salen de la lámina superior de la base y desde este punto se dirigen al borde superointerno del tálamo óptico, que siguen de atrás adelante en toda su extensión. Los *pedunculos medios*, de dirección transversal, van de la lámina superior de la glándula pineal al tálamo óptico. Los *pedunculos inferiores*, nacidos de la lámina inferior, descienden primeramente por delante de la comisura blanca posterior, más tarde se doblan hacia fuera y desaparecen a su vez en el tálamo óptico.

3° **Constitución anatómica y significación.** — Histológicamente la glándula pineal (con su cubierta conjuntiva y su tejido propio) no tiene células ni fibras nerviosas que le sean propias, sino únicamente células de neuroglia. A veces contiene concreciones de carbonato de cal y de fosfato de magnesia (*arenilla del cerebro*).

Su papel es aún incierto. Nótese que no es como se creía antes, el representante del ojo pineal de los lacértidos.

H. *Núcleos centrales de los hemisferios o núcleos optoestriados*

Los núcleos centrales de los hemisferios, colocados inmediatamente junto al bulbo, comprenden el *tálamo óptico* y el *cuerpo estriado*, subdividiéndose este último, a su vez, en dos núcleos secundarios, el *núcleo caudal* y el *núcleo lenticular*.

1° **Tálamo óptico.** — Los tálamos ópticos son dos núcleos voluminosos de sustancia gris, situados a cada lado del tercer ventrículo. Su color es blanco-gris, y miden 40 milímetros de longitud por 20 milímetros de amplitud y 12 de altura.

2° **Conformación exterior.** — Cada uno de ellos tiene la forma de un ovoide, cuya extremidad mayor es posterior y el eje mayor lleva una dirección oblicua de atrás a delante y de fuera a dentro. Pueden considerársele cuatro caras (superior, inferior, interna y externa) y dos extremidades (anterior y posterior).

a) La *cara superior*, ligeramente convexa, está limitada perfectamente hacia fuera por el surco optoestriado y, hacia dentro, por los pedúnculos anteriores de la glándula pineal: esta cara presenta un surco oblicuo, llamado *surco coroideo*, que la divide en dos partes: 1.º, una parte externa triangular (de vértice posterior), que termina hacia delante en una eminencia redondeada, que es el *tubérculo anterior* del talamo óptico; 2.º, una parte posterior igualmente triangular (pero de vértice anterior), que termina por atrás en una segunda eminencia, llamado *tubérculo posterior* o *pulvinar*. Es de notar, en la parte posterointerna de la cara superior, una pequeña región triangular colocada de arriba abajo, llamada *triángulo de la habénula*, que en su parte posterior contiene una pequeña eminencia, el *tubérculo de la habénula*, debajo de la cual se encuentra un pequeño ganglio, el *ganglio de la habénula*, que está unido al ganglio interpeduncular por un pequeño fascículo descendente llamado *fascículo retroreflejo* o *de Meynert*.

β) La *cara inferior* descansa sobre el pedunculo cerebral, del que está separada por una región especial, llamada *región subtálmica* (que comprende tres capas superpuestas, que son, contando de arriba abajo, la *capa dorsal*, la *zona incerta* y el *cuerpo de Luys*).

γ) La *cara interna*, fusionada en un tercio posterior con el istmo del encéfalo, forma, en sus dos tercios anteriores, la parte superior de la pared del ventrículo medio (en ella nace la comisura gris).

δ) La *cara externa* está fusionada, por arriba, con la *tenia semicircular*, y por abajo, con la *cápsula interna*.

ε) La *extremidad anterior* se aloja, en su mayor parte, en la concavidad que le ofrece la cabeza del núcleo caudal. El pilar anterior del trigono rodea esta cara.

ζ) La *extremidad posterior*, libre, sobresale en la encajadura del ventrículo lateral. Está rodeada por el pilar posterior del trigono y por el plexo coroideo. En su parte más inferior se observan dos pequeñas masas grisáceas, llamadas *cuerpos geniculados*, que se distinguen en *interno* y *externo* (recordaremos que están en relación, por una parte, con las dos ramas de bifurcación de la cintilla óptica, y por otra, con los tubérculos cuadrigéminos, AEPI).

b) *Constitución anatómica*. El tálamo óptico, visto en un corte frontal, presenta una masa gris dividida en núcleos por dos láminas de sustancia blanca, llamadas *lámina medular interna*, bifurcada por arriba, y *lámina medular externa*. Entre estas dos láminas se hallan cuatro núcleos: anterior, interno, externo y posterior.

c) *Conexiones* El tálamo óptico está en conexión:

a) *Con el eje encefálico* por medio de tres fascículos: 1.º, la *cinta de Reil interna*, que termina en la parte posteroinferior del núcleo externo, vía aferente; 2.º, la *vía cerebelo-rubrotalámica*, y 2.ª aferente también, que une el cerebelo y el núcleo rojo al tálamo; 3.º, la *vía talamoolivar*, vía descendente.

β) *Con la corteza cerebral* por medio de las fibras, dispuestas en cuatro pedúnculos: 1.º, el *pedúnculo anterior*, que desde el polo anterior se dirige hacia el lóbulo frontal; 2.º el *pedunculo posterior* que termina en la región calcarina del lóbulo occipital (irradiaciones ópticas de Gratiolet); 3.º, el *pedúnculo superior*, que se extiende del núcleo externo al lóbulo parietal (vía sensitiva y vía cerebelosa); 4.º, el *pedúnculo inferointerno*, que comprende dos fascículos: el *fascículo temporotalámico de Arnold*, extendido desde la corteza temporooccipital al pulvinar, y el *pedunculo inferointerno* propiamente dicho que se extiende desde la región inferointerna del tálamo a la parte anterior del lóbulo temporal y de la insula.

γ) *Con la cintilla óptica.*

δ) *Con el cuerpo estriado* por medio de fibras talamolenticulares y talamocaudadas.

e) *Con la región infundibular* por medio de numerosos fascículos: *fascículo de Vicq d'Azyr*, *fascículo lenticular*, *fascículo rubrotalámico*, *fascículo de Forel*, *fascículo del túber*.

ζ) *Con el rinencéfalo* por cuatro fascículos: el *fascículo de Vicq d'Azyr*, extendido desde los tubérculos mamilares al núcleo anterior; el *fascículo retrorreflejo* o *de Meynert*, la *tenia semicircular* y el *fascículo septotalámico*, que abandona algunas fibras a la cara externa del tálamo.

Los dos tálamos ópticos se hallan reunidos entre sí por medio de numerosas comisuras, en particular por la comisura blanca posterior.

El tálamo óptico ha de considerarse como: 1.º, un *centro sensitivo importante*; 2.º, un *centro intermediario óptico* colocado entre la cintilla óptica y la vía óptica central; 3.º, un *centro intermediario olfatorio*; 4.º, un *centro emocional*; 5.º un *centro vegetativo*.

2.º Cuerpo estriado.— Estudiaremos sucesivamente: 1.º, el núcleo caudal; 2.º, el núcleo lenticular; 3.º, las conexiones del cuerpo estriado.

A. NÚCLEO CAUDAL.—El núcleo caudal, llamado también *núcleo intraventricular del cuerpo estriado*, sobresale en la porción

frontal del ventrículo lateral. De color gris rojizo, que resalta claramente sobre el del tálamo óptico. mide 70 milímetros de longitud por 20 milímetros de ancho en su parte anterior y sólo 3 ó 4 milímetros en su parte posterior.

a) *Conformación exterior*. — Visto por arriba, tiene la forma de una virgula, con la extremidad gruesa o cabeza dirigida hacia delante y la extremidad menor o cola hacia atrás. Es aplanado de arriba abajo y podemos considerarle *dos caras* (superior e inferior), *dos bordes* (interno y externo) y *dos extremidades* (anterior y posterior). La *cara superior* es convexa y contribuye a formar el suelo de la porción frontal del ventrículo lateral, está en relación con el cuerpo calloso. La *cara inferior* se fusiona con la parte correspondiente de la cápsula interna. El *borde externo*, ligeramente cóncavo hacia fuera, forma el borde externo de la cavidad ventricular. El *borde interno* es cóncavo y corresponde al surco optocstriado, que lo separa del tálamo óptico. La *extremidad anterior* o *cabeza* es generalmente redondeada y descansa sobre el espacio perforado anterior; la rodea la rodilla del cuerpo calloso. La *extremidad posterior* o *cola* se adelgaza gradualmente hasta la encrucijada ventricular. Llegada a este punto, se dobla hacia abajo y delante, y va a colocarse en la bóveda de la porción esfenoidal del ventrículo, donde podemos seguirla hasta la misma extremidad de la cavidad ventricular.

b) *Constitución anatómica*. — El núcleo caudal, está formado por substancia gris y reviste en todos los casos un aspecto uniforme.

B. NÚCLEO LENTICULAR. — El núcleo lenticular, llamado también *núcleo extraventricular del cuerpo estrado*, está situado debajo y algo por fuera del núcleo caudal, en pleno centro oval. Mide cinco centímetros de longitud.

a) *Conformación exterior*. — Visto en un corte frontal tiene una forma señaladamente triangular. Podemos pues considerarlo como un prisma triangular y distinguírle *tres caras* (inferior, interna y externa), *dos extremidades* (anterior y posterior) y *tres bordes*. La *cara inferior* descansa, en su mayor parte, sobre el centro oval del lóbulo temporoccipital (por delante se fusiona con la substancia gris del espacio perforado anterior). Es cruzada oblicuamente por la comisura blanca anterior, que se labra un canal en dicha cara, llamado *canal de la comisura gris*. La *cara interna* o, mejor, *superointerna*, está cubierta también por una segunda lámina blanca, la *cápsula externa*, que separa el núcleo lenticular del antemuro y de la insula de Reil. La *extremidad posterior* se adelgaza y se resuelve en cierto número

de prolongaciones longitudinales regularmente suprepuestas en sentido vertical. La *extremidad anterior* es más voluminosa, irregularmente redondeada, y se fusiona gradualmente con la cabeza del núcleo caudal, de modo que los dos núcleos así reunidos forman en conjunto una especie de U tendida (\cap), cuyas dos ramas están representadas por los dos núcleos y la parte media por la masa gris que los une por su extremidad anterior. De los *tres bordes*, uno es superior, el segundo inferior y el tercero interno; este último sumamente convexo hacia dentro.

b) *Constitución anatómica.* El núcleo lenticular, visto en un corte frontal, presenta una masa gris fundamental, atravesada de abajo arriba por dos láminas blancas, una interna (*lámina medular interna*) y otra externa (*lámina medular externa*). Estas dos láminas medulares descomponen la masa gris en tres segmentos distintos: *segmento externo o putamen* (que es de color más subido), *segmento interno* (que es de menor coloración) y *segmento medio* (cuya coloración es un término medio entre la del segmento interno y la del putamen). El segmento medio y el interno han recibido también, en conjunto, el nombre de *globus pallidus*. El segmento interno, solo, es llamado también *globus medialis*.

C. *CONEXIONES.* — Los fascículos del cuerpo estriado lo ponen en conexión. 1.º con el tálamo óptico; 2.º, con la región subóptica; 3.º, con la región del tuber; 4.º, con el mesencéfalo; 5.º, con la corteza cerebral. Estos fascículos constituyen el *asa lenticular*, el *fascículo lenticular de Forel*, las *fibras estriotalámicas*, las *fibras estrioluisianas*, el *fascículo palidal de la punta*, el *fascículo talámico de Forel*, las *fibras comisurales* y las *fibras corticoestriadas*. Todas estas fibras pueden clasificarse en tres vías: 1.º, *vías aferentes*, que provienen del tálamo; 2.º, *conexiones intraestriadas*, que van del núcleo caudal al núcleo lenticular; 3.º, *vías eferentes*, que ponen en relación el glóbulo pálido con el mesencéfalo. Estas últimas vías se hallan en relación con las vías morrices extrapiramidales; el cuerpo estriado aparece como un centro cuya función es esencialmente motora.

I. Cápsula interna

La cápsula interna es una lámina de substancia blanca que atraviesa de abajo arriba los músculos optoestriados.

1.º *Modo de conformación y relaciones.* — No es aislable, sólo se ve en cortes *vista en un corte frontal que pase por los nu-*

bérculas mamilares (corte de Charcot), se presenta bajo el aspecto de una lámina blanca que, partiendo del pedúnculo cerebral, se dirige oblicuamente hacia arriba y afuera, pasando por el estrecho corredor que forma el núcleo lenticular por una parte, y por otra el núcleo caudal y el tálamo óptico. Al llegar a la extremidad superior de este estrecho pasadizo, la cápsula interna se continúa con el centro oval.

Si ahora la examinamos en un corte horizontal que pase por la *cisura de Silvio (corte de Flechsig)*, encontraremos esta lámina entre el núcleo lenticular, que está por fuera, y el núcleo caudal y el tálamo óptico, que están por dentro, pero a la vez observaremos que está doblada sobre sí misma, formando un ángulo diedro abierto hacia fuera. Podemos, pues, dividirla en dos segmentos: un *segmento anterior*, oblicuo hacia fuera y adelante comprendido entre el núcleo lenticular y el núcleo caudal, que es llamado *segmento lenticuloestriado*, y un *segmento posterior*, oblicuo hacia fuera y atrás, comprendido entre el núcleo lenticular y el tálamo óptico, llamado *segmento lenticuloóptico*. Estos dos segmentos se unen en un punto que corresponde exactamente al vértice del ángulo diedro, o sea al punto de inflexión de la cápsula, y que recibe el nombre de rodilla. El corte de Flechsig nos muestra, además, que la cápsula interna rebasa por detrás la extremidad del núcleo lenticular; a esta porción extrema posterior de la cápsula es a la que se le da el nombre de *segmento retrolenticular (DÉJÉRINE)*.

2.º Constitución anatómica. — La cápsula interna está constituida exclusivamente de sustancia blanca, o sea de fibras de mielina. Estas fibras se reparten en tres grupos:

a) *Primer grupo. fibras que unen los núcleos optoestriados entre sí* — Son las *fibras talamoestriadas y lenticuloestriadas*, irregularmente diseminadas en los varios segmentos de la cápsula interna.

b) *Segundo grupo. fibras que unen los núcleos optoestriados a la corteza cerebral* — Son: 1.º, las *fibras corticoestriadas*, que ocupan la parte extrema superior de la cápsula y que sólo pertenecen a ella por su posición inicial; 2.º, las *fibras corticolenticulares*, que ocupan la porción de cápsula inmediata al núcleo lenticular; 3.º, las *fibras corticotálamicas*, especialmente el *pedúnculo anterior*, que atraviesa sucesivamente a rodilla y el segmento anterior, y el *pedúnculo posterior*, que atraviesa horizontalmente el segmento retrolenticular.

c) *Tercer grupo. fibras de origen peduncular.* — Son: el fascículo sensitivo o *cinta de Reil*, procedente de la calota; el fascículo

geniculado, que proviene del pie (recordemos que el fascículo corticoprotuberancial posterior o fascículo de Meynert, al llegar a la parte inferior de la cápsula interna, no asciende a esta cápsula, sino que se desvía hacia fuera, para alcanzar la corteza del lóbulo temporal). El *fascículo geniculado*, que ocupa en el pedúnculo el quinto interno del pie, viene a ocupar, en la cápsula interna, la región de la rodilla, y de ahí proviene su nombre, está mezclado en este punto, al igual que en el pedúnculo, con fibras corticoprotuberanciales anteriores. El *fascículo piramidal*, que ocupa en el pedúnculo los tres quintos medios, ocupa en la cápsula los dos tercios anteriores del segmento posterior, se encuentra, como el precedente, mezclado con fibras corticoprotuberanciales anteriores. El *fascículo sensitivo*, por último, que ocupa en el pedúnculo la parte inferior de la calota, viene a ocupar en la cápsula el tercio posterior del segmento posterior, incluso el segmento retrolenticular.

3° Sistematización de la cápsula.— En resumen, la cápsula interna contiene

a) *En su segmento anterior*, fibras internucleares y corticonucleares y, en particular, el pedúnculo anterior del tálamo óptico.

β) *En la región de la rodilla*, el origen del pedúnculo anterior del tálamo óptico, el fascículo geniculado y cierto número de fibras corticoprotuberanciales anteriores.

γ) *En su segmento posterior* (además de las fibras internucleares y de las fibras corticonucleares): 1.º, en sus dos tercios anteriores, el fascículo piramidal, con cierto número de fibras corticoprotuberanciales anteriores (mezcladas con sus propias fibras). 2.º, en su tercio posterior, el fascículo sensitivo, al cual se añaden las irradiaciones ópticas de Gratiolet o pedúnculo posterior del tálamo óptico (*encrucijada sensitiva de Charcot*).

J Centro oval

Se designa con este nombre la substancia blanca de los hemisferios que se encuentra comprendida entre la corteza y los núcleos optoestriados. Las fibras que constituyen el centro oval pueden dividirse en tres grupos: 1.º, *fibras de asociación*, 2.º *fibras comisurales*; 3.º, *fibras de proyección*.

1.º Fibras de asociación.— Las fibras de asociación son las que en un mismo hemisferio, ponen en relación dos regiones de la

corteza más o menos alejada una de otra. Forman los seis grupos siguientes

a) *Fibras arqueadas*. — Son las que unen dos circunvoluciones inmediatas formando una especie de arco o de U, cuya parte media rodea la cisura que separa dichas circunvoluciones. Llámense *fibras arqueadas cortas* cuando enlazan dos circunvoluciones inmediatamente yuxtapuestas, y *fibras arqueadas largas*, cuando enlazan dos circunvoluciones separadas una de otra por otras circunvoluciones.

b) *Cíngulum*. — Llamado también *fascículo del ribete*, *fascículo subyacente a la circunvolución límbica*, ocupa la parte blanca de la gran circunvolución límbica. Presenta, pues, la forma de un anillo casi completo, colocado alrededor del hilo del hemisferio.

c) *Fascículo longitudinal superior*. — Es un fascículo dispuesto en sentido sagital, estrecho en su parte media, desplegado en abanico en sus dos extremidades, que tiene su origen en la corteza del lóbulo frontal y va a terminar, en parte, en el lóbulo occipital, y en parte en el lóbulo temporal.

d) *Fascículo longitudinal inferior*. Es un fascículo dispuesto también en sentido sagital, que va desde el lóbulo occipital al lóbulo temporal.

e) *Fascículo occipitofrontal*. Nace por delante, en la corteza del lóbulo frontal y del lóbulo orbitario. Desde este punto se dirige hacia atrás, pasando a lo largo del borde externo del núcleo caudal; después se desdobra en un ancho abanico, cuyas fibras se irradian por toda la extensión del lóbulo temporooccipital.

f) *Fascículo unciforme*. — Es un fascículo en forma de arco que nace en el lóbulo orbitario; desde este punto se dirige al polo de la insula, después se curva hacia abajo y adelante, para terminar en la punta del lóbulo temporal.

2° *Fibras comisurales*. — Llamadas también *interhemisféricas*, tienen por carácter común atravesar la línea media y terminar, por ambas extremidades, en regiones homólogas de la corteza de los dos hemisferios. A este sistema pertenecen 1°, el *cuerpo caloso*; 2°, la *comisura blanca anterior*, 3°, las fibras transversales del trigono o *fibras de la lira*.

3° *Fibras de proyección*. — Llamadas también *fibras de la corona radiante*, comprenden todas las fibras que, desde la corteza cerebral, van a las masas grises subyacentes: los núcleos optoestriados, el

istmo del encéfalo, el cerebelo, el bulbo y la medula espinal. Se reparten en cuatro grupos, a saber:

A. FIBRAS CORTICOSTRIADAS.— Van de la corteza cerebral al núcleo caudal.

B. FIBRAS CORTICOLENTICULARES.— Van de la cabeza cerebral al núcleo lenticular.

C. FIBRAS CORTICOTALÁMICAS.— Van de la corteza cerebral al tálamo óptico.

D. FIBRAS CORTICOPEDUNCULARES.— Van de la cabeza al pedúnculo. Son:

1.º El *fascículo geniculado*, que, en la extremidad superior de la cápsula interna, se desvía hacia fuera y termina en el cuarto inferior de las dos circunvoluciones frontal ascendente y parietal ascendente.

2.º El *fascículo piramidal*, que, al dejar la cápsula, se despliega en abanico; sus fibras nacen dentro de la corteza de la circunvolución frontal ascendente, así como también en el lobulillo paracentral, centros motores.

3.º El *fascículo sensitivo*, que, desde el segmento posterior de la cápsula interna, se dirige hacia la misma región que el fascículo motor, convirtiéndose así esta en la *zona sensitiva de la corteza*.

4.º El *fascículo corticoprotuberancial posterior* o *fascículo de Meynert*, que, como ya hemos visto antes, pasa por debajo del núcleo lenticular en las circunvoluciones temporales.

5.º Las *fibras corticoprotuberanciales anteriores*, que, mezclándose con las fibras propias del fascículo geniculado y del fascículo piramidal, se dirigen, como estas últimas, a la corteza de la zona sensitivomotriz, y quizá también a la parte más posterior de las tres primeras circunvoluciones frontales.

6. CIRCULACIÓN DEL CEREBRO

El modo de distribuirse los vasos sanguíneos en la masa encefálica ha sido estudiado particularmente y con todo detalle por DURET y HEUBNER. Describiremos sucesivamente: 1.º, las arterias; 2.º, las venas; 3.º, las vías linfáticas.

A. Arterias

Las arterias destinadas al cerebro nacen del polígono de Willis. Las distinguiremos en cuatro grupos: 1.º, *arterias de las circunvolu-*

ciones: 2.^a, *arterias de los núcleos centrales*, 3.^a, *arterias venriculares*; 4.^a, *arterias de la base*.

1.^a **Arterias de las circunvoluciones.** — Las arterias que riegan las circunvoluciones son la *cerebral anterior*, la *cerebral media*, la *cerebral posterior* y la *coroidea anterior*. Cada una de estas arterias se distribuye por una región determinada de la corteza cerebral, la cual constituye su territorio.

A. **TERRITORIO DE LA ARTERIA CEREBRAL ANTERIOR.** — Nacida de la carótida interna, se dirige por delante hacia la cisura interhemisférica. Da algunos ramos delgados a la mitad interna del lóbulo orbitario y al llegar a la rodilla del cuerpo calloso, se divide en tres ramas terminales: 1.^a, *rama anterior*, que se ramifica principalmente por la región anterior de la circunvolución frontal interna; 2.^a, *rama media*, que se distribuye, en parte, por la circunvolución del cuerpo calloso y, en parte, por la porción posterior de la circunvolución frontal interna (excepto el lobulillo paracentral); 3.^a, *rama posterior*, que, después de suministrar numerosos ramos a la circunvolución del cuerpo calloso y al cuerpo calloso mismo, va a terminar en el lobulillo paracentral y en el lóbulo cuadrilátero. Es de notar que dichas ramas terminan, tras de haber rodeado el borde superior del hemisferio en la cara de este último, donde riegan la primera circunvolución frontal, la extremidad anterior de la segunda, la extremidad superior de las dos circunvoluciones frontal y parietal ascendentes, así como la parte superior de la circunvolución parietal superior.

B. **TERRITORIO DE LA ARTERIA CEREBRAL MEDIA O SILVIANA.** — Nacida como la precedente, de la carótida interna, se introduce en la cisura de Silvio, que recorre en toda su extensión. En su trayecto da tres clases de ramas: 1.^a, *ramas ascendentes*; 2.^a, *ramas descendentes*, 3.^a, *una rama terminal*.

a) *Ramas ascendentes.* — Son cuatro. 1.^a, la *arteria frontal inferior* (para la mitad externa del lóbulo orbitario, la tercera circunvolución frontal y el pie de la segunda); 2.^a, la *arteria frontal ascendente* (para los tres cuartos inferiores de la circunvolución homónima); 3.^a, la *arteria parietal ascendente* (para los tres cuartos inferiores de la circunvolución homónima); 4.^a, la *arteria parietal inferior* (que riega la circunvolución parietal inferior y la porción inferior o pie de la circunvolución parietal superior).

b) *Ramas descendentes.* — Son tres, algunas veces cuatro descendiendo al lóbulo temporal para ramificarse por la primera temporal

por la segunda, y solamente una parte por la tercera. Es de notar que sus ramificaciones más anteriores van hasta la parte anterior del lóbulo temporooccipital.

c) *Rama terminal*. Llamada *arteria del pliegue curvo*, sale de la cisura de Silvio a nivel de su extremidad posterior y se ramifica por el pliegue curvo y por la parte anterior del lóbulo occipital.

C TERRITORIO DE LA ARTERIA CEREBRAL POSTERIOR. Es una rama de bifurcación de tronco basilar que rodea la cara inferior de los pedunculos cerebrales y alcanzando el hemisferio se divide en tres ramas terminales: 1.ª *rama anterior* (para la parte anterior del lóbulo temporooccipital, excepto la punta); 2.ª, *rama media* (para la parte media de este lóbulo, y además una parte de la tercera temporal); 3.ª, *rama posterior* (para la parte posterior de este mismo lóbulo, el cíneus y la mayor parte del lóbulo occipital).

D TERRITORIO DE LA ARTERIA COROIDEA ANTERIOR. — De calibre mínimo, nace de la carótida después del nacimiento de la cerebral anterior. Sigue la cinta óptica, a la que cruza por debajo, penetra en la hendidura cerebral de Bichat y va a terminar en el plexo coroideo de los ventrículos laterales. Proporciona: 1.º, una rama para el gancho del hipocampo; 2.º, las arterias perforantes de la cinta óptica que alcanzan la cápsula interna (véase más adelante); 3.º, ramos pedunculares.

E MODO DE RAMIFICACIÓN DE LAS ARTERIAS EN LA PIAMADRE CEREBRAL. — Las tres arterias cerebrales, como acabamos de ver, se dividen en cierto número de *ramas*. Estas ramas, a su vez, se dividen en multitud de *ramos* y *ramúsculos*, que terminan por cierto número de arborizaciones. Las arteriolas que los constituyen son con frecuencia flexuosas, onduladas, pareciendo como si se anastomosasen para formar una vasta red. Esta red no existe pero si existen realmente las anastomosis, por lo que se explica el hecho de que una inyección de sebo introducido por una de las silvianas (después de ligar las tres comunicantes) llene sucesivamente los tres territorios del hemisferio correspondiente y los del opuesto.

2.º **Arterias de los núcleos centrales y de las regiones inmediatas.** — Los núcleos centrales de los hemisferios reciben sus arterias de los cuatro troncos precitados: arteria cerebral anterior, arteria cerebral media, arteria cerebral posterior y arteria coroidea anterior. Es de notar que las arterias de los núcleos no se anastomosan durante su trayecto: son *arterias terminales* por excelencia.

A. RAMAS PROCEDENTES DE LA CEREBRAL ANTERIOR — La cerebral anterior emite, a poco de su origen diversos ramúsculos que atraviesan de abajo arriba el espacio perforado anterior, para terminar en la cabeza del núcleo caudal. son las *arterias estriadas anteriores*.

B. RAMAS PROCEDENTES DE LA CEREBRAL MEDIA La cerebral media o silviana da también cerca de su origen, un grueso *ramillete de arteriolas*, que se introducen por los agujeros del espacio perforado anterior y llegan así hasta la superficie interior del núcleo lenticular. Estas ramas se dividen en internas y externas: las primeras atraviesan el globo pálido; las segundas atraviesan el putamen o lo rodean pasando por su cara externa. Unas y otras, al salir del globo pálido o del putamen llegan a la cápsula interna, la atraviesan oblicuamente de abajo arriba y de fuera adentro, y, finalmente, van a terminar, bien en el núcleo caudal (*arterias lenticuloestriadas*), bien en el tálamo óptico (*arterias lenticuloópticas*). Es de notar, en el grupo lenticuloestriado, una arteria más gruesa que las demás, que asciende por la cara externa del núcleo lenticular, y es la *arteria de la hemorragia cerebral* de CHARCOT.

C. RAMAS PROCEDENTES DE LA CEREBRAL POSTERIOR. La cerebral posterior, en su porción inicial, da las siguientes ramas al tálamo óptico: 1.º, las *arterias ópticas inferiores*, en número variable, que se introducen por los agujeros del espacio perforado posterior y terminan en la cara interna del tálamo óptico; 2.º, la *arteria óptica posterointerna* para la parte posterointerna del tálamo óptico; 3.º, la *arteria óptica posteroexterna*, que llega al tálamo óptico por entre los dos cuerpos geniculados y se distribuye por su parte posteroexterna.

D. RAMAS PROCEDENTES DE LA COROIDEA ANTERIOR — Mediante ramas que atraviesan la rinitilla óptica irriga el brazo posterior de la cápsula externa, el origen de las radiaciones ópticas y la parte superointerna del tálamo óptico.

E. RESUMEN — En suma:

α) El *núcleo caudal* recibe: 1.º, *arterias estriadas anteriores* (para la cabeza), procedentes de la cerebral anterior; 2.º, *arterias estriadas posteriores* (para la cabeza y la cola), procedentes de las estriadas internas y las estriadas externas de la cerebral media o silviana, y ramas de la coroides anterior y de la cerebral posterior.

β) El *núcleo lenticular* recibe de la silviana las *arterias estriadas internas* y las *arterias estriadas externas*, las primeras para el globo pálido (el pálido en su parte interna está irrigado por la coroides anterior) y las segundas para el putamen (parte externa).

γ) El *tálamo óptico*, por último, recibe: 1.º, *arterias ópticas externas o lenticuloópticas*, procedentes (por las arterias estriadas internas y externas) de la cerebral media (su tercio anterior está irrigado por la posterior); 2.º, *arterias ópticas inferiores y arterias ópticas posteriores*, procedentes de la cerebral posterior.

δ) La *región infraóptica* está irrigada por la cerebral posterior y la coroea anterior (cuerpo de Luys).

ε) La *región infralenticular* está irrigada en su mayor parte por la silviana y gradualmente por la cerebral posterior.

ζ) La *cápsula interna* está irrigada por las arterias estriadas de la silviana y por la coroea anterior (brazo posterior).

3.º **Arterias ventriculares.**—Corren, en un principio, a lo largo de los plexos coroideos y de la tela coroea, y de ahí su nombre de *arterias coroeas*. Son tres: 1.º, *arteria coroea anterior* (ya descrita), que nace de la carótida interna, pasa a los plexos coroideos, a nivel de la extremidad anterior de la hendidura cerebral de Bichat, y recorre los dos tercios, aproximadamente, de estos plexos, dándoles ramos sumamente finos; 2.º, *arteria coroea posterior y lateral*, que nace de la cerebral posterior y se divide en dos ramos, uno para el tercio anterior de los plexos coroideos y el otro para la tela coroea; 3.º, *arteria coroea posterior y media*, que nace igualmente de la cerebral posterior y va a parar a la tela coroea.

4.º **Arterias de la base.**—Son arterias de pequeño calibre procedentes de la comunicante anterior, de la cerebral anterior y de la comunicante posterior. La *comunicante anterior* envía diversos ramos al pico del cuerpo calloso, a la lámina supraóptica y al quiasma. La *cerebral anterior* da algunos ramitos al nervio óptico y a su quiasma. La *comunicante posterior* suministra: 1.º *ramúsculos internos*, para el quiasma, el tuber cinéreo y los tubérculos mamilares; 2.º, *ramúsculos externos*, para las cintillas ópticas y para los pedúnculos cerebrales.

B. Venas

Las venas del cerebro se dividen en tres sistemas: 1.º, *venas superficiales o venas de las circunvoluciones*; 2.º, *venas profundas o venas de Galeno*; 3.º, *venas de la base*.

1.º **Venas de las circunvoluciones.**—Las venas de las circunvoluciones se dividen, según la cara del hemisferio a que pertenecen,

en *venas cerebrales internas*, *venas cerebrales externas* y *venas cerebrales inferiores*.

a) *Venas cerebrales internas*. — Nacen de las circunvoluciones de la cara interna. En su mayor parte se dirigen hacia arriba (*venas ascendentes*), para abrirse en el seno longitudinal superior. Algunas de las venas cerebrales internas, procedentes de la circunvolución del cuerpo calloso, de la cuña y del lóbulo cuadrilátero, se dirigen hacia abajo (*venas descendentes*), para desembocar, ya en el seno longitudinal inferior, ya en las venas de Galeno (véase más adelante).

b) *Venas cerebrales externas*. — Nacidas en la cara externa del hemisferio, se distinguen en ascendentes y descendentes. Las *venas ascendentes*, en número de ocho a doce para cada hemisferio, van a desembocar en el seno longitudinal superior. Es de notar: 1.º, que las anteriores desembocan en el seno formando un ángulo agudo de abertura anterior; 2.º, que las medias se abren en el seno en ángulo recto; 3.º, que las posteriores (a partir de la cisura de Rolando) desembocan en el seno formando un ángulo agudo abierto hacia atrás. Las *venas descendentes* se dirigen hacia abajo y van a desembocar: 1.º, las que ocupan la parte posterior del hemisferio, en el seno lateral; 2.º, las que ocupan la parte anterior, en el seno petroso superior o en el seno cavernoso; una de estas últimas sigue el borde posterior de las alas menores del esfenoides y, corriendo por el espesor de la duramadre, constituye el *seno esfenoparietal* de BRESCHET (Nótese entre las venas cerebrales externas, las dos grandes *venas cerebrales anastomóticas* [venas de Trolard y de Labbe], que van del seno longitudinal superior al seno de la base.)

c) *Venas cerebrales inferiores*. — Nacidas en la cara inferior del hemisferio, se distinguen en anteriores y posteriores. Las *anteriores* (o *venas orbitarias*) corresponden al lóbulo orbitario; unas se dirigen hacia delante y desembocan en el seno longitudinal superior; las otras se dirigen hacia atrás y desembocan en las venas de la base. Las *posteriores* (o *venas temporooccipitales*) corresponden al lóbulo del mismo nombre. Desembocan, en parte, en el seno lateral, y en parte, en el seno petroso superior, o también en las venas de la base.

2.º *Venas profundas o de Galeno*. — Las venas de Galeno son dos, una derecha y otra izquierda, encargadas de conducir fuera del cerebro la sangre venosa: 1.º, de una parte de los núcleos centrales; 2.º, de una parte del centro oval; 3.º, de las partes ventriculares.

a) *Origen.* — Nacen ambas en el vértice de la tela coroidea por la reunión de las tres venas: 1.º, la *vena del séptum*, que procede del séptum lúcidum y de la porción refleja del cuerpo caloso; 2.º, la *vena del cuerpo estriado*, que corre, de atrás adelante, en el surco optoestriado; 3.º, la *vena de los plexos coroideos*, que sigue de atrás adelante los plexos coroideos de los ventrículos laterales.

b) *Trayecto y afluentes.* — Así constituidas, las venas de Galeno se dirigen de delante atrás, algo por fuera de la línea media, en el espesor mismo de la tela coroidea. Reciben en su trayecto las tres venas que mencionamos a continuación: 1.º, la *vena del tálamo óptico y del trigono*, 2.º, la *vena del asta de Ammón*; 3.º, la *vena del espolón de Morand*.

c) *Terminación.* — Al llegar a la base de la tela coroidea, las dos venas de Galeno se unen entre sí para formar un tronco común impar y medio (*ampolla de Galeno*), el cual, después de un trayecto de 8 a 10 milímetros, desemboca en la extremidad anterior del seno recto. En la ampolla de Galeno desembocan: 1.º, las venas salidas de los tubérculos cuadrigéminos, 2.º, dos venas cerebrales internas que, por razón de su origen, llamaremos *venas cuneolímbricas*; 3.º, las *venas basílares*, que vamos a describir a continuación.

3.º *Venas de la base.* Las venas de la base son dos: una derecha y otra izquierda, que corren, como su nombre indica, por la base del cerebro.

a) *Origen y trayecto.* — Cada una es continuación de otra vena, llamada *vena cerebral anterior*, que recorre el mismo trayecto que la arteria homónima, pero cuyo territorio no se extiende más allá de la rodilla del cuerpo caloso. Desde este punto se dirige hacia atrás, sigue la hendidura cerebral de Bichat, cruza oblicuamente el pedúnculo cerebral y va a desembocar, ya en la ampolla de Galeno, ya en el seno recto.

b) *Afluentes.* — En su trayecto recibe: 1.º, por dentro (*afluentes internos*), algunas venitas, procedentes de las formaciones interhemisféricas; 2.º, por fuera (*afluentes externos*), las venas posteriores del lóbulo orbitario, la *vena silviana profunda* o *vena insular* (que sigue en su curso el mismo trayecto que la arteria, desemboca en el valle del mismo nombre y recibe algunas venas estriadas inferiores), las venas del plexo coroideo, de los ventrículos laterales, de la circunvolución del hipocampo, del istmo del encéfalo y de los cuerpos geniculados.

c) *Anastomosis*. — Las dos venas basilares se hallan unidas entre sí. 1.º, por delante del quiasma óptico, por una vena transversal, llamada *vena comunicante anterior*; 2.º, a nivel del borde anterior de la protuberancia, por una segunda vena transversal llamada *vena comunicante posterior*. Existe también un *polígono venoso*, que corresponde con bastante exactitud al *polígono arterial de Willis*.

4.º *Anastomosis diversas de las venas cerebrales*. — Las venas cerebrales tienen gran tendencia a contraer anastomosis. Además de las anastomosis con los senos (*vena anastomótica magna* y *vena anastomótica posterior*) y las anastomosis con la red venosa extracranial, que ya hemos descrito en *Angiología*, las venas cerebrales presentan cuatro clases de anastomosis, que son las siguientes:

a) *Anastomosis entre sí*. — Son muy numerosas y se verifican en las circunvoluciones o bien en las anfractuosidades.

b) *Anastomosis entre ambos hemisferios*. — Se observan en dos puntos. 1.º, en la base del cerebro, 2.º, por encima del cuerpo calloso (siendo digna de mención la *vena interhemisférica*, que, naciendo en la parte anterior de ambos hemisferios, se dirige hacia atrás, para desembocar en el seno longitudinal inferior).

c) *Anastomosis de las venas de Galeno con los otros dos sistemas*. — Por una parte, las *venas estriadas superiores*, tributarias de las venas de Galeno, se anastomosan, en pleno cuerpo estriado, con las *venas estriadas inferiores*, que van a la vena basilar (HÉDON). Y por otra parte, hemos indicado la existencia, en pleno centro oval, de anastomosis entre los ramos de las venas de Galeno y los ramos de origen de las venas corticales.

d) *Anastomosis arteriovenosas*. — Existen finalmente, en el espesor de la pia madre, anastomosis directas entre las arteriolas y las venillas, pero estas anastomosis nos han parecido extremadamente raras.

C. Vías linfáticas

En parte alguna del cerebro se encuentran verdaderos vasos linfáticos. La linfa circula allí, como en las demás porciones del eje cerebroespinal, por una parte, en los *intersticios* que separan los elementos histológicos, y por otra, en las *vainas o cubiertas perivasculares* (véanse los tratados de Histología).

CAPITULO VIII

MENINGES

Las meninges o cubiertas del cerebro son tres: la *duramadre*, la *aracnoides* y la *piamadre*. Para su estudio hay que añadir también el *liquido cefalorraquídeo* y las *granulaciones de Pacchioni*.

I DURAMADRE

La duramadre, la más superficial de las tres meninges, es una membrana fibrosa. Conviene estudiarla separadamente: en primer lugar, en el raquis (*duramadre raquídea*), después en el cráneo (o sea la *duramadre craneal*).

1.º **Duramadre raquídea.**—Tiene la forma de un cilindro hueco, contenido en el conducto vertebral, y en su centro se hallan la médula y el bulbo. Se extiende desde el agujero occipital hasta la segunda o tercera vértebra sacra. Se consideran en ella *dos superficies* (externa e interna) y *dos extremidades* (superior e inferior).

A. **SUPERFICIE EXTERNA.**—Corresponde a la pared del conducto raquídeo, de la cual está separada por el *espacio epidural* (en este espacio hay ligamentos, grasa fluida y plexos venosos). Libre por detrás, está unida por la parte contraria al ligamento vertebral posterior por prolongaciones fibrosas. Por sus lados proporciona a los nervios raquídeos prolongaciones en forma de vainas, las *vainas durales*: existe por lo común una vaina para cada raíz.

B. **SUPERFICIE INTERNA.** Lisa y pulimentada, corresponde a la hoja parietal de la aracnoides, que le está íntimamente adherida. Por delante, por detrás y los lados, presta inserción a manojos conjuntivos que proceden de la piamadre y que la unen a esta última membrana (véase *Piamadre*). A derecha e izquierda presenta agujeros para el paso de las raíces raquídeas y los vasos de la médula. Nótese que,

para las dos raíces correspondientes, tan pronto existen dos agujeros como uno solo.

C. EXTREMIDAD SUPERIOR. — Por su extremidad superior, la duramadre raquídea se fija en la cara posterior del axis y alrededor del agujero occipital.

D. EXTREMIDAD INFERIOR. — Corresponde al conducto sacro. Presenta la forma de un embudo, conteniendo el filum terminale y los nervios de la cola de caballo. Termina por un fondo de saco, el fondo de saco dural, el cual, en el adulto, corresponde a la parte inferior de la segunda vértebra sacra y algunas veces a la parte superior de la tercera. A nivel del vértice del fondo de saco mencionado, la duramadre se aplica contra el filum terminale, formándole una vaina, y con el nombre de *ligamento coccígeo de la médula* desciende hasta la primera vértebra coccígea. Nótese que el fondo de saco dural está adherido a la parte anterior del conducto sacro por una especie de tabique medio, más o menos fenestrado, el *ligamento sacrodural*.

2° Duramadre craneal. — Representa una especie de esfera hueca, que de una parte tapiza la cavidad craneal, y por otra envuelve la masa encefálica. También aquí hay que estudiar *dos superficies*, externa e interna, dando esta última origen a importantes prolongaciones.

A. SUPERFICIE EXTERNA. — Se aplica exactamente a la pared interna del cráneo, con la cual la unen numerosas prolongaciones fibrosas y vasculares. Esta adherencia, muy fuerte en la base, es más débil en la bóveda craneal, exceptuando en las suturas (en la región temporoparietal existe la *zona despegable de Marchant*). Al igual que la duramadre raquídea, proporciona a los nervios y vasos que salen del cráneo prolongaciones tubulosas (*vainas durales*), que los acompañan hasta sus respectivos agujeros y más allá de éstos se continúan con el periostio extracraneal.

B. SUPERFICIE INTERNA. — Al igual que la duramadre raquídea, está tapizada por la hoja parietal de la aracnoides, que se le adhiere íntimamente.

C. PROLONGACIONES. Por su superficie interna, la duramadre craneal envía, entre los diversos segmentos del encéfalo, cuatro prolongaciones o tabiques: la *tienda del cerebelo*, la *hoz del cerebro*, la *hoz del cerebelo* y la *tienda de la hipófisis*.

a) *Tienda del cerebelo.* — Tabique transversal, en forma de media luna, situado entre el cerebro y el cerebelo. Su cara superior, con-

tituida en forma de doble vertiente, corresponde al cerebro. Presa su inserción, en la línea media, a la base de la hoz del cerebro. Su *cara inferior*, en forma de bóveda, cubre la superior del cerebelo. Su *circunferencia posterior*, convexa, se adhiere sucesivamente a la protuberancia occipital interna, a la porción horizontal del canal lateral (en cuyo punto corresponde al seno lateral) y al borde superior del peñasco (en donde corresponde al seno petroso superior). Algo por fuera del vértice del peñasco se levanta para formar un *agujero*, a través del cual pasa el trigémino. (Nótese que, por delante de este agujero, la duramadre se desdobla para formar una pequeña cavidad, el *cavum de Meckel*, que aloja al ganglio de Gasser.) Su *circunferencia anterior*, cóncava, circunscribe, con la parte anterior del canal basilar, un orificio prolongado, el *foramen oval de Parchioni* (que corresponde al istmo del encéfalo). Sus *extremidades o puntas* están situadas a derecha e izquierda, debajo del vértice del peñasco, en este punto las dos circunferencias se entrecruzan en X (pasando la anterior por encima de la posterior), para ir a fijarse: la posterior, en las apófisis clinoides posteriores, y la anterior, en las apófisis clinoides anteriores. Esta última, al dirigirse a su apófisis, forma lateralmente una expansión vertical: esta expansión es la pared externa del seno cavernoso.

b) *Hoz del cerebro* — Tabique fibroso medio, situado en la gran cisura interhemisférica. Sus *caras laterales*, verticales y planas están en relación con la cara interna de los hemisferios. Su *borde superior*, convexo, corresponde a la línea media de la calota, desde el agujero ciego a la protuberancia occipital interna; sirve de albergue al seno longitudinal superior. Su *borde inferior*, cóncavo, está en relación con el cuerpo caloso, pero sólo descansa directamente sobre él a la parte posterior. Aloja al seno longitudinal inferior. Su *vértice* se inserta en el borde anterior de la apófisis *crista galli*. Su *base* se adhiere a la parte media de la tienda del cerebelo. Aloja al seno recto.

c) *Hoz del cerebelo* — Tabique vertical mucho más pequeño que el precedente, situado en la línea media, entre los dos hemisferios del cerebelo. Sus *caras laterales* se corresponden con estos hemisferios. Su *borde posterior*, convexo, se inserta en la cresta occipital interna. Aloja los dos senos occipitales posteriores. Su *borde anterior*, cóncavo, se corresponde con la gran cisura media del cerebelo. Su *base* se une a la parte media de la tienda del cerebelo. Su *vértice*, bifurcado, se corresponde con la parte posterior del agujero occipital.

d) *Tienda de la hipófisis* — Llamada también *diafragma de la hipófisis*, es un tabique horizontal, que se extiende por encima de

la silla turca. Se inserta *hacia delante*, en el labio posterior del canal óptico y en las apófisis clinoides anteriores; *por atrás*, en el borde superior de la lámina cuadrilátera y en las apófisis clinoides posteriores *por los lados* descende verticalmente sobre los bordes laterales de la silla turca, formando la pared interna del seno cavernoso. Su *cara superior* corresponde al cerebro (circunvoluciones olfatorias, quiasma óptico y tuber cinereum). Su *cara inferior* cubre la hipófisis o cuerpo pituitario. (Notese, 1.º, que presenta un agujero en su centro, para el paso del tallo pituitario; 2.º, que contiene en su espesor el seno coronario.)

3.º **Constitución anatómica.** - La *duramadre craneal* se compone de dos hojas superpuestas: 1.º, una hoja externa, más gruesa, aplicada a la pared craneal y que desempeña el papel de *periostio interno*; 2.º, una hoja interna, más delgada que constituye la *duramadre propiamente dicha*. A expensas de esta última hoja se desarrollan las prolongaciones más arriba descritas. En cuanto a la *duramadre raquídea*, difiere de la *duramadre craneal*, en que representa, no sus dos hojas, sino su hoja interna solamente. Histológicamente, la *duramadre*, tanto la craneal como la raquídea, tiene la estructura de las membranas fibrosas.

4.º **Vasos y nervios.** - Conviene estudiarlos separadamente, según se trate de la *duramadre craneal* o de la *duramadre raquídea*.

A) EN LA DURAMADRE CRANEAL. a) *Arterias*. Proceden de varios orígenes, de las meningeas anteriores, de la arteria meníngea media, de la meníngea menor y de la meníngea posterior (véase *Angiología*). Forman dos redes: una, *superficial*, en la hoja externa de la membrana; otra, *profunda*, en la hoja interna.

b) *Venas*. Forman igualmente dos redes, una superficial y otra profunda. La *red profunda*, poco desarrollada, desagua en la red superficial. La *red superficial* está formada por dos órdenes de vasos: unos avanzan aisladamente, otros acompañan a los vasos arteriales en número de uno o dos para cada arteria.

c) *Lagunas sanguíneas*. - Se da este nombre a unas cavidades especiales llenas de sangre venosa, por hallarse anexas a las venas, que se desarrollan con preferencia a cada lado del seno longitudinal superior. Estas cavidades, en forma de ampolla irregular (con granulaciones de Pacchioni o sin ellas), presentan con el sistema venoso las relaciones siguientes: 1.º, comunican con los senos; 2.º, reciben las

venas meníngeas, 3.^a entran en relación, por uno o varios canales anastomóticos, con las venas cerebrales subyacentes; 4.^a reciben, finalmente cierto número de venas diploicas.

d) *Linfáticos*. Poco conocidos todavía, son admitidos por unos y rechazados por otros.

e) *Nervios*. — Se dividen en: 1.^o, *nervios anteriores*, procedentes del filete cunoidal del nervio nasal, se distribuyen en la parte inferior y anterior de la meninge fibrosa; 2.^o, *nervios laterales*, procedentes del ganglio de Gasser y, más especialmente, de la porción inicial del nervio maxilar inferior; 3.^o, *nervio posterior*, que constituye el *nervio recurrente* de ARNOLD y se dirige a la tienda del cerebelo.

B. *DURAMADRE RAQUÍDEA*. — Las arterias proceden: 1.^o, *en el cuello*, de los ramos espinales de las vertebrales; 2.^o, *en el dorso*, de los ramos dorsoespinales de las intercostales; 3.^o, *en la región lumbar*, de los ramos dorsoespinales de las arterias lumbares; 4.^o, *en la región lumbar y en la sacra*, de las arterias lumbares y de las arterias sacras. Las venas desaguan en el plexo venoso intrarraquídeo (sin lagunas ni senos). Los *linfáticos* están dispuestos exactamente como en la dura madre craneal. Los *nervios* se comportan también como en la duramadre craneal.

2. PIAMADRE

La piamadre es una membrana celulovascular (*membrana nutritiva* de algunos autores) que se extiende inmediatamente sobre la superficie exterior de los centros nerviosos. La estudiaremos sucesivamente: 1.^o, en la medula y el bulbo, *piamadre raquídea*, 2.^o, en el encéfalo, *piamadre craneal*.

1.^o *Piamadre raquídea*. Tiene la forma de una vaina o cubierta cilíndrica, que rodea la medula y el bulbo. Se pueden considerar en ella, como en la duramadre, *dos superficies y dos extremidades*.

A. *SUPERFICIE INTERNA*. Descansa inmediatamente en el eje cerebroespinal, al cual está íntimamente adherida. Nótese que los tabiques (*septa* y *septula*) que, según los antiguos autores, enviaba a través de la sustancia nerviosa, no existen en realidad. Los *septa* y *septula* en cuestión son de naturaleza neuróglia.

B. *SUPERFICIE EXTERNA*. — Por su superficie externa, la piamadre está completamente bañada por el líquido cefalorraquídeo, el cual la separa de la duramadre. Está unida a esta última por prolongaciones anteriores, posteriores y laterales.

a) *Prolongaciones anteriores*. — Son simples trabéculas conjuntivas que van de la cara anterior de la piamadre a la parte correspondiente de la duramadre.

b) *Prolongaciones posteriores*. Son igualmente simples trabéculas que van de la cara posterior de la piamadre a la parte correspondiente de la duramadre.

c) *Prolongaciones laterales*. Están representadas por dos cintas, una a derecha y otra a izquierda, que van de la cara lateral de la médula a la parte correspondiente de la duramadre, extendiéndose en altura desde el agujero occipital hasta el origen del cono terminal son los *ligamentos dentados*. Cada uno de ellos ofrece: 1°, *dos caras*, una anterior y otra posterior; 2°, un *borde interno*, que se confunde con la piamadre; 3°, un *borde externo*, festoneado (con arcos y dientes), que se fija por sus dientes en la parte lateral del estuche dural (nótese que los arcos están enfrente de los agujeros de conjunción). Los ligamentos dentados tienen por objeto dividir el espacio subdural en dos compartimientos, uno anterior, por el cual se extienden las raíces anteriores, y otro posterior, en el cual se encuentran las raíces posteriores.

C. EXTREMIDAD SUPERIOR. — A este nivel la piamadre raquídea se continua con la piamadre craneal.

D. EXTREMIDAD INFERIOR. — A nivel del cono terminal, la piamadre pasa sobre el filum terminale y lo rodea de una vaina completa. Termina, abajo, en el punto en donde el filum pierde sus elementos nerviosos.

2.º **Piamadre craneal.** — Recubre sucesivamente los diferentes segmentos de la masa encefálica. También aquí se observan *dos superficies*, interna y externa.

A. SUPERFICIE INTERNA. La piamadre craneal tiene por carácter esencial estar siempre en contacto con la superficie exterior del eje cerebroespinal, y, por consiguiente, descender hasta el fondo de las cisuras y de los surcos.

B. SUPERFICIE EXTERNA. — Está en relación con los espacios subaracnoideos (véase más adelante).

C. FORMACIONES COROIDEAS. — A nivel de la hendidura cerebral de Bichat, la piamadre se insinúa en el espesor del encéfalo, formando lo que se llama la *piamadre interna*. La piamadre interna comprende: 1.º, la *tela coroidea superior*, que se extiende por encima del ventrículo medio (pág. 409). 2.º, los *plexos coroideos de los ventrículos laterales*.

les, que avanzan por encima del epéndimo, en las dos porciones frontal y esfenoidal del ventrículo lateral (pág. 408).

3.° **Constitución anatómica.** — La *piamadre raquídea* se compone de dos capas: una capa interna (o *intima pia*) y una capa externa separadas entre sí por una hendidura linfática, el *espacio linfático intrapial*. En cuanto a la *piamadre craneal*, se halla reducida a una sola capa, que es la capa interna o *intima pia*.

4.° **Vasos y nervios.** — Los *vasos sanguíneos* (arterias y venas, han sido ya descritos al tratar de cada uno de los diferentes segmentos del eje cerebrospinal. Los *nervios*, en su mayoría satélites de los vasos, proceden a la vez del sistema neurovegetativo y de las raíces de los nervios, ya craneales, ya raquídeos.

3 ARACNOIDES

La aracnoides es una membrana serosa, situada entre la *dura madre* y la *piamadre*. Se divide, como estas últimas, en *aracnoides raquídea* y *aracnoides craneal*.

1.° **Aracnoides raquídea.** — Se compone, como las serosas, de dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral, interceptando entre las dos una cavidad, la *cavidad aracnoidea*.

a) La *hoja parietal* tapiza la *duramadre raquídea* en toda su extensión y le está íntimamente adherida.

β) La *hoja visceral*, aplicada contra la precedente, reviste la forma de un manguito, que rodea la medula en toda su altura y se prolonga todavía por debajo de ella, sobre la cola de caballo. Desciende de este modo hasta el vértice o punta del fondo de saco dural, en cuyo punto se refleja hacia fuera para continuarse con la hoja parietal. La aracnoides está separada de la superficie exterior de la medula por un vasto espacio circular, que es el *espacio subaracnoideo de la medula* o *lago bulboespinal*.

γ) La *cavidad aracnoidea* es una simple hendidura o, si se quiere, una cavidad virtual.

2.° **Aracnoides craneal.** — También ésta presenta dos hojas y una cavidad intermedia.

a) La *hoja parietal* está íntimamente adherida a la superficie interna de la *duramadre* y de sus diversas prolongaciones.

β) La *hoja visceral*, extendiéndose sobre la accidentada superficie de la masa encefálica, está caracterizada por adherirse a todas las partes salientes y por saltar, a modo de puente, de una a otra de estas partes. De esto resulta, como fácilmente se concibe, la existencia, entre la hoja visceral y las anfractuosidades cerebrales, de cavidades muy irregulares, cuyo conjunto constituye los *espacios subaracnoideos del encéfalo*. Luego volveremos a tratar de esto.

γ) La *cavidad aracnoidea* también es virtual, estando las dos hojas serosas inmediatamente aplicadas una contra otra. Esta cavidad aracnoidea es atravesada por todos los vasos y nervios que van de la duramadre a la piamadre, debiendo notarse que a su nivel la aracnoides les forma vainas completas, las cuales establecen la continuidad de las dos hojas parietal y visceral.

3.º **Constitución o estructura anatómica.** — Cada una de las dos hojas aracnoideas presenta la estructura fundamental de las serosas. (Véanse los tratados de *Histología*.)

4.º **Vasos y nervios.** — La aracnoides no tiene *vasos sanguíneos que le sean propios*. La cuestión de los nervios no está todavía dilucidada.

4. LÍQUIDO CEFALORRAQUIDEO

Se da este nombre a un líquido que llena los espacios subaracnoideos más arriba citados.

1.º **Espacios subaracnoideos.** — Los espacios subaracnoideos están situados entre la piamadre y la hoja visceral de la aracnoides. Son atravesados por trabéculas más o menos gruesas de tejido conjuntivo, que van de una a otra pared, tabicando estos espacios hasta lo infinito.

2.º **Circulación del líquido cefalorraquídeo en los espacios subaracnoideos.** — El líquido cefalorraquídeo circula desde luego por los numerosos surcos que se encuentran en la superficie de la masa encefálica y que según su importancia, toman el nombre de *ri-vius*, de *flumina* (ejemplos: el *flumen rotundico*, el *flumen paralelo*, el *flumen perpendicular interno*). Los flúmina desembocan en cavidades mayores llamadas *confluencias* o *lágunas*. Estas son: 1.ª, el *lago* o *laguna de Silvio*, que ocupa la parte inferior de la cisura de Silvio;

1.º, el *lago calloso*, situado debajo de la rodilla de cuerpo calloso; 3.º el *lago central*, que corresponde al espacio interpeduncular y a una parte de los pedúnculos (pues la hoja visceral de la aracnoides salta, en este punto, de uno a otro hemisferio); 4.º, el *lago cerebeloso superior*, que se extiende entre el rodete del cuerpo calloso y la cara superior del cerebelo; 5.º, el *lago cerebeloso inferior* que descansa (debajo del cerebelo), sobre la mitad posterior del cuarto ventrículo, y 6.º, finalmente, el *lago bulboespinal* que ocupa toda la altura del cilindro bulboespinal (comprendiendo la cola de caballo)

3.º **Caracteres físicos del líquido cefalorraquídeo.** — Líquido claro, transparente incoloro, de una densidad de 1,008 a 1,020. El hombre tiene, por término medio, de 120 a 150 gramos. Nótese que su tensión es siempre superior a la presión atmosférica

5. GRANULACIONES MENÍNGEAS DE PACCHIONI

Son pequeños corpúsculos de un blanco gris, que se desarrollan en el espesor de las meninges o bien en su intervalo.

1.º **Situación.** — Se encuentran con frecuencia a lo largo de la gran cisura interhemisférica a ambos lados del seno longitudinal superior (más raramente a nivel del seno lateral, del seno cavernoso, del seno petroso superior y la cisura de Silvio).

2.º **Formas y dimensiones.** — Ofrecen comúnmente las dimensiones de un grano de mijo (pero pueden alcanzar hasta las de un grueso guisante). Su forma es muy variable: esféricas, ovoideas, piriformes, en forma de maza, sésiles o pediculadas. Tan pronto se presentan diseminadas como dispuestas en grupos. Faltan en el feto, raras veces en el niño, se multiplican en el adulto y aumentan gradualmente en el viejo.

3.º **Significación morfológica.** — Son simples vegetaciones conjuntivas que tienen su origen en los espacios subaracnoideos y se desarrollan luego hacia fuera, levantando poco a poco las dos membranas que las cubren; hay que notar que en este movimiento de expansión excéntrica se dirigen en su mayor parte, ya hacia los senos, ya hacia los lagos sanguíneos de la duramadre, rechazan la pared de estos vasos y parecen entonces bañarse en plena corriente sanguínea.

4.º Constitución anatómica. — Se componen esencialmente:
1.º de una masa central, formada por trabéculas conjuntivas diversamente entrecruzadas que son continuación de las trabéculas similares de los espacios subaracnoides (vienen a ser como una especie de esponja empapada en líquido cefalorraquídeo); 2.º, de dos membranas o cubiertas que las cubren por su parte externa una *cubierta interna*, que representa la hoja visceral de la aracnoides, una *cubierta externa*, que no es otra que la duramadre tapizada por la hoja parietal de la aracnoides. Entre las dos cubiertas se halla una cavidad virtual, en forma de hendidura, que es la continuación, a nivel de la granulación pacchioniana, de la gran cavidad aracnoidea.

SEGUNDA SECCION

SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO

El sistema nervioso periférico está constituido por un conjunto de cordones más o menos voluminosos, los *nervios* a los cuales van anejos unos engrosamientos de forma y dimensiones variables, los *ganglios*.

Los *nervios* nacen unos del *sistema nervioso central* (nervios de la vida de relación) y otros del *sistema nervioso organovegetativo* (nervios de la vida vegetativa). Después de su origen se dividen, como las arterias, en *ramas colaterales* y *ramas terminales*. Ordinariamente acompañan a las arterias, de cuyas relaciones participan más aún que estas últimas, los nervios tienden a seguir un trayecto rectilíneo. En el curso de su trayecto se anastomosan con gran frecuencia, lo más comúnmente de rama a rama. Estas anastomosis son 1° *simples* (oblicua, transversal, ansiforme); 2°, *múltiples*; 3°, *compuestas*. Estas últimas forman los plexos nerviosos.

Los *ganglios* están situados en el trayecto de los nervios, tanto cerebroespinales como simpáticos, contienen células nerviosas, lo cual les da un carácter bien definido. Su volumen, como también su configuración exterior, son muy variables. Forman varios grupos: 1°, *ganglios cerebroespinales*, situados en el trayecto de los nervios raquídeos (raiz posterior) y de los nervios bulboprotuberanciales; 2°, *ganglios simpáticos*, situados en el trayecto del simpático; 3°, *ganglios mixtos* (el ganglio oftálmico, por ejemplo), en relación con los dos sistemas.

Considerados desde un punto de vista puramente descriptivo, los nervios forman tres grupos: 1°, *nervios craneales*; 2°, *nervios raquídeos*; 3°, *nervios organovegetativos*.

CAPITULO PRIMERO

ORIGENES Y TERMINACIONES REALES DE LOS NERVIOS

Cada nervio, craneal, o raquídeo, tiene un *origen aparente* y un *origen real*. Su origen aparente es el punto de ,a superficie exterior del eje cerebroespinal en que está impiantado. Pero en realidad sus fibras van mucho mas allá, penetran en la propia substancia del eje cerebroespinal, recorren en ella un trayecto más o menos largo y van, finalmente, a terminar en una masa de substancia gris. En este núcleo de substancia gris se halla precisamente situado su origen real, y, por lo tanto, este núcleo se convierte en su *núcleo de origen* (que se llama también *núcleo de terminación* cuando se trata de un nervio sensitivo)

1.º Orígenes y terminaciones reales de los nervios raquídeos. — Los nervios raquídeos, *nervios mixtos*, nacen de la medula espinal, por dos raíces — una raíz anterior o *motora* y una raíz posterior o *sensitiva*, esta última provista de un ganglio (*ganglio espinal*).

a) *Raíces motoras* — Las raíces motoras penetran en la medula y se dirigen horizontalmente hasta el cuerno anterior. Cada una de las fibras que constituyen estas raíces penetra en dicho cuerno anterior y se continua con una de las células radiculares. Las fibras radicales anteriores no son sino los cilindroejes de esas células radiculares. Es importante observar que cada célula radicular está en relación, 1.º, con las fibras de la *vía piramidal* (motricidad voluntaria); 2.º, con las fibras de la *vía extrapiramidal*; 3.º, con las fibras *vestibuloespinales*; 4.º, con las fibras de la *cintilla longitudinal posterior* (medula cervical); 5.º, con las fibras *cerebroespinales* (fibras de Marchi); 6.º, con las *colaterales reflejas* de las raíces posteriores (arco reflejo elemental).

b) *Raíces sensitivas* — Las fibras que constituyen las raíces posteriores emanan o proceden de las células ganglionares del ganglio espinal y representan, como sabemos, la prolongación del cilindroeje de esas células.

Cada fibra, al penetrar en la medula, se divide en dos ramas, una descendente y otra ascendente. Las ramas descendentes, después de un corto trayecto, entran en el asta posterior, donde terminan por arborización libre, alrededor de una de las células de dicha asta. Las ramas ascendentes, de mayor importancia, se dividen, según su longitud, en tres grupos: 1º *fibras cortas*, que terminan después de un trayecto relativamente corto, en el cuerno posterior, siempre por arborizaciones libres; 2º, *fibras medianas*, que después de un trayecto algo más largo, van a parar a la columna de Clarke; 3º, *fibras largas*, que suben por el fascículo o manojito de Goll hasta el bulbo, en donde terminan en los núcleos de Goll y de Burdach.

Las células del cuerno posterior, la columna de Clarke y los núcleos de Goll y de Burdach vienen a ser de este modo los *núcleos de origen*, o mejor dicho, los *núcleos terminales* de las fibras sensitivas raquídeas. Recordemos que de estos diferentes núcleos parten luego otras fibras, que, después de entrecruzarse sobre la línea media, llegan hasta la corteza cerebral (*cinta de Retz*).

Resumiendo, la vía sensitiva se compone por lo menos, de dos neuronas: 1º, una *neurona periférica*, en la que la célula está representada por la célula del ganglio espinal y el cilindroeje por la fibra nerviosa que desde el ganglio espinal va al núcleo de terminación; 2º, una *neurona central*, en la que la célula está representada por la célula del ganglio espinal y el cilindroeje por la fibra nerviosa que desde el núcleo terminal se eleva hasta la corteza.

2º Origen y terminaciones reales de los nervios craneales. — Los nervios craneales terminan exactamente como los nervios raquídeos: si son *motores*, en un *núcleo motor*, continuándose las fibras con las células de este núcleo, si son *sensitivos* o *sensoriales*, en un *núcleo sensitivo*, por medio de arborizaciones libres que enlazan las células de este núcleo, si son *mixtos*, terminan a la vez en un *núcleo motor* (para las fibras motoras), en un *núcleo sensitivo* (para las fibras sensitivas). Sentado esto, examinaremos sucesivamente cada uno de los nervios craneales, partiendo de la medula hacia el cerebro.

CAPITULO II

NERVIOS CRANEALES

Estos nervios nacen del encéfalo o del bulbo y atraviesan los agujeros de la base del cráneo, para ir a distribuirse por las regiones a que están destinados. Cada uno de ellos tiene un doble origen: 1.º, *origen aparente*, que es el punto del neuroeje en que está implantado el nervio y del cual parece nacer; 2.º, *origen real*, que es el núcleo de substancia gris central al que van a parar en realidad las fibras constitutivas del nervio. Los nervios craneales forman doce pares:

- 1.º par: *olfatorio*.
- 2.º par: *óptico*.
- 3.º par: *motor ocular común*.
- 4.º par: *patético*.
- 5.º par: *trigémino*.
- 6.º par: *motor ocular externo*.
- 7.º par: *facial*.
- 8.º par: *auditivo*.
- 9.º par: *glosofaríngeo*.
- 10.º par: *neumogástrico*.
- 11.º par: *espinal*.
- 12.º par: *hipogloso mayor*.

1. PRIMER PAR: NERVO OLFATORIO

El nervio olfatorio es el nervio del olfato. Está representado por una serie de pequeños filetes nerviosos que se extienden desde el bulbo olfatorio hasta la mucosa pituitaria.

1.º **Origen aparente.** — Se halla situado en la cara inferior del bulbo olfatorio (lámina cribosa del etmoides).

1.º **Origen real.** — Desde la mucosa pituitaria, en la cual tienen su origen, las impresiones olfatorias se dirigen hacia la corteza cerebral, siguiendo una serie de conductores cuyo conjunto constituye la *vía olfatoria*.

A **TRAYECTO EXTRACEREBRAL DE LAS FIBRAS OLFATORIAS** — Hallamos, ante todo, en la mucosa pituitaria, células especiales, *células olfatorias*, con una prolongación periférica y una prolongación central las cuales son verdaderas células nerviosas, homólogas de las células del ganglio de Corti y del ganglio de Scarpa de la vía auditiva y homólogas, por consiguiente, de las células constitutivas de los ganglios espinales; se trata (como en la retina) de una especie de ganglio desarrollado en superficie. He aquí la *neurona periférica*, la prolongación periférica, muy corta, representa la prolongación protoplasmática (de conducción celulípeta); la prolongación central, muy larga, representa la prolongación cilindroaxil (de conducción celulífuga).

a) *Nervios olfatorios* — Estas prolongaciones cilindroaxiales se remontan hacia la cavidad craneal, constituyendo los *nervios olfatorios*. Estos nervios olfatorios, que son los homólogos de las raíces posteriores de los nervios raquídeos, atraviesan de abajo arriba los agujeros de la lámina cribosa, llegan al cráneo y penetran inmediatamente en el espesor del bulbo olfatorio.

b) *Bulbo olfatorio* — El bulbo olfatorio (pequeña masa nerviosa prolongada de delante atrás, aplanada de arriba abajo, de 9 milímetros por 4, que descansa sobre la lámina cribosa del etmoides) es una porción del eje cerebroespinal, como lo demuestra la embriología, y los filetes olfatorios raquídeos desaparecen en su masa como las raíces posteriores de los nervios raquídeos en el surco colateral posterior de la médula.

Considerado desde el punto de vista de su constitución anatómica, el bulbo olfatorio se compone de tres capas concéntricas, superficial, media y profunda. La *capa superficial* está formada por fibras nerviosas, que son precisamente las fibras de los nervios olfatorios. La *capa profunda* está formada igualmente por fibras nerviosas, cuya significación veremos luego. La *capa media* presenta 1.º, en su zona externa, pequeñas masas esféricas, los *glomérulos olfatorios*; 2.º, en su zona interna, células triangulares de base inferior llamadas *células mitrales*. Las fibras olfatorias, después de haber atravesado la capa superficial del bulbo, penetran cada una de ellas en un glomérulo y terminan en él por una arborización libre, pero muy flexuosa. Cada célula mitral, a su vez, envía por su base una prolongación proto-

plasmática (*prolongación nasal*) que, descendiendo hacia uno de los glomérulos, penetra y se ramifica en él, asimismo, en forma de arborización terminal libre fuertemente flexuosa. El glomérulo olfatorio está, pues, constituido por dos arborizaciones terminales, flexuosas e irregularmente apelonadas, una *cilindroaxil*, procedente de la neurona periférica, y la otra *protoplasmatíca*, procedente de la prolongación basal de la célula mitral.

A nivel del glomérulo y de la articulación de las arborizaciones precitadas, la impresión olfatoria pasa de la neurona periférica a la *neurona central*, la cual no es otra cosa que la célula mitral. Esta célula mitral envía, por su vértice, una prolongación cilindroaxil, que se dobla hacia atrás para alcanzar la extremidad posterior del bulbo olfatorio y pasar desde allí a la cintilla olfatoria.

La impresión olfatoria sigue, por lo tanto, el siguiente trayecto: 1.º, la prolongación protoplasmatíca de la célula olfatoria de la pituitaria (*neurona periférica*); 2.º la prolongación cilindroaxil de esta misma célula olfatoria hasta el glomérulo; 3.º, la prolongación protoplasmatíca basal de la célula mitral (*neurona central*); 4.º, la prolongación cilindroaxil de esta misma célula mitral hasta la cintilla olfatoria y aun más allá.

c) *Cintilla olfatoria*. — La cintilla olfatoria (prescindiendo de las tiras de substancia gris que se extienden irregularmente en la superficie) está constituida por los cilindrojes de las células mitrales, los cuales avanzan de delante atrás hasta la base de la cintilla, es decir, hasta el ángulo del espacio cuadrilátero perforado. Allí, las fibras olfatorias (exceptuando aquellas, poco numerosas, que terminan en la substancia gris del espacio perforado) se dividen en cuatro paquetes, cada uno de los cuales corresponde a una de las cuatro raíces de la cintilla: 1.º, la *raíz blanca externa*; 2.º, la *raíz blanca interna*; 3.º la *raíz media* o *raíz gris*, 4.º, la *raíz superior*.

B TRAYECTO INTRACEREBRAL DE LAS FIBRAS OLFATORIAS, CENTROS CORTICALES DE LA OLFACIÓN. — Las cuatro raíces antes citadas alcanzan la corteza cerebral siguiendo cada una un trayecto especial. La *raíz blanca interna*, muy pequeña, se dirige, al principio, hacia atrás y adentro, hacia la línea media. Después, enderezándose, alcanza la cara interna del hemisferio, para terminar en la porción inicial de la circunvolución del cuerpo calloso, como también en un pequeño lóbulo, *encrucijada olfatoria* de Broca, que es común a la porción inicial de las dos circunvoluciones del cuerpo calloso y frontal interna. La *raíz blanca externa*, más voluminosa que la interna, se dirige

atrás y afuera, cruza la cisura de Silvio y desaparece en la parte anteroexterna de la circunvolución del hipocampo. La raíz media o gris se dirige hacia arriba y adentro y, penetrando en la comisura blanca anterior, de la cual constituye uno de los principales elementos, alcanza la línea media para entrecruzarse allí con la del lado opuesto. Sus fibras son, pues, de dos órdenes: 1.º, unas, *fibras en asa*, remontan hasta la cinta olfatoria y el bulbo olfatorio del lado opuesto (*fibras interlobulares*), asociando entre sí los bulbos; 2.º, otras, *fibras cruzadas*, van a terminar en la corteza del lóbulo temporal (*quiasma olfatorio*, comparable por su estructura al quiasma óptico). La raíz superior se curva hacia arriba, para terminar en las circunvoluciones de la parte postero-interna del lóbulo orbitario.

Resumiendo: existen tantos centros corticales como raíces; por consiguiente, cuatro, 1.º, un *centro callosa*, correspondiente a la raíz interna, 2.º, un *centro hipocámpico* correspondiente a la raíz externa, 3.º, un *centro temporal*, correspondiente a la raíz media; 4.º, un *centro orbitario*, que corresponde a la raíz superior.

Obsérvese que aquí, como en la vía óptica, se añaden a las *fibras olfatorias ascendentes*, que acabamos de describir *fibras olfatorias descendentes*, que, desde el cerebro, van al bulbo olfatorio y allí terminan en elegantes arborizaciones, de las cuales algunas se hallan situadas en el glomérulo. Duval ha emitido la hipótesis, muy sugestiva, de que estas fibras tenían bajo su dependencia los movimientos amiboideos de las dos arborizaciones terminales del glomérulo, y modificando, según las circunstancias, el contacto o la articulación de estas dos arborizaciones, regulaban el paso de las impresiones olfatorias de la neurona periférica a la neurona central. Estas fibras serían en este caso fibras nerviosas que terminarían en otras fibras nerviosas (*nerui nervorum*).

3.º **Trayecto, distribución.**—Al dejar el bulbo olfatorio, los filetes nerviosos atraviesan los agujeros de la lámina cribosa, y al llegar a la parte superior de las fosas nasales se dividen en dos grupos: 1.º, *ramos externos*, en número de doce a veinte, para las conchas superior y media; 2.º, *ramos internos*, en número de doce a dieciséis, formando un plexo en el tabique de las fosas nasales.

2. SEGUNDO PAR: NERVIIO ÓPTICO

1.º **Origen aparente.** Corresponde al ángulo anteroexterno del quiasma óptico.

2.º Origen real. — La vía óptica está exactamente constituida bajo el mismo tipo que la vía sensitiva general: posee una *neurona periférica* y una o dos *neuronas centrales*. La neurona periférica está representada por las células bipolares de la retina, cuya *prolongación periférica* entra en relación con los conos y los bastoncillos (simples células epiteliales), y cuya *prolongación central* viene a terminar alrededor de las células ganglionares de la retina, que, por este motivo, constituyen la neurona central. Por lo tanto, a partir de las células ganglionares, nos hallamos en pleno neuroeje.

a) *Trayecto infracerebral de las fibras ópticas* — Las fibras que constituyen el nervio óptico, que no son más que los cilindroes de las células ganglionares de la retina, se dividen, según su origen en tres grupos: 1.º, las *fibras directas* (luego veremos por qué), que toman su origen de la parte externa o temporal de la retina, 2.º las *fibras cruzadas*, que proceden de la parte interna o nasal; 3.º, las *fibras maculares*, que nacen en la región de la macula. Las *fibras directas* (constituyendo el *fascículo directo*) siguen el lado interno del nervio óptico, luego el lado externo hasta su terminación. Las *fibras cruzadas* (constituyendo el *fascículo cruzado*) siguen el lado interno del nervio óptico, pasan al quiasma, se entrecruzan sobre la línea media con las fibras similares del lado opuesto y penetran en seguida en la cintilla óptica. Las *fibras maculares* (constituyendo el *fascículo macular*) siguen primero el lado interno y luego el centro del nervio óptico. Al llegar al quiasma, van a parar. unas, a la cinta óptica correspondiente, las otras (después de entrecruzarse sobre la línea media), a la cinta del lado opuesto.

A estos elementos esenciales vienen a juntarse fibras dispuestas en asa o en herradura, que siguen el borde interno de las dos cintillas y el borde posterior del quiasma: su conjunto constituye la *comisura de Gudden*. Digamos, desde luego, que estas fibras son enteramente independientes o extrañas a la vía óptica (experimentación, anatomía patológica).

b) *Terminación posterior de la cintilla óptica* — Al llegar a la extremidad posterior del tálamo óptico, cada cintilla óptica se divide en dos ramas: una *interna*, que comprende exclusivamente las fibras comisurales de Gudden y termina en el cuerpo geniculado interno; otra *externa*, que contiene todas las fibras ópticas de la cintilla.

Estas últimas fibras, consideradas desde el punto de vista de su terminación se dividen en fibras largas y fibras cortas. Las *fibras largas* van directamente a la corteza cerebral (luego veremos cómo). Las

fibras cortas terminan cada una por arborización libre, unas en el pulvinar de. tálamo óptico, otras en el cuerpo geniculado externo y otras en el tubérculo cuadrigémino anterior.

c) *Formación del fascículo óptico intracerebral*. — Las células alrededor de las cuales terminan las fibras cortas (segunda neurona central) emiten nuevas fibras (cilindroejes) que, dirigiéndose afuera y abajo, alcanzan la región retrolenticular de la cápsula interna, en donde forman, con las fibras de proyección que allí se encuentran, una región de un aspecto especial, el campo de Wernicke (que presenta, en cortes frontales, la forma de cuerno de la abundancia, cuya base, dirigida hacia abajo, cubre, a modo de casquete, el cuerpo geniculado externo).

d) *Terminación del fascículo óptico intracerebral*. — Las fibras ópticas nuevas, procedentes del pulvinar, del cuerpo geniculado externo y del lóbulo cuadrigémino anterior, se juntan a las fibras largas y juntas constituyen lo que llamamos *fascículo óptico intracerebral*. Este fascículo, dirigiéndose hacia atrás, rodea la pared externa de la prolongación posterior del ventrículo lateral, describiendo una curva de concavidad interna, y tiene por dentro el tapétum, y por fuera el fascículo longitudinal inferior. A medida que adelanta, se despliega en forma de ancho abanico dispuesto en sentido sagital, cuyas fibras se dirigen a la cara interna del lóbulo occipital, unas pasando por encima del ventrículo y otras por debajo. Estas fibras van a terminar: 1.º, según MONAKOW, en las tres caras internas, externa e inferior del lóbulo occipital; 2.º, según HENSCHEN, en los dos labios de la cisura calcarina; 3.º, según VIALER (quien reduce el campo de Monakow, agrandando el de Henschen), en el cúneus, el lóbulo lingual y el lóbulo fusiforme (Nótese, en la vía óptica, la existencia de *fibras descendentes*, todavía poco conocidas, que nacen, unas de la corteza, otras del tálamo y del tubérculo cuadrigémino anterior, y se prolongan hasta la retina).

3.º *Trayecto, relaciones*. — Desde el quiasma, el nervio óptico se dirige oblicuamente hacia delante y afuera, alcanza el agujero óptico, penetra en la órbita y se distribuye por el globo ocular. Así pueden distinguirse en él cuatro porciones:

a) *Porción intracraneal*: un poco aplanada de arriba abajo, por arriba está en relación con el espacio cuadrilátero perforado, por abajo descansa sobre el canal óptico, cerca de la carótida interna de la arteria oftálmica.

b) *Porción intracanalicular*: el nervio se redondea; está situado por dentro de la arteria oftálmica y muy adherido a la pared del agujero óptico.

c) *Porción intraorbitaria*, al penetrar en la órbita, el nervio atraviesa un anillo fibroso, formado por los tendones de los cuatro músculos rectos. En su trayecto describe dos curvas: la primera es posterior y de concavidad inferior e interna; la segunda es anterior y de concavidad externa; así forma una S atáltica. Está en relación: 1.º, con la arteria oftálmica, que cruza su cara superior yendo de la pared externa de la órbita a su pared interna; 2.º, con el ganglio oftálmico, situado en su cara externa; 3.º, con los vasos y nervios ciliares; 4.º, con los vasos centrales de la retina.

d) *Porción intrabulbar*: esta en relación con la esclerótica y con la coroides; en este punto el nervio es un poco más estrecho, pero en seguida se extiende en sentido radiado, para continuarse con la retina.

4.º **Constitución anatómica.** El nervio óptico va envuelto por tres cubiertas concéntricas, en relación con las tres cubiertas del neuroje: 1.º, *vaina interna o pial*, prolongación de la piamadre; 2.º, *vaina externa o dural*, prolongación de la duramadre; 3.º, *vaina media o aracnoidea*, prolongación de la hoja visceral de la aracnoides. A nivel del punto de entrada del nervio en el globo ocular, estas tónicas se pierden en la esclerótica.

El nervio óptico presenta dos espacios linfáticos: 1.º, el *espacio subdural*, situado entre la vaina externa y la vaina media; 2.º, el *espacio subaracnoideo*, situado entre la vaina media y la vaina interna. Estos dos espacios (continuación de los del cerebro) terminan en fondo de saco cerca de la esclerótica.

En el interior del nervio se encuentran: la *arteria central de la retina*, una *vena* y *nervios vasomotores* (*nervio de Tiedemann*).

3. TERCER PAR: NERVIO MOTOR OCULAR COMÚN

El nervio motor ocular común inerva todos los músculos de la órbita, excepto el recto externo y el oblicuo mayor.

1.º **Origen aparente.** — En el lado interno del pedículo cerebral entre la protuberancia anular y el tubérculo mamilar (*surco del motor ocular común*), no existe fibra alguna cruzada que una los dos cordones nerviosos.

2.º Origen real. — El motor ocular común, *exclusivamente motor*, tiene su origen en un núcleo que le es propio, el *núcleo oculomotor común*.

a) *Núcleo de origen* — Sigue al núcleo del patético, y está situado, como este último, inmediatamente por fuera y debajo del acueducto de Silvio e inmediatamente por encima de la cinta longitudinal posterior. Es más bien una *columna* de un centímetro de largo que un *núcleo*, y va hasta el borde posterior del ventrículo medio. Representa, como el núcleo del patético, la base del cuerno anterior de la médula.

b) *Trayecto intrapeduncular del nervio* Las fibras radicales que emanan del citado núcleo se dirigen abajo y afuera describiendo una ligera curva de concavidad interna. Atraviesan sucesivamente la cinta longitudinal posterior, el núcleo rojo, el *locus niger*, y salen del eje cerebroespinal a nivel del borde interno del pedúnculo. Parece demostrado (GUDDEN, EDINGER, PERLIA, KÖLLIKER) que, entre las fibras radicales del nervio motor ocular común, existe cierto número que son *cruzadas*, es decir, que proceden, a través de la línea media, del núcleo del lado opuesto.

c) *División del núcleo en centros distintos.* — Los experimentos electrofisiológicos de HENSEN y VOLKERS, confirmados en parte por los casos clínicos, permiten dividir el núcleo motor ocular común en cuatro segmentos, imperando cada uno de ellos sobre un grupo muscular determinado. Estos son, marchando de atrás adelante: 1.º, el *centro del oblicuo menor*, 2.º, el *centro del recto inferior*; 3.º, el *centro del recto superior y del elevador del párpado superior*, 4.º, el *centro del recto interno*. HENSEN y VOLKERS han descrito además, delante del núcleo y en el borde posterior del tercer ventrículo, otros dos centros: el *centro fotomotor*, para las fibras musculares del iris, y el *centro acomodador*, para el músculo ciliar (véanse, sobre este punto, los esquemas más detallados de PERLIA, STARR y BERNHEIMER).

d) *Relaciones centrales* — El núcleo motor ocular común está en relación: 1.º, con el fascículo geniculado (*motilidad voluntaria*), que lo une a la corteza; 2.º, con la vía sensitiva central y también, por la cinta longitudinal posterior, con las vías auditiva y óptica (*motilidad refleja*), 3.º, con el cerebelo, por un fascículo descendente (KLIMOFF).

MARJAS DUVAL creía que el nervio motor ocular común recibía del núcleo del motor externo del lado opuesto un fascículo radicular que iba a enervar el músculo recto interno, y así, explicaba los movi-

mientos conjugados de los ojos en la visión binocular. Hoy se admite que para cada grupo muscular extrínseco del ojo existen dos clases de inervación. Además de los centros nucleares existen centros supra-nucleares encargados de la coordinación que representan los movimientos conjugados de los ojos: el centro de los movimientos laterales se halla muy cerca del núcleo del motor ocular externo; el de los movimientos verticales, en la región de los tubérculos cuadrigéminos, y el de la convergencia, cerca del núcleo de Perlia.

3.º **Trayecto periférico, relaciones.**—A su salida del pedúnculo se dirige oblicuamente hacia delante y afuera, debajo de la apófisis clinoides posterior, perfora la duramadre, se introduce en el seno cavernoso, atraviesa la hendidura esfenoidal y llega a la órbita. *Al desprenderse del neurorje* está situado entre la arteria cerebral posterior, que está por delante, y la arteria cerebelosa superior, que está por detrás. *En el seno cavernoso* ocupa su pared interna, por encima del patético y del oftálmico. *En la hendidura esfenoidal* ocupa la parte más ancha de esta hendidura y penetra en la órbita por el anillo de Zinn.

4.º **Anastomosis.**—En la pared del seno cavernoso, el motor ocular común tiene dos anastomosis: una, *sensitiva*, que viene del oftálmico; la otra, *organovegetativa*, que procede del plexo cavernoso.

5.º **Distribución.**—A su entrada en la órbita, el motor ocular común se divide en dos ramas:

- a) *Rama superior*: sigue la cara profunda del músculo recto superior y termina en este músculo y en el elevador del párpado.
- b) *Rama inferior*: se divide en tres ramos: uno, *interno*, para el músculo recto interno; otro, *inferior*, para el músculo recto inferior, y otro, *anterior*, muy largo, que va al oblicuo menor y da la raíz motriz del ganglio oftálmico.

4. CUARTO PAR: NERVIIO PATÉTICO

Es el más delgado y más largo de los nervios craneales, y está destinado al músculo oblicuo mayor.

1.º **Origen aparente.**—Tiene lugar, por algunos filetes, a cada lado del frenillo de la válvula de Veussens.

2.º Origen real. — Nervio *exclusivamente motor*, tiene su origen, como el precedente, en un núcleo que le es propio, el *núcleo del patético*

a) *Núcleo de origen.* Está situado en la calota o casquete peduncular inmediatamente por fuera de la línea media, algo por debajo y hacia fuera del acueducto de Silvio, inmediatamente encima de la cintilla longitudinal posterior. Deriva, como el núcleo oculomotor externo, de la base del cuerno anterior.

b) *Trayecto oculto del patético.* — Desde la parte anterior de la válvula de Vieussens, en donde nace, el patético se dirige transversalmente adentro, se entrecruza en la línea media con el del lado opuesto (siendo este entrecruzamiento *total*, la única vez que se verifica en el trayecto de los nervios craneales), sigue todavía durante algún tiempo su trayecto transversal, luego se dobla hacia delante para hacerse longitudinal, y, finalmente, se dobla de nuevo hacia dentro y algo abajo para alcanzar su núcleo. Sucesivamente transversal hacia fuera, longitudinal y transversal hacia dentro, el patético describe en su camino una especie de curva en herradura *doblándose dos veces* y presentando, por consiguiente, *tres porciones*.

c) *Relaciones centrales.* — El núcleo del patético, al igual que el núcleo motor externo, está en relación, 1.º, con el fascículo geniculado (*movimientos voluntarios*); 2.º, con la vía sensitiva central y también por medio de la cinta longitudinal posterior, con la vía óptica y la vía auditiva (*movimientos reflejos*).

3.º Trayecto periférico, relaciones. — Después de su origen, el nervio patético rodea la protuberancia, llega a la base del encéfalo, se dirige hacia delante, penetra en la parte externa del seno cavernoso y se introduce en la órbita por la hendidura esfenoidal (por encima del anillo de Zinn). *Al rodear la protuberancia*, el nervio va acompañado de la arteria cerebelosa superior. *En la base del encéfalo* se sitúa entre el motor ocular común, que está hacia dentro, y el trigémino, que está hacia fuera. *En el seno cavernoso* ocupa su pared externa, entre el motor ocular común, que está por encima y el oftálmico, que está por debajo. A medida que se aproxima a la órbita, el motor ocular común desciende y resulta inferior al patético. *En la hendidura esfenoidal* está por fuera del anillo de Zinn, en la parte superior e interna de esta hendidura

4.º Anastomosis. — Son dos:

a) *Con el simpático*, por el plexo cavernoso.

B) Con el *oftálmico* por dos ramas: una nace cerca del ganglio de Gasser, y se une al patético, del que se separa para seguir un trayecto recurrente (*nervio recurrente de ARNOLD*), la otra nace del oftálmico, un poco por delante de la precedente, y termina en el patético.

5.° **Distribución.** — Después de haber dado algunos filetes muy delgados a las meninges, el patético termina en el oblicuo mayor.

5 QUINTO PAR: NERVIO TRIGÉMINO

El trigémino es un nervio mixto, por sus *filetes sensitivos* inerva la cara y la mitad anterior de la cabeza; por sus *filetes motores* inerva los músculos masticadores.

1.° **Origen aparente.** — Se forma por *dos raíces* colocadas en la cara inferior de la protuberancia anular, en el punto en que ésta se confunde con los dos pedúnculos cerebelosos medios. Una, que es voluminosa, es *sensitiva*; la otra, que es pequeña y está situada por dentro de la primera, es *motriz* (*nervio masticador*).

2.° **Orígenes reales.** — A. TRIGÉMINO MOTOR O NERVIO MASTICADOR. — Procede de dos núcleos, uno principal y otro accesorio.

1.° **Núcleo principal.** — El núcleo principal o *núcleo masticador* es una pequeña columna gris, de 4 a 5 milímetros de altura, profundamente situada en la protuberancia, algo por encima del núcleo facial. Deriva, como este último, de la cabeza del cuerno anterior.

2.° **Núcleo accesorio.** — Está representado por una larga hilera de células nerviosas, las *células vesiculares*, que comienzan, abajo, a nivel del núcleo principal, y que se pueden seguir hacia arriba, hasta el lado interno del tubérculo cuadrigémino anterior.

3.° **Trayecto intraprotuberancial.** — Las fibras radiculares que emanan del núcleo accesorio descienden hacia el núcleo principal, formando un pequeño fascículo (de corte semicircular), que naturalmente se hace más grueso a medida que desciende y que constituye la *raíz superior* del nervio. Una vez llegada a la proximidad del núcleo masticador, esta raíz se dobla hacia delante y afuera, se junta a la *raíz inferior* salida del núcleo principal, y las dos raíces, así fusionadas, se dirigen hacia su punto de emergencia.

B. TRIGÉMINO SENSITIVO. — La gruesa raíz del trigémino, con su ganglio de Gasser, es la homóloga de una raíz posterior raquídea.

1.º *Núcleos terminales*. — Las fibras que lo constituyen terminan en tres núcleos: el núcleo gelatinoso, el núcleo medio y el núcleo del locus coeruleus. El *núcleo gelatinoso* o *núcleo inferior*, el más importante, está representado por una columna longitudinal de sustancia gris, continuación de la cabeza del cuerpo posterior, que se extiende del entrecruzamiento sensitivo hasta el tercio inferior de la protuberancia (nótese que es ella la que forma el cuerpo conciente de Rolando). El *núcleo medio* está situado encima y algo atrás del precedente. Su altura es solo de 3 a 4 milímetros. Es, según Hossel, el homólogo del núcleo de Burdach. El *núcleo del locus coeruleus* estaría en este caso representado por las células, muy ricas en granulaciones pigmentarias, que ocupan esta región de suelo del cuarto ventrículo.

2.º *Trayecto intraprotuberancial*. — Desde su punto de emergencia, las fibras consecutivas del trigémino sensitivo se dirigen oblicuamente atrás y adentro, y al llegar a la corteza, cada una de ellas se divide en dos ramas, una ascendente y otra descendente. Las *ramas descendentes* se dirigen hacia abajo, para terminar en el núcleo inferior o gelatinoso, constituyendo, en su conjunto, la *raíz inferior* (*raíz descendente* de algunos autores). Las *ramas ascendentes* se dirigen, en parte al núcleo medio, y constituyen la *raíz media*; en parte, al locus coeruleus (ya del lado correspondiente, ya del lado opuesto) constituyendo la *raíz superior* (*raíz ascendente* de algunos autores). Cada una de estas fibras termina aquí, como en otras partes, por una arborización libre, alrededor de las células de su núcleo.

C. *RELACIONES CENTRALES*. — a) *Trigémino sensitivo* existe en dos vías trigéminas sensitivas cruzadas que unen los núcleos sensitivos del V par al talamo óptico del lado opuesto. La primera, anterior (*vía central*), sube a la parte profunda y externa de la cinta de Reil media. La segunda (*vía dorsal*), situada por fuera de la cintilla longitudinal posterior, asciende a este fascículo y luego alcanza el talamo.

De estas dos vías parten numerosas colaterales para alcanzar los núcleos bulbares protuberanciales (*vías reflejas*).

b) *Trigémino motor*. El núcleo mastecador recibe fibras del fascículo geniculado, estas fibras son cruzadas.

3.º *Trayecto, relaciones*. — Desde la cara inferior de la protuberancia, estas dos raíces se dirigen hacia el peñasco. La *raíz gruesa* es aplanada y se dirige hacia delante y afuera, se introduce en un orificio formado por la meninges, por fuera de la apófisis clivoides posterior, y penetra en el *canum de Meckel*, que ocupa la parte inter-

na de la cara anterior del peñasco; desde este punto sus filetes se disocian (*plexo del trigémino*, y van a parar al ganglio de Gasser. La raíz menor bordea la parte interna de la precedente, y luego, a nivel del cávum de Meckel, gana la cara inferior del cávum, pasa por debajo del ganglio de Gasser y termina en una de sus ramas eferentes, el nervio maxilar inferior. Estas dos raíces están situadas primeramente entre el cerebelo y la cara posterior del peñasco. Cerca de éste reciben una vaina aracnoidea, que le acompaña hasta el ganglio de Gasser.

4.º Ganglio de Gasser.— Es una masa de substancia nerviosa, colocada en una depresión que ocupa la cara anterior del peñasco. Tiene la forma de una habichuela, cuyo hilio, mirando hacia arriba y atrás, recibe la raíz gruesa del trigémino, y de cuyo borde convexo, dirigido hacia abajo y adelante, salen tres ramas terminales. Va comprendido dentro de un desdoblamiento de la duramadre, estando más adherido a esta membrana por delante que por detrás. Por dentro está en relación con la carótida interna, que está colocada en el seno cavernoso. Recibe algunos filetes simpáticos procedentes del plexo cavernoso. Por su borde convexo emite tres ramas que salen divergentes: 1.º, el *nervio oftálmico*, 2.º, el *nervio maxilar superior*; 3.º el *nervio maxilar inferior*. A cada uno de estos nervios va anexo un ganglio: 1.º, el *ganglio oftálmico*; 2.º, el *ganglio esfenopalatino*, 3.º, el *ganglio ótico*.

A. Nervio oftálmico y ganglio oftálmico o ciliar

El nervio oftálmico llega a la órbita por la pared externa del seno cavernoso (véanse *Motor ocular común* y *Patético*).

A. Distribución.— Después de haber dado algunos ramos sensitivos para la duramadre (*nervio recurrente de Arnold*), se divide en tres ramas que penetran en la órbita por la hendidura esfenoidal. Estas ramas son las siguientes: 1.º, *nervio nasal*, 2.º, *nervio frontal*, 3.º, *nervio lagrimal*.

1.º **NERVIO NASAL.** Es el más interno de los tres, atraviesa la hendidura esfenoidal por la parte interna del anillo de Zinn, gana la pared interna de la órbita y sigue por ella hasta el agujero orbitario interno anterior, en donde se bifurca.

2) **Ramas colaterales.**— Son tres principales: 1.º, *raíz sensitiva* del ganglio oftálmico, filete largo y delgado, 2.º, *nervios ciliares largos*, que se juntan al grupo de los nervios ciliares salidos del gan-

glio oftálmico, 3^a, *filete esfenoidal de Luschka*, que se introduce en el agujero orbitario interno y posterior y termina en la mucosa del seno esfenoidal.

b) *Ramas terminales*. Son dos: 1^a, *nasal externa*, que sigue el borde inferior del oblicuo mayor y se distribuye por la región interiliar, las vías lagrimales y la piel de la nariz; 2^a, *nasal interna*, que atraviesa el conducto orbitario interno anterior, llega al cráneo y penetra en las fosas nasales por el agujero etmoidal; se distribuye en ellas por dos ramos, uno para el tabique y el otro para la pared externa de las fosas nasales y la piel de la nariz (*nervio nasobulbar*).

2^a NERVIOS FRONTALES. — Penetra en la órbita por la hendidura esfenoidal (pero por fuera del anillo de Zinn) y sigue la pared posterior de la órbita, por encima del elevador. A nivel del borde orbitario se divide en dos ramos: 1^a, *ramo frontal externo*, que atraviesa el agujero supraorbitario y se distribuye por la región frontal, el párpado superior y por el espesor del frontal (seno), 2^a, *ramo frontal interno*, que se distribuye por la pared interna de la región frontal, del párpado superior y la nariz.

3^a NERVIOS LAGRIMALES. — Penetra en la órbita por la parte más externa de la hendidura esfenoidal, sigue la pared externa de la órbita, se anastomosa con el patético y con un filete del nervio maxilar superior (*ramo orbitario*) y termina en la glándula lagrimal y en el párpado superior.

B **Ganglio oftálmico.** — Es un pequeño engrosamiento, de color gris amarillento, situado en la parte externa del nervio óptico. Tiene la forma cuadrilátera, con los ángulos un poco redondeados. Como todos los ganglios simpáticos, recibe ramos nerviosos (*ramas aferentes*, y emite otros (*ramas eferentes*).

1^a RAMAS AFERENTES. — Son tres: 1^a, *raíz sensitiva* viene del nervio nasal (también se le da el nombre de *raíz larga*), termina en el ganglio, en su ángulo posterosuperior, 2^a, *raíz motriz*, se desprende del ramo largo que el motor ocular común envía al músculo oblicuo menor, es corta (*raíz corta*) y voluminosa, penetra en el ganglio por su ángulo posteroinferior, 3^a, *raíz organovegetativa*: viene del plexo cavernoso y penetra en el ganglio por su borde posterior.

2^a RAMAS EFERENTES. — Forman los *nervios ciliares* (en número de ocho a diez). Estos nervios, a los cuales se adjuntan algunos ramos análogos procedentes del nervio nasal (*nervios ciliares largos*), se dirigen hacia el globo del ojo. Después de dar algunos filetes muy

finos a la vaina externa del nervio óptico y a la arteria oftálmica, perforan la esclerótica alrededor del nervio óptico. Corren entonces por entre la esclerótica y la coroides (en la lámina fusca); dan algunos filetes a estas dos membranas y llegan hasta la cara externa del músculo ciliar, formando un compactado plexo, de que salen numerosos filetes terminales para el músculo ciliar, para el iris y para la córnea.

**B. Nervio maxilar superior y ganglio esfenopalatino
o ganglio de Meckel**

El nervio maxilar superior nace en el borde convexo del ganglio de Gasser, entre el nervio oftálmico y el nervio maxilar inferior. Sale del cráneo por el agujero redondo mayor, atraviesa sucesivamente la fosa pterigomaxilar, el canal suborbitario, el conducto suborbitario y al llegar al agujero suborbitario, se divide en cierto número de ramas terminales.

A. Distribución.—En su trayecto da seis ramas colaterales.

1.º RAMO MENINGEO MEDIO. Nace en el trayecto intracanal del nervio y sigue la arteria meníngica media.

2.º RAMO ORBITARIO.—Nace en la fosa pterigomaxilar, penetra en la órbita por la hendidura esfenomaxilar, se divide en dos ramos, uno, llamado *ramo lacrimopalpebral*, del cual un filete se anastomosa con el nervio lagrimal y otro va a servir el párpado superior y el otro, llamado *ramo temporomaxilar* que atraviesa el conducto malar y se distribuye por la piel de las dos regiones temporal y malar.

3.º RAMOS DEL GANGLIO ESFENOPALATINO.—Son dos o tres, delgados y muy cortos, que nacen en la fosa pterigomaxilar y van a parar al ganglio esfenopalatino.

4.º RAMOS DENTARIOS POSTERIORES.—Son dos o tres que perforan la tuberosidad del maxilar superior y se distribuyen por los molares, por sus alveolos y por el seno maxilar.

5.º RAMO DENTARIO ANTERIOR. Corre a lo largo de un conducto excavado en el maxilar y se distribuye por los caninos y por los incisivos.

6.º RAMOS SUBORBITARIOS. Son las ramas terminales del nervio maxilar superior, que se distribuyen por el párpado inferior, el labio superior y la piel del ala de la nariz.

B. Ganglio esfenopalatino.—Es un pequeño engrosamiento de color gris roizo, situado por debajo del nervio maxilar superior en la fosa pterigomaxilar algo por fuera del agujero esfenopalatino.

1.º RAMAS AFERENTES. — Además de dos o tres pequeños filetes procedentes del nervio maxilar superior el ganglio de Meckel recibe otras tres ramas unidas entre sí formando un solo tronco, que es el *nervio vidiano*. Estas tres ramas son 1.ª, *ramo carotídeo*, procedente del plexo simpático que rodea la carótida interna; 2.ª, *ramo craneal*, que a su vez está formado por dos ramas, una, el *nervio petroso superficial mayor* (que nace del ganglio geniculado del facial y atraviesa el hiato de Falopio), y la otra, el *nervio petroso profundo mayor* (procedente del ramo de Jacobson ramo del glosofaríngeo). Estas dos ramas, que contienen las tres raíces del ganglio (simpática, matriz y sensitiva), se unen para formar el nervio vidiano, el cual sale del cráneo por el agujero rasgado anterior se introduce en el conducto vidiano y llega así hasta el ganglio de Meckel.

2.º RAMAS EFERENTES. — Se dividen en cuatro grupos, a saber:

α) *Ramo pterigopalatino (nervio de Bock)* — Atraviesa el conducto pterigopalatino para terminar en el *cávim faríngeo*.

β) *Filetes orbitarios*. — Penetran en la órbita por la hendidura esfenomaxilar y se anastomosan con los nervios destinados al globo ocular.

γ) *Nervio esfenopalatino*. Penetra en las fosas nasales por el agujero esfenopalatino y se divide en dos ramos, uno externo y otro interno. El *esfenopalatino externo* se distribuye por la mucosa de las conchas media y superior. El *esfenopalatino interno* recorre diagonalmente la pared interna de las fosas nasales, atraviesa el conducto palatino anterior y se pierde en la región retroalveolar.

δ) *Nervios palatinos*. — Son tres. 1.º, el *nervio palatino anterior*, que se introduce en el conducto palatino posterior y se distribuye por el velo del paladar, da el *nervio nasal posterior e inferior*, para el meato inferior; 2.º y 3.º, el *nervio palatino medio* y el *nervio palatino posterior*, que se introducen en los conductos palatinos accesorios y van a la mucosa del velo del paladar. El último de estos nervios inerva los músculos periestafilino interno y palatoestafilino; es de interés hacer notar que estos filetes proceden del facial (petroso superficial mayor).

C. Nervio maxilar inferior y ganglio ótico

El nervio maxilar inferior lo forman dos raíces, una *sensitiva*, que procede del ganglio de Gasser y la otra *matriz*, que no es otra que la raíz menor del trigémino.

A Distribucion.—Sale del cráneo por el agujero oval y se divide pronto en *siete ramas terminales*

1.^a NERVIOS TEMPORAL PROFUNDO MEDIO.—Se dirige primeramente hacia delante entre la pared superior de la fosa cigomática y el músculo pterigoideo externo, se endereza a nivel de la cresta esfenotemporal y se pierde en el músculo temporal

2.^a NERVIOS TEMPOROMASETERO CO.—Atraviesa la escotadura sigmoides y penetra en el músculo masetero. Da dos ramos, uno para la articulación temporomaxilar y otro para el músculo temporal (*temporal profundo anterior*).

3.^a NERVIOS TEMPOROBUCAL.—Penetra entre los dos fascículos del pterigoideo externo, se dirige hacia el buccinador y termina por filetes sensitivos para la piel de las mejillas y la mucosa bucal. Da filetes para el pterigoideo externo y un ramo para el temporal (*temporal profundo anterior*).

4.^a NERVIOS PTERIGOIDEO INTERNO.—Frecuentemente nace del ganglio ótico y termina en el pterigoideo interno.

5.^a NERVIOS AURICULOTEMPORAL.—Nace por dos raíces (entre las cuales pasa la arteria meníngea media), se dirige hacia el cuello del cóndilo maxilar inferior, lo rodea, se dobla hacia arriba y termina en la región temporal. Antes de llegar a. cóndilo da *ramos colaterales* para el ganglio ótico la arteria meníngea media y la articulación temporomaxilar. A nivel del cuello del cóndilo envía *ramos anastomóticos* al facial y ramas para la parótida, el conducto auditivo y el pabellón del oído. Termina (*ramos terminales*) en el plano superficial de la región temporal.

6.^a NERVIOS DENTARIO INFERIOR.—Se dirige hacia abajo y adelante entre los dos músculos pterigoideos y se introduce en el conducto dentario inferior. Antes de entrar en este conducto da un *ramo anastomótico* para el lingual y el *nervio milohioideo*; este último sigue el canal milohioideo para ir a inervar el músculo milohioideo y el vientre anterior del digástrico. Dentro del conducto da ramos a los molares y a sus alvéolos. Termina formando 1.º, el *nervio incisivo*, para los incisivos; 2.º, el *nervio mentoniano*, que sale del conducto óseo por el agujero mentoniano e inerva la piel del mentón.

7.^a NERVIOS LINGUAL.—Situado primeramente por delante del nervio dentario inferior, sigue un trayecto al principio descendente entre los dos músculos pterigoideos; después se hace horizontal, corre por debajo de la mucosa del suelo de la boca, colocado por fuera del hipogloso y por encima de la glándula submaxilar, y llega hasta la

punta de la lengua, despues de haber pasado (con el conducto de Wharton) por el intersticio que separa el músculo lingual del genio-gloso. Tiene *cuatro anastomosis* con el dentario inferior, con el facial (*cuerda del tímpano*), con el hipogloso y con el milohioideo. El nervio lingual se distribuye por la mucosa lingual en sus dos tercios anteriores, por el velo del paladar y dos pequeñas masas ganglionares: *ganglio submaxilar* y *ganglio sublingual*.

Ganglio submaxilar es un pequeño engrosamiento situado por encima de la glándula submaxilar; recibe (*ramos aferentes*) filetes del nervio lingual (llegan a este punto por la cuerda del tímpano) y del plexo carotideo. Sus *ramas eferentes* van a la glándula submaxilar.

Ganglio sublingual, es inconstante; recibe sus *filetes aferentes* de lingual y envía *filetes eferentes* a la glándula sublingual.

B Ganglio ótico. Es una pequeña masa nerviosa en forma ovoidea, situada por debajo del agujero oval y por dentro del nervio maxilar inferior.

1.º RAMAS AFERENTES. — Además de los ramos que le da el maxilar inferior recibe *tres raíces*: una *motriz*, que procede del facial por el nervio petroso superficial menor, la segunda, *sensitiva*, que viene del glosofaríngeo por el nervio petroso profundo menor (ramo de Jacobson), y la tercera *simpática*, que viene del plexo que rodea la arteria meníngea media.

2.º RAMAS EFERENTES. — Estas ramos se distribuyen por los músculos pterigoideo interno y periestafilino externo, por el músculo del martillo (*ganglio*) y por la mucosa de la caja del tímpano.

6 SEXTO PAR: NERVIIO MOTOR OCULAR EXTERNO

El nervio motor ocular externo es un nervio *exclusivamente motor*, destinado al músculo recto externo.

1. **Origen aparente.** — Nace en la cara anterior del bulbo, en el surco transversal que separa la protuberancia de la pirámide anterior.

2.º **Origen real.** Existen dos núcleos: un *núcleo principal* y otro *accesorio*.

NÚCLEO PRINCIPAL. — Corresponde a la eminencia teres. Este núcleo, que rodea por dentro la porción subependimaria del fascio, está situado algo por encima del ala blanca interna o núcleo del hipogloso.

es, como este último, un resto de la base de los cuernos anteriores. Su longitud es de 3 milímetros, su anchura de 2 milímetros en sentido transversal y de 1 3 milímetros en el sentido anteroposterior.

NÚCLEO ACCESORIO — Se encuentra situado delante del precedente, entre éste y el núcleo del facial.

a) *Trayecto intraprotuberancial* — Las fibras radiculares que nacen de él se dirigen hacia delante, describiendo una ligera curva de concavidad interna, y emergen del eje cerebroespinal, en el surco bulboprotuberancial, a nivel de la base de la pirámide anterior.

b) *Conexiones*. — El núcleo motor ocular externo está en conexión: 1.º, con la vía motriz voluntaria; 2.º, con la vía sensitiva central; 3.º, por medio de la cintilla longitudinal, con fibras ópticas y acústicas procedentes de los tubérculos cuadrigeminos; 4.º, por esta misma cintilla, con los núcleos de los restantes nervios oculomotores.

3.º **Trayecto periférico, relaciones**. — Desde el bulbo se dirige hacia delante y arriba hasta la apófisis clinoides posterior. En este punto perfora la duramadre, rodea el vértice del peñasco y penetra en el seno cavernoso, donde corre colocado por dentro del oftálmico y por fuera de la arteria carótida interna. Penetra en la órbita por la hendidura esfenoidal (por el anillo de Zinn). En su trayecto se anastomosa con el nervio oftálmico y con el gran simpático.

4.º **Distribución**. — El nervio motor ocular externo, después de un trayecto infraorbitario de un centímetro, va a la cara interna del músculo recto externo, en la que termina.

7. SÉPTIMO PAR: NERVIIO FACIAL

El nervio facial inerva todos los músculos cutáneos de la cabeza y del cuello, el músculo motor del estribo y algunos músculos del velo del paladar. Por una de sus ramas, la cuerda del timpano toma una parte activa en la secreción salival.

1.º **Origen aparente**. — Nace en la fosita lateral del bulbo por dos raíces. 1.º, la *raíz interna*, que es muy voluminosa, está situada por fuera del motor ocular externo y constituye el *facial propiamente dicho*. 2.º, la *raíz externa*, situada entre la raíz interna y el nervio auditivo, que constituye el *nervio intermediario de Wrisberg*.

2.º **Origen real**. — El facial y su raíz pequeña, el intermediario de Wrisberg, son dos nervios de diferente valor, siendo el primero

motor y el segundo sensitivo. Los estudiaremos, por lo tanto, separadamente.

a) *Facial propiamente dicho*. — El facial, *nervio exclusivamente motor*, tiene su origen en un núcleo de sustancia gris, el *núcleo del facial*, profundamente situado en la parte anteroexterna del casquete de la protuberancia, entre los fascículos radiculares del motor ocular externo, hacia dentro, y la raíz bulbar del trigémino, hacia fuera. Es una pequeña columna de sustancia gris dirigida en sentido longitudinal, que mide 3,5 milímetros de alto por 2 milímetros de diámetro. Está situada algo por encima del núcleo ambiguo y representa, como este último, la cabeza del cuerno anterior.

El trayecto intrabulbar del facial es muy caprichoso. Desde la fosita supraolivar, de donde emerge, el nervio facial se dirige primero atrás, hacia el suelo del cuarto ventrículo, al cual alcanza en la parte anterior de la *eminencia teres*. Se dirige luego transversalmente hacia dentro, después de arriba abajo a lo largo de la línea media, luego otra vez transversalmente hacia fuera, y, finalmente, se introduce profundamente para perderse en su núcleo. El facial se dobla en ángulo *cuatro veces*, y por este motivo ofrece *cinco porciones*, que se designan respectivamente con los nombres de primera, segunda, etc., partiendo de la fosita supraolivar: sus porciones cuarta y quinta constituyen lo que se llama su *rama de origen*; la primera y la segunda, su *rama de salida*, y, finalmente, su tercera porción, intermedia entre las dos ramas, ha recibido el nombre de *fascículo teres*. Se le da el nombre de *rodilla del facial* al codo que forma el fascículo teres para continuarse con la rama de salida (notese que la rodilla rodea la eminencia teres).

El núcleo de facial comprende grupos celulares morfológica y fisiológicamente distintos. Se describen: un *grupo posterior* (músculos superiores de la cara) o *núcleo del facial superior*, un *grupo interno*, que comprende dos partes, de las cuales la externa tiene bajo su dependencia los músculos del pabellón del oído y la interna está destinada a los músculos del estribo; por último, un *grupo anterior*, el más importante de los tres, y que inerva los músculos bucolabiales superiores (parte interna).

b) *Intermediario de Wrisberg*. El intermediario, con el *ganglio geniculado* que le va anexo, tiene la significación de una raíz posterior raquídea, y por este motivo el nervio facial se convierte en un verdadero *nervio mixto*. Las fibras del intermediario terminan en la parte superior del núcleo solitario, llamado también *núcleo gustativo de Nageotte*.

Como veremos a propósito del neumogástrico y el glosofaríngeo, ciertas fibras del intermediario se originan en un *núcleo organovegetativo* situado cerca del suelo del cuarto ventrículo. Es el *núcleo salival superior*. De allí sus fibras pasan a. facia., atraviesan el ganglio geniculado sin detenerse en él y se deslizan por la cuerda del tímpano v e. nervio lingua. para terminar en el ganglio inframaxilar. Así se explica la acción de la cuerda del tímpano sobre la secreción salival.

c) *Relaciones centrales*. — El *núcleo motor del facial* tiene las relaciones centrales de todo núcleo motor (fascículo geniculado, v a sensitiva central, cinilla longitudinal posterior, etc.). En cuanto a los *núcleos del intermediario*, tienen también iguales relaciones que los núcleos sensitivos del glosofaríngeo y del neumogástrico (vease mas adelante).

3.º **Trayecto periférico, relaciones.** — Desde la fosita lateral del bulbo, el facial se dirige hacia arriba, adelante y afuera, penetra en el conducto auditivo interno, lo recorre en toda su extensión y se introduce entonces en el acueducto de Falopio (vease OSTEOLOGIA). Sigue todas las inflexiones de este último conducto (es decir, sucesivamente horizontal en sentido anteroposterior, después horizontal hacia fuera y por último verticalmente descendente) y sale por el agujero estilomastoideo; va acompañado de la arteria estilomastoidea. A su salida del agujero estilomastoideo penetra en la parótida y se divide en dos ramas terminales.

El *intermediario de Wrisberg* sigue el mismo trayecto que el facial. Dentro del conducto auditivo interno está situado por debajo del facial y por encima del nervio auditivo. Dentro del acueducto de Falopio, a nivel de la primera acodadura del facial, penetra en el *ganglio geniculado*, pequeña masa piramidal cuya base cubre la acodadura del facial.

Es de notar que, dentro del conducto auditivo interno, el facial se anastomosa con el nervio auditivo.

4.º **Distribución.** — Del facial nacen: 1.º, *diez ramas colaterales*, cinco dentro del acueducto de Falopio y cinco fuera del peñasco; 2.º, *dos ramas terminales*.

A. **RAMAS COLATERALES INTRAPETROSAS.** — Son cinco.

1.º *Nervio petroso superficial mayor*. — Nace a nivel del ganglio geniculado, sale del peñasco por el hiato de Falopio y llega a su cara anterior, en este punto recibe el nervio petroso profundo mayor, pro-

cedente del glosofaríngeo, y forma uniéndose con el ramo carotídeo, el *nervio vidiano*, el cual, como hemos visto, termina en el ganglio de Meckel.

2.^a *Nervio petroso superficial menor*. — Nace un poco más abajo del ganglio geniculado y penetra en un pequeño canal especial que lo conduce a la cara anterior del peñasco; recibe el petroso profundo menor, procedente del glosofaríngeo, y termina en el ganglio ótico.

3.^a *Nervio del músculo del estribo*. — Nace en la tercera porción del acueducto de Falopio y penetra en el músculo del estribo (pirámide).

4.^a *Cuerda de tímpano*. — Este ramo, que nace al mismo nivel que el precedente, se introduce en un canal especial, dirigido hacia delante, que lo conduce al oído medio. Lo atraviesa aplicado contra la membrana del tímpano y sale del cráneo cerca de la espina del esfénoides, luego de recorrer un conducto situado por encima de la cisura de Glasser. Al salir del cráneo, la cuerda del tímpano se dirige hacia el nervio lingual y se confunde con él. Termina en la glándula submaxilar y en los dos tercios anteriores de la mucosa lingual.

5.^a *Ramo anastomótico del neumogástrico*. — Nacido a nivel de la cuerda del tímpano, se dirige hacia atrás, recorre un pequeño canal que lo conduce a la fosa yugular y termina en el ganglio superior del neumogástrico.

B. RAMAS COLATERALES EXTRAPETROSAS. — Son también cinco:

1.^a *Ramo anastomótico del glosofaríngeo*. — Rodea la vena yugular interna, formando la llamada *asa de Haller*, y penetra en el glosofaríngeo.

2.^a *Ramo auricular posterior*. — Se dirige hacia arriba, rodea el borde anterior de la apófisis mastoides y termina en los músculos auriculares superior y posterior y en el músculo occipital.

3.^a *Ramo del digástrico*. — Está destinado al vientre posterior del digástrico, penetrando en él cerca de su tercio posterior.

4.^a *Ramo del estilohioideo*. — Se dirige hacia abajo y adelante y termina, después de un trayecto muy corto, en el músculo estilohioideo.

5.^a *Ramo lingual*. — Se dirige hacia la base de la lengua y se distribuye por la mucosa lingual y por los dos músculos glosostafilino y estiloglososo.

C. RAMAS TERMINALES. — Son dos:

1.^a *Rama temporofacial*. — Se aloja en el espesor de la parótida; se dirige arriba hacia el cuello de cóndilo, recibe una doble anasto-

mosis del auriculotemporal y se divide en una serie de ramos: 1.º, *ramos temporales* (músculo auricular anterior); 2.º, *ramos frontales* (músculo frontal); 3.º, *ramos palpebrales* (orbicular de los párpados y superciliar); 4.º, *ramos nasales* (músculos de la nariz, canino y músculos cgomáticos); 5.º, *ramos bucales superiores* (buccinador y mitad superior del orbicular).

2.º *Rama cervicofacial*. — Situada también cerca de la parótida, se dirige hacia abajo y adelante, se anastomosa con el plexo cervical superficial y se divide en tres o cuatro ramos: 1.º, *ramos bucales inferiores* (mitad inferior del orbicular de los labios); 2.º, *ramos mentonianos* (músculos de la región mentoniana); 3.º, *ramos cervicales* (cutáneos del cuello).

8. OCTAVO PAR: NERVIOS AUDITIVOS

El nervio auditivo es un *nervio sensitivo* destinado a recoger y transmitir a los centros las impresiones acústicas.

1.º **Origen aparente.** — Sale del bulbo por dos raíces: una, *interna o vestibular*, nace en la fosita lateral por fuera del intermediario de Wrisberg; la otra, *externa o coclear*, sale del bulbo a nivel del pedúnculo cerebeloso medio, y en este punto parece continuarse con las estrías acústicas o barbas del cálamo.

2.º **Origen real.** La *rama coclear* o *nervio coclear*, que procede del caracol y cuyas células de origen constituyen el *ganglio espinal* de Corti, la *rama vestibular* o *nervio vestibular*, que procede del vestíbulo y de los canales semicirculares y cuyas células de origen constituyen el *ganglio de Scarpa*. El ganglio de Corti y el ganglio de Scarpa, aunque constituidos por células bipolares, tienen igual significación que los ganglios espinales. Las fibras que de ellos emanan son, por lo tanto, las homólogas de las raíces posteriores de los nervios raquídeos. El nervio coclear y el vestibular después de haberse juntado para formar el auditivo, se separan de nuevo al llegar al bulbo, para terminar de un modo especial cada uno. Nótese que, en la fosita lateral del bulbo, punto de emergencia del auditivo, el nervio vestibular es *anterior* y el coclear *posterior*.

A **NERVIO VESTIBULAR.** — Las fibras constitutivas del nervio vestibular, al penetrar en el bulbo a nivel de la fosita lateral, se dirigen oblicuamente atrás y adentro, hacia el suelo del cuarto ventrículo, y

un poco antes de alcanzarlo se divide cada una de ellas en dos ramas, una *ascendente* y otra *descendente*.

a) *Terminación de las fibras ascendentes*. — Las fibras ascendentes van a terminar cada una de ellas por una arborización libre, en tres núcleos. 1.º, el *núcleo dorsal interno*, situado en el suelo del cuarto ventrículo, en la región del ala blanca externa (células de pequeñas dimensiones); 2.º, el *núcleo dorsal externo* o *núcleo de Deiters*, por fuera y algo por delante del precedente inmediatamente debajo del ángulo externo del ventrículo (células multipolares y de grandes dimensiones); 3.º, el *núcleo de Bechterew*, pequeño grupo de células situado por fuera del precedente en pleno cuerpo retiforme. Todos estos núcleos parecen derivar de la base de los cuernos posteriores.

b) *Terminación de las fibras descendentes*. — Las fibras descendentes van a parar a una pequeña columna de sustancia gris, el *núcleo inferior del auditivo*, situado en el lado interno del cuerpo retiforme y que tiene igual significación que el fascículo solitario (deriva de la cabeza del cuerno posterior).

c) *Relaciones centrales*. — Las células que constituyen los núcleos terminales del nervio vestibular emiten nuevas fibras (cilindroejes) que, desde el punto de vista de su destino, se dividen en cuatro grupos. 1.º *fibras cerebrales*, que, después de entrecruzarse en la línea media van a la cinta de Reil o vía sensitiva central; 2.º, *fibras cerebelosas*, las cuales, desde los tres núcleos dorsales, suben por el pedúnculo cerebeloso inferior, para terminar en el núcleo del techo, el núcleo globoso y el embolo (*fascículo acústico cerebeloso*); 3.º, el *fascículo vestibuloespinal*, formado por fibras que descienden a la médula espinal para terminar en los núcleos de origen de los nervios motores raquídeos; 4.º, fibras que van al núcleo oculomotor externo.

B NERVIOS COCLEAR. — Las fibras constitutivas del nervio coclear terminan cada una de ellas, por arborización libre, en una masa de sustancia gris situada en el lado externo del cuerpo retiforme.

a) *Núcleos terminales*. — Las fibras nerviosas, al penetrar en esta masa de abajo arriba, la dividen en dos partes: una, anterior interna, constituye el *núcleo anterior del auditivo*; la otra, posterointerna, forma el *tubérculo acústico lateral*. Las células que constituyen estos núcleos, alrededor de las cuales tienen su terminación las fibras del nervio coclear, emiten naturalmente nuevas fibras (cilindroejes) que, continuando las precedentes, se van hasta el cerebro. Estas fibras siguen un trayecto diferente, según procedan del núcleo anterior o del tubérculo acústico lateral.

b) *Fibras eferentes del núcleo anterior* — Las fibras eferentes del núcleo anterior, que siguen en la protuberancia un trayecto transversal, se dirigen al principio hacia la oliva superior, después hacia la línea media y, finalmente, hacia la oliva del lado opuesto. Estas fibras forman en conjunto una larga cinta que va desde un núcleo anterior al otro, es el *cuerpo trapezoide* (completamente oculto en el hombre y superficial en algunos animales de protuberancia poco desarrollada, como los monos inferiores, por ejemplo). A nivel de las olivas, las fibras del cuerpo trapezoide quedan interrumpidas o bien no hacen más que atravesarlas.

c) *Fibras eferentes del tubérculo acústico lateral*. — Estas fibras rodean de fuera adentro el cuerpo testiforme y llegan de este modo hasta el suelo del cuarto ventrículo, en donde forman las *barbas del calamus* o *estrias acústicas*. Son de dos clases: unas, *fibras directas*, descienden hacia la oliva superior del lado correspondiente, las otras, *fibras cruzadas*, se entrecruzan en la línea media, para descender hacia la oliva superior del lado opuesto.

d) *Formación del fascículo acústico central* — En resumen, las fibras eferentes de los dos núcleos terminales del nervio coclear, tanto si siguen la vía dorsal (*estrias acústicas*) como la vía ventral (*cuerpo trapezoide*), van a parar todas, directamente o después de entrecruzarse, a la oliva superior. Estas fibras, al salir de la oliva, se enderezan hacia arriba, para seguir, a partir de este punto, un trayecto longitudinal y ascendente: a su conjunto es a lo que se da el nombre de *fascículo acústico central*. Observemos desde luego que, de todas las fibras que lo constituyen, unas son *directas* y las otras son *cruzadas*.

e) *Trayecto ulterior del fascículo acústico central* — El fascículo acústico central, una vez constituido, va a colocarse en el lado externo de la cinta de Reil: forma la parte externa de esta cinta. Oculto al principio en el espesor de la protuberancia, se escapa luego de ella por el surco lateral del istmo y, con el nombre de *fascículo lateral del istmo*, se remonta al lado externo de los tubérculos cuadrigéminos. Una vez allí, las fibras se dividen en dos grupos: *fibras cortas* y *fibras largas*. Las *fibras cortas*, torciendo hacia dentro, van a terminar en gran parte en el tubérculo cuadrigémico posterior, y a gunas solamente en el tubérculo cuadrigémico anterior. Estas fibras corresponden (por la cinta longitudinal posterior) a la motilidad refleja. Las *fibras largas* se introducen en los brazos de los tubérculos cuadrigéminos, llegan así a la cara inferior del tálamo óptico, pasan entonces al segmento posterior de la capsula interna (en donde se mezclan con

el fascículo sensitivo) y, al llegar al centro oval, tuercen hacia fuera, para terminal en la parte media de la primera circunvolución temporal, que por ese motivo viene a ser el *centro acústico cortical o esfera auditiva*. (Nótese que a las fibras ascendentes del fascículo central se añaden cierto número de *fibras descendentes*, cuya significación permanece todavía muy obscura.)

3.º Trayecto y relaciones.— El nervio auditivo se dirige hacia el conducto auditivo interno y lo recorre en toda su extensión acompañado del facial y del intermediario de Wrisberg. Dentro del conducto auditivo interno se dispone en forma de canal, de concavidad superior, en la que se alojan el nervio de Wrisberg y el facial. Se anastomosa con este último nervio.

4.º Distribución.— Al llegar al fondo del conducto auditivo interno, el nervio auditivo se divide en dos ramas: 1.ª, una *anterior o coclear*, para el caracol; 2.ª, la otra *posterior o vestibular*, para el vestíbulo y los conductos semicirculares (véase más adelante, *Órganos de los sentidos*).

9 NOVENO PAR: NERVO GLOsofaríngeo

El glossofaríngeo es un *nervio mixto*, pues contiene *fibras motoras* (faringe y vello del paladar) y *fibras sensitivas* (impresiones gustativas).

1.º Origen aparente.— Tiene su origen en el surco lateral del bulbo, por debajo del nervio auditivo y por encima del neumogástrico.

2.º Orígenes reales. a) *Fibras sensitivas.*— Llegadas al ángulo externo de la sustancia reticulada gris, las fibras empiezan a descender en sentido vertical y contribuyen a formar un fascículo conocido con el nombre de *fascículo solitario*. Longitudinal, este fascículo desciende hasta el entrecruzamiento sensitivo. Describe una curva concava hacia fuera. Su volumen aumenta de abajo arriba, engrosado por las ramas descendentes del intermediario de Wrisberg y de IX y X pares. Cierta número de células nerviosas forman un núcleo, el *núcleo solitario*, situado en el lado interno del fascículo (representa la sustancia gelatinosa de la medula). Las fibras del glossofaríngeo terminan en la parte media y superior de este núcleo, denominado *núcleo gustativo de Nageotte*.

b) *Fibras motoras.* Se originan en el denominado *núcleo ambiguo*. Este núcleo, de 18 a 20 milímetros de altura, comienza en la parte superior del entrecruzamiento sensitivo y termina a la altura de la oliva bulbar. Representa la cabeza del asta anterior.

c) *Núcleo orgánico.*—Este núcleo corresponde al ala gris. Las fibras que de él parten atraviesan el ganglio de Andersch sin detenerse en él y terminan en el ganglio ótico de Arnold después de haber pasado por el nervio de Jacobson y el nervio petroso menor.

d) *Relaciones centrales.* Las células motoras están en relación con el fascículo geniculado (vía piramidal). El núcleo gustativo es el punto de partida de la vía sensitiva central del IX par. Esta vía sigue el trayecto de la vía dorsal del trigémino (véase pág. 451).

3.º *Trayecto y relaciones.*—El glosofaríngeo se dirige primeramente hacia fuera y adelante, hasta el agujero rasgado posterior, que lo atraviesa acompañado del neumogástrico y del espinal (está separado de estos nervios por fibrocartilago).

Una vez fuera del cráneo describe una curva de concavidad anterior para ganar la base de la lengua, pasa primeramente entre la yugular interna, que está por fuera, y la carótida interna, que está por dentro, rodea la arteria, sigue la pared lateral de la faringe y se distribuye por la mucosa de la base de la lengua.

En este trayecto presenta dos ganglios: el ganglio de Andersch, alojado en el agujero rasgado posterior (fosita petrosa) y el ganglio de Ehrenratier, situado un poco por debajo de él. Estos ganglios tienen la significación de un ganglio espinal. El glosofaríngeo se anastomosa a su salida del cráneo, con el neumogástrico, el facial y el gran simpático.

4.º *Distribución.*—El glosofaríngeo da *ramas colaterales* y *ramas terminales*:

4 RAMAS COLATERALES En número de seis.

1.ª *Nervio de Jacobson.* Nace en la parte externa del ganglio de Andersch y, siguiendo el conducto timpánico, llega hasta el promontorio del oído medio, en donde da los ramos siguientes: 1.º, dos ramos posteriores, para las ventanas redonda y oval; 2.º, dos ramos anteriores, uno para la mucosa de la trompa de Eustaquio, y el otro, anastomótico, para el plexo carotideo (*sístele carotíco-timpánico*), 3.º, dos ramos superiores, uno es el nervio petroso profundo mayor, que se une al petroso superficial mayor para formar el nervio viano

(para el ganglio esfenopalatino), y el otro, *petroso profundo mayor*, que se une al petroso superficial menor para formar el ganglio otico.

2.^a *Nervio del estilofaríngeo*. — Se distribuye por el músculo estilofaríngeo por uno o dos filetes. Frecuentemente envía un ramo al vientre posterior del digástrico

3.^a *Nervio del estilológico y del glosostafilino*. — Este nervio se une a menudo al ramo lingua del facial para innervar estos músculos

4.^a *Ramos carotídeos* — Forman el *plexo carotídeo* con fibras procedentes del neumogástrico y del simpático.

5.^a *Ramos faríngeos* — Se distribuyen por los músculos la mucosa y los vasos de la faringe

6.^a *Ramos tonsilares* — Para la amígdala

B RAMAS TERMINALES — Se distribuyen, formando un plexo (*plexo lingual*), por la porción de la mucosa lingual situada por detrás de la V lingual. Alrededor del agujero ciego, los dos glosofaríngeos se unen en la línea media (*plexo del agujero ciego*).

10. DÉCIMO PAR: NERVIO NEUMOGÁSTRICO

El nervio neumogástrico o *nervio vago* envía filetes nerviosos a los órganos del cuello, del tórax y del abdomen.

Es un nervio mixto, y también elemento importante del parasimpático craneal

1.^o *Origen aparente*. Nace en el surco lateral del bulbo por encima del espinal

2.^o *Orígenes reales*. a) *Fibras sensitivas* Las fibras sensitivas se comportan como las del glosofaríngeo, es decir, después de haber atravesado la raíz descendente del trigémino y la sustancia gelatinosa, se encorvan y se vuelven descendentes, forman parte del fascículo solitario y terminan en el núcleo solitario por debajo del glosofaríngeo

b) *Fibras motoras*. — Comportanse asimismo como las fibras motoras del IX par y terminan en la parte inferior del núcleo ambiguo, por encima del espinal y por debajo del glosofaríngeo

c) *Núcleo orgánico*. — Ciertas fibras del X par parten de un núcleo denominado *núcleo dorsal del neumogástrico*, que corresponde al ala gris del suelo del IV ventrículo. De allí las fibras pasan al tronco del vago y sin interrumpirse descienden para alcanzar los aparatos respiratorio, digestivo y circulatorio (fibras parasimpáticas)

d) *Relaciones centrales* — Las mismas que el IX par.

3.º **Trayecto y relaciones.** El nervio neumogástrico se extiende desde el bulbo hasta más abajo del diafragma. *Dentro del craneo* está al lado del glosofaríngeo y pasa, como éste, por el agujero rasgado posterior. *En el cuello* camina por el ángulo diedro que forman juntándose, la carótida y la vena yugular, y se encuentra dentro de la misma vaina; el gran simpático está situado detrás y un poco por fuera de él. *Dentro del tórax: hacia la derecha*, después de haber cruzado la cara anterior de la arteria subclavia, cruza el bronquio derecho y sigue la cara posterior del esófago; *hacia la izquierda* cruza la cara del cayado de la aorta, el bronquio izquierdo, y se coloca en la cara anterior del esófago. *Dentro del abdomen*, los nervios neumogástricos están colocados por delante y por detrás del esófago como en el tórax.

Al principio de su trayecto, el nervio neumogástrico presenta dos ganglios, que tienen la significación de ganglios espinales: 1.º, el *ganglio yugular*, situado en el agujero rasgado posterior, 2.º, el *ganglio plexiforme*, más voluminoso, situado debajo del precedente, en la parte superior de la región cervical.

En su trayecto, el neumogástrico se anastomosa con el espinal, el glosofaríngeo, el facial (*ramo de la fosa yugular*), el hipogloso mayor (a nivel del ganglio plexiforme) el gran simpático y los primeros nervios raquídeos.

4.º **Distribución.** — El neumogástrico emite gran número de ramas, que se dividen en *rama intracraneal*, *ramas cervicales*, *ramas torácicas* y *ramas abdominales*.

A **RAMA INTRACRANEAL** — Es única y forma el nervio *meníngeo posterior* (para la duramadre).

B **RAMAS CERVICALES.** Son cuatro.

1.ª **Nervio faríngeo.** Se une a los ramos procedentes del glosofaríngeo, para formar el *plexo faríngeo*; emite ramos musculares y ramos mucosos.

2.ª **Ramos cardíacos cervicales.** Se unen a los otros ramos cardíacos procedentes del neumogástrico y van a terminar en el *plexo cardíaco* (véase Corazón).

3.ª **Nervio laríngeo superior.** — Nacido un poco por debajo del ganglio plexiforme, cruza el paquete vasculonervioso del cuello y se dirige hacia la faringe. Al llegar a. hioides, se divide en dos ramos.

1.º, uno, inferior, descendente (*nervio laríngeo externo*), atraviesa el músculo cricotiroides, a. que inerva, y se distribuye por la mucosa subglótica de la laringe; inerva el constrictor inferior de la faringe. 2.º, el otro es superior, horizontal, perfora la membrana tirohioidea y se distribuye por la mucosa de la epiglotis (sus *filetes anteriores*), por la mucosa de los repliegues aritenopiglóticos (sus *filetes medios*) y por la parte de la mucosa faríngea que cubre la cara posterior de la laringe (sus *filetes posteriores*). Entre estos últimos filetes hay uno que viene a anastomosarse con un filete ascendente del recurrente formando así el *asa de Galeno*.

4.º *Nervio laríngeo inferior o recurrente*. — Este nervio nace a la entrada del tórax y desde este punto sube hacia la laringe.

a) A la *derecha* empieza en la cara anterior de la arteria subclavia, rodea esta arteria, sigue el borde derecho del esófago y llega a la cara posterior de la laringe.

b) A la *izquierda* rodea el cayado de la aorta y sube hacia la laringe, siguiendo el surco que forman, al adosarse entre sí, la cara anterior del esófago y la cara posterior de la traquea. En este trayecto el nervio recurrente da *ramos cardíacos medios*, que contribuyen a formar el plexo cardíaco, *ramos esofágicos*, *traqueales* y *faríngeos*. Llegado a la laringe, el nervio recurrente se distribuye por los músculos cricotiroides posterior, cricotiroides lateral, aritenoides y tiroaritenoides, y envía al nervio laríngeo superior una *anastomosis (asa de Galeno)*.

C. RAMAS TORÁCICAS — Estas forman tres grupos

1.º *Ramos cardíacos inferiores*. — Se unen con los demás ramos procedentes de, neumogástrico o del recurrente, para formar el *plexo cardíaco* (véase *Corazón*)

2.º *Ramos pulmonares*. — Forman el *plexo pulmonar*, del cual parten gran número de ramos para la traquea, el esófago, el pericardio y el pulmón

3.º *Ramos esofágicos inferiores* — Forman un plexo para la parte inferior del esófago.

D. RAMAS ABDOMINALES — Los dos neumogástricos se comportan diferentemente. El *izquierdo* envía filetes a la cara anterior del estómago y al hilio del hígado. El *derecho* cubre con sus ramificaciones la cara posterior del estómago y termina en el ángulo interno del ganglio semilunar (*asa de Wisberg*),

II. UNDÉCIMO PAR NERVIOS ESPINAL

El espinal es un *nervio exclusivamente motor*; termina en el esternocleidomastoideo y en el trapecio por una de sus ramas, la otra termina en el neumogástrico

1° Origen aparente. — Nace a la vez del bulbo y de la medula. *En el bulbo* sale del surco lateral, por debajo del neumogástrico. *En la medula* se origina por numerosas ramas que nacen del cordón lateral, un poco por delante de la línea de emergencia de las raíces posteriores y se extienden hacia abajo hasta el IV par raquídeo

2° Orígenes reales. — El espinal, como ya hemos visto, nace a la vez de la medula y del bulbo por numerosos filetes radiculares escalonados de abajo arriba en un altura de 4 ó 5 centímetros. Examinemos sucesivamente los *filetes medulares* y los *filetes bulbares*.

a) *Espinal medular.* Desde el cordón lateral del cual emergen, los filetes radiculares del espinal se dirigen oblicuamente de fuera adentro y de atrás adelante, alcanzan la parte posterolateral del cuerno anterior y terminan en este cuerno, parte en el núcleo lateral, parte en el núcleo anterolateral, siendo digno de notarse que mientras ciertas fibras se dirigen horizontalmente hacia su núcleo de origen, otras son sucesivamente horizontales luego descendentes, y luego otra vez horizontales (fibras en Z). De esto resulta que, para estas últimas fibras, el núcleo de origen medular se halla situado en un plano inferior al del punto de emergencia.

b) *Espinal bulbar.* — Desde el surco lateral del bulbo de donde emergen, los filetes radiculares del espinal bulbar se dirigen hacia dentro, para terminar, después de un cortísimo trayecto, en la parte inferior del núcleo ambiguo, el cual, como sabemos, representa en este punto la cabeza del cuerno anterior

3° Trayecto y relaciones. — Todos los filetes del espinal se reúnen para formar un tronco único. *En su porción raquídea* corre entre el ligamento dentado y las raíces posteriores. *En el cráneo* pasa por detrás del neumogástrico y sale, con éste y con el glossofaríngeo, por el agujero rasgado posterior. En su trayecto se anastomosa con las raíces posteriores de los dos primeros nervios cervicales; no se trata, pues, de anastomosis verdaderas, porque el espinal restituye siem-

pre estos filetes sensitivos a los fascículos que representan las raíces posteriores

4.ª Distribución. Después de su salida del cráneo, el espinal se divide en *dos ramas*, interna y externa

a) *Rama interna* - La rama interna se junta con el neumogástrico, la fisiología demuestra que va a parar al músculo constrictor superior de la faringe, a los músculos intrínsecos de la laringe (excepto el cricotiroides) y al plexo cardiaco.

b) *Rama externa* La rama externa pasa por debajo de los músculos digástricos y estilogloideos, rodea la carótida, costea la cara profunda del esternomastoideo, al que inerva (anastomosis con el plexo cervical superficial), y atraviesa en seguida el triángulo supraclavicular, para ir a terminar en el trapecio.

12. DUODÉCIMO PAR: NERVIIO HIPOGLOSO MAYOR

El hipogloso mayor es un *nervio motor* que está destinado a los músculos de la lengua y a los de la región infrahiodea.

1.º Origen aparente.— Nace de la cara anterior del bulbo en el surco preolivar por diez o quince filetes

2.º Orígenes reales. El hipogloso nervio exclusivamente motor, termina en dos núcleos de origen.

1.º Núcleos de origen En número de dos, se dividen en núcleo principal y núcleo accesorio. El *núcleo principal* está situado en el suelo del cuarto ventrículo, inmediatamente por fuera de la línea media. Es en *ala blanca interna*, y representa en este punto la base de los cuernos anteriores (tiene 18 milímetros de alto y es de forma triangular en su corte frontal). El *núcleo accesorio* se halla situado delante y algo hacia fuera del núcleo principal, precisamente al lado del núcleo ambiguo. Este núcleo representa, como este último la cabeza del cuerno anterior

2.º Trayecto intrabulbar del hipogloso — Las fibras radicales procedentes del *núcleo principal* (cilindroeje de las células de este núcleo) se dirigen oblicuamente hacia delante y afuera, describiendo en conjunto una ligera curva de concavidad externa. Atraviesan primero la formación reticular, pasan luego entre la oliva y la paraoliva interna y salen de bulbo a nivel del surco preolivar. En cuanto a las

fibras que proceden del *núcleo accesorio*, se dirigen primero hacia atrás, después tuercen hacia dentro y adelante, para reunirse con las fibras del núcleo principal y mezclarse con ellas.

3.º *Relaciones centrales.* El núcleo principal (probablemente también el núcleo accesorio del hipogloso mayor) está en relación: 1.º, con el fascículo o mano o piramidal del lado opuesto (*movimientos voluntarios*); 2.º, con la vía sensitiva central, y principalmente con las fibras que proceden de los tres núcleos neumogástrico, glosofaríngeo y trigémino (*movimientos reflejos*); 3.º, con fibras de la cinta longitudinal posterior (*movimientos reflejos*); 4.º, con el núcleo del lado opuesto, por fibras que se entrecruzan en el rafe medio (asociación funcional de los dos núcleos derecho e izquierdo en ciertos movimientos de la lengua).

4.º *Trayecto y relaciones.* — Desde el surco preolivar, el hipogloso mayor se dirige hacia el agujero condileo anterior, lo atraviesa para llegar al cuello y se dirige hacia la base de la lengua.

a) *Dentro del cráneo,* el hipogloso mayor corre entre la arteria vertebral por de ante y la arteria cerebelosa posterior e inferior por detrás, en seguida se introduce en el agujero condileo anterior.

b) *Por debajo del cráneo,* para llegar a la base de la lengua, describe una prolongada curva de concavidad superior. A su salida del agujero condileo, rodea el ganglio plexiforme del neumogástrico, pasa entre la yugular y la carótida interna, atraviesa los músculos estilóeos y cruza la cara externa de la carótida externa para llegar al borde anterior del esternomastoideo. En este punto, a nivel del asta mayor del hioides, se hace *horizontal* y se aplica junto al constrictor medio de la faringe; está separado de la piel por la glándula submaxilar, la aponeurosis cervical superficial y el cutáneo. En su trayecto horizontal, el hipogloso mayor va acompañado de la arteria lingual, pero, a nivel del hiogloso, la arteria pasa por detrás del músculo y el nervio por delante. Al llegar al borde posterior del milohioideo, el nervio pasa por dentro de este músculo y se distribuye por la cara inferior de la lengua. En el curso de su trayecto, el nervio hipogloso mayor se anastomosa con el gran simpático, el neumogástrico, los dos primeros nervios cervicales y el lingual.

4.º *Distribución.* — El hipogloso mayor da *ramos colaterales* y *ramos terminales*.

A. RAMOS COLATERALES. — Son seis:

1.º *Ramo meningeo.* — Es un fiecte sensitivo para el occipital y el seno occipital posterior

2.º *Ramo vascular* — Va destinado a la vena yugular interna.

3.º *Ramo descendente* — Nace del hipogloso en el momento en que este nervio cruza la carótida externa; se anastomosa con un ramo descendente del plexo cervical (*asa del hipogloso*) y se distribuye por los músculos infrahióideos

4.º, 5.º y 6.º *Ramos del tirohioideo, de los músculos hiogloso, esulogloso y genihioideo*

B RAMOS TERMINALES — El hipogloso mayor penetra en el espesor de la lengua y se distribuye por los diferentes fascículos musculares de este órgano.

CAPITULO III

NERVIOS RAQUIDEOS

Los nervios raquídeos son los que nacen de la medula espinal y atraviesan los agujeros de conjunción para encaminarse a los territorios orgánicos a que están destinados. Son todos ellos *nervios mixtos*, a la vez sensitivos y motores. Nacen por medio de dos raíces.

1.º Raíces raquídeas. — Unas son *anteriores* y otras *posteriores*.

A ASPECTO EXTERIOR. — El aspecto varia según las regiones: el *tipo cervical superior* es en forma de *abanico de rejilla* (fibras delgadas); el *tipo cervical inferior* en *abanico compacto* (fibras voluminosas); el *tipo dorsal* está representado por un *cordón delgado y frágil*; el *tipo lumbosacro*, por un *cordón aplanado*.

B ANASTOMOSIS. — Las raíces anteriores son siempre independientes de las posteriores. Pero existen anastomosis, ya sea entre los filetes constitutivos de una misma raíz, ya sea entre los filetes de dos raíces diferentes.

C DIRECCIÓN, LONGITUD, TRAYECTO. — La falta de correspondencia entre la longitud de la medula y la del conducto vertebral determina variaciones de dirección. Raíces de C¹ ascendentes. Raíces de C² y C³ horizontales. Raíces de los nervios siguientes: descendentes. Prescindiendo del punto de emergencia, los tres primeros pares se encuentran situados a un nivel más alto que el agujero de conjunción en que convergen. La distancia de separación aumenta de arriba abajo. Conócese con el nombre de *cola de caballo* el conjunto de raíces que nacen del ensanchamiento lumbar y del cono terminal de la medula de (L² a S⁴). Estas raíces, muy largas, descienden verticalmente.

D. RELACIONES. En cada raíz se distinguen dos segmentos, uno contenido en el saco dural y otro por fuera de él. En el interior del saco, las raíces anteriores se dirigen hacia atrás, las posteriores hacia delante. Se interpone entre ellas el ligamento dentado y van acompañadas de las arterias radicales. Atraviesan la funda lúral

por orificios separados. *Por fuera del saco* cada raíz, envuelta en una vaina dural, se dirige hacia el agujero de *conjunción*. La raíz posterior se fusiona con la anterior después de pasado el ganglio raquídeo. Llámase *nervio radicular de Nageotte* la porción de las raíces comprendida entre el punto en que llegan a la duramadre y aquel en que la raíz posterior alcanza su ganglio. En su trayecto este nervio radicular se halla en relación con un divertículo de los espacios subaracnoides, y por lo tanto está bañado por el líquido cefalorraquídeo. La vaina meníngea termina adosándose al neurilema del nervio. Los plexos venosos circulan alrededor del nervio, las venas más voluminosas están situadas por delante y arriba. Existe un plexo periganglionar.

Relaciones entre las apófisis espinosas y las raíces — Según CHAPULT, en la región cervical hay que añadir uno al número de una apófisis determinada por el tacto para tener el número de las raíces que nacen a su nivel: en la región dorsal superior hay que añadir dos, desde la 6.^a espinosa dorsal hasta la 11.^a hay que añadir tres: la porción inferior de la 11.^a dorsal corresponde a los tres últimos pares lumbares. La 12.^a apófisis dorsal y el espacio subyacente corresponde a los pares sacros.

2.º **Nervio raquídeo.** — a) *Relaciones* — Llamado también *nervio radicular*, no es liso (aspecto plexiforme). Salvo en la región sacra, la división en ramas terminales se efectúa por fuera del agujero de conjunción. Sensiblemente horizontal en su breve trayecto, está rodeado por la duramadre y se halla en relación con las venas y arteria espinales, filetes simpáticos, el nervio senovertebral y el tejido celular epidural. A su salida del agujero de conjunción atraviesa un opérculo fibroso que se continúa con el periostio y en el que se desvanece la vaina dural.

b) *Colaterales* — Proporciona, 1.º El *nervio senovertebral*, formado por dos ramos, uno espinal y otro simpático, nace por fuera del opérculo fibroso y luego lo perfora y se distribuye por las vértebras, el periostio, los ligamentos y la duramadre. 2.º El *ramo comunicante*, que se dirige al ganglio simpático más próximo.

c) *Terminación*. — El nervio raquídeo se divide en dos ramas de volumen desigual. 1.º una *rama posterior o dorsal*, relativamente pequeña destinada a los músculos y tegumentos de la región dorsal del cuerpo, 2.º una *rama anterior o ventral*, mucho más voluminosa, que se dirige hacia delante y se distribuye por los músculos y tegumentos de la región ventral de cuerpo. Esta última entra en la cons-

tación de los plexos nerviosos (cervical, lumbosacro), donde emergen los troncos periféricos.

3.ª Sistematización de las raíces y los nervios raquídeos.

a) *A las raíces anteriores* pasan: las *fibras motrices* y *fibras simpáticas preganglionares* (van de las raíces al ganglio por el ramo comunicante blanco).

b) *A las raíces posteriores* pasan las fibras de la sensibilidad y algunas fibras simpáticas.

c) *Al nervio raquídeo* pasan: 1.º, las fibras motoras; 2.º, las fibras sensitivas, 3.º, fibras simpáticas, unas motrices y otras sensitivas.

4.º **Territorios radicales.** Lo mismo que los troncos nerviosos periféricos, las raíces tienen su territorio propio. A causa del entrelazamiento de las raíces en el plexo, cada raíz disemina sus fibras por varios nervios de lo que resulta que la topografía de los territorios radicales motores y sensitivos es completamente distinta de la de los troncos nerviosos. Estos territorios tienen forma de bandas dirigidas paralelamente al eje del miembro: en el tronco forman zonas en cintura que se extienden de la línea media anterior a la posterior.

Se distinguen territorios radicales sensitivos y territorios radicales motores (Para más detalles véase el *Tratado de Anatomía Humana* de TESTUT y LATARJET, tomo III).

5.º **División.**—Lo mismo que las vértebras, los nervios raquídeos se dividen en cinco grupos: 1.º, nervios cervicales; 2.º, nervios dorsales; 3.º, nervios lumbares; 4.º, nervios sacros; 5.º, nervio coccigeo.

Estudiaremos primero las ramas posteriores de estos nervios raquídeos y luego las ramas anteriores.

SECCION PRIMERA

RAMAS POSTERIORES DE LOS NERVIOS RAQUÍDEOS

Son treinta y uno a cada lado y se separan de los troncos raquídeos inmediatamente por fuera de los agujeros de conjunción. Se dirigen hacia atrás y dan *ramos cutáneos* y *ramos musculares*. Su modo de distribución es variable, según las regiones. Los dividiremos, como los pares raquídeos mismos, en cinco grupos.

1.º Ramas posteriores de los nervios cervicales. Son ocho las dos primeras presentan una disposición algo especial.

a) *La rama posterior del primer nervio cervical* sale del conducto vertebral entre el occipital y el atlas, y se reparte por los músculos que forman un triángulo en lo profundo de la nuca (rectos posteriores mayor y menor de la cabeza, oblicuo mayor y oblicuo menor)

β) *La rama posterior del segundo nervio cervical o gran nervio occipital de Arnold* sale del conducto vertebral entre el atlas y el axis. Se dirige hacia arriba después de haber cruzado el borde superior del músculo oblicuo mayor y termina en la piel de la región occipital. De paso emite los siguientes ramos: 1.º, un ramo que se anastomosa con la rama posterior del primer nervio cervical (*plexo cervical posterior*), 2.º, ramos para los músculos de la nuca, que no reciben ningún filete del nervio precedente (complexo, esplenio, trapecio)

γ) *Las ramas superiores de los cuatro últimos nervios dorsales* se distribuyen, primero por algunos músculos de la nuca (complexo, transverso espinoso, espinoso) y, después por la piel de la nuca

2.º Ramas posteriores de los nervios dorsales. En número de doce, se distinguen en tres grupos:

a) *La rama posterior del primer nervio dorsal* se conduce exactamente como las ramas cervicales que la preceden, ramos musculares y ramos cutáneos.

β) *Las ramas posteriores de los siete nervios dorsales siguientes* se dividen cada una en dos ramos: 1.º, *ramo externo o muscular*, para el dorsal largo y el sacrolumbar; 2.º, *ramo interno o musculocutáneo*, para el transverso espinoso y la piel.

γ) *Las ramas superiores de los cuatro últimos nervios dorsales* no tienen ramo interno; se conducen como las ramas lumbares

3.º Ramas posteriores de los nervios lumbares. — En número de cinco, dan, primero filetes a los músculos espinales, y después terminan por dos filetes cutáneos, uno *interno* y otro *externo*.

4.º Ramas posteriores de los nervios sacros. — En número de cinco, salen por los agujeros sacros posteriores y forman arcos de los cuales parten: 1.º, *filetes motores*, para los músculos espinales, 2.º, *filetes sensitivos*, para la piel de la región sacrococcígea

5.º Rama posterior del nervio coccígeo. — Extremadamente delgada, termina en la piel que cubre el cóccix.

SECCION II

RAMAS ANTERIORES DE LOS NERVIOS RAQUIDEOS

Las ramas anteriores de los nervios raquídeos, contrariamente a las ramas posteriores, que caminan aisladas, se unen entre sí según las mas diversas modalidades para formar plexos. Describiremos: 1.º el *plexo cervical*; 2.º, el *plexo braquial*; 3.º, los *nervios intercostales*; 4.º, el *plexo lumbar*; 5.º, el *plexo sacro*; 6.º, el *plexo sacro-coccígeo*.

ARTÍCULO PRIMERO

PLEXO CERVICAL

El plexo cervical está formado por las ramas anteriores de los *cuatro primeros nervios cervicales*, forman tres arcos nerviosos, que se superponen en sentido vertical, por delante de las apófisis transversas de las tres primeras vértebras cervicales. Este plexo está situado entre los músculos prevertebrales, por dentro y las inserciones del esplenio y del anguiar, por fuera; el paquete vascular nervioso del cuello está colorado un poco por fuera del mismo. Se *anastomosa* con el hipogloso mayor, el neumogástrico y el simpático. Las ramas del plexo cervical están divididas en *ramas superficiales* y *ramas profundas*.

1.º **Ramas superficiales (plexo cervical superficial).** — Estas ramas son cinco, que reunidas primeramente en la parte media del borde del esternomastoideo, se separan luego, siguiendo direcciones divergentes:

1.ª *Rama cervical transversa* — Sigue una dirección transversa por la cara externa del esternocleidomastoideo, en donde da un ramo a la yugular externa; termina en la piel de las regiones supra e infra hioideas.

2.ª *Rama auricular* — Se dirige oblicuamente hacia arriba y adelante en sentido del pabellón del oído, da ramos a la parótida, a la piel de las dos regiones parótida y maseterica, se anastomosa con el facial y termina en el pabellón del oído.

3.^a *Rama mastoidea*. — Sigue la misma dirección que la rama auricular, pero en un plano un poco más posterior, termina en la piel de las regiones mastoidea y occipital

4.^a *Rama supraclavicular*. — Se dirige oblicuamente hacia abajo y adelante, y se extiende, por numerosas ramificaciones por la piel de la región subclavicular

5.^a *Rama supraacromial*. — Descendente como la supraclavicular, se dirige oblicuamente hacia abajo y afuera, para terminar en la piel que cubre el mufion del hombro.

2.^o **Ramas profundas (plexo cervical profundo).** — Son diez, repartidas en cuatro grupos: *ramas ascendentes, descendentes, internas y externas*

A. RAMAS ASCENDENTES. — Son dos:

1.^a El *nervio del recto lateral*, para el recto lateral de la cabeza

2.^a El *nervio del recto anterior menor*, para el recto anterior menor de la cabeza.

B. RAMAS DESCENDENTES. — Son también dos.

1.^a *Rama descendente interna*. — Se anastomosa con la descendente del hipogloso (*asa del hipogloso*) y contribuye a innervar los músculos de la región infrahioidea (excepto el tiróideo).

2.^a *Nervio frénico*. — Este nervio está destinado al diafragma. Nace del IV par cervical y recibe, a poco de su origen, dos ramos adicionales que proceden uno del III par cervical y el otro del V par

a) *Trayecto y relaciones*. — El nervio frénico atraviesa sucesivamente el cuello y el tórax, siguiendo un trayecto casi rectilíneo. En el cuello desciende por la cara anterior del escaleno anterior, cubierto por el esternomastoideo, el neumogástrico y el gran simpático están por delante de él; la arteria cervical transversa lo cruza pasando por delante. Dentro del tórax, el frénico derecho pasa entre la arteria y la vena subclavia a la entrada del tórax; luego, sigue la parte externa de la vena cava superior, en relación con la aurícula derecha, y termina en el diafragma, en su trayecto, el frénico derecho es casi rectilíneo. El frénico izquierdo entra en el tórax por detrás del tronco venoso braquiocéfálico, siguiendo la arteria subclavia; desciende por el lado izquierdo del cayado de la aorta y sigue el borde izquierdo del corazón para llegar al diafragma, describiendo así una curva de concavidad interna, su trayecto es más largo que el del frénico derecho. Es de notar que los dos nervios frénicos van acompañados en su trayecto por la arteria diafragmática superior, rama de la mamaria interna

β) *Anastomosis*. — El nervio frénico se anastomosa con el nervio del subclavio, el gran simpático y algunas veces con el hipogloso.

γ) *Distribución*. — En su trayecto, el nervio frénico da algunos ramos a la pleura y al pericardio. Termina en el diafragma por ramos, que son: unos, *superiores*, para la cara superior del músculo, y otros, *inferiores*, para la cara inferior. Estos últimos envían también algunos filamentos a las cápsulas suprarrenales, al peritoneo y al plexo solar.

C. RAMAS INTERNAS. Son dos:

1.ª *Nervio del recto anterior*, para el músculo recto anterior de la cabeza.

2.ª *Nervio del largo del cuello*, para el músculo largo del cuello.

D. RAMAS EXTERNAS. — Son cuatro. Las dos primeras, *nervio del esternocleidomastoideo* y *nervio del trapecio* (para los dos músculos esternocleidomastoideo y trapecio), se anastomosan con el espinal que inerva también estos músculos. Las otras dos, *nervio del angular* y *nervio del romboides*, van destinadas al angular y al romboides.

ARTÍCULO II

PLEXO BRAQUIAL

El plexo braquial está formado por el entrelazamiento de las ramas anteriores de los cuatro últimos pares cervicales y el primer par dorsal. Estos troncos nerviosos forman dos X separadas por una Y invertida.

1.º *Modo de constitución*. — C⁵ se une con C⁶ para formar el *tronco primario superior*. D¹ se une con C⁸ para formar el *tronco primario inferior*. C⁷ que ha permanecido independiente, forma el *tronco primario medio*. Cada uno de estos troncos primarios se divide en dos ramas, anterior y posterior. Las ramas posteriores de los tres troncos se reúnen en un solo cordón, el *tronco secundario posterior* o *tronco radiocircunflejo*.

La rama anterior del tronco primario inferior se une con la rama anterior del tronco primario medio, de lo que resulta el *tronco secundario anteroexterno*, que dará la raíz externa del mediano y el musculocutáneo. Finalmente, la rama anterior del tronco primario inferior, que ha permanecido independiente, forma el *tronco secundario anterointerno*, que dará la raíz interna del mediano, el cubital, el braquial cutáneo interno y su accesorio (*tronco mediocúbito cutáneo*).

2.º Situación, forma.— Situado en el hueco supraclavicular y en la parte alta del hueco axilar, tiene la forma de un reloj de arena (dos triángulos opuestos por sus vértices). La base del triángulo superior corresponde a la columna cervical; la base del triángulo inferior, que es más pequeño, corresponde a la axila.

3.º Relaciones.— a) *En el cuello* el plexo atraviesa el hueco supraclavicular. Hacia atrás, junto a la columna, la arteria vertebral pasa por delante de C⁵, C⁶ y C⁷. El ganglio estrellado encubre C⁸ y D¹ y se aplica sobre la primera costilla. Más lejos el plexo pasa por el desfilaro interescalénico junto con la arteria subclavia, situada por debajo de él y en un plano más anterior.

b) *En la axila* el plexo pasa por debajo de la clavícula y alcanza el ápice del hueco axilar. El tronco anteroexterno es superficial; el tronco anterointerno, más profundo; entrambos cubren el tronco posterior. La arteria y la vena subclavias se encuentran situadas por dentro de los troncos nerviosos. En la axila los troncos quedan siempre por fuera de la arteria axilar; luego se extienden en superficie; el tronco mediomusculocutáneo se halla por fuera de la arteria; el tronco mediocubito-cutáneo está por dentro, entre la arteria y la vena; el tronco radiocircunflejo se encuentra por fuera de los vasos.

4.º Anastomosis.— Con C⁴ del plexo cervical; con D¹, con el simpático por varios ramos. Desde el punto de vista de su distribución el plexo braquial emite *dieciocho ramas*, entre *colaterales* y *terminales*:

1. RAMAS COLATERALES

Son doce, que se distinguen por su dirección en *anteriores* y *posteriores*.

A. Ramas anteriores.— Son tres:

1.º *Nervio del subclavio.*— Está destinado al músculo subclavio y envía un ramo anastomótico al nervio frénico.

2.º *Nervio del pectoral mayor.*— Pasa por delante de la arteria axilar y se distribuye por la cara inferior del músculo.

3.º *Nervio del pectoral menor.*— Nace, como el precedente, a nivel de la clavícula, pasa por detrás de la arteria subclavia y se anastomosa con el nervio del pectoral mayor, formando un arco nervioso, del cual emergen filetes para los pectorales mayor y menor.

B. Ramas posteriores.— Son nueve:

1.^a *Nervio supraescapular.*— Nace por encima de la clavícula, se dirige hacia abajo y atrás, pasa por la escotadura coracoidea y se distribuye por los dos músculos que se extienden sobre la cara posterior del omóplato, el supraespinoso (*nervio del supraespinoso*) y el infraespinoso (*nervio del infraespinoso*).

2.^a *Nervio del angular.*— Nacida por encima de la clavícula, corre sobre el escaleno posterior, lo rodea y termina en el angular del omóplato.

3.^a *Nervio del romboides* — Nace entre el escaleno posterior y el angular y va a perderse en el músculo romboides.

4.^a *Nervio superior del subescapular.* Nace por encima de la clavícula y va a parar a la parte superior de este músculo.

5.^a *Nervio inferior del subescapular.* — Nace en el hueco de la axila y se dirige hacia la parte inferior del músculo subescapular.

6.^a *Nervio del dorsal ancho* — Nace en la axila, se dirige hacia abajo y se pierde en la cara profunda del dorsal ancho.

7.^a *Nervio del redondo mayor* — Lleva la misma dirección que el precedente y termina en el redondo mayor.

8.^a *Nervio del serrato mayor* — Nacido por encima de la clavícula, sigue un trayecto descendente sobre la cara externa del serrato mayor (en el ángulo que forma este músculo con el subescapular) y se distribuye por este último músculo.

9.^a *Accesorio del braquial cutáneo interno* — Nacido por encima de la clavícula, atraviesa el hueco axilar, perfora la aponeurosis braquial, se adosa al braquial cutáneo interno y desciende hasta el codo. Inerva la piel de la cara interna del brazo.

2. RAMAS TERMINALES

Las ramas terminales del plexo braquial son seis, circunflejo, braquial cutáneo interno, musculocutáneo, mediano, cubital y radial. Los seis nacen en la axila: el *mediano* nace por dos raíces, una externa, de la que se desprende el *musculocutáneo*, y la otra interna, en la que se originan el *braquial cutáneo interno* y el *cubital*; el *radial* y el *circunflejo* nacen en un tronco común, situado por detrás de las raíces del mediano.

1.^o *Nervio circunflejo.*— Nacido de un tronco común con el radial, el circunflejo se dirige oblicuamente hacia abajo y afuera

Salte del hueso axilar por el cuadrilátero humerotricipital y pasa entre el deltoides y el humero describiendo una curva alrededor del cuello quirúrgico de ese hueso, en compañía de la arteria circunfleja posterior. El circunflejo emite dos ramas colaterales: una *motriz*, para el redondo menor (*nervio del redondo menor*), otra *sensitiva*, para la piel del mufón del hombro. Termina en el deltoides (*nervio del deltoides*).

2.º Nervio braquial cutáneo interno. — Nacido de la raíz externa del mediano, el braquial cutáneo interno pasa de la parte posterior de la arteria axilar a la parte anterior, camina junto a la vena basilica y, al hacerse superficial, desciende hacia el codo. Inerva la piel de la región interna del brazo, y luego, al llegar al codo, termina por dos ramas (anterior y posterior) en la piel de la mitad interna del antebrazo.

3.º Nervio musculocutáneo. — Es un nervio mixto que nace de la raíz externa del mediano.

A TRAYECTO. — Se dirige hacia abajo y afuera; después de haber cruzado el tendón del subescapular, perfora el músculo coracobraquial se coloca en segunda entre el bíceps y el braquial anterior, atraviesa diagonalmente la cara anterior del brazo, perfora la aponeurosis en la parte externa de la flexura de codo y termina en el antebrazo.

B DISTRIBUCIÓN. — El nervio musculocutáneo emite *ramas colaterales y ramas terminales*.

a) *Ramas colaterales* — Las ramas colaterales están destinadas a los tres músculos anteriores del brazo: *coracobraquial*, *bíceps* y *braquial anterior*, cada uno de estos músculos recibe dos filetes. Existen también los filetes óseos, articulares y vasculares, estos últimos para la arteria humeral. El musculocutáneo se anastomosa a menudo con el mediano.

b) *Ramas terminales* — Cuando se hace superficial, el nervio musculocutáneo se divide en dos ramas (una anterior y otra posterior), que terminan en la piel de la mitad externa del antebrazo (y a menudo también en la piel que cubre el primer metacarpiano).

4.º Nervio mediano. — El nervio mediano nace del plexo braquial por dos raíces, interna y externa, que se unen después de un trayecto más o menos largo.

A. TRAYECTO Y RELACIONES. — El nervio mediano atraviesa sucesivamente cada uno de los segmentos del miembro superior. *En la axila* está situado por detrás del pectoral mayor, un poco por fuera de la arteria axilar y por dentro del coracobraquial. Por fuera se encuentra el nervio musculocutáneo; por dentro, el cubital, el braquial cutáneo interno y su accesorio. *En el brazo* sigue el borde interno del bíceps correspondiendo directamente por dentro a la aponeurosis braquial. La arteria humeral, situada primeramente por dentro del nervio, lo cruza en X y se coloca por fuera del mismo en el codo. *En el antebrazo* se sitúa entre los dos fascículos del pronador redondo cruza la arteria cubital y ocupa en el antebrazo la parte media de la cara anterior del mismo, después de haber perforado las inserciones del flexor superficial de los dedos. Se coloca en el intersticio que separa el músculo flexor común de los dedos del flexor largo del pulgar (nótese la *arteria del nervio mediano*). *En la muñeca*, el mediano situado por fuera del paquete de los tendones del flexor superficial corre entre los tendones de los palmares mayor y menor, pasa luego por debajo del ligamento anular del carpo y entra en la mano por dentro de la eminencia tenar.

B. DISTRIBUCIÓN. El mediano da *ramas colaterales* y *ramas terminales*.

RAMAS COLATERALES. — Son cinco:

- 1.ª *Rama articular* — En general es doble: para la articulación del codo.
- 2.ª *Nervio superior del pronador redondo.* Nace del nervio mediano por encima de la epitróclea y se pierde en la cara profunda del músculo pronador redondo.
- 3.ª *Ramos musculares* — Se distinguen dos grupos: 1.º unos son *anteriores*, destinados a los músculos del pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y flexor común superficial de los dedos. 2.º, los otros son *posteriores*, destinados al flexor largo del pulgar, como también a los dos fascículos externos del flexor profundo de los dedos.
- 4.ª *Nervio interóseo* — Sigue la arteria interósea a lo largo del ligamento interóseo, inerva el pronador cuadrado y termina en la articulación radiocarpiana.
- 5.ª *Nervio palmar cutáneo* — Nace del nervio algo por encima de la muñeca y se distribuye por la piel de la eminencia tenar y de la región palmar media.

RAMAS TERMINALES — Nacen todas por detrás del ligamento anular del carpo y se hacen divergentes; son seis.

Primera rama — Muy corta, se divide en varios filetes para todos los músculos de la eminencia tenar excepto el aductor del pulgar.

Segunda rama. — Forma la *colateral palmar externa del pulgar*.

Tercera rama. — Forma la *colateral palmar interna del pulgar*.

Cuarta rama — Inerva e. primer lumbrical y se divide en dos ramos: el *colateral palmar externo del índice* y el *colateral dorsal externo del mismo dedo*.

Quinta rama — Inerva el segundo lumbrical y da dos ramos, destinados: e. externo al lado interno del índice, y el interno al lado externo del medio. Cada uno de ellos se divide en *colateral palmar* y *colateral dorsal*, algo por encima de la raíz de los dedos.

Sexta rama — Se dirige hacia el tercer espacio interóseo, se anastomosa con el cubital y emite e. *colateral palmar interno del medio* y el *colateral palmar externo del anular*, cada uno de ellos se divide, como los ramos precedentes, en *colateral palmar* y *colateral dorsal*.

5° Nervio cubital. — El cubital nace de la *raíz interna del mediano*, por debajo del braquial cutáneo interno.

A TRAYECTO Y RELACIONES. — El nervio cubital se extiende desde la axila a la extremidad de los dedos. *En la axila* camina entre la arteria axilar, que está por fuera, y a vena axilar, que está por dentro. Está muy cerca del mediano. Cruza por detrás los músculos de la pared posterior del hueco axilar. *En el brazo* el nervio cubital está situado al principio muy cerca de la arteria humeral, un poco por detrás de ella, pero luego el nervio se separa cada vez más de la arteria, pasa al compartimiento del tríceps, situado en su parte más interna, y a nivel de la epitróclea los dos órganos están separados por todo el espesor del hueso. *En el codo* el nervio está colocado en el canal epitrocleeoolecraniano y penetra en el antebrazo, atravesando los dos fascículos del cubital anterior. *En el antebrazo* descansa sucesivamente sobre el flexor profundo de los dedos y el pronador cuadrado; está cubierto por el músculo cubital anterior en la parte superior del antebrazo, y más abajo ocupa la parte externa de su tendón y se hace superficial. La arteria cubital, que se junta con el nervio a pocos centímetros por debajo del codo, se halla a su lado externo. *En la muñeca* el nervio cubital, siempre superficial, pasa por delante del ligamento anular en un canal que forman el hueso gancho y el pisiforme.

B. DISTRIBUCIÓN — El nervio cubital da *ramas colaterales* y *ramas terminales*

a) *Ramas colaterales*. — Nacen a lo largo del antebrazo y pueden dividirse en *cuatro grupos*

1.º *Ramos articulares*, para la articulación del codo

2.º *Ramos musculares*, para la cubital anterior y los dos fascículos internos del flexor profundo

3.º *Ramo anastomótico* para el braquial cutáneo interno.

4.º *Nervio cutáneo dorsal de la mano*: nacido por encima de la muñeca, rodea el cúbito, pasa sobre la cara dorsal del antebrazo y se divide en *tres ramos*, que forman los colaterales dorsales del meñique, del anular y de la mitad externa del medio.

b) *Ramas terminales* — Al llegar a la muñeca el nervio cubital termina por dos ramas, una superficial y la otra profunda.

a) La *rama superficial* da un ramo al cutáneo palmar, después se divide en *dos ramas secundarias*: una forma el *colateral palmar interno del meñique*, y la otra el *colateral palmar externo del meñique* y el *colateral palmar interno del anular*

β) La *rama profunda* empieza en la pared interna del pisiforme, atraviesa las inserciones superiores del flexor corto y del meñique y llega a los planos profundos: aquí describe una curva de concavidad dirigida hacia fuera y arriba, y termina en el aductor del pulgar. Por su *convexidad* esta rama emite únicamente algunos filetes articulares para la muñeca. Por su *convexidad* emite ramas para los tres músculos de la eminencia hipotenar, los dos últimos lumbricales, los interóseos palmares y dorsales, el aductor del pulgar y el fascículo interno del flexor corto.

6.º Nervio radial. El nervio radial nace del plexo braquial por un tronco común con el circunflejo

A. TRAYECTO Y RELACIONES. — En la axila está profundamente situado por detrás del mediano y de sus raíces. A poco de su origen se dirige hacia abajo, afuera y atrás; sale de la axila por el ángulo posteroexterno de ésta. En el brazo recorre el canal de torsión del húmero, acompañado de la arteria humeral profunda; se encuentra en la cara posterior del brazo en un canal que forma el vasto interno y el vasto externo, al llegar a la cara anterior del brazo se sitúa en un nuevo canal, formado, por dentro, por el braquial anterior, y por fuera, por el supinador largo y el primer radial externo.

b. DISTRIBUCIÓN — El nervio radial da *ramas colaterales y ramas terminales*.

RAMAS COLATERALES — Son ocho

1.^a *Ramo cutáneo interno* para la piel de la región postero-interna del brazo

2.^a *Ramos de la porción larga del tríceps.*

3.^a *Nervio del vasto interno* (uno de los filetes acompaña al nervio cubital)

4.^a *Nervio del vasto externo y del anconeo*

5.^a *Ramo cutáneo externo* para la piel de la región posteroexterna del brazo.

6.^a *Ramo del braquial anterior* (es muy delgado y no es constante).

7.^a *Nervio del supinador largo*, que nace del radial en la cara anterior del brazo y va a parar a la cara profunda del supinador largo.

8.^a *Nervio del primer radial externo*

RAMAS TERMINALES — Un poco por debajo de la interlínea articular del codo, el nervio radial se divide en dos ramas:

1.^a *Rama posterior o muscular* — Esta da a poco de su origen un filete al segundo radial (*nervio del segundo radial*). Perfora en seguida el supinador corto, al que inerva; dirigiéndose hacia abajo, afuera y atrás, rodea el cuello del radio. Al llegar a la cara posterior del antebrazo, inerva todos los músculos superficiales (excepto el anconeo) y profundos de esta región.

2.^a *Rama anterior o cutánea* — Desciende del antebrazo, por dentro del supinador largo y de los radiales y por fuera de la arteria radial. En el tercio inferior del antebrazo rodea el radio, se hace superficial y se divide en tres ramos, que dan los *arco primeros colaterales dorsales* de los dedos.

C. NERVIOS COLATERALES DE LOS DEDOS. — Los *colaterales palmares* proceden de mediano y del cubital; los *colaterales dorsales*, del cubital y del radial. Hoy se admite que únicamente el pulgar y el meñique tienen su cara dorsal inervada por un colateral dorsal, que procede del radial para el pulgar y del cubital para el meñique. En los tres dedos medios, el colateral dorsal se detiene en la segunda falange; el resto de la cara dorsal de estos dedos es inervado por el colateral palmar correspondiente.

ARTÍCULO III

NERVIOS INTERCOSTALES

1.º Origen. — Los nervios intercostales representan las ramas anteriores de los doce nervios dorsales.

2.º Caracteres comunes. Cada nervio intercostal se anastomosa, a poco de su origen, con cada uno de los ganglios torácicos colocados por encima o por debajo de él (*ramos comunicantes*).

Se dirige en seguida hacia fuera en sentido del espacio intercostal correspondiente. Camina por el canal de la costilla debajo de la vena y de la arteria, entre los dos músculos intercostales.

En el curso de su trayecto, cada nervio intercostal da: 1.º, *ramos musculares*, para los músculos intercostales, el triangular del esternón y el diafragma (los seis últimos nervios); 2.º, *ramos subcostales*, para la costilla y la pleura; 3.º, *ramos cutáneos*, en número de dos, uno *lateral*, destinado a la piel de la pared lateral del tórax, y el otro *anterior*, para la pared anterior del tórax.

3.º Caracteres particulares. — Las diferencias en el trayecto y distribución de cada uno de los doce nervios intercostales son insignificantes. El *primer nervio intercostal* es el más delgado de los doce. El *segundo* y el *tercero* envían un ramo anastomótico al plexo braquial. El *quinto* y el *sexto* proporcionan un filete al serrato menor posterior y superior; el filete anterior del ramo perforante inerva el manguito. Los seis últimos nervios inervan el recto mayor del abdomen; del 8.º al 11.º envían ramos al oblicuo menor y al transversos. El ramo perforante lateral del 12.º proporciona un ramo glúteo cutáneo.

ARTÍCULO IV

PLEXO LUMBAR

El plexo lumbar es variable en cuanto a constitución y constante en cuanto a distribución.

Clásicamente está formado por las ramas anteriores de los cuatro primeros nervios lumbares.

1.º Modo de constitución. — a) El primer par lumbar, después de haber recibido una anastomosis del 12.º intercostal, se une al segundo par lumbar después de haber emitido dos ramas: los nervios *abdominogenitales mayor y menor*.

b) El segundo par lumbar se anastomosa con el tercero y proporciona el *femorocutáneo* y el *genitocrural*.

c) El tercer par lumbar, después de haber proporcionado una rama para el nervio obturador constituye el nervio *crural*.

d) El cuarto par lumbar emite tres ramas: un ramo ascendente, que se une al nervio *crural*, un ramo medio: porción principal del nervio obturador; un ramo descendente, que se une al quinto par lumbar para formar con él el tronco *lumbosacro*.

2.º Relaciones. — Situado en el ángulo diedro comprendido entre los cuerpos vertebrales y las apófisis transversas, el plexo lumbar describe una curva cuya concavidad está vuelta hacia atrás. Está contenido en el interior del *psoas*, rodeado de un espacio celuloso por el que circulan las *arterias lumbares* (hacia atrás) y la *vena lumbar ascendente*.

3.º Anastomosis. — Con el 12.º intercostal, con el plexo sacro (nervio *lumbosacro*); con el simpático por varios *ramos comunicantes* (cuyo número varia de uno a cinco), satélites de la porción horizontal de las *arterias lumbares*.

1. RAMAS COLÁTERALES

Son cuatro: el *abdominogenital mayor*, el *abdominogenital menor*, el *femorocutáneo* y el *genitocrural*.

1.º Nervio *abdominogenital mayor*. Atraviesa el *psoas* en su parte superior y externa, se dirige oblicuamente hacia abajo y afuera, pasa entre el cuadrado lumbar y el peritoneo, y después atraviesa sucesivamente los tres músculos anchos del abdomen.

A nivel de la cresta ilíaca, se divide en *dos ramos*: 1.º, *ramo abdominal*, que se distribuye por los cuatro músculos anchos del abdomen y da, en el borde externo del recto mayor, dos *nervios perforantes cutáneos*, 2.º *ramo genital*, que se dirige oblicuamente hacia abajo y adentro y se distribuye por los tegumentos del pubis y del escroto (en la mujer por los labios mayores).

2.º **Nervio abdominogenital menor.**—Corre paralelamente al precedente y, como é, se divide en dos ramos, uno *abdominal* y el otro *genital*, que tienen la misma distribución.

3.º **Nervio femorocutáneo.**—Atraviesa el psoas y sale de la pelvis por la escotadura innominada entre las dos espinas ilíacas anteriores. Entonces se divide en dos ramos, uno *glúteo*, para la parte externa de la región glútea, y el otro *humeral*, para la parte anteroexterna del muslo.

4.º **Nervio genitofemoral.** Atraviesa el psoas oblicuamente, corre por delante de la arteria ilíaca, y un poco por encima del arco de Falopio se divide en dos ramos: 1.º, *ramo genital*, que recorre el conducto inguinal y se distribuye por el escroto. 2.º, *ramo crural*, que sale de la pelvis por la parte externa del anillo crural, llega al triángulo de Scarpa y termina en la pie de la cara anterior del muslo, después de haber perforado la fascia cribiforme.

2. RAMAS TERMINALES

Las ramas terminales son dos: *nervio obturador* y *nervio crural*.

1.º **Nervio obturador.**—El nervio obturador nace del plexo lumbar por tres raíces (2.º, 3.º y 4.º nervios lumbares), que se reúnen en el interior del psoas. El tronco nervioso sale del psoas por su lado interno, cruza la articulación sacroilíaca, sigue la pared externa de la pelvis, un poco por debajo de la línea innominada, y, finalmente, se introduce en el conducto subpubiano. La arteria y la vena se encuentran por debajo del nervio.

A. RAMAS COLATERALES —No da ramos en el abdomen. Algo por encima del conducto pubiano, o al entrar en él, da un filete al obturador externo.

B. RAMAS TERMINALES En el interior mismo del conducto subpubiano se divide en dos ramos:

1.ª **Rama anterior**, que después de haber salido del agujero obturador se coloca entre el pectíneo y el aductor menor, y se divide en tres ramos, para el *aductor menor*, el *aductor mediano* y el *recto interno*.

2.ª **Rama posterior**, que se dirige directamente hacia abajo y sale del agujero obturador, atravesando el fascículo superior del obturador

externo. Al llegar al muslo, da. 1.º *ramos musculares* para el aductor mayor y el obturador externo, 2.º *ramos articulares*, para la cadera y la rodilla; 3.º, algunos *filetes cutáneos*, para la cara interna de la rodilla y de la pierna.

2.º **Nervio crural.**—El nervio crural está formado por los pares lumbares 2.º, 3.º y 4.º, que se reúnen en el espesor del psoas. El tronco nervioso sale por la parte externa de este músculo y desciende al canal formado por el psoas y el iliaco. A medida que desciende hacia el muslo se aproxima a la arteria iliaca externa, y a nivel del arco de Falopio tan sólo está separado por la cinilla iliopectínea. Dentro de la pelvis, el nervio crural da *ramos colaterales* para el psoas, el iliaco y la arteria femoral. Al llegar al muslo se divide en cuatro *ramos terminales*: dos son anteriores, el *nervio musculocutáneo interno* y el *nervio musculocutáneo externo*, dos son posteriores el *nervio del cuádriceps* y el *nervio safeno interno*.

1.º **Nervio musculocutáneo externo.**—Este nervio se dirige hacia abajo y afuera entre el psoas y el sartorio. Da dos órdenes de ramos: 1.º, *ramos musculares* (largos y cortos), para el sartorio, 2.º, *ramos cutáneos*, en número de tres: *ramo perforante superior*, *ramo perforante medio*, que atraviesan el sartorio y terminan en los ligamentos de la parte anterior del muslo, y *ramo accesorio del safeno interno*, que se divide en dos filetes, uno *satélite de la vena safena interna* y el otro *satélite de la arteria femoral* (que abandona en el anillo del tercer aductor para anastomosarse con el safeno interno y el obturador).

2.º **Nervio musculocutáneo interno.**—Este nervio se dirige hacia dentro y se distribuye por los músculos pectíneo y aductor mediano, así como por la piel de la parte interna y superior del muslo.

3.º **Nervio del cuádriceps.**—Inmediatamente después de su origen se divide en cuatro ramos. 1.º *rama del recto anterior*, para el músculo homónimo; 2.º, *rama del vasto externo*, como el anterior, para el músculo homónimo; 3.º, *rama del vasto interno*, que corre paralelamente al nervio safeno interno, hasta el anillo del tercer aductor, y se distribuye por el vasto interno y por la articulación de la rodilla, 4.º, *rama del crural*, que se pierde por la cara anterior del músculo crural (envía algunos filetes al músculo subcrural y a la sinovial de la rodilla).

4.º **Nervio safeno interno.**—A poco de nacer, se introduce en la vena de los vasos femorales y la sigue hasta el anillo del tercer

aductor. En este punto sale de dicha vaina por un orificio que le es común con la arteria anastomótica mayor y se divide en dos ramos: 1.º, un ramo *rotuliano*, que perfora el sartorio en su parte inferior (*ramo perforante inferior*) y se distribuye por la piel de la región rotuliana; 2.º, un ramo *tibial*, que continúa la dirección del safeno, se hace superficial sigue la vena safena interna y se ramifica por la cara interna de la pierna hasta la garganta del pie.

ARTÍCULO V

FLEXO SACRO

El plexo sacro está formado por el *tronco lumbosacro* y las ramas anteriores de los cuatro primeros pares sacros.

1.º **Modo de constitución.** — a) El *tronco lumbosacro*, formado por L³ y la anastomosis que lo une a L⁴, desciende por delante de la articulación sacroilíaca y se anastomosa con S¹ a la altura de la escotadura ciática mayor.

b) S¹ sigue el borde superior del piramidal, se fusiona con el precedente formando un ángulo en donde se encuentran la arteria y las venas glúteas y termina en S².

c) S² aparece en el intervalo de los dos fascículos superiores del piramidal y se divide en dos ramas, una superior para S³ y otra inferior para S⁴.

d) S³, transversal, se adosa a la rama inferior de S² (nervio bigémino de Jehring).

e) S⁴ se divide en dos ramos: uno ascendente para S⁵ y otro descendente para S⁵ (pleno anacoccigeo).

2.º **Relaciones.** — El plexo sacro tiene la forma de un triángulo cuya base corresponde a la línea vertical que une el último agujero de unión de la columna lumbar con el 4.º agujero sacro anterior. Cubierto por delante por la aponeurosis del piramidal, por dentro se halla en relación con el recto y el simpático sacro. La arteria sacra lateral pasa por delante de S², S³ y S⁴. La arteria isquiática cruza S² y S³. La arteria pudenda interna está situada por delante. En el vértice del plexo se continúa con el nervio ciático mayor que sale por la escotadura ciática.

3.º **Anastemosis.** — Con L⁴, con el plexo sacrococcígeo y con el gran simpático.

1. RAMAS COLATERALES

Son diez, repartidas en dos grupos, *ramas anteriores* y *ramas posteriores*

A Ramas colaterales anteriores. — Son cinco:

1.ª **Nervio del obturador interno** — Nace de la parte inferior del plexo sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor, rodea la espina ciática, entra de nuevo en la pelvis por la escotadura ciática menor y termina en el obturador interno

2.ª **Nervio anal.** Denominado también *hemorroidal*, sigue el mismo trayecto que el precedente y termina en el esfínter anal y en la piel que lo cubre

3.ª **Nervio del elevador del ano** Se distribuye a la vez por el isquiococcígeo y por el elevador

4.ª **Nervio pudendo interno** Sigue el mismo trayecto que el nervio del obturador interno, en compañía de la arteria pudenda interna. Al entrar en la pelvis por la escotadura ciática menor, se divide en dos ramas. 1.ª, *rama inferior o perineal*, que se subdivide a su vez en un *ramo cutáneo*, para la piel del escoto y de la cara inferior del pene, y un *ramo musculouretral*, para los músculos del triángulo isquibulbar (transversa, isquiocavernoso, bulbocavernoso), para el bulbo de la uretra y la mucosa uretra. (*filete bulbar*), para la porción esponjosa de la uretra y el glánde (*filete uretral*); 2.ª, *rama superior o peneal (nervio dorsal del pene)* para los cuerpos cavernosos y el glánde. En la mujer, el nervio pudendo interno se distribuye por las partes homólogas (conduito de la uretra, bulbo de la vagina, clitoris).

5.ª **Nervios viscerales** — Estos nervios se anastomosan con el gran simpático, para formar el plexo hipogástrico (recto y vejiga)

B Ramas colaterales posteriores. — Las ramas colaterales posteriores son también cinco:

1.ª **Nervio glúteo superior** Sale de la pelvis por la parte más alta de la escotadura ciática y se distribuye por los músculos glúteo mediano y glúteo menor.

2.ª **Nervio del piramidal** Termina en la cara anterior de músculo piramidal de la pelvis.

3.º *Nervio del gémimo superior*, para el músculo gémimo superior.

4.º *Nervio del gémimo inferior y del cuadrado crural*. Sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor y termina en estos dos músculos.

5.º *Nervio glúteo inferior o ciático menor*. Sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor, por debajo del piramidal. Siguiendo un trayecto verticalmente descendente, cruza el glúteo mayor, penetra en los músculos de la cara posterior y la aponeurosis termina en el hueco poplíteo. Da los ramos siguientes. 1.º, *ramos glúteos* para el músculo glúteo mayor y la piel de la parte inferior de la región glútea; 2.º, *ramo perineal*, para la piel del perineo, del escroto (en la mujer, grandes labios); 3.º, *ramos femorales*, para la piel de la cara posterior del muslo. El nervio glúteo inferior o ciático menor termina en el hueco poplíteo, por *filetes subcutáneos* destinados a la piel de la parte posterior y superior de la pierna: uno de estos filetes sigue la vena safena externa y se anastomosa con el nervio safeno externo.

2. RAMA TERMINAL. NERVIO CIÁTICO MAYOR

El plexo sacro termina en una sola rama, el *nervio ciático mayor* (sensitivo y motor), que al llegar al hueco poplíteo se divide en dos ramas: el *ciático poplíteo externo* y el *ciático poplíteo interno*, este último, después de haber atravesado el anillo del sóleo, toma el nombre de *nervio tibial posterior*. Vamos a estudiar estos cuatro troncos nerviosos.

1.º **Nervio ciático mayor propiamente dicho.**—El nervio ciático mayor es muy voluminoso y su formación resulta de la convergencia de las ramas del plexo sacro: se extiende desde la pelvis al hueco poplíteo. *En su origen* está en relación con el borde inferior del músculo piramidal, que lo cubre, las arterias isquiática y pudenda interna están situadas a su lado interno. Sale de la pelvis por debajo del piramidal por la parte inferior de la escotadura ciática mayor. *En la nalga* pasa por delante del glúteo mayor por detrás de los gémimos, del tendón del obturador interno y del cuadrado crural, al que cruza en ángulo recto. *En el muslo* sigue la línea áspera del fémur y entra en relación, por delante, con los fascículos de origen del aductor mayor y de la porción corta del bíceps; por detrás está cubierto por la porción larga del bíceps. Más abajo se aproxima al borde externo del semimembranoso y corre por el canal que le forman este músculo

por dentro y el biceps por fuera. En su trayecto va acompañado por la *arteria del ciático*, rama de la arteria isquiática.

A. RAMAS COLATERALES. — El nervio ciático mayor da en su trayecto: 1.º, *ramos musculares*, para las dos porciones del biceps, el semitendinoso, semimembranoso y el aductor mayor, 2.º, *ramos articulares*, para la cadera y la rodilla.

B. RAMAS TERMINALES. — A nivel del hueco poplíteo se divide en dos ramas: el *nervio ciático poplíteo externo* y el *nervio ciático poplíteo interno*.

2.º **Nervio ciático poplíteo externo.** — El nervio ciático poplíteo externo nace en el ángulo superior del hueco poplíteo. Situado por debajo de la aponeurosis, por fuera de la vena poplítea y del ciático poplíteo interno, sigue el tendón del biceps crural, cruza el cóndilo externo y va a la cabeza del peroné, en donde termina (en el mismo espesor del peroneo lateral largo).

A. RAMAS COLATERALES. — Son cinco.

1.ª *Ramo articular*, para la rodilla.

2.ª *Nervio accesorio del safeno externo (safeno peroneo)*: se dirige hacia abajo y adentro, perfora la aponeurosis y se anastomosa a menudo con una colateral del ciático poplíteo interno, el *safeno tibial*, para formar el *safeno externo*. Algunas veces no envía más que una anastomosis a este nervio y termina en la región de la garganta del pie.

3.ª *Nervio cutáneo peroneo*, para la cara externa de la pierna.

4.ª y 5.ª *Ramas musculares*, para el extensor común de los dedos del pie y el tibial anterior.

B. RAMAS TERMINALES. — A nivel del cuello del peroné, el ciático poplíteo externo se divide en dos ramas: *nervio musculocutáneo* y *nervio tibial anterior*.

1.ª **Nervio musculocutáneo.** — El nervio musculocutáneo penetra en el peroneo lateral largo, sale de él y sigue entonces colocado en un canal que forman los dos músculos peroneos laterales. En el tercio inferior de la pierna perfora la aponeurosis y se divide en dos ramas, que se descenden sobre la cara dorsal del pie. En este trayecto da ramos a los músculos peroneos laterales largo y corto. Termina por dos ramas: una interna y la otra externa, que se ramifican en seguida para formar los *siete primeros colaterales dorsales de los dedos* (a veces los nueve primeros). Es de notar que la rama que da el colateral externo

del dedo gordo y el colateral interno del segundo dedo se anastomosa con el nervio tibial anterior.

2.º *Nervio tibial anterior*. — Dirigiéndose hacia dentro atraviesa el peroneo lateral largo y el extensor común de los dedos; al llegar sobre el ligamento interóseo, desciende a lo largo de la pierna, colocado primeramente entre el extensor común de los dedos y el tibial anterior, y después entre este último músculo y el extensor largo propio del dedo gordo. La arteria tibial anterior, situada primeramente por dentro del nervio, lo cruza en X y se coloca en la parte externa a nivel de la garganta del pie. En su trayecto da *ramos colaterales* para los cuatro músculos de la región anterolateral de la pierna (tibial anterior, extensor común de los dedos, extensor propio del dedo gordo y peroneo anterior). Al llegar a la garganta del pie se divide en dos ramos, uno *externo*, para el músculo pedio (*nervio del pedio*), y el otro *interno*, que, continuando el trayecto del nervio tibial anterior, desciende hacia el primer espacio interóseo y se anastomosa con una de las divisiones del nervio musculocutáneo.

3.º *Nervio ciático popliteo interno*. — El nervio ciático popliteo interno va del ángulo superior del hueco popliteo al anillo del sóleo en donde toma el nombre de tibial posterior. Atraviesa en línea recta el rombo popliteo formado por el biceps y el semitendinoso por arriba, los gemelos externo e interno por abajo; está separado del esqueleto de la rodilla por el músculo popliteo. Está situado por fuera de la vena, en un plano más superficial; la arteria está situada por dentro de la vena y en un plano más profundo.

A. RAMAS COLATERALES. — Son de tres órdenes.

a) *Ramos musculares*, destinados a los músculos géminos plantar delgado, sóleo y popliteo.

b) *Ramos articulares*, para la rodilla.

c) *Nervio safeno externo (tibial)*: nace de la parte media del ciático popliteo interno, llega al intersticio de los dos gemelos y viene a colocarse a lo largo del borde externo del tendón de Aquiles, para ir al borde externo del pie, en donde termina. Subaponeurótico al principio, corre en seguida cubierto por un desdoblamiento de la aponeurosis de la pierna, luego por el tejido celular subcutáneo. Recibe el safeno peroneo o cuando menos una anastomosis procedente de este nervio. En el borde externo del tendón de Aquiles da *ramos cutáneos*, llamados *tibiales inferiores*, *calcáneos*, *maleolares* y *ramos articulares* (para la articulación tibiotarsiana). Termina en el borde externo del

pie, dando dos ramos, que dan los tres últimos colaterales dorsales de los dedos (a algunas veces tan sólo el último).

B. RAMA TERMINAL. — A nivel del anillo del sóleo forma el *ner-
mo tibial posterior*.

4.º Nervio tibial posterior. — El nervio tibial posterior recorre la cara posterior de la pierna, siguiendo un trayecto verticalmente descendente. Descansa en el intersticio comprendido entre el tibial posterior y el flexor largo del dedo gordo, y la arteria tibial posterior transcurre colocada en su parte externa; por detrás está cubierto por los cuatro músculos superficiales de la pierna (sóleo, plantar delgado y gemelos). Al llegar al tercio inferior de la pierna se coloca en la parte interna del tendón de Aquiles y está separado de la piel únicamente por una aponeurosis doble. Al llegar al canal calcáneo, termina bifurcándose.

A. RAMAS COLATERALES. Las hay de cuatro órdenes:

1.ª *Ramos musculares*, para el popliteo, el tibial posterior, los flexores tibial y peroneo de los dedos del pie y el sóleo (parte inferior).

2.ª *Ramos articulares*, para la cara externa de la articulación tibiotalariana.

3.ª *Nervio cutáneo interno*, para la piel de la cara interna del talón.

4.ª *Nervio cutáneo plantar*, para la piel de la planta del pie.

B. RAMAS TERMINALES. — Las dos ramas de bifurcación del tibial posterior son el *plantar interno* y el *plantar externo*. Tienen cierta analogía con los nervios mediano y cubital de la palma de la mano.

a) *Nervio plantar interno (mediano de la mano)*. Se divide hacia delante, entre los músculos de la región plantar interna y los de la región media.

a) A nivel del tarso da ramos cutáneos (para la región plantar interna) y ramos musculares (para el aductor del dedo gordo, el flexor corto plantar y la porción interna del accesorio del flexor común).

β) A nivel del metatarso se divide en cuatro ramos, que se dirigen hacia los dedos y, subdividiéndose, dan los siete primeros colaterales plantares. Es de notar que la segunda y la tercera ramas dan al mismo tiempo cada una un filete muscular (para los dos primeros lumbricales).

b) *Nervio plantar externo (análogo al cubital de la mano)* — Corre a alguna profundidad entre el flexor plantar y el accesorio del

flexor largo, llevando dirección oblicua hacia delante y afuera. Da ramos laterales a los músculos del dedo pequeño y a la porción externa del accesorio del flexor largo. Al llegar a la extremidad posterior del cuarto espacio interseo, lo hallamos dividido, como el cubital, en *rama superficial* y *rama profunda*.

a) La *rama superficial* se dirige hacia los dedos y da los tres últimos *colaterales plantares*.

b) La *rama profunda* se dirige oblicuamente hacia delante y adentro describiendo una curva de concavidad dirigida hacia dentro y atrás, da *ramos articulares* (articulaciones del tarso y del metatarso) y *ramos musculares* (para los dos últimos lumbricales, para el aductor transversal del dedo gordo y los músculos interóseos plantares o dorsales) finalmente termina en el abductor oblicuo del dedo gordo.

ARTÍCULO VI

PLEXO SACROCCÍGEO

Esta formado por la anastomosis que contraen entre sí, por delante del sacro y del cóccix, los dos últimos nervios sacros y el nervio coccigeo. De este plexo parten: 1.º, *ramos anteriores*, para el plexo hipogástrico, 2.º, *ramos posteriores*, para la piel que cubre el cóccix. Es de notar también que el nervio coccigeo envía algunos filetes al isquiotoccigeo y al borde inferior del glúteo mayor.

CAPITULO IV

SISTEMA NERVIOSO VEGETATIVO

Esta parte del sistema nervioso establece las relaciones entre los diferentes órganos. La fisiología ha demostrado que existen en este sistema dos formaciones especiales de funciones antagónicas, al menos en apariencia: el simpático llamado también ortosimpático y el parasimpático. Aunque las terminaciones de estos dos sistemas se hallan íntimamente mezcladas a nivel de ciertas vísceras, su origen es distinto.

1. CONSTITUCION GENERAL

Histológicamente los filetes nerviosos constan de fibras mielínicas, como los demás nervios, y de un gran número de *fibras amielínicas* (fibras de Remak).

Topográficamente, el sistema neurovegetativo comprende 1.º, una cadena laterovertebral o catenoide caracterizada por ganglios reunidos entre sí por un largo cordón extendido desde la primera cervical hasta el cóccix, 2.º, ganglios y plexos esplácnicos en conexión, por una parte, con la cadena precedente y, por otra parte, con ganglios y plexos viscerales que constituyen en las vísceras, aparatos autónomos, y que también forman parte del sistema organovegetativo.

Estas diversas formaciones se hallan unas entre sí por medio de filetes nerviosos y por otra parte están en conexión con los nervios raquídeos por medio de ramos llamados *ramos comunicantes*.

Finalmente, el sistema organovegetativo posee centros situados en la sustancia gris del sistema cerebroespinal. Estos centros están localizados: 1.º, en la médula espinal a nivel de la parte externa de la base del asta anterior, 2.º, en el encéfalo a nivel de los núcleos bulbares, protuberanciales y pedunculares de algunos nervios craneales (XI, X, IX, VII, III). Los centros superiores existen en el cerebro pero no son todavía bien conocidos.

2 TERRITORIOS DEL SIMPÁTICO Y DEL PARASIMPÁTICO

a) *Simpático* El gran simpático envía fibras.

1.º A la piel y sus anexos (nervios sudorales, pilomotores)

2.º A los músculos lisos de todos los vasos (nervios vasomotores)

3.º Al plexo cardiaco (nervio acelerador del corazón).

4.º Al aparato respiratorio (músculos lisos y glándulas).

5.º Al tubo digestivo (nervios motores de los músculos y esfínteres lisos)

6.º A la musculatura y a los esfínteres lisos del aparato urinario

7.º A las glándulas endocrinas

8.º A la musculatura lisa del o.o (nervio dilatador del iris).

b) *Parasimpático*.—El territorio del parasimpático parece menos extenso. Hay que distinguir el parasimpático craneal y el parasimpático pelviano.

a) El *parasimpático craneal* envía fibras:

1.º A la musculatura del cristalino (acomodación) y del iris (constricción del iris). nervio motor ocular común.

2.º A las glándulas nasales, bucales, faringicas sublinguales y submaxilares (nervio facial o intermediario de Wrisberg)

3.º A la parótida (nervio glossofaríngeo).

4.º Al aparato respiratorio (músculos lisos y glándulas), al corazón (inhibición), al tubo digestivo (nervio neumoespinal)

b) El *parasimpático pelviano* envía fibras:

1.º A la porción terminal del tubo digestivo (con excepción del esfínter anal)

2.º A la musculatura vesical (*detrusor urinae*).

3.º A los órganos genitales externos (*nervus erigens*).

4.º Al útero y a la vagina

3 ESTUDIO GENERAL DEL SISTEMA NEUROVEGETATIVO

El sistema gran simpático forma dos largos cordones, derecho e izquierdo, situados uno a cada lado de la columna vertebral y extendiéndose desde la primera vértebra cervical hasta la primera vértebra sacra. En los cordones del simpático se ven, en el curso de su trayecto, numerosos engrosamientos, llamados *ganglios centrales* del simpático. Se dice generalmente que su número es igual al de los segmentos oseos del raquis, pero en ciertas regiones se condensan como su

cede en la región cervical. El simpático se comunica con el sistema nervioso cerebroespinal por medio de los *ramos comunicantes*. De los ganglios simpáticos parten fileres nerviosos que van a las vísceras, a los vasos y a las glándulas; antes de distribuirse por estos órganos forman plexos en cuyo centro hay pequeños ganglios, llamados *ganglios periféricos*.

El sistema neurovegetativo se divide en cuatro porciones: *cervical, torácica, lumbar y sacra*. Cada una de estas porciones comprende como elementos constituyentes, 1.º, el *tronco mismo del sistema neurovegetativo*; 2.º, los *ramos comunicantes*; 3.º, las *ramas eferentes*.

SECCION PRIMERA

SISTEMA ORGANOVEGETATIVO CERVICAL

1. TRONCO Y GANGLIOS

Se extiende desde la base del cráneo al orificio superior del tórax. Comprende tres ganglios, uno superior, otro medio inconstante y otro inferior.

1.º **Ganglios.** — a) *Ganglio cervical superior* — Es el más voluminoso de los tres. Esiforme de color gris y superficie lisa, de 2 a 5 centímetros de longitud, 6 a 12 milímetros de anchura y 3 a 4 milímetros de espesor.

b) *Ganglio cervical medio* — Es de forma irregular aplanado y de exiguas dimensiones, pues no excede nunca de 10 milímetros de longitud por 3 ó 4 de anchura.

c) *Ganglio cervical inferior* — Es constante pero la mayoría de las veces se fusiona con el primer ganglio torácico para constituir el *ganglio estrellado*, forma una masa irregular (aspecto de araña). Dimensiones: 2 centímetros de altura por 8 a 12 milímetros de anchura y 8 a 10 de espesor.

2.º **Cordón.** — El cordón, delgado, desciende verticalmente y se pierde en el extremo inferior del ganglio estrellado.

3.º **Relaciones.** — La cadena cervical está aplusada sobre la cara anterior de las apófisis transversas, tapizadas por los músculos pre-

vertebrales. Está envuelta en una vaina celulosa adherida a la vaina del paquete vasculonervioso del cuello en su parte superior e independiente de ella en el resto de su trayecto.

a) El *ganglio superior* corresponde a la segunda y tercera vértebras cervicales, a 2 centímetros por debajo de la base del cráneo. Está situado en la parte posterior del espacio laterofaríngeo, y por lo tanto en relación con los órganos en él contenidos: por delante carótida interna, yugular interna y neumogástrico; por fuera, rama externa del espinal, por detrás y arriba hállase cruzado por el hipogloso mayor.

b) *Ganglio cervical medio*. — Situado algo por debajo del tubérculo de Chassaignac, está en contacto con el cayado de la arteria tiroidea inferior.

c) *Ganglio estrechado*. — Situado profundamente, su parte inferior corresponde al cuello de la primera costilla; está albergado en la fosilla supratretropleural. Aplicada a su cara anterior se encuentra la arteria vertebral; por detrás se encuentra la intercostal superior. Finalmente, también se hallan en contacto con él las dos últimas raíces del plexo braquial. La primera dorsal se halla aplicada contra su borde extremo y la octava cervical se desliza por detrás del ganglio para alcanzar el cuello de la primera costilla.

2 RAMAS COLATERALES

1.º **Ramos comunicantes.** — Los ramos comunicantes vienen: 1.º, para el *ganglio cervical superior*, de los cuatro primeros pares cervicales; 2.º, para el *ganglio medio* de los quinto y sexto pares cervicales; 3.º, para el *ganglio inferior*, de los dos últimos pares cervicales (fibras oculopupilares).

2.º **Ramos eferentes.** — Proviene a la vez de los tres ganglios cervicales.

1.º **RAMAS EFERENTES DEL GANGLIO SUPERIOR.** — Se dividen en cuatro grupos:

a) *Ramas superiores o craneales.* — Las ramas superiores o craneales son dos:

1.ª Una *posterior*, rama anastomótica con los nervios neumogástrico, hipogloso mayor y glossofaríngeo.

2.ª Otra *anterior*, que sigue la carótida interna para formar el plexo carotídeo y el plexo cavernoso. Del plexo carotídeo parten el filete caroticotímpanico (nervio de Jacobson) y el filete carotídeo del

nervio vidiano (ganglio esfenoparaino). Del *plexo cavernoso* parten filetes para el cuerpo pituitario, las meninges, los senos esfenoidales, las ramas de la carótida interna, y filetes anastomóticos para los nervios de la orbita, para el ganglio de Gasser y la raíz simpática del ganglio oftálmico.

b) *Ramas posteriores*. — Están destinadas a los músculos de la región prevertebral y a las vértebras cervicales.

c) *Ramas anteriores*. — Se dirigen todas hacia el ángulo de bifurcación de la carótida primitiva y forman el *plexo intercarotideo*. De este plexo nacen ramas que, a su vez, forman plexos secundarios los cuales siguen todas las ramas de división de la arteria carótida externa. Se denominan *plexo tiroideo superior*, *lingual*, *facial*, *auricular posterior*, *occipital*, *faringeo inferior*, *temporal superficial* y *maxilar interno*.

d) *Ramas internas*. — Van a parar a los órganos viscerales de la región cervical: faringe, esófago, laringe, cuerpo tiroides. Algunas de ellas forman el *nervio cardíaco superior*.

2.º RAMAS EFERENTES DEL GANGLIO CERVICAL MEDIO. — Se distinguen en: 1.º, *ramas tiroideas* que siguen la arteria tiroidea inferior; 2.º *ramas cardíacas*, que forman el nervio cardíaco medio; 3.º *ramas anastomóticas*, para el recurrente.

3.º RAMAS EFERENTES DEL GANGLIO CERVICAL INFERIOR. — Se dividen en tres grupos:

a) *Ramas externas*. Acompañan a la arteria subclavia y forman alrededor de sus divisiones otros tantos plexos. Son los nervios vasomotores del miembro superior.

b) *Ramas ascendentes (nervio vertebral)*. — El nervio vertebral es el conjunto de las ramas que acompañan a la arteria vertebral dentro del cerebro. Da, para las ramas de división de la arteria, otros tantos plexos secundarios (*plexos espinales*, *plexo basilar*, *plexo cerebral posterior*).

c) *Ramas internas*. — Se anastomosan con el recurrente, algunas forman el *nervio cardíaco inferior*.

4.º NERVIOS CARDÍACOS. — Los nervios cardíacos proceden: 1.º, del neumogástrico, por tres ramos (de cada lado); 2.º, del simpático, por tres ramos también, que vienen de los tres ganglios cervicales. Todos estos nervios se dirigen hacia la base del corazón y forman en este punto el *plexo cardíaco*, en el centro del cual se encuentra el ganglio de Wrisberg. De este plexo parten nervios para el miocardio y sus envolturas (véase Corazón).

SECCION II

SISTEMA ORGANOVEGETATIVO TORACICO

A Tronco y ganglios. Desciende, por cada lado de la columna vertebral, desde la primera a la duodécima vértebras dorsales. Descansa sobre la cabeza de las costillas, cruzado por las arterias intercostales y cubierto por la pleura. A lo largo de este trayecto se encuentran diez o doce ganglios, llamados *ganglios torácicos*.

B. Ramos comunicantes. -Proceden de los nervios intercostales vecinos, son a menudo en número de dos por ganglio.

C. Ramas eferentes. Se comportan diferentemente en la parte superior y en la inferior del tórax.

1° **RAMOS EFERENTES SUPERIORES.** — Dan ramos a las vértebras, al esófago, a la aorta y al pulmón. Nacen de los cuatro o cinco primeros ganglios torácicos.

2° **RAMOS EFERENTES INFERIORES.** — Estos ramos procedentes de los siete u ocho últimos ganglios torácicos, se reúnen para formar dos nervios: el *esplénico mayor* y el *menor*.

a, *Nervio esplénico mayor.* Nace de los ganglios torácicos medios por cuatro o cinco ramos, que se dirigen hacia abajo y se unen a nivel de la primera vértebra dorsal. Atraviesa el diafragma y termina en el ángulo externo del ganglio semilunar correspondiente.

b) *Nervio esplénico menor* — Está formado por la reunión de los ramos procedentes de los últimos ganglios torácicos. Atraviesa el diafragma y se divide en tres ramos, que se distribuyen: 1°, por el ganglio semilunar o el esplénico mayor; 2°, por el plexo renal; 3°, por el plexo solar.

3° **GANGLIOS SEMILUNARES.** — Son dos ganglios voluminosos en forma de media luna situados en la parte posterosuperior del abdomen: se aplican contra los pilares del diafragma, en las capsulas suprarrenales u poco por encima del páncreas. Tienen un color gris o rojo y en general su volumen no es mayor que el de una habichuela.

a *Ramas aferentes.* — Están representadas por los esplénicos mayores que penetran en los ganglios por su parte externa. A la ex

tremidad interna del ganglio semilunar derecho van a parar la terminación del neumogástrico derecho, formando el *asa memorable de Wisberg*

b) *Ramas eferentes* — Forman un vasto plexo por delante de la aorta y del tronco celíaco, denominado *plexo solar*. De este plexo parten ramas que se distribuyen por las vísceras, siguiendo el trayecto de sus arterias, sobre las que forman otros tantos plexos secundarios. Se cuentan doce plexos: los *plexos diafragmáticos inferiores, coronario estomacal, esplénico, hepático, mesentérico superior, suprarenales* (arterias capsulares), *renales y espermáticos*. Cada uno de estos plexos se divide a su vez en plexos de tercero y cuarto orden que siguen las divisiones y subdivisiones de las arterias

SECCION III

SISTEMA ORGANOVEGETATIVO LUMBAR

A **Tronco y ganglios.** Al llegar a la cavidad abdominal por un orificio del pilar del diafragma, el tronco del simpático sigue la parte anterolateral de la columna lumbar, cubierta por la aorta en el lado izquierdo y por la vena cava en el derecho, y termina a nivel de la quinta vertebra lumbar. Tiene en su trayecto cuatro o cinco ganglios, llamados *ganglios lumbares*

B **Ramos comunicantes** — Proceden de los nervios lumbares y son muy variables en cuanto a número. de uno a seis.

C **Ramas eferentes.** — Constituyen tres órdenes

a) *Ramos óseos* — Para las vértebras.

b) *Ramos preaórticos.* Por delante de la aorta forman el *plexo lumboaórtico*, que se extiende desde el origen de las arterias espermáticas hasta el origen de las arterias ilacas. Está en relación con el plexo solar y con el plexo hipogástrico. Del plexo lumboaórtico se desprenden numerosos ramos que siguen las arterias espermáticas lumbares e ilacas primitivas; estas últimas forman los nervios vasomotores del miembro inferior. La arteria mesentérica inferior está rodeada por el *plexo mesentérico inferior*, que se divide en plexos secundarios para cada una de las divisiones. Es de notar que el *plexo hemorroidal superior* termina en parte en el plexo hipogástrico

SECCION IV

SIMPATICO SACRO

A Tronco y ganglios. - El simpático sacro descansa sobre la cara anterior del sacro, por dentro de los agujeros sacros superiores, detrás del recto. Presenta en su trayecto cuatro o cinco ganglios llamados *ganglios sacros*. Al llegar al cóccix, el simpático, considerablemente reducido, se anastomosa con el simpático del lado opuesto (*asa coccigea*) o forma un pequeño ganglio impar, llamado *ganglio coccigeo*.

B Ramos comunicantes. Van desde los nervios sacros a los ganglios en general en número de dos para cada ganglio.

C Ramas eferentes. Forman dos grupos:

1.º RAMAS INTERNAS. Están destinadas al sacro, al recto y a la arteria sacra media.

2.º RAMAS ANTERIORES. PLEXO HIPOGASTRICO. Las ramas anteriores de los ganglios sacros van a los ganglios hipogástricos. Estos se hallan en conexión con el plexo lumboaórtico por los nervios hipogástricos. De los ganglios hipogástricos, hojas fenestradas que descansan en el suelo pélvico a cada lado del recto, parten nervios que van a las diferentes vísceras de la pelvis: recto, vejiga, uréteres, vesículas seminales, próstata, conducto deferente en el hombre, útero y vagina en la mujer. Estos ganglios están anastomosados, por otra parte, con los terceros y cuartos pares sacros (*nervio erector de Eckhardt*).

LIBRO VI

ORGANOS DE LOS SENTIDOS

Los órganos de los sentidos son aparatos especiales, productos de diferenciación del ectodermo, que se encuentran en la periferia del cuerpo y tienen por función poner al hombre y los animales en relación con el mundo exterior. Son cinco: 1.º, el *sentido del tacto*, en relación con las sensaciones táctiles; 2.º, el *sentido del gusto*, que nos da a conocer el sabor de los cuerpos; 3.º, el *sentido del olfato*, que nos hace percibir los olores; 4.º, el *sentido de la vista*, que responde al excitante luz y nos proporciona datos sobre la forma, tamaño y color de los objetos luminosos o simplemente iluminados; 5.º, el *sentido del oído*, que nos permite percibir los sonidos.

CAPITULO PRIMERO

SENTIDO DEL TACTO

(Piel y sus anexos)

El sentido del tacto asienta en la *piel* o *tegumen* o *externo*. La piel es una membrana que envuelve el cuerpo en su totalidad y contiene en su espesor toda una serie de pequeños aparatos nerviosos destinados a recoger las impresiones llamadas táctiles. Estudiaremos sucesivamente, respecto de la piel: 1.º, su *conformación exterior*; 2.º, su *constitución anatómica*; 3.º, sus *anexos*.

1. CONFORMACIÓN EXTERIOR

1.º **Caracteres físicos.** La piel es uniformemente extendida por toda la periferia del cuerpo. Su *superficie*, un poco más extensa

que la de cuerpo mismo, por razón de los pliegues que forma en diferentes sitios, mide por término medio 16.000 centímetros cuadrados. La piel es, en toda su extensión, continua, excepto a nivel de los orificios naturales, en donde se continúa con las mucosas correspondientes. El *espesor* de la piel oscila, en general, entre medio milímetro y 2 milímetros (aunque llega a 3 y 4 milímetros en la palma de las manos y en la nuca). Su *resistencia* es considerable. tirillas de piel de 10 a 12 milímetros de anchura no las rompe un peso de 7 u 8 kilogramos. Su *coloración varía*. 1.º, *según las edades* (blanca corrosada en el nacimiento blanca en el niño y en el adulto, ligeramente amarilla en el viejo); 2.º, *según las regiones* (siendo más obscura en las partes descubiertas que en las ocultas particularmente teñida en los órganos genitales externos y en laaréola del pezón); 3.º, *según las razas* (razas blancas, razas amarillas y razas negras). La coloración de la piel depende: 1.º, de la *hematina* de la sangre que circula por los vasos capilares de la dermis, 2.º, de la *melanina* o pigmento negro que se distribuye en forma de granulaciones por las células profundas de la epidermis.

1.º **Cara superficial.** — La cara superficial, además de las uñas y los pelos, que estudiaremos mas adelante, presenta:

a) *Eminencias* — Son de dos órdenes: temporales o permanentes. Las *eminencias temporales* son producidas por la proyección hacia fuera de los folículos pilosos bajo la influencia del frío o a consecuencia de una emoción (*piel de gallina*). Las *eminencias permanentes* están formadas por las papilas de la dermis son principalmente visibles en la palma de las manos y en la planta de los pies, en donde forman un sistema de curvas concéntricas dispuestas en cierto número de tipos (importancia de las impresiones o huellas digitales en Medicina Legal)

b) *Surcos o pliegues* Son de cuatro órdenes. 1.º, *surcos interpapilares*, que separan las hileras de papilas, 2.º *pliegues musculares*, producidos por los músculos subyacentes, al principio temporales y después permanentes; 3.º, *pliegues de locomoción*, situados cerca de las articulaciones (*líneas de la mano*), 4.º, *pliegues seniles*, constituidos por las arrugas propias de la vejez

c) *Orificios.* — Son de dos clases: 1.º, *orificios de los folículos pilosos*, que dan paso a los pelos, 2.º, *orificio de las glándulas sebáceas* y de las *glándulas sudoríparas*, que dan paso, los primeros a la materia sebácea, y los segundos al sudor

3° **Cara profunda.** — Está en relación con el tejido celular subcutáneo. Está surcada de aréolas ocupadas por las glándulas sudoríparas o por pelotones adiposos.

4° **Formaciones subcutáneas.** — Por debajo de la piel, entre esta y la aponeurosis se encuentran: 1°, el *panículo celuloadiposo*, 2°, *bolsas serosas*, 3°, *músculos*.

a) *Panículo celuloadiposo* — El panículo celuloadiposo o *fascia superficialis* está generalmente dispuesto del modo siguiente: 1°, una *hoja conjuntiva superficial o dérmica*, adherida a la dermis; 2°, una *hoja conjuntiva profunda o aponeurotica*, adherida a la aponeurosis; 3°, entre las dos hojas, una *capa adiposa*, por la cual corren los vasos y los nervios superficiales.

b) *Bolsas serosas subcutáneas* — Son cavidades labradas en el tejido celular subcutáneo y destinadas a favorecer el deslizamiento de la piel sobre las capas subyacentes. Su desarrollo es la consecuencia misma del deslizamiento de la piel sobre estas partes salientes. La cavidad, de por sí irregular, anfractuosa, algo tabicada (*bolsas amoculares y multiloculares*), está llena de un líquido claro y transparente análogo a la linfa. Se dividen en: 1°, *bolsas serosas normales* (ejemplo, debajo de la cabeza del primer metatarsiano); 2°, *bolsas serosas accidentales* (ejemplo, en el vértice de la gibosidad de los jorobados); 3° *bolsas serosas profesionales* (ejemplo, en la garganta del pie derecho en los que fríegan entarimados).

c) *Músculos cutáneos* — En ciertos puntos, la piel descansa sobre formaciones musculares, que pertenecen al *sistema muscular estriado* (ejemplo: cutáneos de la cara y del cuello) o al *sistema muscular liso* (ejemplo, músculo subarcolar).

d) *Construcción anatómica* — La piel se compone de dos capas superpuestas: una superficial, la *epidermis* y otra profunda, la *dermis* o *corion*. (Véanse los tratados de *Histología*.)

2° ANEXOS DE LA PIEL

Comprendemos con este título: 1°, las *glándulas sudoríparas*, 2°, las *glándulas sebáceas*, 3°, las *uñas*; 4°, los *pelos*.

1° **Glándulas sudoríparas.** — Su función consiste en secretar el sudor y esparcirlo por la superficie de la piel.

a) *Generalidades* — Cada una de ellas está constituida por un tubo largo y delgado, una de cuyas extremidades se abre en la super-

ficie libre de la epidermis, mientras que la otra termina en fondo de saco. La parte interna del tubo, flexuosa y arrollada sobre sí misma, forma una pequeña masa esférica u ovoidea, llamada *glomérulo* o *parte secretante del tubo*. La parte externa, casi rectilínea, va desde el glomérulo a la superficie cutánea y constituye el *conducto excretorio*. Las glándulas sudoríparas existen en casi todos los puntos de la superficie cutánea. Muy raras en los párpados y en la cara externa del pabellón, no las hay en los pequeños labios y en la porción inferior de los grandes labios. Su número es considerable: 38 por término medio en una superficie de 25 milímetros cuadrados, o sea 2.000.000 en toda la superficie cutánea. (Para lo referente a la estructura, vasos y nervios, véanse los tratados de Histología.)

b) *Glándulas sudoríparas especiales*. Aunque reducibles al tipo común, algunas glándulas sudoríparas merecen una descripción especial. Son: 1.º, las *glándulas axilares*, notables por el volumen de su glomérulo (3 a 4 milímetros de diámetro); 2.º, las *glándulas ceruminosas*, situadas en el conducto auditivo externo, que se distinguen de las glándulas ordinarias en que secretan una materia untuosa, de color amarillento y sabor amargo, llamada *cerumen*; 3.º, las *glándulas de Moll*, situadas en el espesor de los párpados, las cuales, en vez de ser glomerulares, están representadas por un simple conducto contorneado en zigzag o en S itálica (son glándulas sudoríparas que han quedado en su estado embrionario)

2.º **Glándulas sebáceas**. — Las glándulas sebáceas son glándulas en racimo cuya función consiste en secretar una materia grasa, el *sebo* o *materia sebácea*, que derraman en seguida, ya dentro de un folículo piloso, ya directamente en la superficie de la epidermis.

a) *Situación*. Se encuentran en toda la extensión del tegumento externo, excepto en la palma de la mano, en la planta del pie, en la cara palmar de los dedos de las manos y en la cara plantar de los dedos de los pies.

b) *División*. — Las glándulas sebáceas se dividen en tres grupos. El *primer grupo* comprende las glándulas que se abren en los folículos pilosos (*glándulas pilosas*). El *segundo grupo* comprende las glándulas sebáceas que se abren directamente en la superficie de la piel sin tener ninguna relación con los pelos. Son poco numerosas, apenas se encuentran más que en los pequeños labios y en la areola del pezón (véase *Mamas*). El *tercer grupo*, intermedio entre los dos precedentes, está constituido por glándulas, ordinariamente muy voluminosas, que

se abren directamente en la superficie de la piel y contienen a título de apéndice, un folículo piloso minúsculo.

c) *Constitución anatómica* — (Véanse los tratados de Histología.)

3° *Uñas*. — Las uñas son producciones epidérmicas en forma de láminas cuadriláteras, blancuzcas y semitransparentes, situadas en la cara dorsal de la última falange de los dedos de las manos y de los pies. En cada una de ellas hemos de considerar: 1°, la *uña propiamente dicha*, 2° el *órgano productor de la uña*.

A *UÑA PROPIAMENTE DICHA*. La uña es una hoja cuadrilátera, de consistencia córnea, que ofrece a nuestra consideración un cuerpo y dos extremidades.

a) *Cuerpo*. El cuerpo o parte media se extiende desde la raíz hasta el surco que separa la uña del pulpejo del dedo. Se distinguen en él: 1° una *cara superficial*, convexa, de color rosado en casi toda su extensión, excepto en la parte superior, en donde presenta una pequeña zona blanca en forma de media luna o *lúnula*. 2° una *cara profunda* cóncava, fuertemente adherida, que presenta todo un sistema de crestas o surcos longitudinales, que se amoldan exactamente sobre los surcos y las crestas de la dermis subyacente. 3°, dos *bordes laterales*, que están más o menos engastados en un repliegue de la dermis.

b) *Extremidades*. — Se distinguen en proximal y distal. La *extremidad proximal* o raíz está oculta en el repliegue que forma a este nivel la dermis cutánea. Es blanda, flexible e ástica, termina por arriba formando un borde delgado y finamente dentellado. La *extremidad distal* es libre y de un color blanco grisáceo. Crece constantemente.

B *ÓRGANO PRODUCTOR DE LA UÑA*. Ha recibido este nombre toda la porción de la dermis cutánea que está en relación de contacto con la uña. Se divide en tres partes: la dermis subungular, la dermis supraungular y la ranura ungular.

a) La *dermis subungular* es la parte de la dermis sobre la cual descansa la cara profunda de la uña. Presenta dos zonas: una anterior, rosada (*techo de la uña*), y otra posterior, blancuzca, en relación con la lúnula (*matriz de la uña*).

β) La *dermis supraungular* (*manto de la uña* de RENAULT) es la parte de la dermis cutánea que, en forma de repliegue, se reclina sobre la raíz y sobre los bordes laterales de la uña. Su mayor lon-

gitud corresponde a nivel de la raíz; desde este punto va atenuándose hasta la parte inferior de los bordes laterales. Vista en corte, se parece a un triángulo, cuyo vértice mira al cuerpo de la uña.

γ) La *ranura ungular* es el ángulo diedro formado por la convergencia de la dermis supraungular con la dermis subungular. Está en relación con la raíz de la uña y con sus bordes laterales, que se engastan en ella como un vidrio de reloj en su ranura metálica.

4° **Pelos.** - Los pelos son producciones epidérmicas, filiformes y flexibles, que se desarrollan en mayor o menor número en la superficie libre de la piel. En ellos, como en las uñas, hay que distinguir: 1°, el *pelo propiamente dicho*, 2°, el *órgano productor del pelo*, comprendiendo el *folículo* y la *papila*.

A **PELO PROPIAMENTE DICHO.** — El pelo propiamente dicho es la formación epidérmica misma. Comprende: 1°, una parte libre, el *tronco* (es más o menos largo y termina en punta); 2°, una parte oculta en el folículo dérmico, la *raíz* (sufre una ligera estrangulación a su entrada en el folículo, luego se engruesa más o menos para formar el *bulbo*, masa ovoide o piriforme cuya extremidad interna cubre la papila). Se encuentran pelos en toda la superficie cutánea, excepto en la palma de la mano, en la planta de los pies, en la cara plantar y en la cara palmar de los dedos de las manos y de los pies y en los pequeños labios. Su desarrollo varía mucho según las regiones (cabeza, pubis, cara, etc.); los pelos muy reducidos de longitud constituyen el *vello* o *boto*. La implantación de los pelos sigue líneas curvas regulares, llamadas *corrientes*, las cuales se irradian en torno de un punto central llamado *remolino*. Los pelos se dividen en *cinco grupos*: cabellos, barba, pelos de los órganos genitales y de la axila, pelos anexos a los sentidos y pelos de la superficie cutánea general.

a) **Cabellos** — Son los pelos que se desarrollan en la superficie de la cabeza. Su *longitud* es muy variable y oscila de ordinario, en la mujer, entre 50 centímetros y un metro. Su *grosor* es también muy variable: de 15 a 30 centésimas de milímetro (PRUNER BEY). Su *color* varía mucho según las razas y los individuos: en el cuadro cromático de BROCA se cuentan 54 matices. TOPINARD reduce la gama a cinco tipos primordiales: *negro absoluto*, *pardo obscuro*, *castaño claro*, *rubio* y *rojo*. Su *abundancia* es muy variable según los individuos. Tocante a su *forma* y modo de enrollarse, se distinguen en: 1°, *cabellos lisos* (rectilíneos en toda su extensión); 2°, *cabellos ondulados* (que describen extensas curvas); 3°, *cabellos rizados* (formando ani-

llos anchos y siempre incompletos). 4.º, *cabellos lanudos* (formando anillos más pequeños y en mayor número, enredándose unos con otros, presentando las dos variedades interesantes de *cabellos en escoba* de los papues y *cabellos en grano de pimienta* de los bosquimanos). Hemos de recordar que por el aspecto exterior de los cabellos se han dividido las razas humanas en dos grandes grupos: *razas leucóticas* o de cabellos lisos y *razas ulóticas* o de cabellos rizados.

b) *Barba*. — Así se llama el conjunto de pelos que ocupan las diferentes regiones de la cara. Miden, por término medio, de 6 a 10 centímetros de longitud.

c) *Pelos de los órganos genitales y de las axilas*. — Los pelos de los órganos genitales aparecen, como la barba, en la época de la pubertad. Su máximo desarrollo se efectúa sobre el pubis. Su longitud raras veces excede de 5 a 8 centímetros. Los pelos de la axila tienen con los precedentes mucha analogía.

d) *Pelos anexos a los órganos de los sentidos*. — Son los siguientes: 1.º, las *pestañas* y las *cejas* (véase *Sentido de la vista*), 2.º las *vibrissas*, que ocupan la entrada de la nariz (véase *Aberturas nasales*, página 526), 3.º, los *pelos del conducto auditivo externo*, situados en la entrada de este conducto. Todos estos pelos son cortos, rectilíneos y más o menos rígidos.

e) *Pelos de la superficie cutánea general*. — Se encuentran preferentemente en la cara anterior del pecho, en los hombros y en los miembros. Siempre son más desarrollados en el hombre que en la mujer.

B. ORGANOS PRODUCTORES DEL PELO. Los pelos se implantan en depresiones cilíndricas de la dermis, que han recibido el nombre de *folículos pilosos* (Por lo que hace a su constitución, véanse los tratados de Histología.)

3. VASOS Y NERVIOS DE LA PIEL

Las arterias de la piel ofrecen tres tipos o modos de distribución

1.º **El tipo de áreas independientes.** — Comprende dos redes, la una hipodérmica y la otra infradérmica. Se le encuentra en las zonas poco vascularizadas (muñecas, dorso de la mano y del pie)

2.º **El tipo de finas anastomosis dérmicas.**

3.º **El tipo de doble red.** — Es el tipo clásico (cuero cabelludo, abdomen, miembros).

Ciertas regiones están más vascularizadas que otras, y así vemos como la piel de los miembros presenta una doble red bien desarrollada, pero con variantes, de suerte que en la cara de flexión posee vasos hipodérmicos menos voluminosos que en la de extensión. En general, las regiones no expuestas a presión ni a ninguna otra influencia mecánica tienen una vascularización menos abundante.

Las *venas* provienen de *vénuclas subcapilares* que desembocan en las venas subcutáneas.

Los *linfáticos* forman una *red subpapilar* abundante de donde parten numerosos trónculos que van a abrirse en los linfáticos del tejido celular subcutáneo.

Los *nervios* son muy numerosos y terminan por pequeños abultamientos (corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Ruffini), que se alojan bajo la dermis.

En la dermis las fibras nerviosas terminan libremente o en los *corpúsculos del tacto* (corpúsculos de Meissner).

En la epidermis se encuentran terminaciones nerviosas que se detienen en la capa mucosa de Malpighi.

CAPITULO II

SENTIDO DEL GUSTO (Lengua)

El gusto es aquel de nuestros sentidos que nos da la noción del sabor de los cuerpos. Los aparatos nerviosos terminales destinados a ser impresionados están diseminados por la superficie exterior de la lengua, con lo cual ésta resulta el órgano del gusto. Estudiaremos sucesivamente: 1.º su *conformación exterior*; 2.º, su *cuerpo muscular*; 3.º su *mucosa*, 4.º, sus *vasos* y sus *nervios*.

1. CONFORMACIÓN EXTERIOR

La lengua tiene la forma de un cono colocado en sentido sagital y fuertemente aplanado de arriba abajo, cuya punta resulta inclinada hacia delante. Se distinguen en ella dos porciones: una anterior o *bucal*, dispuesta horizontalmente, y la otra posterior o *faríngea*, vertical. Hemos de considerar en ella *dos caras*, *dos bordes*, la *base* y la *punta*.

1.º **Caras.** — Las dos caras se distinguen en superior e inferior.

a) La *cara superior* está en relación, por delante, con la bóveda palatina; por detrás con la cavidad de la faringe. En la línea media tiene un surco longitudinal más o menos marcado. En su parte más posterior se ven tres repliegues, uno medio y dos laterales, que la unen a la epiglotis *repliegue glosopiglótico*. (Para la configuración de esta cara, véase *Mucosa*.)

β) La *cara inferior*, mucho menos extensa que la precedente, descansa en su totalidad sobre el suelo de la boca, a la cual está unida por un repliegue medio, el *frenillo*. En la parte anterior, el frenillo está substituido por un surco medio más o menos marcado. En la parte inferior del frenillo y a cada lado de la línea media se levantan dos pequeños tubérculos en el vértice de estos tubérculos se ven los

orificios de los conductos excretorios de la glándula sublingual. Además, en las paredes laterales de esta cara son de notar las *dos venas raninas* (véase *Mucosa*).

2° **Bordes.** — Son libres y redondeados, mas delgados por delante que por detrás, correspondiendo a los arcos dentales.

3° **Base.** — Ancha y gruesa, está en relación sucesivamente de delante atrás 1°, con los músculos milohioideos y genihioideos; 2°, con el hueso hioides; 3°, con la epiglótis.

4° **Punta.** — Llamada también *vértice*, es aplanada de arriba abajo. En su parte media se juntan los dos surcos medios, superior e inferior. Está en relación con los incisivos.

2. CONSTITUCIÓN ANATÓMICA

Desde el punto de vista de su constitución anatómica, la lengua presenta: 1°, un *esqueleto osteofibroso*; 2°, músculos, los *músculos de la lengua*; 3°, un revestimiento mucoso, la *mucosa lingual*.

A. Esqueleto osteofibroso

Comprende: 1° un hueso, el *hioides*, 2°, dos láminas fibrosas, la *membrana glosohioidea* y el *septum* o *tabique medio*.

α) El *hioides* ha sido descrito en *Osteología*.

β) La *membrana glosohioidea* es una hoja fibrosa situada en la parte posterior de la lengua y dispuesta transversalmente. Nace en el borde superior del cuerpo del hioides. Desde este punto se dirige hacia arriba y adelante y desaparece después de haber recorrido un trayecto de 8 a 10 centímetros por entre fascículos musculares.

γ) El *septum medio* o *tabique lingual* es una lámina fibrosa colocada de canto en la línea media entre los dos músculos genioglosos. Tiene la forma de una pequeña hoz, cuya base se continúa con la membrana glosohioidea y, por mediación de ésta, con el hioides. Su punta, dirigida hacia delante, se pierde insensiblemente en medio de los fascículos musculares del vértice de la lengua. Su borde superior convexo, se dirige paralelamente a la cara dorsal de la lengua, de la cual está separado únicamente por un intervalo de 3 a 4 milímetros. Su borde inferior es cóncavo y está en relación con las fibras más internas del geniogloso.

B. *Músculos de la lengua*

La lengua comprende *diecisiete* músculos; uno solo es impar y medio, el lingual superior; todos los demás son pares y laterales, y quedan resumidos en el cuadro siguiente:

A. MÚSCULOS EX TRÍNSECOS.	{	Que nacen de los huesos próximos	Geniogloso	2
			Estilogloso	2
			Hiogloso	2
	{	Que nacen de los órganos próximos	Palatogloso	2
			Faringogloso	2
			Amigdalogloso	2
B. MÚSCULO INTRÍNSECO	{	Que nacen a la vez de los huesos y de los órganos próximos	Lingual superior	1
			Lingual inferior	2
			Transverso	1

17

1.º **Geniogloso.**—Es el más voluminoso de los músculos de la lengua y tiene la forma de un triángulo de vértice anterior.

INSERCIÓNES.—*Por delante*, se inserta en la apófisis geni superior. *Desde este punto*, se dirige hacia atrás desplegándose a manera de un ancho abanico, para terminar: 1.º, por sus *fibras inferiores*, en el hioides; 2.º, por sus *fibras superiores*, en la punta de la lengua; 3.º por sus *fibras medias*, en la cara profunda de la mucosa, desde la membrana glosohioidea hasta la punta.

RELACIONES.—Su *cara externa* está en relación con la glándula sublingual el conducto de Wharton la arteria lingual, el nervio hipogloso mayor y los tres músculos hiogloso, estilogloso y lingual inferior. Su *cara interna* está en relación con el geniogloso del lado opuesto (excepto a nivel del séptimo medio). Su *borde anterior*, cóncavo, está en relación con la mucosa de la cara inferior de la lengua. Su *borde inferior* descansa sobre el genihioideo.

ACCIÓN.—Por la acción de este músculo la lengua se apelacona sobre sí misma, aplicándose fuertemente sobre el suelo de la boca y sobre la cara posterior del maxilar inferior.

2.º **Estilogloso.**—Es un músculo largo y delgado que va desde la apófisis estiloides a las partes laterales de la lengua.

INSERCIÓNES.—*Por detrás*, se inserta en la apófisis estiloides y en las partes próximas del ligamento estilomaxilar. *Desde este punto*, se dirige oblicuamente hacia abajo y adelante, ensanchándose. Al lle-

gar a los lados de la lengua, se divide en *tres grupos de fascículos*: 1.º, *fascículos inferiores*, que se introducen entre las dos porciones del hiogloso y se continúan, por debajo de este músculo, en parte con el lingual inferior y en parte con el geniogloso, 2.º, *fascículos medios*, que siguen el borde de la lengua hasta la punta; 3.º, *fascículos superiores*, que se doblan hacia dentro para terminar en el séptum lingual.

RELACIONES. *Por fuera*, con la parótida, el pterigoideo interno, la mucosa lingual y el nervio lingual, *por dentro*, con el constrictor superior de la faringe y el hiogloso.

ACCIÓN. Dirige la lengua hacia arriba y atrás, aplicándola fuertemente contra el velo del paladar.

3.º Hiogloso. — Es un músculo delgado, aplanado, cuadrilátero situado en la parte lateral e inferior de la lengua.

INSERCIÓNES. — Nace *por abajo*, por dos porciones: 1.ª, en el cuerpo del hioides (llámase *basilogloso*); 2.ª, en el asta mayor (llámase *ceratogloso*). Estas dos porciones se dirigen hacia arriba y un poco adelante, y ganan la parte interna de la porción media del estilogloso. En este punto se doblan hacia dentro, se hacen horizontales y se mezclan con los fascículos superiores del estilogloso para ir a terminar, como estos últimos, en el séptum medio, desde la base de la lengua hasta la punta.

RELACIONES. — Está en relación: 1.º, por su *cara profunda*, con el constrictor medio de la faringe, el faringogloso, el geniogloso y la arteria lingual (que cruza oblicuamente de atrás adelante y de abajo arriba), 2.º, por su *cara superficial*, con los músculos milohioideo, estilohioideo y digástrico, con la glándula submaxilar, el conducto de Wharton y los dos nervios lingual e hipogloso mayor.

ACCIÓN. — Los dos hioglósos hacen descender la lengua al propio tiempo que la comprimen transversalmente.

4.º Palatogloso. — Llamado también *glosostafilino*, está situado en el espesor del pilar anterior del velo del paladar.

INSERCIÓNES. — Se inserta, *por arriba*, en la cara inferior del velo del paladar. *Por abajo* termina en la base y en el borde de la lengua, confundiendo sus fibras con las del faringogloso y de la porción media del estilogloso.

RELACIONES. — Con la mucosa lingual en la mayor parte de su extensión.

ACCIÓN. — Dirige la lengua hacia arriba y atrás.

5.º **Faringogloso.** — Está representado por un paquete de fibras musculares que el constrictor superior de la faringe manda al borde lateral de la lengua. Terminan: 1.º, las *superiores*, confundéndose con los fascículos del glosostafilino y del estilogloso, 2.º, las *inferiores*, continuándose (por debajo del hiogloso) con las fibras del lingual inferior. Cuando se contrae, el faringogloso dirige la lengua hacia atrás y arriba.

6.º **Amigdalogloso.** — Es un pequeño músculo aplanado y delgado, situado en la parte externa de la amígdala. Nace, por fuera de esta glándula, en la aponeurosis faríngea y desciende hacia la base de la lengua. En este punto, cambiando de dirección para hacerse transversal, gana la línea media (pasando por debajo del lingual superior) y se entrecruza con el del lado opuesto. Unidos entre sí, los dos músculos forman una especie de *cincha* que dirige hacia arriba la base de la lengua y la aplica contra el velo del paladar.

7.º **Lingual superior.** — Es un músculo impar y medio, situado en la cara superior de la lengua, desde la base hasta la punta.

INSERCIÓNES. Nace en la base de la lengua por tres fascículos: un *fascículo medio*, que se desprende del repliegue glosopiglotico medio, y dos *fascículos laterales*, que parten de las astas menores del hioides. Desde sus puntos de origen posteriores los tres fascículos precisados se dirigen hacia arriba y adentro ensanchándose, y pronto se fusionan con una hoja única, que ocupa la porción media de la lengua y puede seguirse hasta la punta.

RELACIONES. — Está en relación: 1.º por su *cara superficial*, con la mucosa lingual; 2.º, por su *cara profunda*, con los músculos subyacentes, 3.º, por los *lados*, con el glosopalatino, el glosofaríngeo y el estilogloso.

Acción. — Eleva la punta de la lengua y al mismo tiempo la dirige hacia atrás (*elevador y retractor* de la punta).

8.º **Lingual inferior.** — Situado en la cara inferior de la lengua, su principal origen parte de las astas menores del hioides (va reforzado por fascículos del glosofaríngeo y del estilogloso). Desde este punto se dirige hacia delante y arriba para terminar en la mucosa que reviste la punta de la lengua. En cuanto a su *acción*, acorta la lengua en sentido anteroposterior, al mismo tiempo que dirige su punta hacia abajo y atrás (*depressor y retractor* de la punta).

9.º Transverso.—Está constituido por fascículos transversales, que tanto al uno como al otro lado toman origen, *por dentro*, en el séptum lingual y vienen a terminar, *por fuera*, en la mucosa de los bordes de la lengua. Estos fascículos, al contraerse, aproximan los bordes de la lengua a la línea media, la lengua se pone redonda y afilada, proyectando su punta fuera de la cavidad bucal.

C. Mucosa lingual

La mucosa lingual envuelve la lengua en toda su extensión, excepto la base, alrededor de la cual se la ve reflejarse para continuarse con las mucosas vecinas (las de la faringe, de la laringe, del velo del paladas, de las encías y del suelo de la boca)

1.º Caracteres físicos.—Delgada y transparente en la cara inferior de la lengua, la mucosa se engruesa al llegar a los bordes, y su máximo espesor corresponde a la cara dorsal, cerca de la línea media. Su *consistencia*, escasa en la cara inferior y en los bordes, es también mucho mayor en la cara dorsal. Su *color* es rosado en la cara inferior; en la cara superior es rosado después de las comidas, blanco amarillento después de una abstinencia de algunas horas, y principalmente por la mañana en ayunas.

2.º Papilas de la lengua.—Según su forma, se dividen en cinco grupos:

a) *Papilas caliciformes*.—Son las más voluminosas y las más importantes. Se componen de las tres partes siguientes: 1.º, un *mamellón central* o *papila* propiamente dicha (de un milímetro o milímetro y medio de altura), ligeramente estrangulada en su extremidad adherente a la base, 2.º, un *rodete circular*, que la rodea a manera de cáliz (*vallum*); 3.º, un *surco*, igualmente circular y por lo general bastante marcado; se halla situado entre la papila y su rodete.

b) *Papilas fungiformes*.—Semejantes a una seta se componen esencialmente de una *cabeza* más o menos voluminosa, sostenida por un *pedículo* más o menos largo. Por término medio miden 1,2 milímetros de altura por 0,8 milímetros de grosor.

c) *Papilas filiformes*.—Se presentan en forma de pequeñas prominencias cilíndricas o cónicas, de cuyo vértice sale un ramo de prolongaciones filiformes. Miden de un tercio de milímetro a tres milímetros de longitud.

d) *Papilas foliadas* -Son pliegues verticales situados en los bordes de la lengua, cerca de la base. Son rudimentarias en el hombre y se hallan en extremo desarrolladas, por el contrario, en ciertos animales, en los cuales constituyen los *órganos foliados* u *órganos laterales del gusto*.

e) *Papilas hemisféricas*. Son mucho más pequeñas que las precitadas y tienen las mayores analogías con las papilas dérmicas de la piel.

3° **Distribucion topográfica de las papilas linguales.**—Todas estas papilas ocupan en la superficie de la lengua una situación determinada. Las *papilas caliciformes*, en número de nueve a once, están situadas en la cara dorsal de la lengua (en el punto de unión de su tercio posterior con sus dos tercios anteriores), en donde forman la V lingual (en este punto es de notar el *agujero ciego*, que corresponde a la papila del vértice de la V). Las *papilas fungiformes*, en número de ciento cincuenta a doscientas, están irregularmente distribuidas por la cara dorsal de la lengua, por delante de la V lingual (también las hay por detrás de la V, pero en corto número). Las *papilas filiformes* ocupan toda la porción de la cara dorsal de la lengua situada por delante de la V. Están dispuestas en series lineales, que se dirigen oblicuamente del surco medio de la lengua hacia los bordes. Las *papilas foliadas* están situadas en la parte posterior de los bordes. Las *papilas hemisféricas* se encuentran en toda la extensión de la mucosa lingual.

4° **Constitución anatómica.**—Para lo concerniente a la estructura de la mucosa lingual y de sus papilas, véanse los tratados de Histología.

5° **Glándulas** -Las glándulas anexas a la mucosa lingual son de dos clases: glándulas foliulares y glándulas mucosas.

a) Las *glándulas foliulares* están situadas en el dorso de la lengua, por detrás de la V, en donde forman una serie continua desde la epiglottis a las papilas caliciformes y desde una amígdala a la otra. Son pequeñas eminencias, irregularmente hemisféricas o lenticulares, de 1 a 4 milímetros de diámetro, que levantan la mucosa a su nivel y presentan en su punto central un pequeño orificio que conduce a una cavidad central (Para la estructura, véanse los tratados de Histología.)

β) Las *glándulas mucosas* son glándulas en racimo, dispuestas en tres grupos: 1.º *grupo posterior*, impar y medio, que comprende todas las glándulas situadas por detrás de la V, entre las dos amígdalas. 2.º *grupo lateral*, que forma a lo largo de los bordes un reguero continuo desde las papilas caliciformes hasta la punta (a nivel de las papilas foliadas hay un pequeño grupo especial, conocido con el nombre de *glándulas de Weber*). 3.º *grupo anteroinferior o grupo de la punta*, que constituye, en la cara inferior de la lengua y a cada lado de la línea media, la *glándula de Blandin* o *glándula de Nuhn*.

3. VASOS Y NERVIOS

1.º **Arterias.** — Las arterias destinadas a la lengua provienen, principalmente, de la lingual, rama de la carótida externa (véase ANGIOLOGÍA); *accesoriamente*, de la palatina inferior y de la faríngea inferior.

2.º **Venas.** — Las venas se dirigen en su mayor parte a la cara externa del músculo hiogloso, y se unen aquí en un tronco común, la vena lingual *propriadamente dicha*, que desemboca en la yugular interna (véase ANGIOLOGÍA).

3.º **Linfáticos.** — Los linfáticos de la lengua forman debajo de la mucosa, en la zona subpapilar del corion, por delante de la V lingual, una rica red, la red *subpapilar*. Los troncos y tronquitos que nacen de esta red se dividen en *posteriores*, *anteriores*, *laterales* y *medios*. Los *linfáticos posteriores* (cuatro o seis) se dirigen unos hacia la epiglótis y los otros hacia las amígdalas, para venir a terminar en dos o tres ganglios situados por delante de la yugular interna. Los *linfáticos apicales o anteriores*, en número de dos, descienden al espesor de la lengua, para terminar, uno en los ganglios suprahioides y el otro en los ganglios de la cadena yugular interna. Los *linfáticos laterales o marginales* parten de los bordes de la lengua (ocho o diez) y terminan, unos en los ganglios submaxilares y los otros en los ganglios yugulares internos. Los *linfáticos medios o centrales* proceden de la porción media de la red mucosa y se dirigen a los ganglios de la cadena yugular interna.

4.º **Nervios.** — Se dividen en motores y sensitivos.

a) **Nervios motores.** — Los nervios motores, destinados al cuerpo muscular, provienen: 1.º, del *facial*, para el estiloso y el glosaeste-

filino, y a veces también para el lingual inferior; 1.ª, del *hipogloso mayor*, para los demás músculos de la lengua.

b) *Nervios sensitivos*. — Los nervios sensitivos destinados a la mucosa, provienen de tres orígenes: 1.º, del *nervio lingual* (comprendiendo en él la cuerda del tímpano), que se ramifica por los dos tercios anteriores de la mucosa; 2.º, del *nervio glosófaringeo*, que se distribuye por las papilas calciformes y por la porción de la mucosa que está situada por detrás de la V, 3.º, del *nervio laríngeo superior*, que envía algunos filetes a la porción de la mucosa más próxima a la epiglottis. Estos nervios, a la vez sensitivos, sensoriales, vasomotores y glandulares, terminan de tres maneras: 1.ª, por arborizaciones libres, en las papilas y en el epitelio, 2.ª por extremidades libres, en unos pequeños cuerpos especiales llamados *mamelones del gusto* (*fibras intergemmales, fibras perigeminales, fibras intragemmales*); 3.ª, por extremidades libres, en los ácinos glandulares (véanse los tratados de Histología).

CAPITULO III

SENTIDO DEL OLFATO (Fosas nasales y pituitaria)

Las terminaciones nerviosas destinadas a recoger las impresiones olorosas están diseminadas en la parte superior de la mucosa pituitaria, la cual tapiza en toda su extensión las fosas nasales. Describiremos sucesivamente: 1.º, la *nariz*, 2.º, las *fosas nasales*.

1. NARIZ

Se da el nombre de *nariz* a esa eminencia voluminosa, impar y media que, dispuesta a manera de tejadillo, se encuentra sobre la entrada de las fosas nasales.

1.º **Conformación exterior.**—Tiene la forma de una pirámide triangular de base inferior. Se consideran en ella *tres caras, tres bordes, vértice y base*.

a) *Caras* — Son tres: dos laterales y una posterior. Las *caras laterales* son planas triangulares e inclinadas hacia la región de las mejillas. Fijas en su mitad superior, son movibles en su mitad inferior (*alas de la nariz*). La *cara posterior* está representada por dos canales, que se confunden con las dos fosas nasales.

b) *Bordes* — Son tres: dos laterales y uno anterior. Los *bordes laterales* forman, con las partes próximas de la cara, un surco longitudinal, que toma sucesivamente los nombres de *nasopalpebral*, *nasogeniano* y *nasolabial*. El *borde anterior o dorso de la nariz* está representado por una línea que se inclina más o menos hacia delante y termina por abajo en una eminencia redondeada llamada *lóbulo de la nariz*. Según los casos, el dorso de la nariz puede ser rectilíneo (*nariz recta*), cóncavo (*nariz arremangada*) o convexa (*nariz aguijeña*).

c) *Vértice*. Corresponde al espacio intercililar. Es convexo en sentido transversal y cóncavo en sentido vertical. Llámanse *nariz griega* aquella cuyo borde anterior se continúa directamente con la línea de la frente sin formar depresión.

d) *Base*. — Horizontal en la nariz recta, es oblicua hacia abajo en la nariz aguileña y oblicua hacia arriba en la nariz arremangada. Presenta un tabique medio, el *subtabique*, y a cada lado orificios llamados *aberturas inferiores de la nariz*. Estos orificios son redondeados o elípticos y su eje mayor varía según las razas: es anteroposterior en las razas blancas, transversal en las razas negras y oblicuo en las razas amarillas.

2.º **Constitución anatómica.** — La nariz se compone de 1.º, *esqueleto*; 2.º, *capa muscular*; 3.º, *cubierta exterior*; 4.º, *cubierta interior*.

A. **ESQUELETO.** — Comprende *huesos*, *cartílagos* y una *membrana fibrosa*.

a) *Huesos*. Son los siguientes: 1.º, huesos propios de la nariz; 2.º, rama ascendente del maxilar superior y borde anterior de su apófisis palatina (véase **OSTEOLOGÍA**).

b) *Cartílagos*. — Hay tres cartílagos principales (*cartílagos del tabique*, *cartílagos laterales*, *cartílagos del ala de la nariz*) y cartílagos accesorios.

a) El *cartilago del tabique* está situado en la línea media y ocupa el espacio angular comprendido entre la lámina perpendicular del vomer y el vómer. Presenta *dos caras laterales*, que corresponden a las fosas nasales, y *cuatro bordes*, dos anteriores y dos posteriores.

β) Los *cartílagos laterales*, en número de dos, uno derecho y el otro izquierdo, tienen también cada uno la forma de una lámina triangular, cuya base situada en la línea media, se confunde en parte con el cartilago precedente, y cuya punta, más o menos redondeada, se dirige hacia el surco nasogeniano.

γ) Los *cartílagos del ala de la nariz*, uno derecho y otro izquierdo, están situados por debajo del precedente. Cada uno de ellos tiene la forma de una U, con: 1.º, una *hoja externa*, que corresponde al ala de la nariz; 2.º, una *hoja interna*, en relación con el subtabique; 3.º, una *parte media*, en relación con el dorso de la nariz.

δ) Los *cartílagos accesorios*, situados entre los precedentes, son: 1.º, los *cartílagos cuadrados* (dos o tres a cada lado), en la parte posterior e inferior del ala de la nariz, 2.º, los *cartílagos sesamoideos* (en número variable), entre el cartilago lateral y el cartilago del ala de la

nariz; 3.º, los *cartílagos vomerianos* o *cartílagos de Huschke*, que ocupan el borde posteroinferior del cartílago del tabique.

c) *Membrana fibrosa*. — Llena todos los espacios que dejan libres los cartílagos precitados. Es una dependencia del periostio y del pericondrio.

B. *CAPA MUSCULAR*. — La forman los músculos piramidal, triangular de la nariz, mirtiforme, dilatador propio de las aberturas nasales, elevador común del ala de la nariz y del labio superior.

C. *CUBIERTA EXTERIOR*. — Está representada por la piel de la nariz, que está forrada de una capa de tejido celuloadiposo, excepto a nivel del lóbulo. Es de notar el desarrollo de las glándulas sebáceas.

D. *CUBIERTA INTERIOR*. — Está representada: 1.º, *por abajo y delante*, por la piel de las aberturas nasales. 2.º, *por arriba y atrás*, por la mucosa pituitaria (véase más adelante).

3.º *Vasos y nervios*. — Las *arterias* provienen de la nasal (rama de la oftálmica) y de la facial, que envían a la nariz la arteria dorsal y la arteria del subtabique. Las *venas* desembocan unas en la angular y otras en la facial. Los *linfáticos* se distinguen en tres grupos: *superiores*, que parten de la raíz de la nariz y terminan en los ganglios parotídeos superiores, 1.º, *medios* (tres o cuatro), que nacen debajo de los precedentes y van, ora a los ganglios inferiores, ora a los ganglios submaxilares; 3.º, *inferiores* (de seis a diez), que descienden oblicuamente por las partes laterales de la cara, para terminar en los ganglios submaxilares. Los *nervios* son motores o sensitivos: los *nervios motores*, destinados a los músculos, provienen de la facial; los *nervios sensitivos*, destinados a la piel, emergen del nasal externo, del suborbitario y del nasolobular (rama del nasal interno).

3. FOSAS NASALES Y PITUITARIA

Las fosas nasales son dos, derecha e izquierda, representan dos largos conductos dirigidos de delante atrás. Se distinguen en ella tres partes, que son, de delante atrás: 1.º, las *aberturas nasales*; 2.º, las *fosas nasales propiamente dichas*; 3.º, la *cavidad posterior de las fosas nasales*.

A. *Aberturas nasales*

Las aberturas nasales, llamadas también *vestíbulos de las fosas nasales*, ocupan la parte anterior de estas cavidades. Su revestimiento interno está formado por la piel y no por una mucosa.

1.º Configuración y relaciones.— En cada una de las aberturas nasales hay que considerar dos paredes, interna y externa; dos extremidades, anterior y posterior, y dos orificios, inferior y superior. La *pared interna*, de 10 a 14 milímetros de altura, está en relación: 1.º, en su tercio superior, con el cartilago del tabique, 2.º, en sus dos tercios inferiores, con el cartilago del ala de la nariz. Es de notar que el borde superior de este último forma una eminencia anteroposterior muy marcada; por encima de esta eminencia, la piel es lisa y sin pelo; por debajo, rugosa y provista de pelos. La *pared externa*, de 14 a 16 milímetros de altura, está en relación con el cartilago del ala de la nariz. Tiene la forma de una bóveda de concavidad infero-interna y tiene largos pelos en su parte inferior. La *extremidad posterior* es regularmente redondeada. La *extremidad anterior* se prolonga dentro del lóbulo en un pequeño fondo de saco, el *vestibulo del lóbulo de la nariz*. También está poblado de pelos. El *orificio inferior* es el mismo orificio anterior de las fosas nasales. El *orificio superior*, muy estrecho, está dispuesto en forma de hendidura anterosuperior y pone en comunicación la abertura nasal con la fosa nasal correspondiente. Sirve de límite entre la piel y la mucosa.

2.º Cubierta cutánea. La piel que cubre la abertura nasal se continúa, *por abajo*, con la de la cara, y *por arriba*, con la pituitaria. Se distingue por la presencia de largos pelos, llamados *vibrissas*.

3.º Vasos y nervios. Las *arterias* proceden de diversas fuentes: de las etmoidales, de la esfenopalatina y de la arteria del subtabique. Las *venas* desembocan en la facial. Los *linfáticos* van a parar a los ganglios submaxilares. Los *nervios* emanan del nasal interno.

B Fosnas nasales propiamente dichas, pituitaria

Las fosnas nasales las hemos descrito en OSTRZOLÓGIA; por lo tanto, para no incurrir en repeticiones, aquí trataremos únicamente de la pituitaria.

1.º Disposición de la pituitaria. La pituitaria, llamada también *mucosa nasal*, *membrana de Schneider* y *mucosa olfatoria*, reviste sin interrupción las paredes de las fosnas nasales.

a) En la *pared superior* o *bóveda* cierra todos los agujeros de la lámina cribosa. A nivel del orificio del seno esfenoidal penetra en este seno y reviste regularmente las paredes.

β) En la pared externa, la pituitaria se extiende sucesivamente sobre la concha superior y el meato superior, la concha media y el meato medio, la concha inferior y el meato inferior. En el meato superior pasa por delante del agujero esfenopalatino cerrándolo; por otra parte, envía una prolongación dentro de las células etmoidales posteriores (orificio único y múltiple). En el meato medio se encuentran dos orificios: el orificio del seno maxilar y el orificio que está sucesivamente en relación con el infundíbulo. Penetra en estos dos orificios para tapizar, de una parte, el seno maxilar, y de otra parte, las células etmoidales anteriores y el seno frontal. Es de notar que el orificio del seno maxilar está considerablemente estrechado por la pituitaria. Nótese también que el infundíbulo se continúa con la pared externa de las fosas nasales por un canal oblicuo hacia abajo y atrás (*canal del infundíbulo*), el cual está limitado, por dentro, por un repliegue ascendente de la mucosa (*repliegue unciforme*), y por fuera, por una eminencia más o menos voluminosa, el *promontorio de las fosas nasales de Zoja* o bulbo etmoidal de Zuckerkandl. En el meato inferior, la pituitaria halla el orificio inferior del conducto nasal. Penetra en él, para tapizarlo en toda su extensión (véase más adelante *Conducto nasal*).

γ) En el suelo, la pituitaria reviste muy uniformemente los huesos que lo constituyen. A nivel del conducto palatino anterior se introduce en él formando un pequeño fondo de saco, que en general no ocupa más que el tercio o la cuarta parte superior de este conducto.

δ) En la pared interna se extiende muy uniformemente también, sin modificar en su aspecto exterior las diferentes piezas óseas o cartilaginosas que forman el tabique. Es de notar en su parte anterior e inferior, la existencia de un pequeño orificio que conduce a una pequeña cavidad tubulosa, de 2 a 7 milímetros de longitud, llamada *tubo de Ruysch* (homólogo en los animales del *órgano de Jacobson*).

ε) A nivel de los orificios anterior y posterior (conas), la pituitaria se continúa, por una parte, con la piel de las ventanas de la nariz, y por otra, con la mucosa de la faringe.

1° **Caracteres físicos.**— La pituitaria tiene un color rosado en su parte externa superior, con un reflejo amarillento (*locus luteus de Ecker*). Su grosor es variable: de 1 a 3 milímetros en las fosas nasales; tiene un tercio, un cuarto y aun una décima de milímetro en el seno. Su consistencia es blanda y su resistencia escasa. Su adherencia al esqueleto es en toda su extensión íntima aunque menos fuerte en el tabique y en el suelo.

3.º Constitución anatómica. Se compone: 1.º, de una capa profunda o *corion*; 2.º, de una capa superficial o *epitelio*, 3.º, de *glándulas*

a) *Corion* (véanse los tratados de Histología)

b) *Epitelio* — Contiene tres clases de células: *celulas epiteliales* propiamente dichas, *celulas basales* y *celulas olfatorias* (véanse los tratados de Histología) Es de notar que estas últimas, que son verdaderas células nerviosas (*neurona olfatoria periférica*), únicamente se encuentran en la parte superior de la pituitaria, en donde se divide esta última en dos partes: una parte superior u *olfatoria* y una parte inferior o *no olfatoria*. La línea de demarcación de las dos regiones sería un plano horizontal que pasara: para ciertos autores por el borde libre de la concha media y para otros (entre ellos von BRUNN), a 7 milímetros por encima del borde libre de la concha superior.

c) *Glándulas* — Son muy numerosas (de 30 a 50 por centímetro cuadrado, SAPPEN, y se encuentran lo mismo en la porción no olfatoria que en la porción olfatoria y en los senos.

4.º Vasos y nervios. — Las arterias provienen: 1.º, de las etmoidales anterior y posterior. 2.º, de la esfenopalatina; 3.º, de la nasal posterior; 4.º, de la suborbitaria; 5.º, de la pterigopalatina; 6.º, de la facial. Forman en la pituitaria tres redes: una *red profunda*, en relación con el periostio; una *red media*, para la porción media del corion mucoso, una *superficial*, situada por debajo de la membrana basal. Las venas son muy numerosas se hallan anastomosadas en un rico plexo (*cuerpos cavernosos de la pituitaria*, y se dividen en: 1.º *anteriores*, que salen de las fosas nasales por su orificio anterior para terminar en la facial, 2.º, *posteriores*, que atraviesan el agujero esfenopalatino para desembocar en el plexo maxilar interno, 3.º, *superiores*, que constituyen las venas etmoidales anterior y posterior, tributarias de la oftálmica. Los *linfáticos* forman una red muy rica que se extiende por la pituitaria. En los troncos y tronquitos eferentes se distinguen dos grupos: 1.º, *linfáticos anteriores*, que se dirigen hacia delante y abajo, y terminan en los ganglios submaxilares; 2.º, *linfáticos posteriores*, los más importantes; se dirigen hacia atrás hasta la pared lateral de la faringe, y, desde allí, van a terminar, unos (*superiores*) en uno o dos ganglios situados detrás de la faringe, delante del cuerpo del axis, otros (*medios e inferiores*, en los ganglios de la cadena yugular interna. Los nervios se dividen en nervios de sensibilidad general y nervios de sensibilidad especial: los primeros pro-

viene del nasal interno, del esfenopalatino, del nasal posterior (ramo del palatino anterior) y del pterigopalatino, y los *segundos* emanan del olfatorio (véase este nervio).

C. *Cavidad posterior de las fosas nasales*

La cavidad posterior de las fosas nasales es propiamente la porción superior de la faringe o *faringe nasal*. La describiremos al hablar de este último órgano.

CAPITULO IV

SENTIDO DE LA VISTA

(Ojos y sus anexos)

El órgano esencial del sentido de la vista es el *globo ocular*, y más especialmente una de sus membranas, la *retina*, en la cual se encuentran reunidos los aparatos nerviosos terminales destinados a percibir las impresiones luminosas. Estudiaremos sucesivamente: 1.º, el *globo ocular* propiamente dicho; 2.º, sus *anexos*.

ARTÍCULO PRIMERO

OJO O GLOBO OCULAR

El ojo órgano par, simétricamente colocado en la base de la órbita, tiene la forma de una esfera ligeramente aplanada de arriba abajo. Su diámetro anteroposterior mide 25 milímetros, su diámetro transversal, 23,5 milímetros, su diámetro vertical, 23 milímetros. El ojo pesa de 7 a 7,5 gramos.

1.º **Topografía ocular.** — Se distingue en él, como en el globo terrestre, al cual se ha comparado: 1.º, un *polo anterior* y un *polo posterior* (que son los dos puntos de la superficie exterior que atraviesa el diámetro anteroposterior del órgano); 2.º, un *ecuador* (que es el círculo mayor perpendicular al eje anteroposterior, en el cual cada uno de los puntos es equidistante de los dos polos); 3.º, dos *hemisferios*, uno anterior y el otro posterior (son dos segmentos del ojo que están situados uno por delante y el otro por detrás del ecuador); 4.º, *meridianos*, en numero ilimitado (que son todos los círculos máximos que pasan a la vez por ambos polos).

1.ª Relaciones generales. — El globo ocular está situado en la parte anterior de la cavidad orbitaria.

a) *Relaciones del eje ocular con el eje orbitario.* El eje anteroposterior de los dos ojos diverge de atrás adelante: este ángulo, llamado *ángulo de divergencia*, es de 10 grados. Como el eje orbitario se inclina sobre el plano medio 23°, resulta que este eje orbitario y el eje ocular correspondiente se inclinan el uno sobre el otro en un ángulo de 18°.

b) *Relaciones del ojo con las paredes orbitarias* — El globo del ojo está más aproximado a la pared externa que a la interna, y un poco más aproximado a la pared superior que a la inferior.

c) *Relaciones del ojo con la base de la órbita* — En un corte sagital, el vértice de la córnea transparente está situado a corta distancia de una línea recta que uniese los puntos más salientes de los rebordes orbitarios superior e inferior. En un corte horizontal, la línea que une el borde interno al borde externo de la órbita pasa muy por detrás de la córnea; *por dentro* encuentra la parte anterior del cuerpo ciliar, *por fuera* pasa un poco por detrás de la *ora serrata*.

3.ª Constitución anatómica. — El ojo se compone 1.º, de tres túnicas concéntricas, que son, referidas de fuera adentro: la *túnica fibrosa*, la *túnica vascular* y la *túnica nerviosa*; 2.º, medios transparentes, que son, de delante atrás: el *humor acuoso*, contenido dentro de las *cámaras del ojo*, el *cristalino* y el *cuerpo vítreo*.

1. TÚNICA FIBROSA DEL OJO

La túnica fibrosa del ojo, muy gruesa y muy resistente casi inextensible se divide en dos porciones: una porción posterior, la *esclerótica*, y una porción anterior, la *córnea*.

A. Esclerótica

La esclerótica, o *córnea opaca*, representa aproximadamente las cinco sextas partes posteriores de la túnica externa del ojo. Por término medio pesa 1 15 gramos. Su espesor es de un milímetro en la parte posterior, de 0,6 milímetros en la anterior y de 0,4 milímetros en su parte media.

1.º Forma y relaciones. — La esclerótica es un segmento de esfera hueca, cuyo radio sería de 11 a 12 centímetros. Hemos de

considerar en ella dos superficies, interior y exterior, y dos orificios, anterior y posterior.

a) *Superficie exterior*. — Es convexa, azulada en el niño, blanco-nacarada en el adulto y ligeramente amarilenta en el viejo. Está en contacto con la cápsula de Tenon. En ella se insertan los cuatro músculos rectos del ojo y también los dos oblicuos. Se ven en ella diferentes orificios que la atraviesan y se distinguen en: 1.º, *posteriores*, en número de quince a veinte, dispuestos alrededor del nervio óptico, que dan paso a las arterias ciliares posteriores y a los nervios ciliares; 2.º, *anteriores*, dispuestos alrededor de la córnea (para las arterias ciliares anteriores, venillas y linfáticos); 3.º, *medios*, en número de cuatro situados un poco por detrás del ecuador (para los cuatro vasos varicosos y los linfáticos correspondientes)

b) *Superficie interior*. — Es cóncava, de coloración negruzca y está en contacto con la coroides. Está unida a ésta por vasos y nervios que la atraviesan y por una capa de tejido conjuntivo laxo, llamada *lámina fusca*.

c) *Abertura posterior*. — Destinada a dar paso al nervio óptico está situada a 3 milímetros por dentro y 1 milímetro por debajo del polo posterior. Es un orificio cortado a bisel, cuyo diámetro disminuye de atrás adelante; no es cilíndrico, sino cónico truncado, de base posterior (siendo su diámetro de 4 a 5 milímetros en su parte posterior y de 1 a 1,5 milímetros en su parte anterior). Está cerrado por delante por una membrana fibrosa sembrada de agujeros, la *lámina cribosa*, constituida por las laminillas más internas de la esclerótica, a las que se unen, en su parte extrema anterior, cierto número de fascículos procedentes de la coroides. A través de la lámina cribosa se tamizan los fascículos del nervio óptico antes de terminar en la retina.

d) *Abertura anterior*. — La abertura anterior, destinada a recibir la córnea transparente, está cortada a bisel a expensas de las capas internas de la esclerótica. El bisel es irregular *visto por detrás* es una circunferencia regular, de la cual todos los diámetros miden 13 milímetros; *visto por delante* es un orificio oval de eje mayor transversal, cuyo diámetro transversal es de 12 milímetros y el diámetro vertical de 11 milímetros solamente. A nivel de la línea de soldadura esclerocoraeal y en la porción extrema posterior de esta línea se encuentra un pequeño conducto de forma oval, llamado *conducto de Schlemm*, el cual tiene la significación de un conducto linfático o de un seno venoso que transporta a la vez sangre venosa y humor acuoso. Un poco por delante del conducto de Schlemm se ven algunos

pequeños vasos venosos, cuyo conjunto constituye el *plexo venoso de Leber*, proceden del conducto de Schlemm y van a parar a las venas musculares.

2° **Constitución anatómica.** (Véanse los tratados de Histología.)

3° **Vasos y nervios.**— Las *arterias* emanan de las ciliares cortas y posteriores y de las ciliares anteriores. Las *venas* van a las ciliares anteriores y a las coroidales. Los *linfáticos* no son conocidos. Los *nervios* provienen de los ciliares.

B. Córnea

La córnea es una membrana transparente (*córnea transparente*), engastada en la abertura anterior de la esclerótica. Representa un segmento de esfera, cuyo radio es un poco más pequeño que el de la esclerótica, resultando de ello que la córnea representa, con relación a la esfera ocular, una parte ligeramente abombada. Su espesor es de 1 milímetro en su porción periférica y de 0,8 milímetros en su porción central.

1° **Forma y relaciones.**— La córnea, como todo segmento de esfera hueca, presenta *dos caras* (anterior y posterior) y una *circunferencia*.

a) *Cara anterior.*— Convexa, lisa y uniforme está en relación, según las circunstancias, con la atmósfera o con los párpados. De forma oval, mide 12 milímetros en sentido transversal y 11 milímetros solamente en sentido vertical. Su radio de curvatura es de 7 u 8 milímetros.

b) *Cara posterior.*— Es cóncava, lisa y uniforme; está en relación con el humor acuoso. Por lo regular, es circular y mide 13 milímetros en todos sus diámetros. Su radio de curvatura es de 7,5 milímetros.

c) *Circunferencia.*— La circunferencia o *limbo corneal* está cortada a bisel a expensas de sus láminas anteriores. Además, este bisel es más pronunciado por arriba y por abajo que por fuera y por dentro: resulta de esto que la esclerótica, cubriendo una parte de la cara anterior de la córnea en todo su contorno, la cubre más por su diámetro vertical que por los dos extremos de su diámetro transversal. Es de notar que a nivel de su punto de contacto, las dos mem-

branas, córnea y esclerótica, están unidas entre sí por fusión de tejido. Es de notar también que, en las personas de alguna edad, se ve aparecer, en la región circunferencial una línea estrecha, de color grisáceo, que se designa con el nombre de *arco senil*.

1.º Constitución anatómica. La córnea comprende *cinco capas*, que son, referidas de delante atrás

1.ª La *capa epitelial anterior*, en relación con la capa epitelial de la conjuntiva.

2.ª La *lamina elastica anterior*, que se continúa con la basal de la conjuntiva y tiene la misma significación

3.ª El *tejido propio de la córnea*, de naturaleza fibrosa

4.ª La *lámina elástica posterior (membrana de Descemet o de Demours)*, anhistia en la mayor parte de su extensión, se hace fibrilar en su parte periférica y se engruesa en la parte interna del conducto de Schlemm para formar el *anillo tendinoso de Dollinger*. Más allá del anillo tendinoso, las fibrillas constitutivas de la lámina elástica posterior, divergiendo en forma de abanico, están dispuestas en tres planos: *fibrillas anteriores*, constitutivas de la lámina elástica posterior divergen pasando por detrás del conducto de Schlemm y desaparecen en la esclerótica, *fibrillas medias*, que terminan en los fascículos del músculo ciliar, *fibrillas posteriores*, que se reflejan de delante atrás para venir a perderse en la cara anterior del iris (el conjunto de estas últimas fibrillas constituye el *ligamento pectíneo de Hueck*). Este ligamento pectíneo triangular en corte, se compone esencialmente de fascículos fibrilares, irregularmente anastomosados, que circunscriben espacios muy irregulares, los *espacios de Fontana*: están en comunicación por una parte con el conducto de Schlemm, y por otra, con los espacios linfáticos del iris y de la cámara anterior

5.ª La *capa epitelial posterior*, formada por una sola línea de células apiladas, de contornos poliédricos (véanse los tratados de Histología)

3.º Vasos y nervios. No hay *vasos sanguíneos* en la córnea, únicamente en el borde (entre la lámina elástica anterior y el tejido corneal) hay algunos finos capilares que forman una zona de 1 ó 2 milímetros de anchura, dispuestos en asa. Tampoco hay *vasos linfáticos*, en concepto de conductos claramente definidos. En cambio son muy numerosos los *nervios*, que provienen de los cilares y penetran en la córnea por la circunferencia. Se dividen en *posteriores y anteriores*,

formando tres plexos, que, de atrás adelante, son el *plexo subbasal*, el *plexo subepitelial* y el *plexo intraepitelial*.

2.º TÚNICA VASCULAR DEL OJO

La túnica media del ojo (*túnica, tractus uveal, membrana iridocoroidea, membrana nutricia del ojo*) es una membrana de color obscuro, situada entre la túnica fibrosa y la túnica nerviosa. Se divide en tres partes: 1.º, una parte posterior o *coroides propiamente dicha*; 2.º, una parte medio o *zona ciliar*; 3.º, una parte anterior o *iris*.

A. Coroides propiamente dicha

La coroides representa un segmento de esfera hueca, intercalado entre la esclerótica y la retina. Tiene un tinte algo obscuro tirando a pardo o negro, es de escasa consistencia, y su espesor, de cuatro décimas de milímetro en su parte posterior, es de tres y hasta de dos décimas de milímetro en su parte anterior.

1.º **Forma y relaciones.** — Hemos de considerar en ella, como en la esclerótica, *dos caras y dos aberturas*:

a) *Cara exterior* — Es convexa y está en relación con la esclerótica, de la cual está separada por la lámina fusca.

b) *Cara interior* — Es cóncava y está en relación con la retina, sobre la cual se amolda sin adherirse a ella (en ciertos animales se ve, en la parte posterior de la coroides, una mancha brillante, de reflejos irisados, que ha recibido el nombre de *tapiz*).

c) *Abertura posterior*. — Da paso al nervio óptico. Es de notar que, en este punto, cierto número de elementos de la coroides contribuyen a formar la lámina cribosa (pág. 533).

d) *Abertura anterior*. — Limitada también *borde anterior* de la coroides, está situada un poco por delante del ecuador del ojo. Se continua con la zona ciliar. El límite de separación entre las dos formaciones está indicado por una línea circular, festoneada con bastante regularidad, que se llama *ora serrata*.

2.º **Constitución anatómica.** — Consta de *cuatro capas* concéntricas, que son de fuera adentro:

1.º La *lámina fusca*, capa conjuntiva situada entre la esclerótica y la coroides (*espacio supracoroideo de Schwalbe*).

2.º La *capa de los grandes vasos*, que comprende a su vez: un plano profundo formado por las arterias; un plano superficial for-

mado por las venas (éstas dispuestas en remolinos y llamados *vasa vorticosa*). Todos estos vasos están envueltos en una atmósfera conjunta llamada *extrema corioidea*.

3.^a La *capa de los capilares*, llamada también *capa coriocapilar* o *membrana de Ruysch*.

4.^a La *membrana vítreo* o *membrana de Bruch* (véanse los datos de Histología).

3.^o **Vasos y nervios.**—Las arterias proceden de las *ciliares cortas posteriores*. Las venas terminan en los cuatro *vasa vorticosa*, tributarios de la vena oftálmica. Los *vasos linfáticos* están representados por vainas perivasculares. Desembocan primeramente en el espacio supracoroides y, desde este punto (por conductos que acompañan a los *vasa corticosa*), en el *espacio supraesclerótico* o *espacio de Tenon*. Los *nervios* provienen de los *ciliares*.

B. Zona ciliar

La zona ciliar, intermedia entre la corioidea propiamente dicha y el iris, comprende dos partes: 1.^a, una parte superior, que forma el *músculo ciliar*, 2.^a, una parte posterior, representada por los *procesos ciliares*.

1.^o **Músculo ciliar.**—El músculo ciliar (*músculo de Brücke*, *músculo tensor de la coroides*) tiene la forma de un anillo aplanado de un color blanco grisáceo, cuya anchura es de 7 milímetros por fuera (lado temporal) y de 6 milímetros por dentro (lado nasal). Visto en un corte meridiano, aparece con la forma de un triángulo, cuyo vértice corresponde a la ora serrata y la base mira a la pupila.

Desde el punto de vista de su constitución anatómica, el músculo ciliar se compone de dos clases de fibras: 1.^a, *fibras radiadas* o *meridianas*, que nacen del anillo tendinoso de Döllinger y, desde este punto, se dirigen hacia atrás, para terminar, unas en el borde anterior de la coroides y otras en el tejido conjuntivo de los procesos ciliares; 2.^a, *fibras celulares, anulares* o *ecuatoriales*, situadas en la parte postero-interna de las precedentes. Su conjunto (dos o tres gruesos fascículos en los cortes meridianos) constituye el *músculo de Rouget* (*músculo de Muller* de los anatomistas alemanes). Todas las fibras constitutivas del músculo ciliar son fibras lisas. Generalmente se admite que, para el ojo normal, las fibras radiadas representan las nueve décimas de la masa total del músculo ciliar.

2.º Procesos ciliares.—Son una serie de repliegues dispuestos en sentido meridiano, situados en la parte posterior del músculo ciliar. Su conjunto constituye la *corona ciliar* o *cuerpo ciliar*. Se cuentan setenta. Cada uno de ellos tiene la forma de una pirámide triangular de 3 a 5 milímetros de longitud: el vértice dirigido hacia atrás, se confunde con la coroides a nivel de la ora serrata; la base, más o menos redondeada se intercala entre la cara posterior del iris y la cara anterior del cristalino. De las tres caras de los procesos ciliares, una, la anterior, está en relación con el músculo ciliar; las otras dos, las laterales, están en relación con las caras similares de los procesos ciliares inmediatos, pero sin entrar en contacto con ellas; cada proceso ciliar está, en efecto, separado de sus dos vecinos por surcos dispuestos, como ellos, en sentido meridiano: los *valles ciliares*. Los procesos ciliares están constituidos por paquetes de vasos que se anastomosan y se ramifican hasta la producción de capilares, todo en medio de una estroma conjuntiva.

3.º Vasos y nervios. Las arterias de la zona ciliar (músculo y proceso) provienen del gran círculo arterial del iris, a cuya formación concurren a la vez las ciliares largas y posteriores y las ciliares anteriores. Las venas de los procesos ciliares desembocan en la red corioidea, las del músculo ciliar van a parar en parte a la red corioidea y en parte (atravesando la esclerótica) a las venas musculares. Los nervios emanan de los ciliares.

C Iris

El iris, segmento anterior de la túnica vascular, es una membrana circular, que tiene un agujero en su centro (*pupila*), colocada verticalmente entre el cristalino y la córnea, y por consiguiente en medio del humor acuoso.

1.º Forma y relaciones.—Se consideran en él *dos caras* (anterior y posterior) y *dos circunferencias* (mayor y menor).

a) *Cara anterior*.—Es ligeramente convexa y constituye el límite posterior de la cámara anterior del ojo. Su color varía en los distintos sujetos, observándose cinco matices fundamentales: negro, pardo, castaño, gris y azul. Es de notar que esta coloración generalmente está en armonía con el tinte de los cabellos. Cualquiera que sea el tono fundamental del iris, el color de la cara anterior no es uniforme sino que forma dos zonas concéntricas: c, *anillo colorado*

interno, que mide 1 ó 2 milímetros, y el *anillo colorado externo*, que mide 3 ó 4 milímetros. La cara anterior del iris la recorren estrías dispuestas en forma radiada: corresponden a los vasos del iris y por consiguiente son rectilíneas cuando la pupila está contraída y flexuosas cuando está dilatada.

b) *Cara posterior*. — Es ligeramente cóncava y está en relación: 1.º por su parte central, con el cristalino; 2.º, por su parte excéntrica, con los procesos ciliares. Su color, es negro subido.

c) *Circunferencia mayor*. — Está en relación con la zona ciliar y con la línea de unión esclerocraneal. La sujetan en este punto: 1.º, el ligamento pectíneo de Hueck; 2.º, la continuidad del tejido conjuntivo del iris con el de la zona ciliar; 3.º, los vasos que van desde la zona ciliar al iris y viceversa.

d) *Circunferencia menor*. Circunscribe un orificio llamado *pupila*. La pupila es esencialmente móvil y ocupa el centro del iris o un punto muy próximo al centro. Ordinariamente es circular, algunas veces (20 por 100) es elíptica, siendo muy variable su diámetro mayor. Es de notar que, durante la mayor parte de la vida fetal, la pupila está cerrada por una membrana circular, de gema y transparente, llamada *membrana de Wachendorff*, la cual desaparece del séptimo al noveno mes.

2.º **Constitución anatómica.** El iris se compone de cinco capas superpuestas, que son, de delante atrás,

1.ª La *capa epitelial anterior*.

2.ª La *basal anterior*.

3.ª El *tejido propio de iris* (vasos, nervios y fibras musculares lisas, unas circulares, que constituyen el *esfínter de la pupila*, y otras radiadas, que forman el *músculo dilatador*).

4.ª La *basal posterior*.

5.ª La *capa epitelial posterior* (véanse los tratados de Histología).

3.º **Vasos y nervios.** — Las *arterias* emanan del *gran círculo arterial del iris*. Siguiendo un trayecto radiado, se dirigen hacia la pupila y forman alrededor de este orificio un rico plexo: el *pequeño círculo arterial del iris*. Las *venas*, en sentido inverso, desaguan en las venas de los procesos ciliares y desde este punto en la red coroidea. Las *vías linfáticas* desembocan en la cámara anterior y desde este punto en el conducto de Schlemm. Los *nervios* proceden de los ciliares (fibras sensitivas, fibras motoras y fibras vasomotoras).

3 TÚNICA NERVIOSA DEL OJO

La túnica nerviosa del ojo, uniformemente aplicada contra la túnica precedente se extiende, en realidad, desde el punto óptico hasta el orificio pupilar. Se divide en *tres porciones*: 1.^a, porción posterior, en relación con la coroides que es la *retina propiamente dicha*, 2.^a, porción media, en relación con la zona ciliar, llamada *porción ciliar de la retina*; 3.^a porción anterior, en relación con el iris, que se llama *porción iridiana de la retina*.

A. *Retina propiamente dicha*

Se extiende desde el nervio óptico, del cual es una expansión, hasta la ora serrata. Su espesor es de 0,4 milímetros en la parte posterior, 0,2 milímetros en su parte media y 0,1 milímetros en su parte anterior. Aparte su capa externa (que es de un bello color negro) la retina es perfectamente transparente. Incolora cuando está bien iluminada, en ojos mantenidos en la obscuridad tiene una coloración rojiza (*púrpura retinal* o *rodopsina*).

1.^o **Forma y relaciones.** — Siendo un segmento de esfera hueca, hemos de considerar en la retina *dos caras* (exterior e interior) y *un borde anterior*.

a) *Cara exterior.* — Es convexa, lisa y uniforme, y está en relación con la lámina vítreo de la coroides, pero sin adherirse a ella.

b) *Cara posterior.* Más convexa que la precedente corresponde, pero también sin adherirse a él. En su parte posterior se ven dos regiones especiales: la *pápila óptica* y la *mancha amarilla*.

a) La *pápila*, punto de expansión del nervio óptico, es una superficie de color blanquizco, redondeada y oval (1,5 a 1,8 milímetros de diámetro), situada a 3 milímetros por dentro y a 1 milímetro por encima del polo posterior del ojo. Es plana, presentando en su centro una ligera depresión en forma de embudo; la *excavación central* de la papila.

B) La *mancha amarilla* *mácula lútea* o *macula* simplemente, ocupa exactamente el polo posterior del ojo. Es ésta una pequeña región amarillenta, oval, de diámetro mayor transversal (de 2 a 3 milímetros de anchura por 1,5 milímetros de altura), deprimida en su centro formando una especie de tosita, llamada *fovea centralis*. Los bordes de la fovea corresponden a la parte más gruesa de la retina.

c) *Borde anterior*. El borde anterior o circunferencia está situado a nivel de la ora serrata. En este punto se confunde con la porción ciliar de la retina.

2.º **Constitución anatómica.** — Histológicamente, la retina se compone de diez capas superpuestas que, de dentro afuera, son:

- 1.ª La membrana limitante interna
- 2.ª La capa de las fibras ópticas
- 3.ª La capa de las células ganglionares.
- 4.ª La capa plexiforme interna.
- 5.ª La capa granulosa interna.
- 6.ª La capa plexiforme externa.
- 7.ª La capa granulosa externa
- 8.ª La membrana limitada externa
- 9.ª La capa de los bastoncillos y de los conos
- 10.ª La capa pigmentaria (véanse los tratados de Histología)

3.º **Vasos y nervios.** — Las arterias provienen de la *central de la retina*. Al llegar al centro de la papila, se divide en dos ramas, una ascendente y otra descendente, las cuales, después de un corto trayecto, se subdividen a su vez cada una en dos ramas: un *ramo interno o nasal* y un *ramo externo o temporal*. Se forman dos redes principales: una en la capa de las fibras nerviosas y de las células ganglionares y la otra en la capa granulosa interna. Las venas convergen hacia la papila, en donde se condensan en dos pequeños troncos, uno superior y el otro inferior, los cuales se introducen en el espesor del nervio óptico, se juntan y, finalmente, van a terminar en la vena oftálmica. Es de notar que la red sanguínea de la retina es, por decirlo así, independiente. Únicamente a nivel de la lámina cribosa se ven algunas finas anastomosis entre la pared retiniana de una parte, y la red coroidea y la del nervio óptico por otra. Las *vías linfáticas* conducen la linfa hacia la mácula y desde este punto hacia los espacios linfáticos del nervio óptico. Los nervios son vasomotores y acompañan a las arterias.

B. *Porción ciliar de la retina*

Más allá de la ora serrata, la retina, rudimentaria, inexcitable y desprovista de toda función, está representada por una película muy delgada, en relación, *por delante*, con la parte posterior de los procesos ciliares, y adherida íntimamente, *por detrás*, a la zona de Zinn

C. *Porción iridiana de la retina*

A nivel del iris, la túnica nerviosa del ojo, más reducida todavía que a nivel de la zona ciliar, está representada por la capa epitelial posterior de esta membrana, que ordinariamente se designa aunque impropriamente con el nombre de *úvea*.

4. CRISTALINO

Pequeña lente biconvexa, colocada de canto detrás de la pupila y de las cámaras del ojo y por delante del cuerpo víreo.

1.º **Generalidades.**—El eje anteroposterior del cristalino se confunde casi (muy ligera desviación) con el eje anteroposterior del ojo. Sus *dimensiones* son: *diámetro*, de 9 a 10 milímetros; *espesor*, 5 milímetros. Su *peso* es de 10 a 25 centigramos. Se mantiene en posición en virtud de una membrana elástica, la *zona de Zinn* o *zónula*.

2.º **Forma y relaciones.**—El cristalino presenta, como toda lentícula, *dos caras* (anterior y posterior) y una *circunferencia*.

a) *Cara anterior.*—Convexa, lisa y uniforme, representa un segmento de esfera de 9 milímetros de radio. Está en relación sucesivamente con la pupila, con la cara posterior del iris y con los procesos ciliares. Es de notar que su punto central, *polo anterior del cristalino*, está separado de la córnea por un intervalo de 2 a 2,5 milímetros.

b) *Cara posterior.*—Más convexa que la precedente, corresponde a una esfera de 5 a 6 milímetros de radio. Está en relación con el cuerpo vítreo. Su punto central, *polo posterior del cristalino*, está separado de la mancha amarilla por un intervalo de 16 milímetros.

c) *Circunferencia.*—La *circunferencia* o *ecuador* uniformemente circular, punto de convergencia de las dos caras, es una especie de ángulo curvilíneo. Está en relación, en todo su contorno, con el conducto abollonado de Petit.

3.º **Propiedades químico-físicas.**—El cristalino es un cuerpo esencialmente *elástico*. Es *incoloro* y completamente transparente en el feto y en el niño. De treinta a cuarenta años, su parte central tiene un *tinte amarillo de paja*, que en lo sucesivo se acentúa más. En el viejo llega a tener un *color ambarino*. También su *consistencia* varía con la edad. blando en el feto y en el niño, es más firme en el adulto.

y mas duro aun en el viejo. Es de notar que esta consistencia, en vez de ser uniforme, aumenta gradualmente en cada una de las dos caras, yendo de la periferia al centro; de ahí la división en tres capas: *capa superficial*, relativamente blanda; *capa media*, más consistente, y *capa profunda* o *núcleo*, más consistente todavía. El índice de refracción, aumentando igualmente de la periferia al centro, es de 1,405 en las capas superficiales, de 1,429 en las capas medias y de 1,454 en las capas centrales, resultando 1,430 el índice de refracción total.

4.º Constitución anatómica. El cristalino se compone. 1.º, de una *cubierta* o *cápsula*; 2.º, de un *epitélio*; 3.º, de un sistema de fibras acintadas, las *fibras del cristalino*, 4.º, de una *substancia amorfa*, que forma el cemento (véanse los tratados de Histología)

5.º Aparato suspensorio del cristalino, zona de Zinn o zónula. - La *zona de Zinn* o *zónula*, que mantiene en fijación el cristalino, está formada por un sistema de fibras dispuestas en su mayoría en sentido meridiano, las cuales se extienden desde la región ciliar al ecuador del cristalino. Estas fibras *zonulares*, que por largo tiempo se han descrito como una dependencia de la membrana hialoidea, se consideran hoy como un producto de secreción de las células de la retina ciliar. Forman en conjunto una especie de membrana anular, la *zónula*, que ofrece a nuestra consideración dos bordes (*externo e interno*) y dos caras (*anterior y posterior*).

a) *Borde externo* — Representa la circunferencia máxima del anillo zonular y corresponde a la ora serrata.

b) *Cara posterior*. — Corresponde a la membrana hialoidea del cuerpo vítreo

c) *Cara anterior* - - Está en relación con la zona ciliar de la coroides y de la retina. *Por detrás*, en el punto en que la zona ciliar es todavía lisa, la *zónula*, lisa también, se aplica uniformemente contra ella y se adhiere a la misma de una manera íntima. *Por delante*, al nivel de los procesos ciliares, la *zónula* se pliega exactamente como estos últimos y se adhiere también íntimamente a ellos. Es de notar, no obstante, que, a nivel de los valles ciliares, la *zónula* no desciende hasta el fondo de éstos, sino que pasa, a manera de puente, de un proceso ciliar a otro. De ahí la existencia, entre la *zónula* y el fondo de los valles ciliares, de pequeños espacios libres, los *recessus camerae posteriores de Kuhnt*, que no son más que prolongaciones radiales de la cámara posterior.

d) *Borde interno*. — Corresponde al ecuador del cristalino. Allí las fibras constitutivas de la zónula terminan en la cristaloides: las unas, delante del ecuador, las otras, al mismo nivel de éste, otras, en fin, algo por detrás de este ecuador y por lo tanto, en la cristaloides posterior. Las fibras zonulares divergen, pues, al nivel de su inserción anterior, de lo cual resulta que en un corto meridiano del ojo la zónula presenta la forma de un triángulo cuyo vértice mira hacia la ora serrata, y la base, dirigida en sentido opuesto, corresponde a la vez a la cristaloides anterior al ecuador y a la cristaloides posterior. De esta dispersión de las fibras zonulares resulta también que la zónula, en la vecindad del cristalino, no está representada ya por una membrana continua, sino por una multitud de pequeñas cuerdas tendinosas, de direcciones diversas, separadas unas de otras por una especie de hendiduras.

6.° *Conducto de Petit*. — Los fascículos anteriores (*preecuato-riales*) y los fascículos posteriores (*postecuato-riales*) de la zónula, al apartarse unos de otros, dejan entre sí un espacio triangular, cuya base está representada por el ecuador del cristalino: es el *conducto abollonado de Petit*. Este conducto, limitado por delante por los fascículos anteriores de la zónula, y por detrás por los fascículos posteriores de la misma (revestidos por la membrana hialoides), da la vuelta al ecuador del cristalino. Cuando se le insufla, se ve que está constituido por partes estrechas que alternan regularmente con partes más anchas, y de ahí su nombre de *abollonado*. Es de notar que las partes estrechadas corresponden a los *procesos ciliares* (pág. 538) y las anchas a los *valles* (pág. 538). El conducto de Petit es un *espacio linfático*, comunica, en efecto, por las hendiduras de su pared anterior, con la cámara posterior del ojo.

7.° *Nutrición del cristalino, vías linfáticas*. — El cristalino, en el adulto, está enteramente desprovisto de vasos y de nervios. La circulación de los líquidos nutritivos (procedentes de los vasos de los procesos ciliares) se efectúa por los intersticios de los elementos anatómicos que entran en la constitución del órgano. Los líquidos eférentes, con sus materiales de desecho, penetran, a través de la cápsula cristaliniiana, en el conducto de Petit y en la cámara posterior del ojo. Es de notar que, durante la vida fetal, el cristalino está rodeado por una rica red vascular (*cápsula vascular*), que proviene, en parte, de la arteria central de la retina, y en parte, de los vasos del iris.

5 CUERPO VÍTREO

LLámase *cuerpo vítreo* a la masa transparente y de consistencia gelatinosa que ocupa el espacio comprendido entre la retina y la cara posterior del cristalino. Tiene, naturalmente, la forma de un esferoide deprimido en cúpula en su parte anterior (*fosa patellaris*), en la que se aloja el cristalino. Su peso específico es de 1,005, su poder refringente, de 1,338. Morfológicamente, el cuerpo vítreo se compone de dos partes que son las siguientes: 1.ª, una membrana de cubierta, llamada *membrana hialoides*, 2.ª, un contenido, el *humor vítreo*.

1.ª **Membrana hialoides.** — Es una película fina y delicada, que envuelve el cuerpo vítreo en toda su extensión. Por delante (al nivel del cristalino) y por detrás (al nivel de la papila) se refleja sobre sí misma para penetrar en el conducto hialoideo y revestir sus paredes. Su espesor no es siempre el mismo: relativamente espesa en toda la porción que corresponde a la retina propiamente dicha, la hialoides es extremadamente delgada a nivel de la zónula y de la cara posterior del cristalino. Esta membrana es completamente anhistia. En su cara interna se encuentran elementos celulares de uno o dos núcleos, que se conocen con el nombre de *celulas subhialoides de Ciaccio*.

2.ª **Humor vítreo.** — Contenido en el interior de la membrana hialoides, se presenta bajo la forma de una sustancia gelatinosa más consistente en el niño que en el adulto. No es, sin embargo, un bloque compacto y homogéneo; al contrario, está dividido por un doble sistema de hendiduras, unas circulares y otras radiadas, en numerosos segmentos (fragmentación en *cascos de cebolla* y en *gajos de naranja*). Para conocer la estructura del humor vítreo (fibras, células y sustancia amorfa y semilíquida) (véanse los tratados de Histología).

3.ª **Conducto hialoideo.** — El humor vítreo está atravesado de atrás adelante por un conducto central, llamado *conducto de Gloquet* o *conducto de Stilling*. En la parte posterior empieza a nivel de la papila, por una extremidad ensanchada, el *área de Martegiani*, y termina, a nivel del polo posterior del cristalino, por una extremidad igualmente ensanchada. Durante la vida fetal, el conducto de Stilling da paso a la *arteria capsular*, rama de la arteria central de la retina; esta arteria capsular no existe ya en el adulto y el conducto en cuestión no tiene entonces más que linfa.

6 CÁMARAS DEL OJO, HUMOR ACUOSO

Llámanse *cámaras del ojo* todo el espacio comprendido entre el cristalino y la cámara. El iris divide este espacio en dos partes: una anterior o *camara anterior* y otra posterior o *cámara posterior*.

1.º **Cámara anterior.**—Situada por delante del iris, tiene la forma de una lente convexa por delante y ligeramente cóncava por detrás. Su diámetro anteroposterior varía entre 2 y 2,5 milímetros. Se consideran en ella. 1.º, una *pared anterior*, cóncava, formada por la cara posterior de la córnea y, más allá de la córnea, por la porción próxima del limbo escleral; 2.º, una *pared posterior*, ligeramente convexa, formada por la cara anterior del iris y, a nivel de la pupila, por la cara anterior del cristalino; 3.º, *circunferencia*, en relación con un ángulo diedro, el *ángulo iridocorneal* o *ángulo de la cámara anterior* (está ocupado por el *ligamento pectíneo de Hueck*).

2.º **Cámara posterior.**—Situada por detrás del iris, tiene la forma de una cavidad anular con *dos paredes* y *dos circunferencias*: 1.º, una *pared anterior*, formada por la cara posterior del iris; 2.º, una *pared posterior*, formada a la vez por la cara anterior del cristalino y la cara anterior de la porción libre de la zónula; 3.º, una *circunferencia menor*, resultante del encuentro del borde pupilar del iris con la cara anterior del cristalino (en este punto comunican las dos cámaras); 4.º, una *circunferencia grande* o *mayor*, formada por la base de los procesos ciliares (siendo de notar que a este nivel se desprenden las *prolongaciones radiadas de Kuhnt*, que siguen el fondo de los valles ciliares).

3.º **Humor acuoso.**—Líquido incoloro, de limpidez perfecta, que ocupa las dos cámaras del ojo. El humor acuoso proviene de los vasos del iris, del conducto de Petit y del cristalino. Este humor se acumula primeramente en la cámara posterior, pasa luego a la cámara anterior por el orificio pupilar y desde allí corre por el conducto de Schlemm (pág. 533), el cual lo vierte en las venas musculares.

ARTÍCULO II

ANEXOS DEL OJO

Los anexos del ojo comprenden: 1.º, los *músculos de la órbita*; 2.º, las *cejas*; 3.º, los *párpados*, 4.º, la *conjuntiva*

1. MÚSCULOS DE LA ÓRBITA

La órbita contiene siete músculos: 1.º, el *elevador del párpado superior*; 2.º, cuatro *músculos rectos*, 3.º, dos *músculos oblicuos*. Estos músculos están en íntima relación con una membrana conjuntiva, llamada *cápsula de Tenon*.

1.º **Cápsula de Tenon** — Membrana de naturaleza conjuntiva más bien que fibrosa, que cubre toda la porción esclerótica del ojo, amoldándose exactamente sobre la misma.

a) *Forma y relaciones* — Tiene la forma de un segmento de esfera hueco con dos caras y una circunferencia. La cara anterior, cóncava y lisa, corresponde a la esclerótica en toda su extensión. La cara posterior, convexa, corresponde al mismo tiempo: 1.º, hacia atrás, a la masa celulo adiposa de la órbita; 2.º, por delante, a la conjuntiva. La circunferencia va progresivamente haciéndose más delgada hasta llegar al contorno de la córnea, en donde se confunde con el corion de la conjuntiva. La cápsula de Tenon es atravesada de atrás adelante por todos los órganos que van al ojo o que vienen de él: el nervio óptico, los nervios ciliares, los vasa vorticosa, los cuatro músculos rectos y los dos oblicuos.

b) *Prolongaciones enviadas por la cápsula de Tenon a los músculos que la atraviesan* — A este nivel de los puntos en los cuales es perforada por los seis citados músculos, la cápsula de Tenon envía a cada uno de ellos una prolongación anterior y una prolongación posterior. La *prolongación anterior* o *vaina tendinosa* rodea el tendón muscular hasta su inserción en la esclerótica (nótese que estas vainas tendinosas están unidas entre sí por expansiones laterales). La *prolongación posterior* o *vaina muscular* rodea el cuerpo muscular hasta su inserción de origen, exceptuando el oblicuo mayor, en el cual dicha prolongación no pasa más allá de la polea de reflexión.

c) *Prolongaciones orbitarias de las vainas musculares* — Todas las vainas musculares exceptuando la del oblicuo mayor, envían hacia

la base de la órbita unas expansiones llamadas *aletas ligamentosas tendones orbitarios* y *tendones de detención*. Las *aletas de los dos músculos recto interno y recto externo* van a insertarse, la del recto interno en la cresta del unguis, la del recto externo inmediatamente por detrás del ligamento externo de los párpados. Fibrosas en su origen, se cargan, junto a su terminación, de fibras musculares lisas (*músculo orbitario interno y músculo orbitario externo de Sappey*). Las *aletas de los músculos recto superior y recto inferior* se dirigen igualmente hacia la base de la órbita, pero se contentan con enviar algunas fibras al reborde orbitario, y, siguiendo adelante, van a terminar en el borde proximal del tarso correspondiente. La *aleta del oblicuo menor* de 10 a 12 milímetros de longitud, se desprende del borde anterior del oblicuo menor. Desde allí se dirige oblicuamente afuera y algo adelante, para venir a fijarse en el suelo de la órbita, junto a su ángulo inferoexterno.

d) *Significación anatómica de la capsula de Tenon* — La capsula de Tenon está constituida, en realidad, por *dos hojas conjuntivas*: una *posterior*, más gruesa (en relación con la masa celuloadiposa de la órbita), la otra, *anterior*, más delgada (en relación con la esclerótica), adosadas entre sí y fusionándose recíprocamente en el contorno de la córnea. Estas dos hojas, revestidas de endotelio, representan la *parietal* y la *visceral* de una serosa. Entre las dos se encuentra una cavidad central, más o menos tabicada que es el *espacio de Tenon* o *espacio supraesclerotal*. La capsula de Tenon adquiere así la significación e importancia de una *serosa*, pero de una *serosa tabicada*.

1.º **Músculo elevador del párpado superior.** Músculo delgado, triangular, de base anterior, carnoso por detrás y tendinoso por delante.

INSERCIÓNES — *Hacia atrás*, en el ala menor del esfenoides (por delante del agujero óptico) y en la vaina fibrosa del nervio óptico. Desde estos puntos, el músculo se dirige hacia delante y se convierte en un vasto tendón, que se extiende, por lo ancho, de uno a otro lado de la órbita. Este tendón terminal comprende dos capas: 1.º, una *capa superficial o anterior*, conjuntiva, que va a insertarse (después de atravesar el séptum orbital y el músculo orbicular), en parte en la cara profunda de la piel del párpado superior, y en parte en la cara anterior del tarso superior; 2.º, una *capa profunda o posterior*, formada por fibras musculares lisas (*músculo palpebral superior de Muller*), que va a fijarse en el borde superior del tarso.

RELACIONES. Situado en parte en la órbita y en parte en el párpado. En la órbita tiene encima la pared superior de la misma y el nervio frontal; debajo, el músculo superior (nótese que por fuera separa las dos porciones de la glándula lagrimal). En el párpado corre por delante de la conjuntiva, que lo separa del globo ocular.

Acción — Levanta el párpado superior y descubre de este modo la córnea y una porción de la esclerótica.

3° Músculos rectos del ojo. — Son en número de cuatro y se dividen en superior, inferior, interno y externo. Los cuatro son músculos en forma de cinta algo más anchos en su extremidad anterior que en su extremidad posterior, carnosos en la mayor parte de su extensión, divergentes entre sí, de manera que su conjunto forma una especie de pirámide hueca, cuya base, dirigida hacia delante, abraza el globo ocular.

INSERCCIONES, TRAYECTO Y RELACIONES. — *Hacia atrás*, en el vértice de la órbita; *por delante*, en la esclerótica más allá del ecuador del globo ocular.

a) *Recto superior.* — Se inserta: *por detrás*, en el reborde superior del agujero óptico y en la vaina del nervio óptico; *hacia delante*, en la parte anteroposterior de la esclerótica, a 8 milímetros por encima de la córnea. Cubierto por el elevador del párpado superior, pasa por encima del nervio óptico, de la arteria y de la vaina oftálmicas, de las arterias y nervios ciliares. Más adelante, cruza oblicuamente el tendón ensanchado del oblicuo mayor, que lo separa momentáneamente de la esclerótica.

b) *Recto inferior* — Forma la continuación del manojito inferior del tendón de Zinn. (Se da este nombre al cordón fibroso, muy corto, que se inserta, por debajo del agujero óptico, en la parte más ancha de la hendidura esfenoidal y que casi inmediatamente después se divide en tres manojos divergentes: uno para el recto interno, otro para el recto externo y el tercero para el recto inferior.) Por delante, el recto inferior termina en la parte anteroinferior de la esclerótica, a 6,5 milímetros por debajo de la córnea. Avanza por debajo del nervio óptico, por encima del suelo de la órbita. En su parte extrema anterior está rodeado en su cara inferior por el oblicuo menor.

c) *Recto interno* — Nacido del manojito interno del tendón de Zinn, termina, por delante, en la parte anterointerna de la esclerótica, a 5,8 milímetros de la córnea. Está en relación: *por dentro*, con la pared interna de la órbita; *por fuera*, con el tejido celuloadiposo

de la órbita, que lo separa del nervio óptico. Su borde superior va acompañado del oblicuo mayor

d) *Recto externo.* — Nacido del fascículo externo del tendón de Zinn (siendo de observar que este manojito se divide en dos ramas, que más lejos se reconstituye formando una especie de ojal, el *anillo de Zinn*, para los nervios motor ocular común, motor ocular externo, nasal y la vena oftálmica), termina, por delante, en la parte antero-externa de la esclerótica, a 7,1 milímetros de la córnea. Nótese que si se unen por una línea continua los cuatro puntos de inserción esclerótica de los músculos rectos, esta línea no resulta *circular*, sino una *línea espiral*, que, partiendo de la inserción del recto interno, se aparta cada vez más de la córnea. Está en relación 1.º *hacia fuera*, con la pared externa de la órbita y con la porción orbitaria de la glándula lagrimal, 2.º, *por dentro*, con el tejido celuloadiposo de la órbita, que lo separa del nervio óptico y del ganglio oftálmico.

Acción. — Los cuatro músculos rectos obran sobre el globo ocular. El *recto superior* lleva la córnea hacia arriba y algo adentro, el *recto inferior*, abajo y algo adentro. El *recto interno*, hacia dentro; el recto externo, hacia fuera.

1.º **Músculos oblicuos del ojo.** — Son en número de dos: el *oblicuo mayor* y el *oblicuo menor*.

A. **OBLICUO MAYOR.** — Músculo prolongado, carnoso en su parte posterior, tendinoso en su parte anterior.

Inserciones y trayecto. — Nace, *por detrás*, en la parte interna y superior del agujero óptico y también en la vaina del nervio óptico. Desde allí se dirige hacia delante, siguiendo el borde superior interno de la órbita. Al llegar al borde orbitario, se introduce en un anillo fibrocartilaginoso (*polea de reflexión*), se dobla hacia fuera y atrás y va a terminar, por un ancho tendón, en la parte superoexterna del hemisferio posterior del ojo.

Relaciones. — Hay que considerar dos porciones: *porción directa* y *porción refleja*. En su *porción directa*, el músculo avanza entre el recto superior y el recto interno. En su *porción refleja*, descansa sobre la esclerótica, cubierto por el recto superior. Una pequeña *sinusial* va anexa a la polea de reflexión.

Acción. — Mueve la córnea hacia fuera y abajo; además, inclina hacia dentro la parte superior del meridiano vertical.

B. **OBLICUO MENOR.** — Músculo en forma de cinta, situado en toda su extensión en la base de la órbita.

Inserción y trayecto. Nace en el borde externo del orificio superior del conducto nasal, se dirige atrás y afuera y va a insertarse en el hemisferio posterior del ojo, a 6 u 8 milímetros por debajo de la inserción del oblicuo mayor.

Relaciones. — Está en relación: 1.º, *hacia abajo*, con el suelo de la órbita y después con el recto externo; 2.º *hacia arriba*, con el globo ocular y con el músculo recto inferior.

Acción. — Mueve la córnea hacia dentro y arriba; además, inclina hacia fuera la parte superior del meridiano vertical.

2. CEJAS

Se da este nombre a dos prominencias arqueadas y provistas de pelos, situadas sobre los párpados.

1.º **Forma y relaciones.** — Ambas tienen la forma de un arco, dirigido transversalmente y de concavidad inferior. Se distinguen en ellas: 1.º, la extremidad o *cabeza*, 2.º, la parte media o *cuerpo*; 3.º, la extremidad externa o *cola*. Las cabezas de las dos cejas están separadas, en la línea media, por una superficie desprovista casi siempre de pelos y de dimensiones muy variables según los individuos, llamada *entrecejo* o *espacio intercilial*.

2.º **Constitución anatómica.** — Presentan cinco capas superpuestas, que son, de delante atrás:

1.ª La *piel*, muy gruesa, fuertemente adherida muy rica en glándulas sebáceas y cubierta de unos pelos especiales, los *pelos de las cejas*.

2.ª La *capa celulosa subcutánea*, formada por trabéculas conjuntivas más o menos densas, muy pobres en grasa.

3.ª La *capa muscular*, formada por tres órdenes de manojos: manojos del frontal, manojos del orbicular y manojos del ciliar.

4.ª La *capa celulosa submuscular*, formada por tejido conjuntivo laxo.

5.ª El *periostio*, que descansa directamente sobre el arco orbitario.

3.º **Vasos y nervios.** — Las *arterias* proceden de la supraorbitaria y de la temporal superficial. Las *venas* forman dos grupos: *grupo interno*, que sale de la raíz de la nariz, para terminar ya en la supraorbitaria, ya en la angular; *grupo externo*, que se dirige hacia fuera,

a la temporal superficial. Los *linfáticos* se dividen igualmente en *internos*, que siguen la vena facial y desemboran en los ganglios submaxilares, y *externos*, que se dirigen hacia fuera, a los ganglios parotídeos. Los *nervios* se dividen en sensitivos y motores: los *sensitivos* proceden del frontal interno y del frontal externo; los *motores* los suministra el facial.

3. PÁRPADOS

Son velos musculomembranosos situados delante de la base de la órbita y que cubren una parte más o menos considerable del globo ocular. Son *dos* y se dividen en *superior* (que es el más movable) e *inferior*.

1.º **Conformación exterior.** — Los párpados ofrecen cada uno de ellos, *dos caras* (anterior y posterior), *dos extremidades* (interna y externa) y *dos bordes* (borde libre y borde adherente).

a) *Cara anterior.* — Regularmente convexa en el párpado inferior. En el párpado superior, únicamente la parte inferior es convexa; la parte superior está representada por un surco transversal, el *surco orbitopalpebral superior* (siendo de notar que este surco se hace más notable cuando el párpado se levanta).

b) *Cara posterior* — Cóncava, corresponde al globo ocular y al tejido celuloadiposo periorcular.

c) *Extremidades.* — Los párpados, al reunirse por sus extremos, forman dos comisuras, una interna y otra externa. La *comisura interna* está ordinariamente indicada por una pequeña prominencia de dirección transversal. La *comisura externa* tiene la forma de una ligera depresión lineal oblicua hacia abajo y afuera. Por encima de ella se ve cierto número de pliegues cutáneos, que se hacen más notables en los individuos viejos.

d) *Borde adherente* — Corresponde al borde de la órbita, del cual está separado por un surco transversal: *surco orbitopalpebral superior*, para la pared superior, *surco orbitopalpebral inferior*, para la pared inferior. Este último es menos pronunciado, y aun algunas veces es reemplazado por un rodete.

e) *Borde libre.* — El borde libre, de 2 milímetros de grosor, está dividido por el *tubérculo lagrimal* en dos porciones: una porción interna o *lagrimal*, muy pequeña, redondeada, lisa y desprovista de pestañas; una porción externa o *ciliar*, mucho más larga, que lleva en su labio anterior unos pelos rígidos llamados *pestañas* (100 a 150 en

el párpado superior y 70 a 75 en el párpado inferior) Nótese que las pestañas son de tal manera curvas, que cuando los párpados se cierran, las dos líneas de pestañas se ponen en contacto por su convexidad, sin penetrarse ni entrecruzarse. En el labio posterior de la porción ciliar se ven los orificios de las glándulas de Meibomio. Finalmente, en el intersticio se verifica la continuidad de la piel y la mucosa. Los bordes libres de ambos párpados, al unirse entre sí a nivel de las comisuras, interceptan una abertura oval cuyo eje mayor es transversal, que es la *abertura palpebral*, variable según los individuos (*ojos grandes y ojos pequeños*). Cuando los párpados están cerrados o aproximados, la mencionada abertura es reemplazada por una simple hendidura, la *hendidura palpebral*, rectilínea en su parte interna y de concavidad superior en su parte externa. Las dos extremidades interna y externa de la hendidura palpebral constituyen el *ángulo interno* y el *ángulo externo* del ojo (*canthus major y canthus minor*). El ángulo externo, francamente agudo, está situado a 10 ó 12 milímetros de la córnea. El ángulo interno, de vértice redondeado, está separado del ojo por un intervalo de 5 a 7 milímetros. Cuando el ojo está abierto, el párpado superior desciende hasta el borde superior de la córnea, y aun llega a veces a cubrir un poco dicho borde, cuando el ojo está cerrado desciende hasta la proximidad del borde inferior de la córnea, donde llega a ponerse en contacto con el párpado inferior.

2.° **Constitucion anatómica.**—Cada párpado, considerado desde el punto de vista de su estructura, presenta siete planos sucesivos, que son, de delante atrás:

A. PIEL.—Muy fina, muy delgada, vello aterciopelado, glándulas sebáceas poco desarrolladas y glándulas sudoríparas muy numerosas, pero de pequeñas dimensiones.

B. CAPA CELULOSA SUBCUTÁNEA.—Tejido conjuntivo laxo, pobre en grasa, dejándose infiltrar fácilmente.

C. CAPA MUSCULAR DE FIBRAS ESTRIADAS.—Formada por el músculo orbicular de los párpados (véase MIOLOGÍA).

D. CAPA CELULOSA SUBMUSCULAR.—Formada por tejido conjuntivo laxo.

E. CAPA FIBROSA.—Comprende dos porciones: una porción marginal, formada por los *tarsos*, y una porción periférica, que constituye los *ligamentos anchos* de los párpados.

a) *Tarsos*.—Los tarsos son laminillas fibrosas, muy gruesas, que ocupan el borde libre de los párpados. Son en número de dos uno

para la porción superior, *tarso superior*, y otro para la porción inferior, *tarso inferior*. El primero tiene la forma de una media luna (10 milímetros de altura); el segundo, la forma de un largo rectángulo (5 milímetros de alto). Cada uno de ellos presenta una cara anterior (orbicular), una cara posterior (conjuntiva), un borde libre, un borde adherente, una extremidad interna y una extremidad externa. Las extremidades externas están unidas entre sí por un ligamento, el cual, por otra parte, va a insertarse en el lado externo y en la base de la órbita: es el *ligamento palpebral externo*. Igualmente, las extremidades internas están unidas a la rama ascendente del maxilar superior por un ligamento análogo, el *ligamento palpebral interno*.

b) *Ligamentos anchos* — Los ligamentos anchos de los párpados, en número de dos (uno para el párpado superior y otro para el párpado inferior), son membranas fibrosas que, partiendo del borde proximal de los tarsos, van a terminar en todo el contorno de la órbita. En su conjunto constituyen el *septum orbitale*. Nótese que, por fuera, el *septum orbitale* se confunde con el ligamento palpebral externo, mientras que, por dentro, se separa del ligamento palpebral interno, para ir a insertarse en la cresta del unguis entre los dos están el saco lagrimal, los conductos lagrimales, el músculo de Horner, órganos todos *intrapalpebrales* y no *intraorbitarios*. Nótese también que el *septum orbitale* está atravesado por todos los órganos (vasos y nervios lagrimales, vasos y nervios supraorbitarios, nervio frontal interno, nervio basal y arteria nasal, y vena oftálmica), que, desde la cavidad orbitaria, van a los párpados.

F. *CAPA MUSCULAR DE FIBRAS LISAS*. — Fibras musculares lisas, en su mayor parte de dirección vertical, de dirección transversal solamente algunas constituyendo en su conjunto el *músculo palpebral superior* y el *músculo palpebral inferior de Muller*.

G. *CAPA MUCOSA*. — Está formada por la conjuntiva palpebral (véase *Conjuntiva*).

3° *Glándulas de los párpados*. — Comprende tres grupos: las glándulas de Meibomio, las glándulas ciliares y las glándulas de Moll. Las *glándulas de Meibomio* son glándulas arracimadas, situadas en el espesor de los tarsos, y se dirigen de su borde adherente a su borde libre, en el cual se abre su conducto excretorio, existen de 25 a 30 en el párpado superior y de 20 a 25 en el párpado inferior. Las *glándulas ciliares* son glándulas sebáceas anexas a los folículos pilosos de las pestañas, existiendo dos para cada pestaña; están poco des-

arrolladas y algunas veces reducidas a simples fondos de saco. El producto mixto de las glándulas ciliares y de las glándulas de Meibomius forma las *legañas*. Las *glándulas de Moll* son glándulas sudoríparas rudimentarias, que ocupan el borde libre de los párpados y van a abrirse entre las pestañas.

4° **Vasos y nervios.** — Los dos párpados superior e inferior, son formaciones muy vasculares.

a) *Arterias* — Las arterias principales son: la *palpebral superior* y la *palpebral inferior*, ramas de la oftálmica; siguen de dentro afuera el borde libre de los párpados (entre el orbicular y el tarso) y se anastomosan entre sí en la región del ángulo externo. Como *arterias accesorias*, existen: *arriba*, la supraorbitaria; *abajo*, la infraorbitaria; *adentro*, la nasal, y *afuera*, la lagrimal, la temporal superficial y la transversal de la cara. Estas diferentes arterias forman en cada párpado dos arcos: un *arco interno*, que sigue el *borde distal de los tarsos*, formado por las palpebrales, y un *arco externo*, que sigue el *borde proximal de los tarsos*. De estos dos arcos se desprenden numerosos ramos, que se distribuyen por las diversas partes constituyentes de los párpados formando dos redes: 1°, una *red pretarsiana*, dependiente del arco interno; 2°, una *red retrotarsiana*, aumentada por ramos procedentes del arco externo.

b) *Venas*. — Existen igualmente dos redes venosas: 1°, una *red retrotarsiana* o *subconjuntival*, que procede casi exclusivamente de la conjuntiva y desemboca en la vena oftálmica; 2°, una *red pretarsiana*, que va a desembocar, en parte (*venas externas*) en la temporal superficial y en parte (*venas internas*) en la vena facial.

c) *Linfáticos* — Forman también dos redes: *red superficial* o *pretarsiana* y *red profunda* o *retrotarsiana*. Ya sean superficiales, ya profundos, se dirigen como los de las cejas: 1°, los unos hacia fuera (*linfáticos externos*), para terminar en los ganglios preauriculares y parotídeos, 2°, los otros hacia dentro (*linfáticos internos*), para terminar, siguiendo la vena facial, en los ganglios submaxilares.

d) *Nervios*. — Se dividen en motores, sensitivos y simpáticos. Los *filetes motores* (destinados al orbicular) proceden del facial. Los *filetes sensitivos* proceden del nasal externo, del lagrimal, del frontal interno, del frontal externo y del suborbitario. Los *filetes neurovegetativos* (destinados a los vasos y músculos palpebrales) proceden del simpático cervical.

4. CONJUNTIVA

Membrana mucosa, dependiente del tegumento externo, que une el globo ocular a los párpados.

1.º **Conformación exterior.** — La conjuntiva reviste primeramente la parte anterior del globo ocular. Al llegar junto al ecuador se dobla hacia delante, para pasar a los párpados y revestirlos hasta llegar a nivel de su borde libre. Presenta tres porciones: 1.º, la *conjuntiva palpebral*, 2.º, la *conjuntiva ocular*; 3.º, la *conjuntiva del fondo de saco*.

A CONJUNTIVA PALPEBRAL. Está en contacto con los tarsos; luego, más allá de los tarsos, con los músculos palpebrales. Es delgada, transparente, de color rojizo y fuertemente arrugada en toda su porción extratarsiana. En el borde libre de los párpados se continúa con la piel.

B CONJUNTIVA DEL FONDO DE SACO. — Es el repliegue que forma la conjuntiva al pasar del párpado al globo ocular; es un fondo de saco circular (*fórnix*) que corresponde sucesivamente a los dos surcos orbitopalpebrales y a las dos comisuras interna y externa. Este fondo de saco o cu opalpebral dista de la córnea: *hacia arriba*, 10 milímetros; *hacia abajo*, 8 milímetros; *hacia fuera*, 14 milímetros; y *hacia dentro*, 8 milímetros.

C. CONJUNTIVA OCULAR O BULBAR. — Está en contacto sucesivamente con la esclerótica y con la córnea.

a) *Sobre la esclerótica (porción escleral)* pasa por delante de los tendones de los músculos rectos. Está unida a la esclerótica por una capa de tejido celular laxo, en la cual se ve, en el adulto, cierta cantidad de vesículas adiposas.

b) *Sobre la córnea (porción córnea)*, la conjuntiva queda reducida a su epitelio, no siendo otra cosa que el epitelio anterior de la córnea.

c) *En el ángulo interno*, la conjuntiva ocular presenta dos formaciones especiales: 1.º, la *carúncula lagrimal*, pequeña eminencia rojiza, en forma de mamelón, situada exactamente entre las porciones lagrimales de los párpados (formados por diez o doce folículos pilosos, algunas glándulas sebáceas, algunos pelos rudimentarios y algunas fibras musculares, y cubierto todo por la mucosa); 2.º, el *repliegue semilunar*, situado por fuera de la carúncula, en forma semilunar ver

tical de concavidad externa (es un órgano rudimentario que representa la *membrana nictitante* de las aves)

2.º **Constitución anatómica.** Presenta, como todas las mucosas, dos capas: *dermis* o *corion* y *epitelio* (véanse los tratados de Histología)

3.º **Glándulas.** — Forman tres grupos: glándulas acinosas, glándulas tubulosas y glándulas utriculares. Las *glándulas acinosas* están situadas en la mitad interna de fondo de saco; forman en conjunto una especie de herradura de concavidad externa. 35 a 40 en el párpado superior y solamente 6 a 8 en el párpado inferior. Las *glándulas tubulosas* han sido descritas por HENLE (*glándulas de Henle*) en la porción de la conjuntiva comprendida entre el borde adherente de los tarsus y el fondo de saco o conjuntival. Su existencia es muy discutida todavía. Las *glándulas utriculares*, que han sido descritas por MANZ junto a la circunferencia de la córnea (*glándulas de Manz*) no serían para WALDEYER más que simples masas epiteliales.

4.º **Vasos y nervios.** — Las *arterias*, muy numerosas, forman dos territorios: 1.º, un gran territorio (comprendiendo la conjuntiva palpebral, la conjuntiva del fondo de saco y la mayor parte de la conjuntiva ocular) regado por las diferentes arterias que se distribuyen por los párpados: es el *territorio palpebral*, 2.º, un territorio más pequeño que comprende la porción de la conjuntiva ocular que rodea la córnea a la altura de 3 ó 4 milímetros) alimentado por las arterias ciliares anteriores: este es el *territorio ciliar*. Nótese que este territorio ciliar, escasamente anastomosado con el territorio palpebral, está por el contrario en íntima relación con los vasos del músculo ciliar y del iris. Las *venas* procedentes del territorio palpebral se dirigen, en parte a las venas de los párpados (luego a la temporal superficial y a la facia) y, en parte, a la vena oftálmica. Las que proceden del territorio ciliar terminan en las ciliares anteriores y, por ellas en la vena oftálmica. Los *linfáticos* forman dos redes: una *red superficial*, colocada en la parte superficial de la dermis y una *red profunda*, situada en el tejido conjuntivo submucoso. Se dividen, como los de los párpados, en *externos* (destinados a los ganglios parotídeos) e *internos* (para los ganglios submaxilares). Los *nervios* proceden *por fuera*, del lagrimal *por dentro*, del nasal externo, *los de la porción corneal*, de los nervios ciliares. Terminan por extremidades libres y también

por unos engrosamientos o nódulos especiales, llamados *corpúsculos de Krause*

5. APARATO LAGRIMAL

El aparato lagrimal se compone, en el hombre: 1º, de una glándula que secreta las lágrimas y las vierte en la conjuntiva: la *glándula lagrimal*, 2º, de un conjunto de conductos, las *vías lagrimales*, que recogen las lágrimas en esta última membrana y las transportan luego a las fosas nasales.

A. Glándula lagrimal

La glándula lagrimal es una glándula arracimada, situada en la parte superior, anterior y externa de la órbita.

1º **Conformación exterior y relaciones.** — Se divide en dos porciones: una *porción orbitaria* y una *porción palpebral*. Estas porciones están separadas entre sí por el músculo elevador del párpado y por una expansión fibrosa que, desde el borde externo de este músculo va al lado externo del reborde orbitario.

a) *Porción orbitaria* — Está alojada en la fosita lagrimal (véase OSTEOLOGÍA). Aplanada de arriba abajo y prolongada en el sentido transversal, tiene la forma de una almendra: 10 milímetros de longitud por 12 milímetros de ancho y 5 de espesor. Presenta *dos caras, dos bordes y dos extremidades*. *Cara superoexterna*, convexa: corresponde al periostio. *Cara inferointerna*, cóncava descansa sobre el músculo elevador y su expansión. *Borde anterior* delgado, coriáceo: corresponde al saco orbitario. *Borde posterior*, más grueso corresponde al tejido celuloadiposo de la órbita. Las *dos extremidades* descansan: la interna sobre el elevador y la externa sobre el recto externo.

b) *Porción palpebral*.—Está situada debajo de la precedente, en la parte externa del párpado superior. Aplanada de arriba abajo y de forma cuadrilátera, presenta: una *cara superior*, en relación con el elevador; una *cara inferior*, correspondiente a la conjuntiva y al tejido celuloadiposo de la órbita; un *borde posterior*, que se confunde en parte con la porción orbitaria, un *borde anterior* que descansa sobre el fondo de saco oculoconjuntival, una *extremidad interna*, que se detiene al mismo nivel que la de la porción orbitaria, y una *extremidad externa*, que se extiende hasta la comisura de los párpados.

2° **Constitución anatómica.** - La glándula lagrimal tiene la estructura de las glándulas arracimadas (véanse los tratados de Histología).

3° **Conductos excretorios.**—De seis a diez conductos, procedentes unos de la porción orbitaria y otros de la porción palpebral, se dirigen oblicuamente abajo y adelante, y van a abrirse, por distintos orificios, en la parte superior y externa del fondo de saco oculo conjuntival. Nótese que los conductos que proceden de la porción orbitaria atraviesan de arriba abajo la porción palpebral y reciben o no de esta un cierto número de sus conductos excretorios.

4° **Vasos y nervios.** - Las arterias de la glándula lagrimal proceden de la arteria del mismo nombre. Las venas van a la oftálmica. Los linfáticos son todavía poco conocidos. Los nervios proceden del lagrimal (rama del oftálmico) y del ramo orbitario del nervio maxilar superior.

B. *Vías lagrimales*

Se designa con este nombre el conjunto de vías que siguen las lágrimas para ir a parar a las fosas nasales.

1° **Conformación exterior y relaciones.** - Estas vías comprenden el *lago lagrimal*, los *puntos lagrimales*, los *conductos lagrimales*, el *saco lagrimal* y el *conducto nasal*.

a) *Lago lagrimal.* Es el pequeño espacio triangular comprendido entre la parte interna de los párpados. Está limitado, hacia fuera, por una línea trazada de un tubérculo lagrimal a otro.

b) *Puntos lagrimales.* - Son unos pequeños orificios redondeados, que ocupan el vértice de los tubérculos lagrimales. Están constantemente sumergidos en el lago lagrimal. Nótese que el *inferior* es algo más ancho que el *superior* ($1\frac{1}{2}$ de milímetro contra $1\frac{1}{4}$) y, por otra parte, que está situado algo más hacia fuera.

c) *Conductos lagrimales.* — Los conductos lagrimales que son continuación de los puntos lagrimales, se dividen en superior e inferior, el superior se dirige al principio hacia arriba, después tuerce hacia fuera, el inferior se dirige primero hacia abajo después hacia fuera. Cada uno de ellos presenta, por lo tanto, dos porciones, una vertical y otra horizontal. La *porción vertical*, al principio muy estrecha (con milímetros *angustia* de GEREACH), va luego ensanchándose;

ofrece, pues, la forma de ampolla (algunas veces esta ampolla es doble), cuya base corresponde al comienzo de la porción horizontal. La *porción horizontal* regularmente cilíndrica, mide de 5 a 7 milímetros de largo por medio milímetro de diámetro. Los dos conductos lagrimales se reúnen comúnmente un poco antes de alcanzar el saco lagrimal, abriéndose entonces en este receptáculo por un orificio común. El conducto único resultante de la reunión de los dos conductos lagrimales mide, según los individuos, de 1 a 2 milímetros de largo.

d) *Saco lagrimal*. Pequeño depósito membranoso situado en la parte interna de la base de la órbita, en el conducto lacrimonasal (véase OSTEOLOGÍA). Tiene la forma de un cilindro algo aplanado de delante atrás, cuyo eje mayor está oblicuamente dirigido de arriba abajo, de delante atrás y de fuera adentro. Mide de 12 a 15 milímetros de alto por 5 a 6 milímetros de ancho.

Se distinguen en él: 1°, una *extremidad superior*, cerrada en fondo de saco (*fondo*), 2°, una *extremidad inferior*, que se continúa en el conducto nasal, 3° una *cara anterior*, en relación con el tendón directo del orbicular, 4°, una *cara posterior*, en relación con el tendón reflejo (reforzado por el músculo de Horner) y también con el tabique orbitario, 5°, una *cara externa*, correspondiente al conducto común de los conductos lagrimales, al ángulo de bifurcación de los tendones del orbicular y al músculo oblicuo menor, 6°, una *cara interna*, que descansa sobre el conducto lacrimonasal.

Visto interiormente, el saco lagrimal es de color rojo o rosado. Presenta en su parte externa, en la unión del tercio superior con el tercio medio, el orificio redondeado u ovalado de los conductos lagrimales, al cual precede una pequeña fosita infundibuliforme, el *seno de Maier*. En el extremo inferior se ve el *seno de Arlt*.

e) *Conducto nasal*. El conducto nasal (que en el esqueleto está formado a la vez por el maxilar superior, el unguis y el cornete inferior) viene a continuación del saco lagrimal. Su longitud es de 12 a 16 milímetros; su diámetro, de 2 a 2.6 milímetros. Continúa al principio la dirección del saco lagrimal; después se inflexiona poco a poco sobre sí mismo, para dirigirse abajo, atrás y adentro, describiendo en su conjunto una ligera curva, cuya convexidad mira hacia delante abajo y algo afuera. Se abre, abajo, en el meato inferior, pero su orificio nasal es muy variable en su situación y forma. Como *situación*, se admite generalmente que está colocado en el meato, en la unión de su cuarto anterior con sus tres cuartos posteriores, a 30 milímetros aproximadamente de ala de la nariz correspondiente.

como forma, puede ser circular (que es la más frecuente) oval, en forma de hendidura, cerrado por una válvula en forma de diafragma, etcétera.

2.º **Constitución anatómica.** — Las vías lagrimales están constituidas por una sola túnica, que es la túnica mucosa la *mucosa lagrimal* o *lacrimonasal*. Se continua, *arriba*, con la conjuntiva, *abajo*, con la pituitaria. En el conducto nasal está reforzada por el periostio del conducto.

3.º **Glándulas.** — Todos los autores coinciden en admitir de buen grado *glándulas mucosas* en la mucosa lagrimal, análogas a las de la pituitaria. Pero, en cambio, existen las mayores divergencias por lo que toca a su repetición topográfica.

4.º **Válvulas.** — La mucosa lacrimonasal presenta numerosos *repliegues transversales*, que, formando relieve hacia dentro, estrechan otro tanto el conducto. Estos repliegues, muy variables en su situación y desarrollo, son los que, equivocadamente, se han descrito como válvulas. 1.º, *válvulas de Bochdaleck*, a nivel de la *angustia* de GERLACH; 2.º, *válvula de Rosenmüller* o *de Huschke*, en el punto en que desembocan los conductos lagrimales en el saco, 3.º, *válvula de Béraud* o *Krause*, en el límite de saco lagrimal y de conducto nasal; 4.º *válvula de Taisfeller*, en la parte media del conducto nasal, 5.º, *válvula de Hamer*, en el orificio inferior de este último conducto. Estos repliegues no pueden en ningún caso desempeñar el papel, que gratuitamente se les ha atribuido, de aparatos reguladores del curso de las lágrimas.

5.º **Vasos y nervios.** — Las *arterias* proceden de la palpebral inferior y de la nasal. Las *venas*, muy desarrolladas a nivel del conducto nasal (siempre abiertas, observadas en los cortes, muy aproximadas y fuertemente anastomosadas, recordando con gran exactitud el tejido eréctil del cornete inferior) comunican, por arriba, con la red de los párpados, y por abajo, con la de la pituitaria. Los *nervios* provienen del nasal externo, rama del oftálmico.

CAPITULO V

SENTIDO DEL OIDO

(Oído)

El oído es aquel de nuestros cinco sentidos que nos hace percibir los sonidos. El aparato anatómico que le es propio ha recibido en su conjunto el mismo nombre de *oído*. El oído se divide en tres porciones:

- 1.^a Una porción externa, u *oído externo*
- 2.^a Una porción media, u *oído medio*.
- 3.^a Una porción interna, u *oído interno*.

ARTÍCULO PRIMERO

OIDO EXTERNO

El oído externo comprende dos partes: 1.^a, una parte externa llamada *pabellón del oído* o simplemente *oreja*; 2.^a, una parte interna, que constituye el *conducto auditivo externo*.

1. PABELLÓN DEL OÍDO

Expansion laminada, situada en las partes laterales de la cabeza, delante de la apófisis mastoidea y detrás de la articulación temporomaxilar. Tiene de 60 a 65 milímetros de altura por 25 a 35 milímetros de ancho. Libre en sus dos tercios posteriores, está sujeto a la cabeza por su tercio anterior. El ángulo diedro del seno posterior que forma con la cabeza (*ángulo cefaloauricular*) mide, por término medio, de 20 a 30 grados.

1.^a **Conformación exterior.** Se consideran en el pabellón: una *cara externa*, una *cara interna* y una *circunferencia*.

a) *Cara externa*. — En su parte media se ve una excavación profunda, la *concha*.

Alrededor de ella, y sirviéndole de límites, están dispuestas cuatro eminencias: 1.ª, e. *hélix*, repliegue curvilíneo que ocupa la parte anterior, superior y posterior del pabellón (con su *raíz*, su *cola* y su *canal*); 2.ª, el *antehélix*, situado entre el *hélix* y la *concha* (con sus dos ramas y su *fosita escafoides* o *navicular*); 3.ª, el *tragus*, eminencia laminada en forma triangular, situada en la parte anterior de la *concha* (con su *base* y su *vértice* a menudo formado por dos tubérculos); está separado del *hélix* por un surco, el *surco anterior de la oreja*; 4.ª, el *antitragus*, situado en la parte posterior de la *concha* enfrente del *tragus*, del cual está separado hacia abajo por una escotadura profunda, la *escotadura de la concha*.

Debajo de la cola del *hélix*, del *tragus* y del *antitragus*, se ve el *lóbulo de la oreja*, formación blanda de 10 a 12 milímetros de altura, de forma muy variable (triangular, cuadrilátera, semicircular, semi-elipsoidea).

b) *Cara interna*. — Mira hacia dentro y atrás. Correctamente limitada hacia arriba, atrás y abajo por la circunferencia, está limitada por delante por un surco curvilíneo, el *surco cefaloauricular*. Muy desigual, como la cara externa; sus desigualdades son exactamente las mismas que hemos señalado en la cara externa, pero inversamente configuradas (*convexidad de la concha*, *convexidad del antehélix*, etc.).

c) *Circunferencia*. — De forma ovalada, como el propio pabellón.

2.º *Constitución anatómica*. — El pabellón comprende: 1.º, un fibrocartilago, el *cartilago de la oreja*, 2.º, *ligamentos*, 3.º, *músculos*; 4.º, una *cubierta cutánea*.

A. *CARTÍLAGO DE LA OREJA*. — Lámina delgada y elástica que ocupa toda la extensión del pabellón, a excepción del *lóbulo*. Reproduce fielmente, en ambas caras, todas las desigualdades del pabellón. Nótese: 1.º, delante, la *espinas* o *apófisis del hélix*; 2.º, detrás, la *lengüeta caudal del hélix y del antehélix*, separadas del *antitragus* por la *fisura posterior* del cartilago; 3.º en la cara interna, el *surco transversal de la oreja*, que separa a eminencia de la *concha* de la del *antehélix*. Histológicamente, pertenece al grupo de los cartilagos elásticos o reticulados.

B. *LIGAMENTOS*. Los ligamentos del pabellón se dividen en extrínsecos e intrínsecos.

a) *Ligamentos extrínsecos.* — Son dos: uno, *anterior* que va del tubérculo cigomático al tragus, a la apófisis del hélix y a la parte anterior de la concha; el otro, *posterior*, que va de la base de la apófisis mastoideas a la convexidad de la concha y a la pared superior del conducto auditivo externo.

b) *Ligamentos intrínsecos.* Son cuatro: el *primero* va de la convexidad de la concha a la convexidad del antehélix, el *segundo* está formado por manojos fibrosos, que van de la convexidad del hélix a la convexidad del antehélix y de la concha; el *tercero* ocupa la fisura posterior; el *cuarto* va del tragus al hélix.

C. *Músculos.* — Los músculos del pabellón se dividen, como los ligamentos, en extrínsecos e intrínsecos.

a) *Músculos extrínsecos* — Son tres:

α) El *auricular superior*, situado en la parte posterosuperior de la región temporal. Se inserta: arriba, en la aponeurosis epicraneal; abajo, en la convexidad de la fosita navicular del antehélix. Lleva el pabellón hacia arriba.

β) El *auricular anterior*, delgado, en forma de cinta, está situado delante del pabellón. Se inserta: por delante, en la apófisis epicraneal, por detrás, en la apófisis del hélix y en la parte anterior de la concha. Lleva el pabellón hacia delante.

γ) El *auricular posterior* se compone de dos o tres pequeños manojos, que van de la apófisis mastoideas a la convexidad de la concha. Lleva el pabellón hacia atrás.

b) *Músculos intrínsecos* — En número de seis:

1.º El *músculo mayor del hélix*, que se extiende sobre la porción ascendente del hélix y se inserta, abajo, en la apófisis del hélix; arriba, en la piel y en el cartilago.

2.º El *músculo menor del hélix*, situado en el codo o ángulo que forma la raíz del hélix con su porción ascendente.

3.º El *músculo del tragus*, pequeño manojito aplanado cuadrangular, recortado sobre la cara externa del tragus.

4.º El *músculo del antitragus*, que nace en la cara externa del antitragus y va a terminar en la parte superior de la lengüeta caudal del hélix.

5.º El *músculo transverso*, formado por manojos muy cortos, que en la cara interna del pabellón se extienden desde la convexidad del hélix a la convexidad de la concha.

6.º El *músculo oblicuo*, formado por dos o tres manojos, que van de la convexidad de la fosa navicular a la convexidad de la concha.

Todos estos musculitos son en el hombre rudimentarios y están desprovistos de funciones.

D. PIEL. — Se extiende regularmente sobre las dos caras del cartilago, cuyas irregularidades reproducen fielmente. Por debajo de ella se encuentran el *tejido celular subcutáneo*, relativamente laxo en la cara interna, más raro y apretado en la cara externa. Como anexos presenta: 1.º, *pelos rudimentarios*, con excepción del ramillete (*barbula hirci*) situado en la cara interna del tragus, 2.º, *glándulas sebáceas*, unas anexas a los pelos, otras que se abren directamente en la superficie de la piel, 3.º, *glándulas sudoríparas*, muy raras y que no existen sino en ciertos puntos.

3.º **Vasos y nervios.** a) Las *arterias* provienen de la temporal superficial y de la auricular posterior. Las primeras, *ramas auriculares anteriores*, por lo común en número de tres (*inferior, media y superior*), se distribuyen en la cara externa del pabellón, pero únicamente en su mitad interna. Las segundas, *ramas auriculares posteriores*, en número de tres o cuatro, se distribuyen primero en la cara interna del pabellón; después, por medio de las *arterias perforantes* (tres o cuatro) y de las *arterias circundantes*, riegan la mitad posterior de la cara externa. Resultan, pues, dos territorios vasculares (más o menos anastomosados entre sí)

β) Las *venas* se dividen en *anteriores* (que van a la temporal superficial) y *posteriores* (que terminan en la yugular externa y algunas en la vena mastoidea).

γ) Los *linfáticos* forman una rica red: los de la cara interna terminan, en parte, en los ganglios mastoideos, y en parte, en los ganglios parotídeos posteriores; los de la cara externa se dividen en *anteriores* (que van a los ganglios preauriculares), *inferiores* (que van a los ganglios parotídeos) y *posteriores* (que rodean el borde del pabellón, para mezclarse con los linfáticos de la cara interna)

δ) Los *nervios* se dividen en *motores y sensitivos*: los primeros proceden del facial, los segundos proceden del auriculotemporal y de la rama auricular del plexo cervical.

4.º CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO

El conducto auditivo externo se extiende desde la concha al oído medio. Comprende dos partes: una parte *interna u ósea*, excavada en el temporal, y otra parte *externa o fibrocartilaginosa*, formada por partes blandas.

1.ª **Consideraciones generales.** — El conducto auditivo externo, considerado desde el punto de vista de su *dirección*, se dirige oblicuamente adentro, adelante y algo hacia abajo, describiendo en su conjunto una curva muy irregular, cuya concavidad mira abajo y atrás (examen de los cortes, de los moldes o vaciados). Su *longitud*, medida en el sentido de su eje, es de 24 milímetros, de los cuales corresponden 8 a la porción fibrocartilaginosa y 16 a la porción ósea. En la pared inferior del conducto es donde esta longitud alcanza su máximo (27 milímetros), presentando su mínimo en la pared superior (21 milímetros). Su *diámetro* varía, según sean los puntos examinados, de 9 a 4,6 milímetros. Nótese que su parte más estrecha, *istmo del conducto*, corresponde a la unión de su tercio interno con sus dos tercios externos.

2.ª **Forma y relaciones.** — El conducto auditivo, de forma cilíndrica, algo aplanado de delante atrás, presenta *cuatro paredes* (anterior, posterior, superior e inferior) y *dos extremidades* (externa e interna).

α) La *pared anterior* está en relación con la articulación temporomaxilar y, más especialmente, con el cóndilo del maxilar inferior.

β) La *pared posterior* corresponde a la apófisis mastoides.

γ) La *pared superior* está en relación con el departamente medio de la cavidad craneal.

δ) La *pared inferior* corresponde a la parótida.

ε) La *extremidad interna*, fuertemente oblicua hacia abajo, afuera y atrás, está cerrada por la membrana del tímpano (véase pág. 564).

ζ) La *extremidad externa* se abre en la parte anterior e inferior de la concha, por un orificio cuyo eje mayor es vertical.

3.ª **Constitución anatómica.** El conducto auditivo se compone: 1.º, de un *esqueleto óseo*; 2.º, de un *esqueleto fibrocartilaginoso*, 3.º, de un *revestimiento cutáneo*.

a) *Esqueleto óseo.* — La porción ósea del conducto auditivo pertenece al temporal. Está formada: 1.º, por *delante, abajo y atrás*, por el hueso timpánico representando una especie de canal; 2.º, por *arriba*, por la porción escamosa (véase *Temporal*).

b) *Esqueleto fibrocartilaginoso.* — La porción fibrocartilaginosa, que sigue a la precedente, está constituida por dos láminas, una cartilaginosa y la otra fibrosa, adoptando ambas la forma de un canal y reunidas por sus bordes.

a) La *hoja cartilaginosa* ocupa la parte anteroinferior del conducto: su extremidad interna se une al orificio externo del conducto óseo; su extremidad externa se continua con el tragus (recuérdese la *cisura terminalis de Schwalbe*). Algo por dentro del tragus, el cartilago del conducto auditivo ofrece dos hendiduras verticales (una externa y otra interna), que son las *cisuras de Santorini*.

β) La *lámina fibrosa* ocupa la parte posterior y superior del conducto. Obsérvese que va aumentando en anchura de fuera adentro, mientras que la lámina cartilaginosa se va estrechando progresivamente en igual sentido.

c) *Revestimiento cutáneo* — La piel que reviste el conducto auditivo es prolongación de la que reviste el pabellón. Gruesa en su porción fibrocartilaginosa, se hace más delgada en la porción ósea y se adelgaza más todavía en la membrana del tímpano. Presenta, en la parte interna del conducto, numerosas *crestas semilunares*. Como anexos, ofrece: 1.º, *pelos* muy rudimentarios; 2.º, *glándulas sebáceas*, menos desarrolladas que en el pabellón; 3.º, *glándulas sudoríparas*, que presentan en este punto un desarrollo considerable (capa de 3 a 4 milímetros de espesor) y una disposición especial. son las *glándulas ceruminosas*, que secretan una materia amarillenta llamada *cerumen*.

4.º *Vasos y nervios*. — Las arterias proceden: 1.º, *las de la pared fibrocartilaginosa*, de la temporal superficial y de la auricular posterior; 2.º, *las de la pared ósea*, de la timpánica. Las venas se dividen en *anteriores* y *posteriores*: las posteriores van a la yugular externa; las anteriores, a la maxilar interna y al plexo pterigoideo. Los *linfáticos* van, en parte, a ganglio preauricular y, en parte, a los ganglios parotídeos y a los ganglios cervicales profundos. Los *nervios* emanan a la vez del auriculotemporal, de la rama auricular del plexo cervical y del facial.

ARTÍCULO II

OÍDO MEDIO

El oído medio es una cavidad llena de aire, *caja del tímpano*, excavada en el espesor del temporal, entre el conducto auditivo que está por fuera, y el oído interno, que está por dentro. Contiene los *huesillos del oído*. Comunica, por delante, con la faringe por la *trompa de Eustaquio*; por detrás, con las *cavidades mastoideas*. Está tapizada en toda su extensión por una membrana mucosa, la *mucosa timpánica*.

1. CAJA DEL TÍMPANO O DEL TAMBOR

La caja del tímpano tiene la forma de un tambor (*tympanium*) cuyas dos bases estuviesen muy próximas entre sí y ambas deprimidas hacia el centro de la cavidad; es, por lo tanto, una especie de lente biconcava. Su orientación es tal, que cada una de sus bases mira oblicuamente afuera, abajo y adelante. Su diámetro mide 15 milímetros; su anchura, que en la periferia es de 4 a 6 milímetros, se reduce en el centro a 1,5 ó 2 milímetros. Se describen en la caja del tímpano las tres regiones siguientes: 1.ª, *pared externa*, 2.ª *pared interna*; 3.ª, *circunferencia*.

1.º *Pared externa*. — Comprende: 1.º en el centro, una *membrana*, la *membrana del tímpano*; 2.º, alrededor de esta membrana, una *porción ósea*.

A. *PORCIÓN MEMBRANOSA DE LA PARED EXTERNA. MEMBRANA DEL TÍMPANO*. — La membrana del tímpano es una membrana delgada, transparente, regularmente bastante circular, extendida y situada de canto entre el conducto auditivo externo y la caja del tímpano.

a) *Dimensiones*. Su diámetro es de 9 a 10 milímetros. Se llaman *polo superior* y *polo inferior* las dos extremidades superior e inferior del diámetro vertical.

b) *Inclinación*. — Horizontal en el embrión, la membrana del tímpano se levanta poco a poco por su lado externo, de modo que viene a formar con la horizontal un ángulo abierto hacia fuera, que es de 30 a 35 grados en el feto y de 40 a 45 grados en el adulto.

c) *Forma*. — Casi circular, abombada hacia dentro, y por consiguiente, infundibuliforme cuando se la examina por su cara externa. Su punto más hundido se llama *ombiligo*: está situado algo por debajo del centro y corresponde al extremo del mango del martillo.

d) *Modo de inserción*. — La membrana del tímpano corresponde al *sulcus tympanicus* del hueso timpánico y se halla sujeta al mismo por una faja circular de tejido conjuntivo: el *rodete anular*.

a) El hueso timpánico está interrumpido en su parte superior (*segmento de Rivinus*); a este nivel, la membrana del tímpano viene a fijarse en la parte superior del conducto auditivo externo (formada por la porción escamosa o concha del temporal); esta porción más superior de la membrana del tímpano, correspondiente al segmento de Rivinus, ha recibido de SCHRAPNELL el nombre de *membrana flaccida*.

da; es más delgada y menos tensa que el resto de la membrana. Está limitada hacia abajo por dos pequeños cordones conjuntivos que, partiendo de los dos cuerpos del círculo timpánico, van por otro lado a fijarse en la base de la apófisis corta del martillo: son los *ligamentos timpanomaleolares*, que se dividen en anterior y posterior.

b) La *membrana flicáda*, que forma prominencia hacia el lado del conducto auditivo, presenta, por el contrario, del lado de la caja, una pequeña excavación, la *bolsa superior* de la membrana del tímpano. Nótese otras dos depresiones: una de ellas se halla debajo del ligamento timpanomaleolar anterior (*bolsa anterior*) y la otra debajo del ligamento timpanomaleolar posterior (*bolsa posterior*).

c) *División topográfica*.—Si consideramos, trazados en la superficie de la membrana del tímpano, dos diámetros, uno vertical (por el mango del martillo) y otro perpendicular al precedente (uniéndose los dos a nivel del ombligo), tendremos partida dicha membrana en cuatro sectores o cuadrantes: *cuadrante posterosuperior*, *cuadrante posteroinferior*, *cuadrante anterosuperior* y *cuadrante anteroinferior*. Los dos primeros son *retroumbilicales*; los dos últimos, *preumbilicales*.

f) *Estructura*.—La membrana del tímpano se compone de tres capas superpuestas. 1.ª, una capa media fibrosa; 2.ª una capa externa, *cutánea*; 3.ª, una capa interna, *mucosa*.

g) *Vasos y nervios*.—Las *arterias* forman dos redes. 1.ª, una *red externa o cutánea*, alimentada por la arteria timpánica, rama de la maxilar interna; 2.ª, una *red interna o mucosa*, alimentada por las arterias de la caja (arteria timpánica, arteria estilomastoidea). Las *venas* desembocan: 1.ª, las de la red cutánea, en la yugular externa; 2.ª, las de la red mucosa, parte en la red venosa de la trompa y parte en las venas de la duramadre. Los *linfáticos* se dividen, como los vasos sanguíneos, en externos (que se juntan a los linfáticos del conducto auditivo) e internos (que se mezclan con los de la caja). Los *nervios* proceden: 1.ª, del auriculotemporal; 2.ª, del ramo auricular del vago; 3.ª, del nervio de Jacobson.

B. *Porción ósea de la pared externa*.—En todo el contorno de la membrana del tímpano, la pared externa de la caja está formada por el hueso. Esta porción ósea mide: 1 milímetro de altura en la parte inferior; 2 milímetros de altura en la parte anterior y posterior; 3 ó 6 milímetros en la parte superior (*cavidad superior* de la caja, *álica* de los otólogos).

2.ª **Pared interna.**— La pared interna o laberíntica separa el oído medio del oído interno. Presenta:

α) En su parte central, una eminencia mamelonada, el *promontorio*. Es de notar en esta prominencia un *conducto ramificado*, que termina por abajo en un orificio, el *orificio superior del conducto de Jacobson* (para el nervio de Jacobson y sus ramas).

β) Por detrás y debajo del promontorio, la *ventana redonda* (1,5 a 2 milímetros de diámetro) hace comunicar la caja con la rampa timpánica del caracol; está cerrada por la *membrana de la ventana redonda o tímpano secundario*.

γ) Por detrás y por encima del promontorio, la *ventana oval* (3,5 por 2 milímetros de diámetro) tiene forma semicircular. Hace comunicar la caja del tímpano con el vestíbulo del oído interno. En estado fresco está ocupada por la base del estribo.

δ) Por detrás del promontorio, entre las dos ventanas, una depresión de 4 milímetros de diámetro y de 3 milímetros de profundidad: el *seno timpánico*.

ε) Inmediatamente detrás del seno timpánico, la pirámide, pequeña eminencia ósea que aloja en su interior el músculo del estribo y presenta en su vértice un pequeño orificio por el cual sale el tendón de este último músculo.

ζ) Por arriba y por delante del promontorio, un conducto transversal, continuación, por delante, del conducto del músculo interno del martillo, y cuya extremidad posterior se endereza hacia fuera, a modo de mango de cuchara, es el *pico de cuchara* (destinado a dar paso al músculo interno del martillo).

3.ª **Circunferencia.**— La circunferencia de la caja es irregularmente circular.

α) Su *parte superior (pared superior o craneal)* corresponde al borde superior y a la cara anterosuperior del peñasco (seno petroso superior). Está formada por una hoja o lámina muy delgada, el *tegmen timpani*, que separa la caja de la cavidad craneal. Nótese que esta lámina está constituida por el peñasco (*por dentro*) y por la porción escamosa (*por fuera*), unidos entre sí por la sutura petroescamosa (algunas veces verdadera fisura).

β) La *parte inferior (pared inferior o yugular)*, de 3 a 4 milímetros de ancho solamente, tiene la forma de un canalito de dirección anteroposterior: está un milímetro por debajo del nivel del conducto auditivo. Por debajo de esta pared cuyo espesor es extremadamente

variable, se encuentran la fosa yugular y el golfo de la vena yugular, que ocupa dicha fosa.

γ) La *parte posterior* (*pared posterior o mastoidea*) presenta de arriba abajo: 1.º, el *conducto timpanomastoideo* (*aditus ad antrum*), que conduce a las cavidades mastoideas; 2.º, una pequeña escotadura, para la rama horizontal del yunque; 3.º, el *orificio de entrada de la cuerda del tímpano*; 4.º, en el extremo inferior presenta una prominencia redondeada, la *protuberancia estiloidea de la caja*.

δ) La *parte anterior* (*pared anterior o tubárica*) está ocupada en gran parte por un ancho orificio, el *orificio timpánico de la trompa*. Hay que notar la existencia: 1.º, en la *parte extrema superior*, del conducto del mango del martillo; 2.º, *afuera*, del *orificio de salida de la cuerda del tímpano*, continuando en la base del cráneo por el *conducto de Huguier*; 3.º, *abajo*, de *pequeños agujeros* para las venillas y para el *filete caroticotimpánico* (que une el nervio de Jacobson al plexo carótido). Esta pared anterior sólo está separada de la carótida interna por una delgada lámina ósea, algunas veces dehiscente.

2 CADENA DE LOS HUESILLOS DEL OÍDO

Los huesillos del oído están colocados unos tras otros, formando una cadena sin interrupción, que se extiende transversalmente de la pared externa a la pared interna.

A. **Descripción de los huesillos.** — Los huesillos del oído son tres, esto es, yendo de fuera adentro, el *martillo*, el *yunque* y el *estríbo*.

1.º **MARTILLO.** — El martillo, que se extiende de arriba abajo, de 7 a 9 milímetros de largo, presenta cabeza, cuello, mango y apófisis.

α) La *cabeza* representa la parte más elevada del hueso. Está situada en el átrio y por consiguiente encima de la membrana del tímpano. Redondeada, lisa, convexa, tiene en su parte postero-interna una carilla elíptica para el yunque.

β) El *cuello* es la parte estrechada que sostiene la cabeza. Corto, aplanado de delante atrás y ligeramente retorcido sobre el eje.

γ) El *mango* se dirige abajo y algo atrás, englobado en el espesor de la membrana del tímpano. Termina, a nivel del ombligo, por una extremidad ensanchada en forma de espátula.

δ) Las *apófisis* son dos, una corta y gruesa y otra larga. La *apófisis corta* es una pequeña eminencia cónica, de un milímetro de largo, que nace en la parte inferoexterna del cuello y se dirige luego hacia

fuera y algo arriba hacia la parte superior de la membrana del tímpano. La *apófisis larga* o *apófisis de Raw* tiene la forma de una espina aplanada y sinuosa, de 4 a 5 milímetros de longitud, que va de la parte anterior del cuello a la parte más externa de la cisura de Glaser.

2.º Yunque. — Situado por dentro del martillo, ofrece (como el yunque del herrero, al cual se ha comparado) un cuerpo y dos ramas.

a) El *cuerpo*, situado en el ático (como la cabeza del martillo), es cuboideo y aplanado en el sentido transversal. En su parte anterior se ve una carilla cóncava, en forma de media luna para articularse con el martillo.

β) Las *dos ramas*, fuertemente divergentes, se dividen en superior e inferior; la *rama superior*, horizontal se dirige atrás, hacia la pared posterior de la caja; la *rama inferior*, vertical, se dirige primero abajo, después tuerce hacia dentro, para terminar en un pequeño abultamiento, la *apófisis lenticular*.

3.º Estríbo. — El estríbo, colocado entre la apófisis lenticular y la ventana oval, ofrece a nuestra consideración (como un estríbo de montar) una cabeza, una base y dos ramas.

a) La *cabeza*, que representa la parte más externa del hueso, es cuadrilátera y fuertemente aplanada de arriba abajo. Presenta, en su parte externa, una pequeña carilla articular, cóncava para la apófisis lenticular.

β) La *base* es una pequeña placa ósea que se aloja en la ventana oval y presenta, naturalmente, igual configuración que esta última (ovalada, con su eje mayor transversal y su más gruesa extremidad posterior).

γ) Las *dos ramas*, una anterior y otra posterior, nacen en las dos extremidades de la base y desde allí se dirigen hacia la cabeza, describiendo cada una de ellas una ligera curva (estas dos curvas se miran por su concavidad). Entre las dos forman una especie de semicírculo, el *asa del estríbo*. En el punto de unión de las ramas con la cabeza existe comúnmente una ligera estrangulación circular conocida con el nombre de *cuello*.

B. Conexión de los huesillos. — Los huesillos del oído, además de estar unidos entre sí lo están a las diferentes paredes de la caja.

1.º ARTICULACIONES DE LOS HUESILLOS ENTRE SÍ — Existen dos articulaciones: 1.ª, articulación del *martillo con el yunque*; 2.ª, articulación del *yunque con el estríbo*.

a) *Articulación del martillo con el yunque* — Articulación por encaje recíproco: dos *carillas ovaladas*, inversamente configuradas y revestidas de cartilago, en la cabeza del martillo y en el cuerpo del yunque; un *ligamento capsular* (con un pequeño menisco intra-articular); una *pequeña sinovial*

b) *Articulación del yunque con el estribo*. — Es una *enartrosis*: *pequeña carilla redondeada y convexa* en la apófisis lenticular, *pequeña carilla cóncava* en la cabeza del estribo; una *cápsula fibrosa*, una *pequeña sinovial*

2.º *UNIÓN DE LOS HUESILLOS CON LAS PAREDES DE LA CAJA*. — Cada uno de los tres huesillos está unido a las paredes de la caja por ligamentos.

a) *El martillo* tiene, ante todo, cuatro ligamentos. 1.º, *ligamento superior*, que va de la parte superior de la cabeza a la parte correspondiente de la bóveda; 2.º, *ligamento externo*, muy corto, que va de la parte externa del cuello a la pared externa de la caja, 3.º, *ligamento anterior*, muy largo, que, desprendiéndose del cuello y de la base de la apófisis larga, atraviesa la cisura de Glaser y va a terminar en la base del cráneo, junto a la espina del esfenoides, 4.º, *ligamento posterior*, representado por el manojó más apartado del ligamento externo

b) *El yunque* tiene dos ligamentos. 1.º, un *ligamento superior* que desciende de la bóveda sobre el cuerpo del hueso (no es constante); 2.º, un *ligamento posterior*, que une el vértice de la rama horizontal del hueso al contorno de la pequeña fosita sobre que descansa.

γ) *La base del estribo* está unida al contorno o marco de la ventana oval por una serie continua de fibras conjuntivas y elásticas, cuyo conjunto constituye el llamado *ligamento anular de la base del estribo*.

C. *Aparato motor de los huesillos*. — La cadena de los huesillos del oído está sometida a la acción de dos músculos: el *músculo del martillo* y el *músculo del estribo*

1.º *MÚSCULO DEL MARTILLO*. — Pequeño músculo fusiforme de 20 a 25 milímetros de largo, contenido en un conducto óseo especial, descrito en *OSTEOLOGÍA*. Nace en el ángulo que forma la porción petrosa del temporal con su porción escamosa, y también en la porción cartilaginosa de la trompa de Eustaquio. Desde allí se dirige afuera y arriba costea el borde superior de la trompa, llega a la caja del tímpano y se dobla después hacia fuera, para ir a fijarse en la extremidad

del mango del martillo. Presenta, por lo tanto, dos porciones: 1.ª, una *porción interna*, carnosa, paralela al eje del peñasco; 2.ª, una *porción externa*, tendinosa, perpendicular a la precedente.

2.º **MÚSCULO DEL ESTRIBO.** — Más pequeño que el músculo del martillo, está alojado en el conducto de la pirámide. Se inserta por abajo en el fondo de este conducto, se dirige al principio arriba, después se flexiona hacia delante, sale de la pirámide a nivel de la cúspide y va a terminar, por un tendón muy delgado, en la parte posterior del estribo, ya en la cabeza, ya en el cuello.

3.º **ACCIÓN DE ESTOS DOS MÚSCULOS.** — Los huesillos están articulados de tal modo (movimiento de la campanilla), que el movimiento o desplazamiento de uno de ellos implica el movimiento o desplazamiento de los otros dos.

a) El *músculo del martillo*, moviendo hacia dentro el mango del martillo (*acción directa*), pone tensa la membrana del tímpano; luego, moviendo también hacia dentro la base del estribo (*acción indirecta*), comprime el líquido contenido en el vestíbulo.

β) El *músculo del estribo* primeramente tira hacia atrás la cabeza del estribo: ésta es la *acción directa*. Después, por *acción indirecta*, mueve: 1.º, la base del estribo, el cual, saliendo de la ventana oval, provoca una disminución de presión en el líquido del vestíbulo; 2.º, el mango del martillo, el cual, alejándose del centro de la caja, es causa de una relajación de la membrana del tímpano. Así, pues, los dos músculos son recíprocamente antagonistas, poniendo el primero tensa la membrana del tímpano y aumentando la presión del líquido laberíntico, y el segundo rebaja la membrana del tímpano y rebaja la presión de este líquido laberíntico.

3. REVESTIMIENTO MUCOSO DE LA CAJA

La caja del tímpano está tapizada en toda su extensión por una mucosa, la *mucosa timpánica*: es delgada, transparente, de coloración grisácea, íntimamente unida al perostio. Reviste los huesillos y sus ligamentos.

El espacio semicircular comprendido entre la base del estribo y sus dos ramas está ocupado por un repliegue mucoso horizontal: la *membrana obturatriz del estribo*.

4. VASOS Y NERVIOS DE LA CAJA

1.° **Arterias.** — Muy numerosas, proceden de la arteria estilo-mastoidea, de la arteria timpánica, de la meníngea media, de la faríngea y de la carótida interna. Anastomosándose entre sí, forman una red fundamental, que ocupa las capas profundas del corion mucoso. De esta red se desprenden dos órdenes de ramos arteriales: 1.°, *ramos óseos*, para las paredes óseas de la caja y para los huesillos, 2.°, *ramos mucosos*, para el corion mucoso.

2.° **Venas.** — Más numerosas y voluminosas que las arterias, salen de la caja por los mismos orificios.

3.° **Linfáticos.** — Presentan igual disposición que en la capa interna de la membrana del tímpano. Notese la presencia, en la parte superior de la caja, de formaciones linfoides, representando *ganglios rudimentarios*.

4.° **Nervios.** — Los *filetes motores* proceden: 1.°, para el *músculo del martillo*, del ganglio óptico, 2.°, para el *músculo del estribo*, del propio tronco del facial. Los *filetes sensitivos y simpáticos* emanan del nervio de Jacobson y (por medio del manojito carotídeo timpánico) del plexo carotídeo.

5. CAVIDADES MASTOIDEAS

El orificio timpanomastoideo (*aditus ad antrum*), que, según dijimos antes, existe en la parte superior de la pared posterior de la caja, conduce a unas cavidades anfractuosas: las *cavidades mastoideas*.

1.° **Disposición general.** — Están excavadas en gran parte en la porción petromastoidea del temporal; solamente algunas pertenecen a la porción escamosa. Disposición extremadamente variable: se encuentra, por lo común, una cavidad central mayor que las otras, el *antro mastoideo*, y en todo el contorno del antro, cavidades más pequeñas que comunican entre sí y además con el propio antro.

2.° **Relaciones.** — Las cavidades mastoideas están en relación: 1.°, *por delante*, con los conductos semicirculares, la caja del tímpano, el nervio facial y la pared posterior del conducto auditivo externo;

2.º, *por arriba*, con la cavidad craneal; 3.º, *por abajo*, con la apófisis mastoidea y la ranura digástrica; 4.º, *por fuera*, con las partes blandas de la región mastoidea (de las cuales están separadas por una lámina de tejido compacto); 5.º, *hacia atrás y adentro*, con un conducto descendente, ocupado en el vivo por el seno lateral.

3.º **Cavidades neumáticas y cavidades aneumáticas.** — La mayor parte de las cavidades mastoideas comunican directa o indirectamente con la caja del tímpano; por esta razón están llenas de aire (*cavidades neumáticas*), y no son más que divertículos de la caja. La otra parte pertenece al diploe, éstas no comunican con la caja, no contienen aire (*cavidades aneumáticas*) y están rellenas por una medula ósea de color rojizo.

4.º **Vasos y nervios.** Las arterias destinadas a las cavidades mastoideas proceden, en parte, de la estilomastoidea y, en parte, de la meníngea media. Las venas terminan en el seno petroso superior y en el seno lateral. Los linfáticos se confunden verosimilmente con los de la caja.

6. TROMPA DE EUSTAQUIO

Largo conducto que pone en comunicación la caja del tímpano con la faringe. Se compone de dos porciones: 1.º una porción externa, excavada en la porción inferior del temporal, *porción ósea* o *porción dura*; 2.º, una porción interna, formada por partes blandas, *porción blanda* o *fibrocartilaginosa*.

1.º **Consideraciones generales.** — Desde el punto de vista de su *dirección*, la trompa se dirige oblicuamente de atrás adelante, de fuera adentro y de arriba abajo. Además, las dos porciones ósea y fibrocartilaginosa forman entre sí un ángulo muy obtuso, abierto hacia abajo y adelante. Su *longitud* es de 35 a 45 milímetros, cuyos dos tercios pertenecen a la porción fibrocartilaginosa y el otro tercio a la porción ósea. Su *calibre* varía según los puntos en que se la considera. Siguiendo el conducto de fuera adentro, se le ve estrecharse poco a poco hasta el comienzo de la porción fibrocartilaginosa (*ístmico*); luego, a partir de este punto, se ensancha progresivamente hasta la faringe. Conviene añadir que es fuertemente aplanada de delante atrás y de fuera adentro (*orificio timpánico*, 5 milímetros por 3; *orificio faríngeo*, 8 milímetros por 5; *ístmico*, 2 milímetros por 1).

1.º Forma y relaciones. — Como puede verse, la trompa está formada por dos conos (*cono timpánico* y *cono faríngeo*), que se unen por sus vértices a nivel del istmo. Se consideran en ella *dos caras, dos bordes y dos extremidades*.

a) *Cara anteroexterna*. — Está en relación sucesivamente con la ciura de Glaser, el músculo periestafilino externo y el borde posterior del ala interna de la apófisis pterigoides.

b) *Cara posterointerna*. — Está en relación sucesivamente con el conducto carotídeo (y con la carótida), el músculo periestafilino interno y la mucosa de la faringe.

c) *Borde superior*. — Está en relación, primero (yendo de fuera adentro) con el conducto del músculo interno del martillo, luego con la sutura que une el peñasco al ala mayor del esfenoides, y finalmente, con la base de la apófisis pterigoides.

d) *Borde inferior*. — Ocupa el intervalo comprendido entre los dos músculos periestafilino interno y periestafilino externo.

e) *Orificio externo*. — Ya descrito al tratar de la caja

f) *Orificio interno*. — Llamado también *orificio faríngeo* o *pabellón de la trompa*, está situado en las partes laterales de la faringe nasal. Es comúnmente triangular, de base inferior (a menudo elíptico, en forma de fisura, reniforme o piriforme), presentando en este caso un labio anterior y un labio inferior. El *labio posterior* forma un rodete vertical, el *rodete de la trompa* (que corresponde al fibrocartilago), teniendo debajo de él el *pliegue salpingofaríngeo* y detrás la *fosita de Rosenmüller*. El *labio anterior* está formado por un segundo repliegue mucoso, el *pliegue salpingopalatino*, por delante de él, hay un conducto vertical, el *conducto nasofaríngeo*, que lo separa de las fosas nasales. El *labio inferior*, que no es saliente como los precedentes, está inclinado abajo y atrás. Es de notar, como relaciones importantes: 1.º, que el pabellón de la trompa ocupa el centro del cuadrilátero que forma la pared lateral de la faringe nasal; 2.º, que está situado a 10 milímetros por detrás de la extremidad posterior del cornete inferior y a 65 milímetros, por término medio (de 53 a 75), de la entrada de las fosas nasales.

3.º Constitución anatómica. — La trompa se compone: 1.º, de un aparato de sostén o *armazón*; 2.º, de una *mucosa*; 3.º, de *músculos*.

A. ARMazón DE LA TROMPA. Varía según se examina en el cono timpánico o en el cono faríngeo.

a) *En el cono timpánico.* — Está constituida por el hueso temporal.

b) *En el cono faríngeo.* — Aquí la armazón de la trompa comprende dos láminas, una cartilaginosa y otra fibrosa.

a) La *lámina cartilaginosa* ocupa la parte posteroexterna de la trompa. Tiene la forma de un triángulo, cuyo vértice se fija a la extremidad interna de la porción ósea y cuya base libre forma prominencia detrás del pabellón. Su borde superior se conserva hacia delante formando gancho. Grosor de la lámina: 1 milímetro en la parte de afuera, 2 milímetros en su parte media y 3 milímetros en la parte de adentro. Hay que anotar: 1.º, en la lámina en cuestión, la frecuente existencia de fisuras o cisuras; 2.º, alrededor de ellas, la existencia casi constante de pequeños cartílagos accesorios.

β) La *lámina fibrosa* se extiende de uno a otro borde de la lámina cartilaginosa y constituye la pared anteroexterna de la trompa.

B. *Mucosa.* — La trompa está revestida en toda su extensión por una mucosa, *mucosa tubárica*, que se continúa de una parte, con la mucosa de la caja, y de otra, con la mucosa de la faringe. Delgada en su porción ósea, es más gruesa en su porción fibrocartilaginosa. Está íntimamente adherida a las capas subyacentes. A la mucosa van *anejos*: 1.º, *glándulas acinosas* (el suelo de la porción fibrocartilaginosa); 2.º, *folículos cerrados*, en la parte media de la porción fibrocartilaginosa (*amígdala tubárica* o de *Gerlach*).

C. *Músculos.* — Los músculos que actúan en la trompa son 1.º, el *periestafilino interno* y el *periestafilino externo*; 2.º, el *fascículo salpingofaríngeo*.

4.º *Vasos y nervios.* — Las arterias provienen de la faríngea, de la meníngea media y de la vidiana. Las *venas*, formando una tupida red, van al plexo pterigideo y de allí a las yugulares. Los *linfáticos* se continúan con los de la caja y los de la faringe. Terminan en los ganglios retrofaríngeos. Los *nervios* se dividen en motores y sensitivos: los *filetes motores*, destinados a los dos periestafilinos, proceden del ganglio ótico (los del externo) y del ganglio de Meckel (los del interno); los *filetes sensitivos*, destinados a la mucosa, emanan del nervio de Jacobson y del nervio faríngeo de Bock.

ARTÍCULO III

OÍDO INTERNO

El oído interno está situado en el espesor del peñasco, por dentro y algo por detrás de la caja del tímpano. Se compone de cierto número de cavidades cuyo conjunto constituye el *laberinto óseo*. Estas cavidades encierran, en estado fresco, cavidades más pequeñas, de paredes blandas y membranosas que forman en su conjunto el *laberinto membranoso*. Las cavidades membranosas están llenas de un líquido, la *endolinfa*, y sumergidas en otro líquido, la *perilinfa*.

1. LABERINTO ÓSEO

El laberinto óseo comprende las tres partes siguientes: 1.ª, el *vestíbulo óseo*; 2.ª, los *conductos semicirculares óseos*; 3.ª, el *caracol óseo*. Nosotros añadiremos el *conducto auditivo interno*.

1.º **Vestíbulo óseo.**—Cavidad cuboidea, situada inmediatamente por dentro de la vena oval. Mide 6 milímetros en sentido anteroposterior, 4 ó 5 milímetros en sentido vertical y 3 milímetros en el transversal. Se describen en él seis paredes:

a) *Pared externa.*—Separa el vestíbulo de la caja; está, en la mayor parte de su extensión, ocupada por la ventana oval.

b) *Pared interna.*—Separa el vestíbulo del fondo del conducto auditivo interno. Muy accidentada y muy importante, presenta primero una cresta anteroposterior la *cresta del vestíbulo*, que se bifurca por atrás y termina por delante en una pequeña prominencia triangular llamada *pirámide*; encima de ella, una fosita, la *fosita semiovoidea*; debajo, una segunda fosita, la *fosita hemisférica*; detrás, entre sus dos ramas de bifurcación, una tercera fosita, la *fosita coclear*. Finalmente, detrás de la fosita semiovoidea, se ve un surco vertical, el *canal sulciforme*, que termina arriba en un orificio, que es el *orificio interno del acueducto del vestíbulo*. El acueducto, que, por otra parte, se abre en la cara posterior del peñasco (véase *Temporal*), tiene una longitud de 8 a 10 milímetros y aloja el *conducto endolinfático*. La pared interna del vestíbulo presenta, además, una serie de agujeros microscópicos dispuestos en cuatro grupos (*mancha cribosa*), 1.ª, *mancha cribosa superior* (de veinticinco a treinta agujeros o conductillos), que ocupa la pirámide y la mitad anterior de la fosita

semilovoidea; 2.º, *mancha cribosa anterior* (de doce a quince conductillos), situada en la fosita hemisférica; 3.º, *mancha cribosa posterior* (de seis a ocho conductillos), a nivel del orificio ampollar del conducto semicircular posterior; 4.º, *mancha cribosa de Reichert*, que ocupa la fosita coclear. Todas dan paso a nervios.

c) *Pared anterior*. — Muy estrecha (2 milímetros), está en relación: arriba, con el acueducto de Falopio y el facial. En la parte más inferior se ve un orificio elíptico que conduce a la rampa vestibular: el *orificio vestibular del caracol*.

d) *Pared posterior*. — En su parte inferior hay un orificio redondeado; es el orificio ampollar del conducto semicircular posterior.

e) *Pared superior*. — La pared superior o *bóveda* presenta cuatro orificios: 1.º, *dos posteriores* (uno externo y otro interno), que son el orificio no ampollar del conducto semicircular externo y el orificio común de los dos conductos semicirculares, superior e inferior; 2.º, *dos anteriores* (uno externo y otro interno) que son el orificio ampollar del conducto semicircular externo y el orificio ampollar del conducto semicircular superior.

f) *Pared inferior*. — La pared inferior o *suelo* presenta la porción inicial de la *lámina espiral*, que se desprende de la pared inferior inmediatamente por delante de la fosita coclear y desde allí se dirige adelante para juntarse con el caracol. Nótese, en el lado externo de esta lámina, la existencia de una estrecha hendidura: la *hendidura vestibulotimpánica*, que pone en comunicación el vestíbulo con la rampa timpánica.

2.º **Conductos semicirculares óseos**. — Situados detrás y encima del vestíbulo, son tres: *superior, posterior y externo* (recuérdese la palabra SPE).

a) *Caracteres comunes*. — Tienen la forma de tubos curvos en arco de círculo, algo aplanados en sentido lateral (por consiguiente, de corte elíptico). Su diámetro mayor es de 1,2 a 1,5 milímetros; su diámetro menor, de 0,8 a 0,9 milímetros. Los conductos semicirculares parten del vestíbulo y vuelven al mismo. Por lo tanto, cada uno de ellos presenta dos orificios: un orificio ensanchado en forma de ampolla llamado *ampollar*, y un orificio no ensanchado, llamado *no ampollar*.

b) *Caracteres particulares*. — Resumiremos en el cuadro sinóptico siguiente las principales particularidades descriptivas que presenta cada conducto semicircular.

Conductos semicirculares	Longitud	Orientación general	Direcc. de la curva- ridad	Modo de terminar con el vestíbulo	
				1.º Orificio ampollar	2.º Orificio no ampollar
1.º Superior	15 mm	Vertical per- pendicular al eje del peñasco.	Arriba	Distinto: se abre en la bóveda del vestíbulo hacia delante	Confundido con el del conduc- to semicircular posterior, se abre en la bó- veda del vesti- bulo, hacia atrás.
2.º Posterior	15 mm	Vertical para- lelo al eje del peñasco.	Atrás.	Distinto: se abre en la pared posterior del vestíbulo.	Confundido con el del conduc- to semicircular posterior se abre en la bó- veda del vesti- bulo, hacia atrás.
3.º Externo	12 mm	Horizontal	Afuera	Distinto: se abre en la bóveda posterior del vestíbulo.	Distinto: se abre en la bóveda del vestibulo hacia atrás.

3.º Caracol óseo. — El caracol *óseo* o *cóclea*, llamado así por su semejanza con la concha de un caracol común, tiene la forma de una masa conoidea, cuya base, dirigida hacia atrás, corresponde al fondo del conducto auditivo interno. Está situado en su totalidad en el espesor del peñasco. Consideramos en él tres partes: 1.ª, el *núcleo*; 2.ª, la *lámina de los contornos*, 3.ª, la *lámina espiral* (que divide la cavidad de la lámina de los contornos en dos cavidades secundarias, llamadas *rampas*).

A. NÚCLEO. — El núcleo o *columela* (*modiolus*) ocupa el *eje del caracol*. Tiene la forma de un cono macizo, de 3 milímetros de alto y 3 milímetros de ancho a nivel de su base. Ofrece a nuestra consideración *base, vértice y superficie exterior*.

a) La *base* corresponde exactamente a la fosita anteroinferior del conducto auditivo interno. Se ven en ella una multitud de pequeños agujeros dispuestos en doble línea espiral, que constituyen la *criba espiroidea de la base del caracol*. Cada uno de estos agujeros es el orificio inferior de un conducto que al principio se dirige paralelamente al eje del caracol, y luego, después de recorrer cierto trayecto,

tuerce hacia fuera para alcanzar el borde adherente de la lámina espiral. Esta disposición se observa muy claramente en los cortes verticales de la columela (nótese que, en estos cortes, cada uno de los conductos citados, así que alcanza la lámina espiral, parece dilatarse). En realidad la dilatación que se observa no es otra que el corte transversal de un *conducto continuo*, que rodea en espiral la parte cortical de la columela, siguiendo exactamente la línea de soldadura de esta parte cortical con la lámina espiral: es el *conducto de Rosenthal* (para el ganglio de Corti)

β) El *vértice* presenta un pequeño agujero, orificio superior del conducto central del núcleo.

γ) La *superficie exterior* corresponde a la pared interna de la lámina de los contornos y al borde cóncavo de la lámina espiral (nótese, a nivel de este borde, los orificios superiores de los conductos antes descritos que atraviesan el núcleo) (*foramina modiolii*).

B. LÁMINA DE LOS CONTORNOS. — La lámina de los contornos es un tubo hueco, *tubo óseo coclear*, que se enrolla alrededor del núcleo, desde la base hacia el vértice, formando de este modo tres vueltas de espiral. Su longitud total es de 28 a 30 milímetros; su diámetro, de 1,5 a 2 milímetros. El tubo óseo coclear presenta dos mitades: una mitad interna o *pared interna* (*pared axis*), que corresponde a la superficie del núcleo, y una mitad externa o *pared externa* (*pared periférica*), enfrente de la precedente y que constituye la corteza del caracol. Mientras que la pared interna, al llegar al vértice del núcleo, se confunde con este vértice, la pared externa, más extensa, termina encima del núcleo a modo de bóveda o cúpula (*cúpula del caracol*). Conviene añadir que el vértice del caracol está unido a la cúpula por una laminilla ósea, que presenta la forma de un semicono hueco: es la *laminilla seminfundibuliforme* de la lámina de los contornos.

C LÁMINA ESPIRAL. — Laminilla ósea que nace en el suelo del vestíbulo (véase pág. 580), se introduce luego en el tubo óseo coclear (laminilla de los contornos) y se extiende hasta la otra extremidad de este tubo, describiendo, como él y en igual sentido, vueltas de espiral alrededor de. núcleo.

Presenta: 1.º, una *cara posterior*; 2.º, una *cara anterior*; 3.º, un *borde interno*, cóncavo, que corresponde a la pared interna de la lámina de los contornos (por consiguiente, al núcleo, y se confunde con ella); 4.º, un *borde externo*, convexo, que mira hacia la pared externa de la lámina de los contornos, pero sin llegar a ella, por lo menos en el esqueleto.

La lámina espiral, va disminuyendo de anchura a medida que se aleja de su origen, y termina en la tercera vuelta por una extremidad libre en forma de gancho (*pico, rostrum* o *hamulus*).

Nótese que, en realidad, está formada por dos delgadas láminas (una anterior y otra posterior), unidas entre sí por trabéculas óseas, entre estas dos láminas se ven conductos radiados que van de un borde a otro los cuales son continuación de los conductos ya descritos en el núcleo.

D RAMPAS DEL CARACOL. La lámina espiral (completada por fuera por partes blandas, véase más adelante) divide naturalmente la cavidad del tubo coclear en dos mitades, llamadas *rampas*, teniendo cada una de ellas la forma de un semicilindro hueco.

De estas dos rampas una, colocada delante de la lámina espiral, es la rampa anterior o *vestibular* (porque comienza en el vestíbulo, véase pág. 579), la otra situada detrás de la lámina, es la rampa posterior o *timpánica*, porque comienza en la caja del timpano, o, más exactamente, en la ventana redonda.

Las dos rampas recorren en espiral toda la extensión del tubo coclear y al llegar debajo de la cúpula se confunden entre sí a nivel de un orificio de forma redondeada, llamado *helicotrema*. Hay que notar, en la porción inicial de la rampa timpánica (en su pared interna e inmediatamente delante de la membrana que cierra la ventana redonda), la existencia de un pequeño agujero: el *orificio interno del acueducto del caracol* (10 a 12 milímetros de longitud), cuyo orificio externo se halla situado en el borde posterior del peñasco.

4.º Conducto auditivo interno. — El conducto auditivo interno, que ya vimos en la cara poserosuperior del peñasco (10 milímetros de largo por 5 milímetros de diámetro), termina hacia fuera por una pared ósea, vertical, que corresponde a la parte interna del vestíbulo y a la base del caracol. Una cresta transversal, *cresta falciforme*, divide esta pared ósea en dos departamentos superpuestos o pisos, uno superior y otro inferior.

a) El *piso superior* está subdividido por una cresta vertical en dos partes o fositas: una *fosita anterior*, principio del acueducto de Falopio, en la cual penetra el facial, y una *fosita posterior* para la rama superior del nervio vestibular.

b) El *piso inferior* está a su vez subdividido por una segunda cresta vertical en dos fositas: una *fosita anterior* o *coclear*, que no es otra cosa que la base del caracol, perforada por numerosos conduc-

tillos dispuestos en doble espiral (pág. 579). y una fosita posterior, para la rama inferior del nervio vestibular. Nótese, detrás de esta fosita, el *foramen singulare de Morgagni*, para el ramo posterior del nervio vestibular.

2. LABERINTO MEMBRANOSO

El laberinto membranoso comprende todas las partes blandas alojadas en las tres cavidades del laberinto óseo: 1.º, el *vestibular membranoso*; 2.º, los *conductos semicirculares membranosos*; 3.º, el *caracol membranoso*.

1.º **Vestíbulo membranoso.**—Se compone: 1.º, de dos vesículas, el *utrículo* y el *sáculo*, 2.º, de la *porción inicial del conducto coclear*, 3.º, del *conducto endolinfático*.

a) *Utrículo.*—Pequeña vesícula, prolongada de delante atrás, aplanada transversalmente, que mide 3 ó 4 milímetros de largo por 1 milímetros de alto, situada junto a la fosita semiovoidea, a la cual está íntimamente adherida. Su superficie interior presenta, en su lado interno, una pequeña eminencia ovoidea, de color blanquecino (3 milímetros de largo por 2 milímetros de ancho); es la *mancha acústica del utrículo* (para el nervio utricular). El utrículo recibe las extremidades ampollares y no ampollares de los conductos semicirculares membranosos.

b) *Sáculo.*—Situado debajo del utrículo (al cual está íntimamente adherido), el sáculo es una pequeña vesícula redondeada, de 2 milímetros de diámetro, aplicada contra la fosita hemisférica y débilmente adherida a la misma. Interior y precisamente a nivel de la fosita hemisférica, presenta una pequeña prominencia blanquecina: la *mancha acústica del sáculo* (para el nervio sacular).

c) *Porción inicial del conducto coclear.*—Descansa sobre el suelo del vestíbulo, inmediatamente debajo del sáculo, al cual está unida por un pequeño conducto vertical, el *canalis reuniens de Hensen*.

d) *Conducto endolinfático.*—Estrecho conducto que ocupa el acueducto del vestíbulo (pág. 579). Detrás, en la cara posterosuperior del peñasco, termina por un pequeño abultamiento en forma de fondo de saco que levanta la duramadre; es el *fondo de saco endolinfático*. Delante, en el vestíbulo, se divide en dos ramas que van a abrirse, una en el utrículo y otra en el sáculo, estableciendo así una comunicación indirecta entre estas dos vesículas. (Para la estructura del vestíbulo

membranoso, como también para la de los conductos semicirculares y del caracol membranoso, véanse los tratados de Histología.)

1.ª **Conductos semicirculares membranosos.** — Son tres (*superior, posterior y externo*). Están situados dentro de los conductos semicirculares óseos, que sólo llenan en parte (aproximadamente la cuarta) y de los cuales siguen el lado convexo. Por lo demás, tienen la misma dirección, igual longitud y el mismo modo de terminación que estos últimos: los tres se abren en la parte posterosuperior del utrículo por cinco *onfiscos*, de los cuales tres son ampollares. Cada uno de los ampollares presenta en su parte interna un pequeño repliegue transversal, son las *crestas acústicas* (para las terminaciones nerviosas del acústico o auditivo).

3.ª **Caracol membranoso.** — El caracol membranoso (prescindiendo del peristio que reviste la superficie interna de la lámina de los contornos y las dos caras de la lámina espiral) está representado por un conducto de gran longitud, que es el llamado *conducto coclear*.

A. **DISPOSICIÓN ANATÓMICA.** Este conducto nace, como ya vimos, en la parte inferior del vestíbulo (porción inicial); después se introduce, a nivel del orificio vestibular del caracol, en el tubo óseo coclear y lo recorre en toda su extensión, describiendo, como él, cerca de tres vueltas de espiral. En este trayecto, dicho conducto se extiende a lo largo del borde externo o borde libre de la línea espiral y, continuando este borde hasta la pared externa del tubo óseo coclear, intercepta toda comunicación lateral entre la rampa timpánica y la rampa vestibular. Visto en corte transversal, el conducto coclear tiene la forma de un triángulo, con una pared externa, una pared anterior y una pared posterior.

B. **ESTRUCTURA.** — Su estructura, muy compleja, ofrece a nuestra consideración las cinco partes siguientes: 1.ª, el *ligamento espiral*; 2.ª, la *cintilla surcada*, 3.ª, la *membrana de Reissner*, 4.ª, la *membrana basilar*, 5.ª, un *revestimiento epitelial*, del cual el *órgano de Corti* no es más que una dependencia.

a) **Ligamento espiral.** — Engrosamiento local del peristio a nivel de la pared externa del tubo óseo coclear. En los cortes transversales reviste la forma de media luna, cuya cara cóncava, mirando hacia dentro, forma la pared externa del conducto coclear. En esta cara cóncava se ven tres eminencias lineales, que son en sentido anteroposterior: la *cresta de inserción de la membrana basilar*, el *rodete*

del *ligamento espiral* y la *cresta de inserción de la membrana de Reissner*. Entre la cresta de inserción de la membrana basilar y el rodete del *ligamento espiral* existe un surco, el *surco espiral externo*.

b) *Cintilla surcada*. — Es también un engrosamiento del periotio, situado en la cara anterior de la lámina espiral. Triangular vista en un corte transversal, ofrece tres caras: 1.ª, *cara posterior*, que corresponde a la lámina espiral y está íntimamente adherida a la misma; 2.ª, *cara anterior*, libre, que ofrece numerosos surcos (*surcos interdentarios*), unos longitudinales y otros transversales, que se dividen en una multitud de pequeñas masas cuadriláteras, los *dientes auditivos*; 3.ª, *cara externa*, cóncava hacia fuera, que forma en su conjunto un conducto profundo, el *surco espiral externo*, con dos labios, uno anterior o vestibular, otro posterior o timpánico (nótese en este último la existencia de numerosos orificios, *foramina nervina*, para el paso de los filetes nerviosos).

c) *Membrana de Reussner*. — Delgada lámina conjuntiva, que forma la parte anterior del conducto coclear, y se inserta: 1.º, *por dentro*, en la cara anterior de la lámina espiral, a nivel del borde interno de la *cintilla surcada*, 2.º, *por fuera*, en la cresta anterior del *ligamento espiral*.

d) *Membrana basilar*. — Otra membrana, también muy delgada, que forma la pared posterior del conducto coclear. Se extiende transversalmente del borde libre de la lámina espiral a la cresta posterior del *ligamento espiral*. Hay que notar que comprende dos zonas de diferente aspecto: una zona interna, que constituye la *zona lisa*, y una zona externa, llamada *zona estriada*.

e) *Revestimiento epitelial, órgano de Corti*. — El conducto coclear está revestido interiormente por una capa epitelial continua, el *epitelio coclear*. A nivel de la parte interna de la membrana basilar, este epitelio (que por lo demás conserva en todas sus partes su carácter embrionario) se diferencia en un órgano sensorial especial, encargado de percibir las vibraciones impresas al líquido laberíntico por los sonidos: es el *órgano de Corti*. Se compone esencialmente: 1.º, de los *arcos de Corti*, constituidos cada uno de ellos por dos pilares (interno y externo) y formando en su conjunto una larga galería cubierta, el *túnel de Corti*, 2.º, de *células epiteliales*, notablemente diferenciadas (*células ciliadas*, *células de Deiters*, *células de Claudius*); 3.º, de una primera membrana, la *membrana reticular*, que descansa directamente sobre las células epiteliales del *órgano de Corti*; 4.º, de una segunda membrana, la *membrana de Corti* o *membrana tectoria*,

que recubre también el órgano de Corti, pero es más superficial que la precedente y está, por lo tanto colocada delante de ella (véanse, para la estructura de estas diferentes formaciones, los tratados de Histología).

3. LÍQUIDOS DEL OÍDO INTERNO

El oído interno presenta dos clases de líquidos: la *endolinfa* y la *perilinfá*.

1.º **Endolinfa.** La endolinfa llena todas las cavidades que forma el laberinto membranoso: utrículo, sáculo, conductos semicirculares y conducto coclear. Obsérvese que, como todas las cavidades comunican entre sí, la endolinfa no forma más que una sola y única masa. Es un líquido claro, fluido como el agua, ligeramente rojizo en el feto, pero completamente incoloro en el adulto. La endolinfa contiene, a nivel de las manchas y crestas acústicas: concreciones calizas (*polvo auditivo, otoconia, otolitos*).

2.º **Perilinfá.** — La perilinfá llena todo el espacio comprendido entre las formaciones blandas del laberinto membranoso y las paredes del laberinto óseo; estos espacios, a excepción de las dos rampas, están más o menos tabicados por trabéculas conjuntivas, que, desde el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares, van a la pared ósea correspondiente. Es un líquido claro, incoloro, fluido como el agua. Todos los espacios perilinfáticos tienen comunicación entre sí y por lo tanto, la perilinfá, al igual que la endolinfa, forma una sola y única masa líquida.

4. VASOS Y NERVIOS DEL OÍDO INTERNO

1.º **Arterias.** — El oído interno, aparte algunas arteriolas accesorias que proceden de las regiones próximas, recibe sus arterias de la *auditiva*, rama del tronco basilar. Esta arteria, en el fondo del conducto auditivo externo, se divide en dos ramas: 1.ª, la *rama vestibular*, para el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares; 2.ª, la *rama coclear*, cuyos ramos (de quince a veinte) se introducen en la criba espiroide del caracol, atraviesan la columela y terminan, a nivel de la lámina espiral, en tres órdenes de ramúsculos (*anteriores, medios y posteriores*), para las diversas partes constituyentes del caracol.

2.° **Venas.** — La sangre venosa del oído interno corre por tres vías principales. 1.ª, la *vena auditiva interna*, que sale por el conducto auditivo interno y va a parar al seno petroso inferior o al seno lateral; 2.ª, la *vena del acueducto* del vestíbulo, que sale por el acueducto del vestíbulo para venir a parar al seno petroso superior; 3.ª, la *vena del acueducto del caracol*, tributaria de la yugular interna.

3.° **Vías linfáticas.** — No existen conductos linfáticos propiamente dichos. La linfa, representada por el líquido de los espacios perilinfáticos, corre principalmente por un estrecho conducto que sigue al acueducto del caracol y que partiendo de la rampa timpánica, termina en los espacios supraaracnoideos. Es de notar también la comunicación de los espacios perilinfáticos con los espacios subaracnoideos por mediación de las vainas linfáticas del nervio auditivo.

4.° **Nervios.** — Proceden de las dos ramas del nervio acústico: la *rama coclear* y la *rama vestibular*.

a) *Rama coclear* — Se dirige adelante, aplanándose paulatinamente y arrollándose sobre sí misma a modo de voluta. Sus innumerables manojos se introducen en la criba espiroide de la base del caracol, siguen los conductos que hemos descrito más arriba en el espesor del núcleo, llegan de este modo a la lámina espiral y salen de ella por los *forámene nervina*, para venir a terminar por extremidades libres en el órgano de Corti. En el trayecto intracóclea de los filetes del nervio coclear se encuentra un ganglio, que llena el conducto espiral de Rosenthal; es el *ganglio de Corti*, homólogo de un ganglio espinal. Nótese que, en el momento de introducirse en la criba espiral, la rama coclear abandona un pequeño ramo (provisto de un ganglio, el *ganglio de Boetcher*) que va, en el vestíbulo, a terminar en la porción inicial del conducto coclear.

b) *Rama vestibular* — La rama vestibular, en cuyo trayecto se encuentra un ganglio, el *ganglio de Scarpa* (homólogo del ganglio de Corti y, por consiguiente, de un ganglio espinal), se divide, en el fondo del conducto auditivo interno, en tres ramos (superior, inferior y posterior).

a) El *ramo superior* se dirige hacia la fosita posterosuperior del conducto auditivo, se introduce en los agujeros que allí se encuentran, llega de este modo al vestíbulo (por la mancha cribosa superior) y termina allí por tres filetes: *nervio utricular*, para la mancha acústica del utrículo; *nervio ampollar superior*, para la cresta acústica del

conducto semicircular superior, y *nervio ampollar externo*, para la cresta acústica del conducto semicircular externo.

β) El *ramo inferior* se dirige hacia la fosita posteroinferior y, con el nombre de *nervio sacular*, va a terminar en la mancha acústica del sáculo.

γ) El *ramo posterior* se introduce en el *foramen singulare de Morgagni* y con el nombre de *nervio ampollar posterior*, se distribuye por la cresta acústica del conducto semicircular posterior.

LIBRO VII

APARATO DE LA DIGESTION

El aparato de la digestión tiene por función tomar del mundo exterior las sustancias llamadas alimenticias, destinadas a reparar las pérdidas de organismo, hacer estas sustancias asimilables, absorberlas en su mayor parte y expulsar finalmente la porción inútil de las mismas. Se compone en el hombre:

1.º De un largo tubo, irregularmente cilíndrico, más o menos flexuoso, que es el *tubo digestivo*, con un orificio de entrada, la *boca*, y un orificio de salida, el *ano*.

2.º De una serie de formaciones o aparatos glandulares, que se desarrollan a su alrededor, y que describiremos bajo el nombre colectivo de *anexos del tubo digestivo*.

CAPITULO PRIMERO

TUBO DIGESTIVO

El tubo digestivo se extiende desde la boca al ano. su longitud media es de 10 a 12 metros. Ocupa sucesivamente la cara el cuello, el tórax y el abdomen. Está constituido por tres túnicas concéntricas: 1.ª, una túnica interna, *mucosa*; 2.ª, una túnica media, *celulosa*, 3.ª una túnica externa, *muscular*. A estas tres túnicas, que existen exclusivamente en la porción del tubo digestivo supradiafragmática, se añade, por debajo de este tabique, una cuarta túnica, de naturaleza *serosa*, la túnica peritoneal.

Considerado desde el punto de vista topográfico, el tubo digestivo comprende 1.º, la *boca*, 2.º, la *faringe*, 3.º, el *esófago*, 4.º, el *estómago*; 5.º, el *intestino delgado*; 6.º, el *intestino grueso*, 7.º, el *ano*

ARTÍCULO PRIMERO

BOCA Y SUS DEPENDENCIAS

La boca está situada en la parte inferior de la cara, entre las fosas nasales y la región suprahioidea. Oval, con su eje mayor en sentido anteroposterior, está dividida por los arcos alveolodentarios en dos porciones (el *vestíbulo bucal*, por delante de los arcos, y la *boca propiamente dicha*, por detrás), que comunican por los *espacios interdentarios y retrodentarios*. Virtual cuando los arcos están en contacto, la cavidad bucal se hace real cuando éstos se separan uno de otro. Su diámetro transversal es de 50 a 65 milímetros; su diámetro anteroposterior, de 70 a 75 milímetros. Estudiaremos sucesivamente: 1.º, las *paredes de la boca*; 2.º, las *encías*, 3.º los *dientes*.

1. PAREDES DE LA BOCA

Las paredes de la boca, en número de seis, se distinguen en anterior, posterior, superior, inferior y laterales

1.º **Pared anterior, labios.** — La pared anterior de la boca está formada por los labios

A CONFORMACIÓN EXTERIOR. — En número de dos, uno superior y otro inferior, los labios son repliegues musculomembranosos, que ofrecen a nuestra consideración cada uno de ellos dos caras y dos bordes.

a) *Cara anterior.* — La cara anterior presenta: 1.º, en el labio superior, un surco subnasal, terminado abajo por el *tubérculo del labio superior* y limitado lateralmente por dos rodetes y una superficie plana, cuyos pelos largos y rígidos, constituyen el *bigote*; 2.º, en el labio inferior, una fosita en la cual se implanta en el hombre la mosca.

b) *Cara posterior.* — La cara posterior es lisa y está cubierta por la mucosa

c) *Borde adherente* — Exteriormente está limitado: 1.º, en el labio superior, por la nariz y el surco *geniolabial*, 2.º, en el inferior, por el surco *mentolabial*. Interiormente y del lado de la cavidad bucal, está indicado por el surco *gingivolabial* y el *fronillo del labio*

d) *Borde libre.* — El borde libre corresponde a la vez a la mucosa y a la piel; presenta, en el labio inferior, una *escotadura media*, correspondiente al *tubérculo del labio superior*.

e) *Orificio bucal y hendidura bucal.* — Unidos a nivel de sus comisuras, los labios, separados, constituyen el *orificio bucal*; una vez aproximados, forman la *hendidura bucal* (47 a 53 milímetros de longitud aproximadamente).

B CONSTITUCIÓN ANATÓMICA — Los labios están constituidos por las cuatro capas siguientes:

1.ª La *piel*, gruesa, adherente, rica en folículos pilosos

2.ª Una *capa muscular* comprende el orbicular de los labios (*constrictor* del orificio), cierto número de músculos cutáneos de la cara (*dilatadores*) y fibras propias de dirección anteroposterior (*músculo compresor de los labios*).

3.ª Una *capa submucosa*, tejido conjuntivo y *glándulas labiales*, perceptibles al tacto por su relieve

4.ª Una *capa submucosa*, grisácea y abollonada en la cara posterior de los labios; delgada, adherente y rosada a nivel de su borde libre. Se compone de un corion dermopapilar y de un epitelio muy

parecido al tegumento cutáneo, difiriendo del mismo por la ausencia de queratinización. Corresponde, según el punto en que se le considere, a la zona cutánea, a la zona intermedia y a la mucosa propiamente dicha.

C. VASOS Y NERVIOS. — Las *arterias* nacen del círculo formado por la unión a plena luz de las dos *coronarias* y de algunas otras arterias de la cara (*transversal, bucal, etc.*). Las *venas* van a la vena facial y a las venas submentonianas. Los *linfáticos* del labio superior van a los ganglios submaxilares, los del labio inferior van, parte a los mismos ganglios y parte a los ganglios suprahioides. Los *nervios* se dividen en motores y sensitivos: los nervios motores vienen del facial; los nervios sensitivos, procedentes del trigémino, terminan en gran parte en los corpúsculos de Krause y tal vez en verdaderos corpúsculos del tacto (KÖLLIKER).

2.º Paredes laterales, mejillas. — Limitadas arriba por la órbita, abajo por el maxilar, delante por los surcos nasogeniano y labio-geniano, las mejillas ocupan la mayor parte de la cara. Su espesor varía según el estado de gordura de los individuos.

A. CONFORMACIÓN EXTERIOR. — Se consideran en ella dos caras, una interna y otra externa. La *cara externa*, abombada en el niño, está excavada en los individuos flacos y los viejos (*mejilla senil*). La *cara interna*, libre en su parte media, está adherida al plano óseo en el resto de su extensión.

B. CONSTITUCIÓN ANATÓMICA — Están constituidas por:

1.º La *piel*, fina, rica en vasos y en glándulas sebáceas, sus pelos constituyen la *barba*.

2.º Un *tejido celular subcutáneo*, rico en grasa (que constituye en este punto una formación especial, la *bola adiposa de Bichat*) y que presenta manojos musculares pertenecientes a los músculos cutáneos de la cara.

3.º Una *capa muscular*, formada por el masetero y el buccinador, revestidos de sus aponeurosis.

4.º La *mucosa bucal*, lisa y provista de algunas glándulas alojadas en el espesor o bien en la cara externa del músculo buccinador, las *glándulas molares*. Hay que notar, además, en la mejilla la presencia del *conducto de Sténon*, que la recorre transversalmente, antes de abrirse a nivel del segundo molar mayor superior.

C. VASOS Y NERVIOS. — Las *arterias* de la mejilla proceden de la facial, de la temporal superficial, de la lagrimal y de las ramas de

la maxilar interna. Las *venas* van a las venas facial y temporal superficial y al plexo pterigoides. Los *linfáticos* van a los ganglios submaxilares y a los ganglios cervicales superficiales. Los *nervios* se dividen en motores y sensitivos: los *filetes motores* vienen del facial y del maxilar inferior (rama del trigémino); los *filetes sensitivos* nacen del trigémino.

3.° **Pared superior, bóveda palatina.** — La bóveda palatina ósea (por oposición a la bóveda palatina membranosa, que es el velo del paladar) es una región en forma de herradura, circunscrita por los arcos dentarios.

A. **CONFORMACIÓN EXTERIOR.** — Ofrece a nuestra consideración: 1.° en la línea media, un *rafe* más o menos saliente terminado hacia delante por un *tubérculo*; 2.°, a cada lado y en el tercio anterior, dos *crestas transversales mucosas*; 3.°, en los dos tercios posteriores papilas y orificios glandulares.

B. **CONSTITUCIÓN ANATÓMICA.** — La bóveda palatina está constituida de arriba abajo por los *tres planos* siguientes:

1.° Una *capa ósea* (véase **OSTEOLOGÍA**).

2.° Una *capa glandular*, correspondiente a las *glándulas palatinas* y que apenas existe más que en los cuatro quintos posteriores de la región.

3.° Una *capa mucosa*, de color rosado, gruesa y resistente.

C. **VASOS Y NERVIOS.** — Las *arterias* de la bóveda vienen de la *palatina* y de la *esfenopalatina*. Las *venas* van al plexo pterigoides, algunas se unen a las venas de la mucosa nasal. Los *linfáticos* van a parar a ganglios colocados a los lados de la membrana tirohloidea. Los *nervios* nacen (por el nervio palatino anterior y el esfenopalatino interno) del ganglio esfenopalatino.

4.° **Pared inferior, suelo de la boca.** — La pared inferior de la boca está formada por la lengua y la región sublingual, cuyo suelo está constituido por el *musculo milohioideo*.

A. **LENQUA.** — Véase *Organos de los sentidos*.

B. **REGIÓN SUBLINGUAL.** — Es el espacio comprendido entre las encías y la base de la lengua. Triangular, con el vértice correspondiente a los incisivos inferiores, esta región presenta: 1.° el *frenillo* de la lengua o *filete mucoso medio*, 2.°, a cada lado de su extremidad posterior, un *tubérculo*, correspondiente al orificio del conducto de Wharton; los conductos excretorios de la glándula sublingual; dos eminencias simétricas, las *carúnculas sublinguales*, debidas al levan-

tamiento de la mucosa por las glándulas sublinguales. Nótese que, entre la mucosa y el plano muscular profundo de los genioglosos, existe el *espacio sublingual*, recorrido por el conducto de Wharton y lleno de tejido conjuntivo, en el cual se ha descrito la *bolsa serosa de Fleischmann*.

3.º **Pared posterior, velo del paladar, amígdalas.** — La pared posterior de la boca está formada en su mayor parte por el *velo del paladar*, entre cuyos pilares se hallan las *amígdalas*.

A. **VELO DEL PALADAR.** — El velo del paladar, ríquico blando, móvil y contráctil, presenta una dirección anteroposterior, primero horizontal, luego oblicua y finalmente vertical.

a) **Conformación exterior.** — Se consideran en él *dos caras y cuatro bordes*: La *cara bucal*, cóncava, lisa, de color rosado, presenta un rafe medio y numerosos orificios glandulares. La *cara faríngea*, convexa desigual, coloreada, es más pequeña y posee una cresta saliente debida al relieve de los dos músculos palatocastilinos. Sus *bordes anterior y laterales* se confunden con la bóveda palatina ósea. Su *borde inferior*, libre, ofrece a nuestra consideración: 1.º, la *uvula*, prolongación vertical, media, de vértice redondeado, de cara anterior lisa y cara posterior rugosa; 2.º, los *pilares anteriores*, debidos al relieve de los músculos glosocastilinos, que van a terminar en la base de la lengua y limitan así una abertura en forma de boca de hornos el *istmo de las fauces*; 3.º, los *pilares posteriores*, que contienen en su espesor los músculos faringoocastilinos; por dentro sobresalen de los pilares anteriores (lo cual facilita en gran manera su examen por el orificio bucal), terminando en las paredes de la faringe por atrás y constituyendo por su conjunto un orificio que pone en comunicación la faringe bucal con la cavidad posterior de las fosas nasales: es el *istmo nasofaríngeo*. Entre el pilar anterior y el pilar posterior del mismo lado se ve una fosita, la *fosita amigdalina*.

b) **Constitución anatómica** — El velo del paladar está constituido por una *aponeurosis*, *músculos* y un *revestimiento mucoso*.

a) La *aponeurosis palatina*, de forma cuadrilátera, que se inserta por delante en el borde posterior de la bóveda y a los lados en la apófisis pterigoides, es resistente, delgada y fuertemente tensa.

β) Los *músculos* son:

1.º El *palatocastilino*: cilíndrico, delgado, contiguo, en la línea media, a su homónimo, con el cual parece formar un solo músculo; se inserta, por delante, en la espina nasal posterior y eleva la úvula.

1.º El *periestafilino interno* o *petroestafilino* este músculo se inserta arriba en la cara inferior del peñasco, por delante y algo por fuera del orificio de entrada del conducto carotídeo, como también en el suelo de la porción cartilaginosa de la trompa de Eustaquio; sus fibras se despliegan luego en forma de abanico sobre la cara posterior del velo, entrecruzándose allí con sus homónimas; este músculo es elevador del velo del palatino.

3.º El *periestafilino externo* o *esenoestafilino*: nace arriba en la *fosa escafoidea*, en la parte del esfenoides situada por delante y adentro del agujero oval, y finalmente en la cara anteroexterna de la trompa de Eustaquio; sus manojos, reflejados en parte sobre el gancho de la apófisis pterigoides, se extienden en forma de abanico por la cara anterior de la aponeurosis del velo; el periestafilino externo comprende, pues, dos segmentos, uno *vertical* y el otro *horizontal*; su acción respectiva hace de este músculo un tensor del velo del paladar y un dilatador de la trompa.

4.º El *faringoestafilino* tiene su origen, por una extremidad larga y delgada, en la cara posterior del velo, reforzado por dos manojos accesorios, el *palatofaríngeo* y el *salpingofaríngeo*, penetra en el pilar posterior y va a terminar en la pared de la faringe, tomando inserción, por medio de algunos manojos, en el borde posterior del cartílago tiroides: eleva la laringe y la faringe y es constrictor del istmo nasofaríngeo y dilatador de la trompa.

5.º El *glosoestafilino* se extiende desde la cara inferior del velo a la base de la lengua siguiendo el pilar anterior.

γ) La *mucosa* de la cara inferior del velo es de color rosado, lisa, de epitelio pavimentoso; la de la cara superior es roja, desigual, de epitelio vibrátil en su parte anterior. Hay *glándulas* anexas a esta mucosa: en la cara superior recuerdan las de la pituitaria; en la cara inferior forman una gruesa capa y presentan el tipo de las glándulas salivales bucales.

c) *Vasos y nervios* — Las *arterias* del velo nacen de las *palatinas* superior e inferior y de la *faringea* inferior. Las *venas* van, las de arriba, al plexo de la pituitaria, y las de abajo, a los troncos venosos de la amígdala y de la lengua. Los *linfáticos* van a los ganglios del cuello. Los *nervios* se dividen en motores y sensitivos: los *sensitivos* están formados por los tres nervios palatinos, ramas del nervio esfenoparainf. nacido del maxilar superior (trigémino); los *motores* provienen de la rama motora del nervio palatino posterior, del facial (?) por el ramo lingual y del nervio maxilar inferior (periestafilino externo).

B. AMÍGDALAS.—Las amígdalas o tonsilas son dos y ocupan las fosas amigdalinas. Son de dimensiones variables: su forma es la de una almendra.

a) *Conformación exterior.*—Cada una de ellas presenta: 1.º, una *cara interna*, plana y convexa, con excavaciones en forma de *criptas*; 2.º, una *cara externa*, en relación con la faringe y, más allá de la faringe con un espacio llamado *maxilofaríngeo*, en el que se encuentran numerosos vasos (carótida, facial, etc.); 3.º, dos *bordes*, *anterior* y *posterior*, en contacto con los pilares; 4.º, una *extremidad superior*, separada del velo por la *fosita supraamigdalina*; 5.º, una *extremidad inferior*, en relación con la lengua por un grupo de glándulas foliculares, cuyo conjunto constituye la *amígdala lingual*.

b) *Constitución anatómica.*—Por su estructura, la amígdala constituye una formación adenoidea, rodeada de una *cápsula* y a la cual van anexas *glándulas arracimadas* que vierten su producto en su misma superficie o en uno de sus divertículos.

c) *Vasos y nervios.* Las arterias de la amígdala (*arterias tonsilares*) nacen de la lingual, de la faríngea inferior y de las palatinas superior e inferior. Las venas van al *plexo tonsilar*, dependencia del plexo faríngeo. Los linfáticos van a los ganglios próximos al ángulo de la mandíbula. Los nervios (plexo tonsilar) nacen del lingual y del glossofaríngeo.

2. ENCÍAS

Se da este nombre a la parte mucosa bucal que cubre los arcos alveolares en los cuales están implantados los dientes. Cubre las caras interna y externa del arco alveolar y los espacios interdentarios, constituyendo a este nivel una especie de doble festón. Está íntimamente adherida al periostio.

3. DIENTES

Son órganos de consistencia ósea, de origen epidérmico, implantados en el borde libre de las mandíbulas y destinados a triturar o dividir los alimentos sólidos para hacerlos más accesibles a la acción de los jugos digestivos.

1.º *Consideraciones generales.*—Hasta la edad de seis o siete años, los dientes son en número de diez en cada mandíbula (*dientes temporales*), en el adulto este número se eleva a dieciséis (*dientes permanentes*). Están alojados en los alvéolos de los maxilares uni o

multioculares, según el número de sus raíces. Están comúnmente implantados *verticalmente*, pero, en ciertas razas, los incisivos superiores o inferiores se proyectan más o menos hacia delante (*prognatismo alveolodentario*). Están sólidamente fijos gracias al *ligamento alveolodentario*, conjunto de manojos fibrosos que, más o menos transversal u oblicuamente, van de la pared alveolar a la superficie del diente, realizando así una especie de articulación, una *gonfosis*.

2.º Conformación exterior. Los dientes presentan caracteres *comunes* y caracteres *especiales*.

A CARACTERES COMUNES. — Los dientes poseen todos ellos una o varias *raíces* y una *corona*, separadas por el *cuello*. La *raíz* es amarillenta, simple o ramificada, de forma cónica, aplanada, según las superficies de contacto, y perforada en su vértice por un orificio destinado a los vasos y nervios de la pulpa. El *cuello*, que está claramente limitado del lado de la corona, se continúa sin demarcación con la raíz. La *corona*, de color blanco, de consistencia dura, representa una masa de forma variable, que va ensanchándose desde el cuello a la superficie libre. Las coronas de los dientes están separadas por los *espacios interdentarios*.

B CARACTERES ESPECIALES — Los dientes corresponden a los cuatro tipos siguientes: *incisivos*, *caninos*, *premolares* o *molares menores* y *molares mayores*.

a) *Incisivos*. — En número de cuatro en cada mandíbula, están (dos a la derecha y dos a la izquierda) *agrupados* a cada lado de la línea media, y de ahí su división en *incisivo interno* e *incisivo externo*. Su *corona* es aplanada de delante atrás y cortada a bisel su *extremidad libre* o *triturante* es transversal, cortante y coronada a su vez en la infancia por tres pequeños mamelones, la corona es además, convexa por delante y cóncava por detrás. La *raíz* es cónica y aplanada transversalmente. Corona y raíz están separadas por dos líneas curvas, una anterior y otra posterior. Los incisivos superiores son más voluminosos que los inferiores. El incisivo externo superior es algo menos robusto que el interno. Se puede distinguir un *incisivo derecho* de un *incisivo izquierdo*. 1.º, a causa de la dirección que toma el vértice de la raíz, que se inclina hacia fuera, como huyendo de la línea media, 2.º, a causa del aspecto del borde cortante, cuyo desgaste es mucho más notable en el ángulo externo que en el interno.

b) *Caninos*. — Son dos en cada maxilar y están situados inmediatamente por fuera de los incisivos. Su longitud es más considerable

que la de los demás dientes. Su *corona*, conoide, presenta en su cara posterior una pequeña cresta roma y vertical, que se extiende hasta la superficie triturante del diente y constituye en este punto su cúspide. La *raíz*, única y voluminosa, levanta la superficie del maxilar formando una especie de joroba o abolladura (*abolladura canina*). Es aplanada lateralmente. Los caninos superiores son más voluminosos que los inferiores y tienen la corona más ancha, una raíz más larga y menos aplanada. Se puede distinguir un *canino derecho* de un *canino izquierdo* teniendo en cuenta el hecho de que la cúspide de la corona está limitada lateralmente por dos vertientes, de las cuales la interna es la más corta.

c) *Premolares o molares menores*. — En número de dos (primero y segundo), están situados a continuación de los caninos. Su *corona* es gruesa, cuadrangular, y presenta dos *tubérculos* o *cúspides*, una interna y otra externa. La *raíz* es única, aplanada de delante atrás, y presenta en cada una de sus dos caras un surco vertical. Los *molares menores superiores* se distinguen de los *inferiores* por su corona más aplanada de delante atrás por el desarrollo más pronunciado de sus cúspides, por su mayor tendencia a hacerse bifidos. El primer molar menor presenta una cúspide externa más saliente que la interna.

d) *Molares mayores*. — Se cuentan seis en cada mandíbula, tres a la derecha y tres a la izquierda (primero, segundo y tercero). El tercero, de aparición tardía, es la *muela del juicio*. La *corona* es cuboidea: de sus caras, la anterior y la posterior son planas, la interna y la externa son convexas y lisas; su cara triturante presenta cuatro y aun cinco cúspides. Sus *raíces* son siempre múltiples (dos, tres y rara vez cuatro o cinco). Para un mismo diente, las raíces son divergentes y más raramente convergentes (*dientes barradas*). Los molares superiores son generalmente más pequeños que los inferiores; tienen por lo común tres o cuatro raíces; los inferiores no poseen más que dos. Los *tres molares superiores* van decreciendo del primero al tercero; el primero posee cinco cúspides, el segundo cuatro, el tercero tres. Para averiguar a qué lado pertenece un molar dado, bastará recordar que: 1.º, si el diente posee tres raíces, dos son externas y una interna, y que de las dos externas la anterior es más voluminosa; 2.º, si el diente posee dos raíces, la anterior es la más voluminosa.

3.º *Arcos dentarios*. — Los dientes están dispuestos a cada lado en una serie regular que lleva el nombre de *arco* o *arcada dentaria* (superior e inferior).

Cada arco presenta dos caras y dos bordes: 1.º, una *cara anterior*, convexa, dispuesta formando una curva muy irregular; 2.º, una *cara posterior*, cóncava, 3.º, un *brote adherente o alveolar*; 4.º, un *borde libre*.

De los dos arcos, el superior rebasa al inferior en todo su contorno. Los incisivos superiores se deslizan por delante de los inferiores, realizando así el modo de obrar de unas tijeras; además, en los lados, los molares mayores y menores se oponen a sus homónimos, de tal suerte que las cúspides externas de los molares inferiores vienen a alojarse en la ranura que en los molares superiores, separa las cúspides externas de las cúspides internas. Siendo los dientes superiores y los inferiores de volumen desigual, los dientes homónimos no se corresponden cuerpo con cuerpo, sino que cada uno de ellos, considerado aisladamente, se pone en contacto con los dientes adyacentes del arco opuesto.

4.º Constitución anatómica. — Los dientes están constituidos por un bloque de sustancias especiales, el *marfil*, provistos de una cavidad central que contiene la *pulpa*, y revestidos, a nivel de la corona, por el *esmalte*, y a nivel de la raíz, por el *cemento*.

a) *Pulpa dentaria*. — La *pulpa dentaria* es un órgano blando, rojizo, que llena por completo la cavidad dentaria. Su volumen disminuye con la edad.

b) *Marfil*. — El *marfil* o *dentina* está cubierto enteramente por el *esmalte* y el *cemento*; este último invade ligeramente el *esmalte* a nivel del cuello. El *marfil* está constituido por *sustancias orgánicas* (caseína y grasa) y *sustancias inorgánicas* (fosfatos de cal y magnesia, fluoruros).

c) *Esmalte*. — Cubre la corona a modo de capuchón; su grosor alcanza el máximo en la superficie triturante. Su superficie externa presenta una serie de estrias transversales. Su coloración varía desde el amarillo al blanco azulado. Su resistencia es notable; el *esmalte* sólo puede ser gastado o corroído por el mismo *esmalte*.

d) *Cemento*. — Es una sustancia dura, opaca, amarillenta, muy análoga al tejido óseo. Cubre la raíz del diente y se adhiere, por su cara externa, al ligamento alveolodentario, cuyos manojos lo penetran mas o menos profundamente (*fibras de Sharpey*).

5.º Vasos y nervios. Las arterias de los dientes son numerosas. Cada raíz recibe una arteria (*arteria pulposa*), que nace de la

dentaria inferior (para el maxilar inferior), de la alveolar y de la suborbitaria (para el maxilar superior). Las arterias pulposas terminan en finos capilares, que no penetran en el marfil. Las venas van a las venas dentaria inferior, suborbitaria y alveolar. Los *linfáticos* van en parte a desembocar en los ganglios submaxilares y en parte en los cervicales profundos. Los *nervios* proceden de los ramos dentarios del trigémino y constituyen en la pulpa un rico plexo.

6.º Desarrollo de los dientes.—El recién nacido no tiene dientes. Estos aparecen sucesivamente del sexto al trigésimo sexto mes y son en número de veinte. Los dientes homónimos aparecen por pares en cada mandíbula: los del maxilar inferior aparecen primero, se ven sucesivamente aparecer los incisivos medios, los incisivos laterales, los primeros molares, los caninos y los segundos molares. El conjunto de estos dientes constituye los llamados *dientes temporales* o *dientes de leche*.

A partir del quinto año los dientes de la segunda dentición (*dientes de substitución*, *dientes definitivos*), situados debajo de los precedentes en el espesor del maxilar, se dirigen hacia la mucosa. Las raíces de los dientes temporales se atrofian; su corona acaba por caer.

La segunda dentición comprende treinta y dos dientes. Los primeros dientes permanentes son los primeros molares mayores; aparecen aproximadamente a los siete años (*dientes de siete años*). Vienen luego los veinte dientes de substitución por el mismo orden que los dientes de leche, y finalmente los segundos y los terceros molares mayores. El cuarto molar mayor no aparece hasta los diecinueve a treinta años (*muela del juicio*).

Los dientes se gastan fisiológicamente: su corte se embota y pierde su esmalte, el marfil queda al descubierto; el conducto central se llena. Los dientes, convertidos en cuerpos extraños, son eliminados y sus alvéolos resorbidos: el borde del maxilar se vuelve liso como en el período fetal. La época en que se produce la caída de los dientes es generalmente la vejez, pero no está sujeta a ninguna regla fija.

ARTÍCULO II

FARINGE

Conducto musculomembranoso, interpuesto entre la boca y las fosas nasales, de una parte, y la laringe y el esófago, de la otra; la faringe da paso a la vez al bolo alimenticio y al aire inspirado.

1.º Consideraciones generales. La faringe es un órgano impar, mediano, simétrico, extendido de la base del cráneo a la séptima cervical. Se subdivide de arriba abajo en tres regiones: *superior o nasal; media o bucal; inferior o laringea*. Su *longitud* (13 centímetros y medio por lo general) varía con los movimientos de deglución. Su *anchura* es aproximadamente de 4 centímetros en la parte superior y de 5 centímetros en la parte media; queda reducida a 2 centímetros a nivel de la extremidad inferior. Su *diámetro anteroposterior*, de 3 a 4 centímetros en la porción bucal, baja a 2 centímetros en su porción laringea. La faringe es estrecha por arriba, ancha en medio y otra vez estrecha por abajo.

2.º Constitución anatómica. — La faringe está esencialmente compuesta de una *aponeurosis*, reforzada en su cara externa por *músculos* y en su cara interna por una *mucosa*.

A. APONEUROSIS FARÍNGEA. — La aponeurosis de la faringe representa un semicírculo de concavidad dirigida hacia delante. Su *extremidad superior* se inserta en la superficie basilar y muy especialmente en un tubérculo óseo situado en la línea media (*tubérculo faríngeo*), y lateralmente en la cara interna del peñasco, en la lámina fibrocartilaginosa que corresponde al agujero rasgado anterior, y en el borde posterior de la apófisis pterigoides. Su *extremidad inferior* se adelgaza para formar una capa *celulosa*, que se continúa con la capa media del esófago. Su *borde anterior* corresponde, de arriba abajo: al borde posterior del ala interna de la apófisis pterigoides, al ligamento pterigomaxilar, a la parte posterior de la línea milohioidea, al ligamento estilohioideo, a las astas del hioides, al ligamento tirohioideo lateral, al borde posterior del cartilago tiroideo y a la cara posterior del cartilago cricoideo.

B. MÚSCULOS DE LA FARINGE. — Los músculos de la faringe son unos *constrictores* y otros *elevadores*.

a) *Constrictores.* — Los constrictores son:

1.º El *constrictor superior*, cuadrilátero, que a derecha e izquierda se inserta en los mismos puntos que la aponeurosis faríngea, desde la base del cráneo hasta la parte posterior de la línea milohioidea (nótese que su borde superior no llega a la base del cráneo).

2.º El *constrictor medio*, de forma triangular, con un vértice correspondiente al borde superior del asta mayor del hioides y una base constituida por fibras que en la línea media se entrecruzan con las del lado opuesto.

3.º El *constrictor inferior*, trapezoidal, que está fijo por delante de los cartílagos tiroideos y cricoides y cuyos manojos se juntan a sus homólogos del lado opuesto a nivel de la línea media (*rafe*).

b) *Elevadores*. — Los elevadores son:

1.º El *faringoestafilino* (véase *Velo del paladar*)

2.º El *estilofaríngeo*, largo, delgado, que nace de la apófisis estiloides, desciende oblicuamente a lo largo de la cara externa de la faringe, se desliza sobre el constrictor medio y, desplegándose en forma de abanico, se fija, en parte, a la aponeurosis faríngea, y en parte, a la epiglottis y al cartilago tiroideos.

C *Mucosa*. — La mucosa faríngea, en su porción nasal, es gruesa, rojiza y de forma irregular; en su porción bucal, delgada y pálida; a nivel de la faringe está revestida por una gruesa capa de tejido conjuntivo.

Está constituida por un *epitelio* pavimentoso estratificado y una *dermis* o *corion*, rica en aparatos linfoides. Van anexas a la misma *glándulas mixtas*, mucosas y serosas.

El *tejado adenoideo* se condensa en ciertos puntos y constituye, alrededor del istmo bucofaríngeo, el *gran círculo linfático de Waldeyer*, uno de cuyos principales elementos es la *amígdala faríngea*. Esta situada en la línea media, detrás de las aberturas posteriores de las fosas nasales, delante del tubérculo faríngeo. Prominente, cuadrangular, presenta una *hendidura media*, terminada hacia atrás por la *bolsa faríngea*, y un sistema de *pliegues* y *surcos* laterales muy variables. Máximo desarrollo, a los doce o catorce años; luego se atrofia. Su estructura es análoga a la de la amígdala palatina.

La invaginación de la mucosa, conocida con el nombre de *bolsa faríngea* (L. SCHKA), varía en su situación según la edad del individuo: se halla situada en el adulto a mitad de la distancia entre el atlas y las aberturas posteriores de las fosas nasales. Su profundidad varía de 1 a 4 milímetros. Su estructura es igual a la del divertículo amigdalino. La significación y el desarrollo de esta formación no son todavía bien conocidos.

3.º *Configuración interior. Endofaringe*. — La endofaringe se divide en tres zonas o compartimientos que son, enumerados de arriba abajo, la *rinofaringe*, la *orofaringe* y la *laringofaringe*.

a) La *rinofaringe* o *nasofaringe* se extiende desde la base del cráneo al velo del paladar. En su parte superior se ve la amígdala faríngea. En su parte anterior se abren las fosas nasales. Lateralmente

presenta el *orificio faríngeo de la trompa de Eustaquio*, y, detrás del mismo, la *fosita de Rosenmüller*.

b) La *orofaringe* o *faringe bucal* se extiende desde el velo del paladar hasta un plano horizontal que pasa a nivel del hueso hioides; comunica por delante con la boca por el *istmo de las fauces*. Lateralmente se comprueba la presencia de las amígdalas entre dos pilares.

c) La *laringofaringe* o *faringe laríngea* se extiende hasta el orificio superior del esófago. Corresponde, por delante, al orificio de la laringe y a su pared posterior. Está deprimida lateralmente formando dos canales, los *senos piriformes*.

4.º **Relaciones.** — Por delante la faringe comunica con las *fosas nasales*, la boca y la *laringe*.

Por detrás corresponde a la pared anterior de la columna vertebral, revestida de los músculos prevertebrales. Un espacio celoso, el *espacio retrofaríngeo*, que contiene ganglios y venas, la separa de dichos músculos.

Lateralmente se distinguen en la faringe dos regiones, una cervical y otra cefálica.

a) *Porción cervical.* — Las relaciones se establecen con los vasos y nervios de la región carotídea: bifurcación de la carótida externa, yugular externa, tronco tirolaringofacial, nervio neumogástrico, nervio laríngeo superior, hipogloso mayor, corpúsculo retrocarotídeo.

b) *Porción cefálica.* — Es toda la porción colocada por encima del borde inferior del maxilar inferior. La faringe corresponde al *espacio maxilofaríngeo*. Este espacio, de sección triangular, está limitado por la rama ascendente del maxilar superior por fuera, por detrás por la mastoidea y el vientre posterior del digástrico, por dentro de la faringe.

Este ancho espacio está tabicado por la aponeurosis lateral de la faringe y los músculos y ligamentos que se insertan en la apófisis estiloides (ramillete de Riolo). La *porción preestilina* contiene los órganos de la región cigomáica (músculos pterigoideos, ramas del nervio inferior, arteria maxilar interna). El *compartimiento retroestilino* contiene la carótida interna, la yugular interna, el neumogástrico, el espinal, el glosofaríngeo, el hipogloso y el simpático cervical.

5.º **Vasos y nervios.** Las arterias nacen de la faríngea inferior y, como accesorias, de la pterigopalatina, de la palatina inferior y de la tiroidea superior. Las venas, formando dos plexos, uno profundo

submucoso, otro superficial subaponeurótico, se reúnen en troncos voluminosos, las *venas faríngeas*, que van a la yugular interna. Los *linfáticos* van unos a los ganglios retrofaríngeos, los otros a los ganglios superiores y medios de la cadena yugular interna. Los *nervios*, reunidos en un rico plexo, provienen del glossofaríngeo, del neumoespinal y del simpático y dan a la faringe la sensibilidad, la motilidad y la vasomotilidad. Se desconoce cómo terminan

ARTÍCULO III

ESÓFAGO

El esófago es un conducto musculomembranoso que, desde la faringe, conduce al estómago el bolo alimenticio.

1.º Consideraciones generales. — Su *límite superior* corresponde al borde inferior del cricoides; su *límite inferior* (*cardias*), a la décima o undécima vértebra dorsal. Ocupa sucesivamente el cuello, el tórax, el espesor del diafragma y la parte extrema superior del abdomen.

Está en relación en toda su extensión con la columna vertebral, sigue sus curvaturas y sólo se aparta de ellas ligeramente a partir de la cuarta dorsal. Presenta una *curvatura superior* de concavidad dirigida a la derecha, una *curvatura inferior* de concavidad dirigida a la izquierda, inflexiones, por lo demás, poco pronunciadas. Está mantenido en posición, en primer lugar, por su continuidad con la faringe y el estómago, y además, por manojos conjuntivos especiales, por la pleura y el peritoneo, que lo sujetan, por decirlo así, al plano óseo subyacente. Su *longitud* es aproximadamente, de 25 centímetros. Su *forma* es variable. Aplanado en *estado de vacuidad*, su luz o calibre se presenta en este caso bajo la forma de una elipse, de un óvalo o de una hendidura de 5 a 12 milímetros de longitud (este aplanamiento es menos notable en su mitad inferior). En *estado de distensión* presenta, además de un *aplanamiento general* máximo a nivel del corazón, *estrechamientos normales* (*cricoideo*, *aórtico*, *bronquial*, *diafragmático*), separados por *segmentos dilatados* o *ensanchados* (*crico-aórtico*, *bronicodiafragmático* y *subdiafragmático*). Finalmente, entre el diafragma y el cardias, el esófago se ensancha en forma de embudo formando el *embudo precardiaco*. A estos estrechamientos constantes

se añaden otros cuya existencia es variable. El significado de unos y otros ha sido vivamente discutido por los autores.

a° Modo de conformación y relaciones. El esófago ofrece a nuestra consideración *dos superficies*, interior y exterior, y *dos extremos*.

A SUPERFICIE INTERIOR.—La superficie interior del conducto esofágico es blanquecina y, en estado de vacuidad, está surcada de pliegues mucosos que se borran por la distensión.

B SUPERFICIE EXTERIOR Y RELACIONES.—La superficie exterior lúpida y lisa, está cubierta por una *capa celulosa periesofágica*, de espesor variable según sean los puntos en que se la considere. Por medio de esta cubierta o capa entra en relación:

a) *En su porción cervical:* 1.°, *por delante*, con la tráquea y el músculo esternotiroideo, el cuerpo tiroideo y la arteria tiroidea inferior; 2.°, *por atrás*, con la columna vertebral; 3.°, *a los lados*, con el cuerpo tiroideo, la arteria tiroidea inferior el nervio recurrente y el simpático. Es de notar que, estando el esófago desviado hacia la izquierda con relación a la tráquea, el recurrente izquierdo descansa sobre su cara anterior y el recurrente derecho sobre su cara lateral.

b) *En su porción torácica:* 1.°, *por delante*, con la tráquea y el bronquio izquierdo, a los cuales está unido por formaciones musculares especiales (*músculo bronquoesofágico de Hyrtl*, al cual podemos añadir los *fascículos pleuroesofágico y aorticoesofágico*); debajo de la tráquea se encuentran, siempre delante del esófago, los *ganglios intertraqueobronquicos* y el *pericardio* (fondo de saco de Haller). 2.°, *por detrás*, con la columna vertebral, de la cual lo separan el conducto torácico, las ácigos mayor y menor, las arterias intercostales derechas y la propia aorta; 3.°, *por los lados y a la derecha*, con la pleura mediastínica derecha y el cayado de la ácigos; 4.°, *a los lados y a la izquierda*, con la pleura y el pulmón izquierdo por arriba y la aorta descendente por abajo. Los neumogástricos acompañan al conducto esofágico por la derecha y por la izquierda; en la porción inferior del tórax, el izquierdo pasa sobre su cara anterior y el derecho sobre su cara posterior; además, se anastomosan a su alrededor formando un rico plexo. Las pleuras forman, junto al esófago, una serie de fondos de saco (*ácigosofágico, aorticoesofágico, retroesofágico*) y un ligamento (*ligamento interpleural de Morosow*).

c) *En su porción diafragmática*, el esófago está rodeado por las fibras del diafragma, que le sirven de esfínter.

d) *En su porción abdominal*, finalmente, el esófago está en contacto: 1.º, *por delante*, con el neumogástrico izquierdo y el lóbulo izquierdo del hígado; 2.º, *por detrás*, con el neumogástrico derecho, los pilares del diafragma y la aorta; *a la derecha*, con el lóbulo de Spiegel; *a la izquierda*, con la gruesa tuberosidad o fondo de saco mayor del estómago. Nótese que del peritoneo, que a este nivel reviste el esófago, parten una serie de repliegues o ligamentos que van a parar a los órganos vecinos (bazo, hígado).

C. EXTREMIDAD SUPERIOR. — La extremidad superior del esófago corresponde a la extremidad inferior de la faringe; recordemos que está separada de los arcos dentarios por una distancia de 13 a 15 centímetros.

D. EXTREMIDAD INFERIOR. — Su extremidad inferior se continúa con el estómago por el *cardias*.

3.º **Constitución anatómica.** — El esófago está formado por tres *tunicas* superpuestas, que son de fuera adentro: 1.º, una *túnica muscular*; 2.º, una *túnica celulosa*, y 3.º, una *túnica mucosa*.

a) *Túnica muscular.* — Comprende dos órdenes de fibras: 1.º, *fibras externas o longitudinales*, que en su mayor parte se insertan en la cara posterior de la laringe (constituyendo en este punto el *ligamento suspensorio del esófago* de GILLETTE), para irradiarse luego en forma de abanico y extenderse sobre las caras del conducto esofágico; 2.º, *fibras internas o circulares*, más o menos horizontales. Estas fibras se continúan, por arriba, con las fibras transversales del constrictor inferior de la faringe, y por abajo con las fibras circulares del estómago. La capa muscular del esófago está constituida por fibras estriadas en su cuarto superior y por fibras lisas en el resto del órgano.

b) *Túnica celulosa* — La túnica celulosa, continuación de la aponeurosis de la faringe, está muy adherida a la mucosa; contribuye a la continuación de sus pliegues y da alojamiento a sus glándulas.

c) *Túnica mucosa* — La túnica mucosa, de coloración blanquecina gruesa (un milímetro) y resistente, está constituida por: 1.º, un *epitelio* pavimentoso estratificado; 2.º, un *corion*, delgado en algunos puntos, con papilas, y una *mucosa muscular*, más pronunciada en la proximidad del *cardias*; 3.º, finalmente, *glándulas mixtas, seromucosas*, cuyo fondo de saco está alojado en la túnica celulosa; éstas son las llamadas *glándulas esofágicas*. El paso de la mucosa del esófago a la del estómago se distingue particularmente por una brusca transformación del epitelio pavimentoso en epitelio cilíndrico.

4° Vasos y nervios. — Las *arterias* del esófago proceden, según el punto que se considere, de la tiroidea inferior, de las bronquiales de la misma aorta, de las intercostales y de las diafragmáticas inferiores. Las *venas*, reunidas en dos plexos, uno *submucoso* y otro *periesofágico*, van a parar a los troncos venosos del cuello y del tórax y en parte a la vena coronar a estomáquica. Los *linfáticos* constituyen, debajo de la mucosa, un rico plexo de mallas longitudinales que van a parar a los ganglios periesofágicos, y los de la porción abdominal, a los ganglios vecinos del cardias. Los *nervios* proceden a la vez del simpático y del neumogástrico. Forman un primer plexo en la capa muscular (*plexo muscular*), cuyas fibras, casi todas de mielina, terminan en las *placas o manchas motoras* (RANVIER), y un segundo *plexo submucoso*, formado por fibras más pálidas y células multipolares, cuyas prolongaciones terminan finalmente en los elementos propios de la mucosa.

ARTÍCULO IV

PERITONEO

El peritoneo es una membrana serosa que tapiza las paredes de la cavidad abdominopélvica y los órganos que en ella están contenidos.

1. DEFINICIONES

1° Hojas. — Aunque continua en sí misma, la membrana peritoneal presenta dos hojas: una *parietal*, que tapiza las paredes, y otra *visceral*, que se aplica sobre las vísceras. La hoja parietal está revestida de una capa de tejido conjuntivo que hace que pueda desprenderse fácilmente casi por todas partes. La hoja visceral, en cambio, es más adherente, salvo en ciertos órganos (vesícula biliar, apéndice cecal).

2° Láminas o fascias. — Se da este nombre a una formación peritoneal simple en apariencia, pero constituida en realidad por el adosamiento de varias hojas peritoneales elementales. Algunas láminas son indisociables, en tanto que otras se dejan disociar.

3° Mesos. — Son formaciones peritoneales que unen los órganos a la pared, formados por dos hojas, contienen en su interior los pedículos vasculares y nerviosos destinados a los órganos.

4° Epiplones. — Dase este nombre a unas extensas membranas peritoneales que unen un órgano a otro órgano. Ejemplo: epiplón gastrohepático, gastrocólico, gastroesplénico, etc.

5° Ligamentos. — Son repliegues serosos que no contienen pedículos vasculares importantes. Unen los órganos a la pared o entre sí. Ejemplo: ligamentos del hígado, del útero; ligamentos duodenocólico, duodenorenal, etc. Algunas de estas formaciones son inconstantes o muy variables.

6° Fondos de saco, fositas, canales, bolsas, divertículos, cavidades. — Dase estos distintos nombres a depresiones del peritoneo, ya que la serosa se hunde en ciertos puntos, a nivel de la pared y a nivel de las vísceras. Ejemplo: fondo de saco de Douglas, tras-cavidad de los epiplones, fosita intersigmoidea, etc.

Describiremos las formaciones peritoneales con las vísceras, pero desde ahora podemos ya establecer una topografía general del peritoneo en el adulto.

2 TOPOGRAFÍA DEL PERITONEO

1.° Cavidad previsceral. — Trátase, naturalmente, de una cavidad virtual. Normalmente, los órganos establecen contacto con el peritoneo parietal anterior y se deslizan sobre él. La frontera de esta cavidad es la pared abdominal anterior. El peritoneo parietal tiene una disposición diferente por encima a nivel y por debajo del ombligo.

a) *Por encima del ombligo.* — Después de haber tapizado el diafragma, el peritoneo tapiza la cara posterior de los músculos transversales y los rectos mayores; está separado de ellos por una capa de tejido celular delgado y tupido (dificultad de la separación, facilidad de los desgarros). En la línea media está algo levantado por el cordón fibroso (vena umbilical del feto obliterada) que se dirige al hígado, de donde resulta un repliegue tendido de la pared abdominal a la convexidad del hígado: es el *ligamento suspensorio del hígado u hoz mayor del peritoneo*.

b) *A nivel del ombligo.* — El peritoneo pasa a modo de puente por detrás del anillo umbilical y deja ver por transparencia los cordones fibrosos que convergen hacia el ombligo (vena umbilical, uraco, arterias umbilicales).

c) *Por debajo del ombligo.* — El peritoneo pasa por detrás del uraco de las dos arterias umbilicales obliteradas. Estos tres cordones

lo levantan más o menos formando tres repliegues, las *haces menores del peritoneo*, que se extienden divergiendo hasta alcanzar la parte superior de la vejiga.

En la región suprapúbica se comprueban las tres fositas inguinales (véase pág. 192).

2.º Compartimiento supramesocólico. — El colon transversal y el meso, prolongado hacia los lados por los ligamentos frenocólicos derecho e izquierdo, divide la cavidad peritoneal en dos compartimientos, uno superior y otro inferior.

El compartimiento supramesocólico está dividido en tres celdas por medio de tabiques de separación constituidos por el hígado, el estómago y el epiplón menor. Comprende: 1.º, la *celda suprahepática*, situada entre la cara convexa del hígado y la cara inferior del diafragma; 2.º, la *celda infrahepática derecha*, situada entre la cara inferior del hígado y el mesocolon transversal; 3.º, la *celda gástrica*, situada a la izquierda del ligamento suspensorio y por delante del epiplón menor, se abre hacia la izquierda en la celda esplénica; 4.º, la *trascavidad de los epiplones*, que representa una gran bolsa insinuada entre la cara posterior del estómago y la pared posterior del abdomen, se abre por un orificio estrecho, el hiato de Winslow, comprendido entre el pedículo hepático por de ante (borde libre del epiplón menor), la vena cava inferior (revestida por el peritoneo parietal) por detrás, el duodeno hacia abajo y el lóbulo de Spiegel hacia arriba. Por este hiato se penetra en el *vestíbulo de la trascavidad*. Este vestíbulo, limitado a la derecha por el hiato, tiene una pared anterior formada por el epiplón menor y una pared posterior constituida por el peritoneo que tapiza la región celiaca; el vestíbulo comunica hacia la izquierda con la trascavidad por un estrecho agujero, el *foramen bursae omentalis*. Este foramen está circunscrito hacia delante, por la parte inferior de la curvatura menor del estómago, hacia abajo y a la derecha por un repliegue seroso que contiene la arteria hepática (*haz de la arteria hepática*); hacia arriba y atrás, por otro repliegue tendido del páncreas a la parte inferior de la curvatura menor (*haz de la arteria coronaria*). La *trascavidad propiamente dicha o bolsa retroestomacal* está limitada hacia delante, por el estómago, hacia atrás, por el peritoneo que tapiza el cuerpo del páncreas. La parte superior sube hasta el diafragma, la parte inferior desciende un poco hasta dentro del espesor del epiplón mayor. Hacia la izquierda, presenta una prolongación que llega hasta el bazo y que está limitada por el

epiplón gasoesplénico por delante y por el epiplón pancreático esplénico por detrás. *Hacia la derecha*, la trascavidad no excede de la primera porción del duodeno

3° Compartimiento inframesocólico. — Este compartimiento tiene por límites: *hacia arriba*, el colon transverso y su meso; *hacia abajo*, el colon pelviano y su meso; *hacia delante*, el epiplón mayor, que lo aísla más o menos de la cavidad prevascular; *hacia atrás*, la pared abdominal posterior; *hacia los lados*, la pared abdominal anterolateral. Comprende la mayor parte de la cavidad abdominal y contiene la casi totalidad de la masa intestinal. El mesenterio y los cólores ascendente y descendente se subdividen en espacios secundarios: *espacio mesentericocólico derecho*, *espacio mesentericocólico izquierdo*, ambos comprendidos entre el mesenterio y el colon correspondiente; *espacio parietocólico derecho*, comprendido entre el colon ascendente y la pared derecha del abdomen; *espacio parietocólico izquierdo*, comprendido entre el colon descendente y la pared lateral del abdomen

4° Compartimiento pelviano. — La parte inferior de la cavidad peritoneal forma una especie de embudo que desciende hasta la pelvis. El mesocolon sigmoide y el colon sigmoide forman un tabique que aísla, aunque de modo imperfecto, este compartimiento de la cavidad peritoneal mayor. El compartimiento pélvico nos muestra, en el hombre, el *fondo de saco vesicorrectal*, situado entre la cara inferior del recto y la cara posterior de la vejiga; en la mujer, este fondo de saco desciende entre el útero por delante y el recto por detrás. Este *fondo de saco rectouterino* o *fondo de saco de Douglas* está limitado hacia arriba por dos repliegues muy acentuados los *repliegues de Douglas*. Por delante del útero, nueva depresión que forma el *fondo de saco vesicouterino*. Lateralmente, tanto en el hombre como en la mujer, el peritoneo forma los *canales laterouentrales* y *laterorrectales*.

ARTÍCULO V

ESTÓMAGO

Porción dilatada del intestino inferior del embrión, el estómago es el sitio de transformación de los alimentos en quimo

1.° Consideraciones generales. — Ocupa una gran parte del epigastrio y casi todo el hipocondrio izquierdo. Está sostenido en su

posición por su continuidad con el resto del tubo digestivo y los numerosos repliegues que el peritoneo forma a su nivel. Su forma es generalmente de una J mayúscula; algunas veces es *bilocular* (se han emitido gran número de teorías para explicar esta disposición). Su *dirección*, oblicua de arriba abajo, primeramente es vertical, luego horizontal. Sus *dimensiones* son, por término medio, las siguientes: 25 centímetros en su mayor longitud, 12 centímetros de ancho y 8 de espesor o profundidad. Por lo demás, varían según la mayor o menor repleción del órgano. Su *capacidad* media es de 1,300 centímetros cúbicos, se modifica según la alimentación del individuo.

La radiología permite examinar la forma del estómago en el vivo.

2.º **Configuración exterior.**— El estómago presenta una porción descendente o vertical y una porción horizontal. La porción vertical presenta la *tuberosidad mayor* o *fondo del estómago*, que se adapta a la curva de la bóveda del diafragma; el *cuerpo del estómago*, que tiene forma de cilindro aplanado y se une a la porción horizontal por medio de un codo, y el *fondo de saco menor del estómago*.

La *porción horizontal* está constituida por la *región pilórica*.

Los *bordes del estómago* se designan con el nombre de *curvatura menor* y *curvatura mayor*. Se da el nombre de *cardias* al orificio superior y el de *píloro* al orificio inferior (véase más adelante).

3.º **Relaciones.**— Se distinguen dos caras, dos extremidades y dos orificios.

a) *Cara anterior*.— La cara anterior corresponde al diafragma, a la altura de la 3.ª, 6.ª, 7.ª y 8.ª costillas izquierdas; está cubierta, en su parte superior, por la extremidad del lóbulo izquierdo del hígado, en su parte inferior está en contacto con la pared anterior del abdomen a nivel del *triángulo de Laddé*.

b) *Cara posterior*.— La cara posterior mira hacia atrás y abajo; a este nivel el estómago está en relación con la cavidad posterior de los epíplones y, por su mediación, con una serie de órganos, en su mayor parte adosados a la cara posterior del abdomen: bazo, riñón y cápsula suprarrenal izquierdos, páncreas, duodeno, colon transversal y mesocolon.

c) *Borde derecho*.— El borde derecho o *curvatura menor* del estómago, que va del cardias al píloro, corresponde aproximadamente al plano sagital y está en contacto con el tronco celíaco y el lóbulo de Spiegel; en este borde se inserta el epiplón gastrohepático, que

contiene, en contacto con el estómago los vasos coronarios, nervios importantes y ganglios.

d) *Borde izquierdo*. — El borde izquierdo o *curvatura mayor*, en contacto con el colon transversal, es recorrido por el arco de los vasos gastroepiploicos, este borde corresponde a la línea de inserción superior del epiplón gastrocólico.

e) *Orificio superior* — El orificio superior o *esofágico* constituye el *cardias*. Corresponde a la undécima dorsal; está inclinado de arriba abajo y de izquierda a derecha. Presenta, en su interior, un aspecto radiado (*ad stellæ similitudinem*); desprovisto a la vez de válvula y de esfínter, es, por esta misma razón, perfectamente dilatable.

f) *Orificio inferior* — El orificio inferior o *duodenal* constituye el *píloro*. Se nota al exterior por un ensanchamiento o estrangulación y una mayor resistencia parietal. De situación variable según sea el grado de repleción del estómago, corresponde, en el estómago vacío, a la línea media (a nivel de la duodécima vértebra dorsal). En este punto está en relación: por delante, con la cara inferior del hígado, por detrás, con la vena porta y la arteria hepática, hacia abajo, con la cabeza del páncreas. El epiplón menor está unido sobre el borde superior, dirigido hacia arriba, atrás y a la derecha. Posee un *esfínter* debido al engrosamiento de las fibras circulares del estómago: este esfínter, revestido de la mucosa reforzada por tejido conjuntivo, constituye la formación impropriamente llamada *válvula pilórica*, nótese que su cara duodenal está como cortada a pico, mientras que su cara estomacal se continúa progresivamente con la superficie interna del estómago: de ahí el diferente aspecto de la válvula, según la cara que se considere.

g) *Extremidad izquierda* — La extremidad izquierda y superior o *tuberosidad mayor* del estómago se cobija debajo del diafragma. Alcanza la altura de la quinta costilla. A este nivel se pone en relación: con el corazón y el pulmón, *por arriba*; el bazo, el riñón, la cápsula suprarrenal *por detrás*, y el colon, *por delante*. En la tuberosidad mayor se insertan los repliegues frenogástrico y gastroesplénico.

h) *Extremidad derecha* — La extremidad derecha e inferior o *tuberosidad menor* precede al píloro (*antro del píloro*). De dimensiones variables, está en relación *hacia atrás*, con el duodeno (cuarta porción) y el páncreas; *hacia delante*, con el hígado (cara inferior).

3.º **Constitución anatómica.** — El estómago está constituido por cuatro *túnicas superpuestas*, que de fuera adentro son:

a) *Túnica serosa*. — El peritoneo se extiende sobre las caras anterior y posterior del estómago, al cual abandona a nivel de los bordes para extenderse sobre las vísceras vecinas, constituyendo de este modo los *epiplones*. Se distinguen tres epiplones. 1.º, *epiplón gastrohepático* o *epiplon menor* (de la curvatura menor a la cara inferior del hígado); 2.º *epiplón gastroesplénico* (de la tuberosidad mayor al hilio del bazo), continuado hacia arriba por el ligamento *frenogástrico*; 3.º *epiplón gastrocólico* o *epiplón mayor*, el más largo de todos y cuya parte media, flotante replegada sobre sí misma entre la curvatura mayor y el colon transversal ha recibido el nombre de *epiplon mayor*. Debajo del peritoneo gástrico se extiende una capa de tejido celular, la *capa celulosa subperitoneal* delgada, a nivel de las caras, más gruesa en los bordes y por la cual corten los vasos y nervios del estómago.

b) *Túnica muscular*. — Comprende varias capas. 1.º, capa de las *fibras longitudinales* (capa superficial), paralelas al eje mayor del órgano, estas fibras se condensan a nivel de la curvatura menor para formar la *corbata suiza*, 2.º, capa de las *fibras circulares* (capa media), perpendiculares a las precedentes, condensadas a nivel del píloro; 3.º, capa de las *fibras en asa* (capa profunda).

c) *Túnica submucosa*. De naturaleza conjuntiva, contiene los vasos y nervios que van a la mucosa.

d) *Túnica mucosa*. — Da al tacto una sensación de terciopelo y su color es blanco mate o rosado, según esté el estómago vacío o distendido. Su grosor máximo corresponde al nivel de píloro. Consistente en el individuo vivo, se reblandece pronto en el cadáver por ser seguida la putrefacción de una especie de autodigestión. Ofrece: 1.º, una serie de *repliegues* ondulantes, que se borran con la distensión del órgano; 2.º, *mamelones*, de 2 a 4 milímetros de diámetro cuya superficie está enclavada en *criptas*, visibles al microscopio y que sirven de salidas o desembocaduras a los tubos glandulares.

4.º **Vasos y nervios.** — A. *Arterias* — Cada curvatura del estómago es recorrida por dos arterias que le llegan por ambos extremos caminan en sentido inverso una de otra y vienen a anastomosarse por inosculación a lo largo de las curvaturas. El estómago tiene, pues, cuatro pedículos arteriales.

El *arco arterial de la curvatura menor* está formado por la arteria coronaria estomáquica y la arteria pilórica. La *coronaria estomáquica*, nacida del tronco celíaco, asciende verticalmente para alcanzar el estómago; levanta el peritoneo (hoz de la coronaria) y luego se acoda para

alcanzar la parte superior de la curvatura menor del estómago e ir a perderse en el epiplón menor. Está situada entre dos planos nerviosos formados por los ramos gástricos de los dos neumogástricos. Se divide en dos ramas terminales que se anastomosan con las ramas de la pilórica.

La *arteria pilórica* es de pequeño calibre y procede de la porción ascendente de la *arteria hepática*. Desciende por el borde superior del píloro y se divide en dos ramas terminales.

De este arco arterial proceden arterias cardioesofágicas y gástricas.

El *arco arterial de la curvatura mayor* está formado por las dos arterias gastroepiploicas. La *arteria gastroepiploica izquierda* procede de la arteria esplénica antes de su división y sigue la curvatura mayor de izquierda a derecha para ir a anastomosarse con la *arteria gastroepiploica derecha*. Esta última nace de la arteria gastroduodenal, a nivel del borde inferior del píloro, y sigue la curvatura mayor de derecha a izquierda. El *arco arterial gastroepiploico* da ramos ascendentes destinados a ambas caras del estómago y ramos descendentes para el epiplón mayor.

Independientemente de estos arcos arteriales, la tuberosidad mayor del estómago recibe los *vasos cortos*, que nacen, en número variable, de las ramas de división de la arteria esplénica en el hilio del bazo. De aquí pasan al epiplón gastroesplénico, donde se sitúan encima de la arteria gastroepiploica izquierda.

B. VENAS — La mayoría son tributarias del sistema porta. La *curvatura menor* es recorrida por un *arco venoso comparable al arco arterial*. La vena coronaria estomáquica discurre por dentro del epiplón menor y va a desembocar en el extremo superior de la vena porta. La vena pilórica desemboca en la vena porta, en la parte media del pedículo hepático. El *arco venoso de la curvatura mayor* vierte en las *venas gastroepiploicas*. De éstas, la derecha termina en la vena mesentérica superior, ya directamente, ya por mediación de la vena cólica derecha. Señalemos, además, como afluentes, las *venas pilóricas e infrapilóricas*.

C. LINFÁTICOS — Los linfáticos convergen, ora hacia la curvatura menor, ora hacia la curvatura mayor. A nivel de la primera, los grupos ganglionares se escalonan de arriba abajo (*ganglios gástricos superiores, precardiácos y retrocardiácos, y ganglios gástricos inferiores*); a lo largo de la curvatura mayor, los ganglios forman la cadena gastroepiploica derecha, en la que se encuentran ganglios infrapilóricos y retropilóricos.

Algunos *linfáticos de la tuberosidad mayor* alcanzan el epiplón gastroesplénico y terminan en los ganglios pancreaticoesplénicos. Tenemos, pues, tres territorios linfáticos importantes: *curvatura menor, curvatura mayor y tuberosidad mayor*.

D. NERVIOS. — Los nervios provienen de los neumogástricos y del simpático.

Nervios gástricos procedentes de los neumogástricos. — El *neumogástrico izquierdo* es anterior, y a nivel del borde derecho del cardias emite de cuatro a seis ramos independientes escalonados los unos debajo de los otros. El último es el más importante (*nervio principal anterior de la curvatura menor*, LATAJET).

Los ramos del neumogástrico posterior, antes de alcanzar el plexo solar, emiten ramas análogas a las del anterior. También aquí se distingue un *nervio principal posterior*.

La *región del píloro* está inervada por los *nervios suprapilóricos* o *duodenopilóricos*, nervios sumamente delgados procedentes de los nervios hepáticos anteriores (LATAJET).

A lo largo de la curvatura mayor, ciertos filetes nerviosos procedentes del plexo solar y satélites de la arteria gastroepiploica derecha emiten algunos ramos gástricos.

Existen, pues, tres pedículos nerviosos: el *pedículo de la curvatura menor*, el más importante; el *pedículo pilórico* y el *pedículo de la curvatura mayor*.

ARTÍCULO VI

INTESTINO DELGADO

El intestino delgado se extiende desde el *píloro* a la *válvula ileocecal*. En la serie animal presenta un desarrollo tanto más considerable cuanto más vegetal es la alimentación. En el hombre, su *longitud* es de 6 a 8 metros; su *diámetro* decrece, de arriba abajo, de 30 milímetros a 20 y aun 15 milímetros. Comprende 1.º, una *porción fija*, el *duodeno*, 2.º, una *porción flotante*, el *yeyunoíleon*.

1.º **Duodeno.** — El duodeno, porción fija del intestino delgado, está en relación con la pared posterior del abdomen.

A. CONSIDERACIONES GENERALES. — Está *sujeto en posición* por el peritoneo, por los diversos vasos y conductos que en él terminan y por una formación especial, el *músculo de Treitz*.

Partiendo de la extremidad pilórica del estómago (segunda vértebra lumbar), se dirige a la derecha, arriba y atrás, hasta el cuello de la vesícula, descinde luego a lo largo de la cabeza del páncreas, se acoda, pasa por debajo de los vasos mesentéricos superiores, sube por el lado izquierdo de la columna hasta el borde inferior del cuello del páncreas y allí termina, continuándose en el yeyunoíleon.

Se le puede considerar dividido en cuatro porciones: *primera porción*, que va del piloro al cuello de la vesícula (dirección oblicua arriba y atrás); *segunda porción*, que va del cuello de la vesícula a la parte más declive de la cabeza de páncreas (dirección descendente); *tercera porción*, que va del punto precedente a los vasos mesentéricos (dirección horizontal); *cuarta porción*, que se extiende desde los vasos mesentéricos al ángulo duodenoeyunal (dirección ascendente). En su totalidad, la *curva duodenal* toma formas variables según los individuos: tipo en V, en Y, en anillo. Su *longitud* es, por término medio, de 0.25 metros.

B. RELACIONES. Las relaciones del duodeno son las siguientes:

a) *Primera porción* — *Por delante*, la cara inferior del hígado y cuello de la vesícula, *por detrás*, la vena porta, conducto colédoco, arteria gastroepléica derecha, *por arriba*, el epiplón gastronepático y su contenido; *por debajo*, el borde superior de la cabeza del páncreas y el epiplón mayor.

b) *Segunda porción* — *Por delante*, el ángulo o codo derecho del colon transversal, mesocolon transversal y asa del intestino delgado, *por detrás*, la vena cava inferior, cara anterior del riñón derecho, vasos renales derechos y la pelvis del riñón; *a la derecha*, el lóbulo derecho del hígado y colon ascendente, *a la izquierda*, la cabeza del páncreas (que se le adhiere íntimamente) y conductos excretorios de esta glándula.

c) *Tercera porción* — Corresponde a la cuarta lumbar. *Por delante*, el peritoneo parietal, parte extrema superior del mesenterio y vasos mesentéricos superiores, *por detrás*, el psoas y vena cava inferior; *hacia arriba*, el borde inferior de la cabeza del páncreas; *por abajo*, las asas del intestino delgado.

d) *Cuarta porción*. — Recorre de abajo arriba el lado izquierdo de la columna; *por delante*, la pequeña tuberosidad del estómago, mesocolon transversal y asas del intestino delgado; *por detrás*, el psoas y vasos renales izquierdos; *a la izquierda*, el borde interno del riñón izquierdo, del cual la separan la arteria cólica izquierda y la vena mesentérica inferior (*arco vascular de Treitz*); *por arriba*, se inserta

un manojito musculotendinoso, el *músculo de Treitz*, que pasando por detrás del páncreas, va a fijarse por su extremidad superior en el tejido conjuntivo que rodea el tronco celíaco y el pilar izquierdo del diafragma.

2.º **Yeyunoíleon.**—Parte flotante del intestino delgado, que ocupa la mayor parte del abdomen inferior. Está sujeto a la pared posterior por el *mesenterio*. A partir del ángulo duodenoeyunal se dirige sucesivamente de derecha a izquierda y de izquierda a derecha hasta el ciego, describiendo una serie de *asas* (*circunvoluciones intestinales*), cuya forma y disposición están, por lo demás, influidas por todas las modificaciones fisiológicas y patológicas de los órganos vecinos. Su longitud es de 6 a 8 metros. Su forma es la de un cilindro, con un *borde adherente* al mesenterio y un *borde libre*. Está en *relación* con la pared anterior del abdomen, de la cual lo separan habitualmente el epiplón mayor y la mayor parte de los órganos contenidos en el abdomen (hígado, bazo, páncreas, vejiga, útero y recto). Se encuentra a veces (2 por 100, anexo a la parte inferior del íleon un apéndice en fondo de saco, el *divertículo de Meckel*, de forma y dimensiones variables, resto del conducto onfalomésentérico del embrión.

3.º **Constitución anatómica del intestino delgado.**—El intestino delgado comprende una serie de tónicas superpuestas: serosa, muscular, celulosa y mucosa.

a) *Túnica serosa.*—Su disposición anatómica difiere según los puntos en que se la considera:

α) *En el duodeno*, el peritoneo cubre solamente la cara anterior del órgano. Únicamente en el punto en que el duodeno se continúa con el estómago es donde el peritoneo le proporciona una doble hoja anterior y posterior, continuación de las hojas que tapizan las caras correspondientes del estómago. Estas mismas hojas, reflejándose sobre el hígado y la vesícula constituyen los *ligamentos duodenohepático* y *duodenocístico*. Un repliegue de igual naturaleza va de la segunda porción del duodeno al riñón *ligamento duodenorrenal*.

β) *En el yeyunoíleon*, el peritoneo cubre toda la superficie del conducto y se refleja sobre sí mismo a nivel del borde adherente, para constituir el *mesenterio*.

El *mesenterio* atraviesa oblicuamente el compartimiento inframesocólico del abdomen. Su *borde parietal* o *raíz* es corto (15 a 17 cen-

(metros); su *borde visceral*, inserto sobre el intestino flotante, tiene la misma longitud que éste (5 a 6 metros); la altura alcanza su máximo en la unión del tercio superior con los dos tercios inferiores del intestino delgado. La raíz del mesenterio se extiende desde el ángulo duodenoyeyunal (primera lumbar) hasta el ángulo ileocecal (articulación de la sínfisis sacroilíaca derecha); cruza el esqueleto vertebral, pasa por delante de la cuarta porción del duodeno y su porción horizontal, luego, después de haber seguido la dirección de la aorta y la vena cava inferior, pasa a la derecha de ellas. Salva el músculo psoas y pasa por delante del uréter derecho y de los vasos y nervios espermáticos. El *borde visceral* corresponde al intestino delgado. Entre las dos hojas se encuentran los vasos dispuestos en forma de arcada, lo mismo que los nervios del intestino delgado. Estos órganos están rodeados de grasa.

y) *Junto al ángulo duodenoyeyunal*, el peritoneo forma cierto número de repliegues, las *fositas duodenales*: la *fosita duodenal inferior*, de concavidad superior, y la *fosita duodenal superior*, de concavidad inferior; se superponen sobre la cara izquierda de la cuarta porción del duodeno, la *fosita duodenoyeyunal*, más rara que las precedentes, corresponde al dorso del ángulo duodenoyeyunal. La forma y el número de estas fositas son variables. Su significación es todavía oscura: algunas parecen debidas al levantamiento del peritoneo por los vasos subyacentes (WALDEYER), otras a defectos de adosamiento.

b) *Túnica muscular*. — Comprende dos capas: una capa superficial, de *fibras longitudinales*, una capa profunda, de *fibras circulares*.

c) *Túnica celulosa o submucosa*. Al igual que la túnica homónima del estómago, de la cual es continuación, contiene los nervios y los vasos destinados a la mucosa.

d) *Túnica mucosa*. — Constituye por sus funciones la parte esencial del órgano. De coloración blanco-rosada en su tercio superior, grisácea en sus dos tercios inferiores, ofrece a nuestra consideración una serie de formaciones que le son peculiares.

a) Las *válvulas conniventes* son repliegues transversales de la mucosa; en número de 800 a 900, de una longitud media de 5 a 6 centímetros, de una altura aproximada de 6 a 7 milímetros, únicamente faltan en la primera porción del duodeno y en la proximidad del ciego. Amplían la superficie absorbente del intestino.

β) Las *vellosidades intestinales* son eminencias laminiformes o cónicas, de un milímetro o más de altura, diseminadas en gran nú-

mero (más de dos millones según SAPPEY) por toda la superficie del intestino delgado.

γ) La superficie libre de la mucosa presenta, además, en el intervalo de las vellosidades, muy numerosos orificios glandulares y formaciones linfoides especiales: los folículos cerrados y las placas de Peyer (éstas en la segunda mitad de yeyunoíleon).

δ) En cuanto a la estructura microscópica de la mucosa, viene a reducirse a un epitelio formado por células cilíndricas y caliciformes, que descansan sobre una capa de tejido conjuntivo reticulado, rico en elementos linfoides. También se encuentran glándulas: 1.º, glándulas de Brunner (únicamente en el duodeno); 2.º, glándulas de Lieberkuhn (en toda la extensión del intestino delgado); 3.º, formaciones linfáticas (folículos cerrados y placas de Peyer), a las cuales nos hemos referido más arriba. (Para detalles sobre la constitución microscópica de la mucosa intestinal, véanse los tratados de Histología.)

4.º Vasos y nervios del intestino delgado. — Las arterias del duodeno proceden de la *pancreaticoduodenal superior* (rama de la gastroepiploica derecha) y de la *pancreaticoduodenal inferior* (rama de la mesentérica superior), que se anastomosan entre sí y cuyo conjunto forma el *arco pancreaticoduodenal*. Las arterias del yeyunoíleon proceden de los arcos formados por las ramas que nacen de la convexidad de la mesentérica superior. Estas diversas ramas arteriales, o *vasa recta*, se ramifican en el interior de las tunicas intestinales o constituyen una *red submucosa*, de la cual nacen las ramas propias de la mucosa, cuya expansión terminal en forma radiada ha recibido el nombre de *estrellas de Heller*. Las venas, que salen de una *red submucosa* y que se reúnen formando una segunda *red subperitoneal*, constituyen, finalmente, la *mesaraica mayor* o *mesentérica superior*, rama de la vena porta. Los linfáticos toman su principal origen de los tubos linfáticos contenidos en las vellosidades. Forman redes submucosas, intramusculares y subserosas, constituyen los *vasos lácteos* o *quíferos* del mesenterio y desembocan finalmente en la *cisterna de Pecquet*. Los nervios emanan del plexo solar, a cuya constitución concurren el simpático y el neumogástrico. Se anastomosan formando plexos: 1.º, el *plexo de Auerbach*, intramuscular, cuyas fibras, provistas de ganglios, terminan en los elementos musculares por *manchas motoras*, 2.º, el *plexo de Meissner*, análogo al precedente, pero de malas más estrechas y más irregulares; está colocado en la submucosa; presenta

trabéculas de fibras amielínicas, *ganglios* situados en los puntos de cruce y *ramos terminales* que llevan a los diversos elementos de la mucosa *fibras vasomotoras, motoras y sensitivas*.

ARTÍCULO VII

INTESTINO GRUESO

El intestino grueso, segmento terminal del tubo digestivo, es continuación del intestino delgado, del cual lo separa la válvula ileocecal, y termina en el ano. Se compone de varios segmentos: el ciego, el colon y el recto.

1. INTESTINO GRUESO EN GENERAL

Su longitud total es aproximadamente de 1,65 metros; su diámetro va disminuyendo desde 70 milímetros a 25 ó 30 milímetros.

1.º **Conformación exterior.** — Presenta, en casi la totalidad de su trayecto, *fajas musculares*, de dirección longitudinal y en número de tres (*anterior, posterointerna y posterocexterna*). En el intermedio de estas tres fajas, la pared del intestino se levanta formando *abolladuras o relieves*, visibles en el feto y que revelan probablemente la distensión del conducto por las materias fecales. A lo largo de estas fajas la grasa subperitoneal levanta la serosa, formando prolongaciones simples o ramificadas, los *apéndices epiploicos*.

2.º **Conformación interior.** — Visto interiormente, el intestino grueso presenta *ampollas y repliegues falciformes*, correspondientes a los detalles exteriores que acabamos de estudiar.

3.º **Conformación anatómica.** — Recuerda con bastante exactitud la del intestino delgado. Se compone de las cuatro tunicas siguientes:

1.ª Una *túnica serosa*, gruesa y reforzada por una fuerte capa conjuntiva.

2.ª Una *túnica muscular*, con *fibras superficiales y longitudinales* condensadas en tres largas fajas, y *fibras circulares profundas*, que forman una capa mucho más delgada.

3.ª Una *túnica celulosa submucosa*.

4^a Una *túnica mucosa*, que difiere de la del intestino delgado en que no presenta ni válvulas conniventes ni vellosidades. (Para detalles, véanse los tratados de Histología)

2 CIEGO

El ciego, segmento inicial del intestino grueso, es la porción de este intestino que se halla situada debajo de un plano que pasa inmediatamente por encima de la válvula ileocecal

1^o **Consideraciones generales.** Tiene la forma de una ampolla, continuada arriba por el colon y provista abajo de una prolongación cilíndrica, el *apéndice cecal* o *apéndice vermicular*. La *capacidad* media del ciego varía entre 200 y 300 centímetros cúbicos. Su longitud parece aumentar con la edad del individuo. Está *mantenido en posición* en la fosa ilíaca derecha por dos ligamentos peritoneales (TUFFIER): un *ligamento superior*, que se inserta arriba en la pared abdominal posterior a nivel del riñón y un *ligamento inferior*, que no es más que la inserción de la parte inferior del mesenterio en la fosa ilíaca. A pesar de estos ligamentos el ciego se mueve con la mayor facilidad

2^o **Relaciones** — El ciego ofrece a nuestra consideración las relaciones siguientes:

- a) *Por delante*, con la pared anterior del abdomen.
- β) *Por detrás*, con la aponeurosis lumboilíaca, revestida en sus dos caras de una capa celulograsosa
- γ) *Por fuera*, con el músculo ilíaco y la parte anterior de la cresta ilíaca
- δ) *Por dentro*, con el lado anterointerno del psoas, que lo separa de la excavación pelviana; a este nivel es donde viene el yeyuno-íleon a terminar en el ciego, formando con él el *ángulo ileocecal*, ordinariamente obtuso hacia arriba y agudo hacia abajo
- e) *Por arriba (extremo superior)* se continúa directamente con el colon ascendente.
- ζ) *Por abajo (extremo inferior)* corresponde generalmente al ángulo diedro formado por la pared abdominal y la fosa ilíaca; puede hallarse en *posición alta* y en *posición baja*; esta última es más frecuente en el viejo.

3° **Superficie exterior.**— Vista exteriormente, la ampolla cecal presenta las *tres fajas longitudinales o tenias*, que hicimos notar más arriba. Estas toman origen, todas ellas, en el punto de implantación del apéndice, es decir, atrás y adentro. De estas cintas, una es anterior, la segunda *posterointerna* y la tercera *posteroexterna*.

4° **Superficie interior.**— Visto interiormente, el ciego presenta los mismos relieves o prominencias en forma de fajas y las mismas abolladuras ampollares que hicimos notar más arriba. Se notan, además: 1°, a la izquierda y atrás la *válvula ileocecal*, 2°, algo por debajo de esta válvula, el *orificio del apéndice ileocecal*.

5° **Válvula ileocecal.**— La válvula ileocecal (o *válvula de Bauhin* o *barrera de los boticarios*) aparece bajo un aspecto muy diferente según la cara que de ella se considere. *Vista por el lado del ileon*, es una cavidad cuneiforme que se estrecha cada vez más a manera de cuña. *Vista por el lado del ciego*, es una prominencia oblonga compuesta de dos *valvas superpuestas*: una superior, más corta, y una inferior, más larga. Las valvas se unen en sus dos extremidades anterior y posterior, formando dos *comisuras*, que dan origen a los *frenos o riendas* de la válvula ileocecal. Nótese que las valvas citadas no se ponen en contacto más que por su borde libre originando de este modo un orificio virtual, el *orificio ileocecal*.

La válvula ileocecal, invaginación del ciego y del ileon, está constituida, en cada una de sus dos valvas, por la pared intestinal repliegada sobre sí misma: todas las tónicas forman parte de este repliegue, a excepción de la túnica serosa y la capa longitudinal de la túnica muscular las cuales pasan directamente del ileon al intestino grueso.

La válvula ileocecal tiene por funciones, por una parte, permitir el libre paso de las materias sólidas, líquidas o gaseosas del intestino delgado al intestino grueso, y por otra parte, oponerse al retroceso de estas mismas materias.

6° **Apéndice cecal.**— Es un pequeño tubo cilíndrico, flexuoso, implantado en la parte inferior e interna del ciego, a 2 ó 3 centímetros por debajo de la válvula ileocecal, en el punto de reunión de las tres fajas musculares del ciego. Su *longitud media* es de 8 a 10 centímetros; su *anchura*, de 6 a 8 milímetros. Su *dirección* es variable: puede dirigirse hacia el riñón (*ascendente*), introducirse en la pelvis menor (*descendente*), dirigirse hacia fuera (*externo*), hacia dentro

(interno) y alojarse en el espesor del mesenterio. El apéndice está provisto de una *cavidad central*, en la cual se encuentra meconio en el feto o restos alimentarios en el adulto. GERLACH ha hecho notar una *válvula* en el orificio cecal de esta cavidad. La *pared* es gruesa (5 ó 6 milímetros) y presenta igual estructura que el resto del ciego. Morfológicamente, el apéndice vermicular no es otra cosa que la parte extrema inferior del ciego, que no se ha desarrollado en las mismas proporciones que el resto del intestino grueso.

7.º **Constitución anatómica.**—El ciego presenta las cuatro tónicas siguientes:

a) *Túnica serosa*.—El peritoneo cubre ordinariamente el ciego en toda su extensión; el órgano flota entonces libremente en la fosa ilíaca. solamente en la décima parte de casos se forma un *mesociego* (*mesocæcum*). Al apéndice, el peritoneo le suministra un *mesoapéndice triangular*, con una base que corresponde a la unión del ciego y el ileon; un borde cóncavo, que aloja a la arteria apendicular. En el espesor de este meso se aloja el *ganglio apendicular de Glado*. En la mujer, un repliegue peritoneal variable (*ligamento lumboovárico apendiculoovárico*) une la base del mesoapéndice a la extremidad externa del ovario. Al pasar del ileon al ciego, la serosa determina la aparición de dos fositas: la *fosita cecal superior*, situada en la parte anterosuperior del ángulo ileocecal; la *fosita cecal inferior*, situada por debajo de la porción terminal del ileon. Detrás del ciego se encuentran a veces fositas más o menos profundas: son las *fositas retrocecales*.

b) *Túnica muscular*.—Comprende: 1.º, una *capa superficial*, de fibras longitudinales agrupadas formando fajas; 2.º, una *capa profunda*, de fibras circulares.

c) *Túnica celulosa o submucosa*.—Muy gruesa a nivel del apéndice.

d) *Túnica mucosa*.—Ofrece todos los caracteres de la mucosa del intestino grueso; muy rica en folículos cerrados a nivel del apéndice.

8.º **Vasos y nervios.**—Las arterias proceden de la mesentérica superior. Esta arteria, a nivel del ángulo ileocólico, se divide en cuatro ramas, a saber: 1.ª, la *arteria ileocecal anterior*, que cruza el ileon levantando el peritoneo en una fosita (*fosita cecal anterior*); después se ramifica por la cara anterior del ciego; 2.ª, la *arteria ileocecal por-*

terior, que se extiende por la cara posterior del ciego. 3.ª, la *arteria iléal*, que se distribuye, siguiendo un trayecto recurrente, por la porción terminal del ileon. 4.ª, la *arteria apendicular*, que pasa detrás del ileon y vasculariza el apéndice, sin anastomosarse con los sistemas vecinos. Las *venas* terminan en la mesentérica superior. Los *linfáticos* se dividen en: *anteriores*, que van a dos o tres ganglios situados en el repliegue ileocecal anterior, y *posteriores*, que van a los ganglios que ocupan el lado posterointerno del ciego. Los linfáticos del *apéndice* van primero a los ganglios apendiculares y luego a los ganglios ileocecales. Los *nervios* proceden del plexo solar por medio del plexo mesentérico superior.

3. COLON

El colon es la parte media del intestino grueso; se extiende del ciego al recto. Se encorva dos veces, formando un *codo derecho* y un *codo izquierdo*.

1.ª **Conformación exterior y relaciones.** Por razón de los cambios de dirección que presenta, se consideran en él varios segmentos: *colon ascendente*, *colon transverso*, *colon descendente* y *colon ilioapéndice*.

A **COLON ASCENDENTE.** — Va del ciego a la cara inferior del hígado. Pegado a la pared posterior del abdomen, está sujeto en esta posición por el peritoneo, que unas veces pasa simplemente delante de él, mientras otras le forma un meso. Algunas veces fija su ángulo derecho por medio de un pliegue seroso que va de este ángulo a la cara inferior del hígado, el *ligamento hepatocólico*.

El colon ascendente está en relación: *por detrás*, con la fosa ilíaca y con el riñón derecho; *por dentro*, con las asas delgadas y con el psoas; *por delante* y *afuera* con las circunvoluciones intestinales.

Ofrece a nuestra consideración: *exteriormente*, tres fajas musculares, una anterior y las otras posterointerna y posteroexterna; *interiormente*, presenta tres prominencias en forma de cintas, y entre ellas, una serie de cavidades no ampollares.

B **COLON TRANSVERSO** — Va de la extremidad inferior del colon ascendente a la extremidad superior del colon descendente.

En este trayecto se eleva de derecha a izquierda y forma una curva de concavidad posterior, más o menos pronunciada (*arco del colon*). Está sujeto a la pared posterior por medio del mesocolon transversal.

Está en relación: *por arriba*, con el hígado (cara inferior), con el estómago (curvatura mayor) y con el bazo; *por abajo*, con las circunvoluciones del intestino delgado; *por delante*, con la pared abdominal., de la cual está separado por el epiplón mayor, *por detrás*, con el riñón derecho el duodeno, el páncreas y el riñón izquierdo.

C. COLON DESCENDENTE. — El límite inferior de este último corresponde a un plano horizontal que pasa por la cresta iliaca. El peritoneo se comporta con él aproximadamente de igual modo que con el colon ascendente (existencia o falta de un *mesocolon descendente*).

El colon descendente difiere del ascendente en que es más largo, más voluminoso está más profundamente situado en el abdomen, remonta más arriba sobre el riñón izquierdo y tiene relaciones más extensas con el cuadrado de los lomos.

D. COLON ILIOPÉLVICO. — Ocupa sucesivamente la fosa iliaca izquierda y una parte de la pelvis, de donde le viene el nombre de colon iliopélvico.

Sueto a la pared por un repliegue seroso extenso y flotante (*mesocolon iliopélvico*), es muy *móvil*. Describe el siguiente trayecto: 1.º, desciende verticalmente hasta el cuarto inferior de la fosa iliaca interna; 2.º, cruza más o menos transversalmente el psoas 3.º, atraviesa la pelvis de izquierda a derecha 4.º, va del borde derecho de la pelvis a la parte media de la tercera vértebra sacra.

El aspecto exterior del colon iliopélvico es muy parecido al de las demás porciones del colon, con la única diferencia de que las *cintas musculares* quedan aquí reducidas a dos y el órgano tiende cada vez más a convertirse en un cilindro regular, perdiendo poco a poco sus abolladuras.

Desde el punto de vista de sus relaciones, la *porción iliaca* corresponde: 1.ª, *por delante*, a la pared anterior del abdomen; 2.ª, *por detrás*, a la fascia iliaca, al psoas y los vasos ilíacos externos. La *porción pelviana* descansa sobre el espacio comprendido entre la vejiga y el recto, en la mujer está en contacto con el útero; lo está también con la masa flotante del intestino delgado.

2.º **Constitución anatómica.** — Al igual que el ciego, el colon comprende cuatro túnicas: *serosa, muscular, celulosa y mucosa*.

a) *Túnica serosa.* — En el colon ascendente, el peritoneo, según los casos, pasa directamente sobre el órgano o bien le forma un *mesocolon ascendente*. No existe, como se ha dicho, entre las hojas de este mesocolon, tejido conjuntivo laxo que permita al colon llegar

por distensión a ponerse en contacto con la pared sin interposición de serosa

a) El *mesocolon transverso* se inserta en la pared siguiendo una línea que va del riñón derecho al riñón izquierdo, pasando a nivel del borde inferior del cuerpo del páncreas. En sus dos extremidades, el mesocolon transverso presenta dos pequeños repliegues triangulares que se dirigen horizontalmente hacia la pared y se insertan en ella. Son éstos los ligamentos *frenocólico derecho* (*sustentaculum hepatis*) y *frenocólico izquierdo* (*sustentaculum lienis*).

β) El *mesocolon descendente* parece menos frecuente que el mesocolon ascendente.

γ) El *mesocolon ilio pélvico* tiene la forma de abanico. Su inserción parietal está representada por una línea varias veces acodada, que va de la fosita ilíaca izquierda a la concavidad del sacro, cruzando el psoas, los vasos ilíacos izquierdos y la última vértebra lumbar. Si se desvía hacia arriba el colon ilio pélvico, se descubre, a nivel de la arteria ilíaca primitiva izquierda, un orificio circular, que se continúa en una cavidad en fondo de saco: es la *fosita intersigmoidea*, de dirección ascendente.

b) *Túnica muscular*. — Presenta: 1.º, *fibras longitudinales* superficiales, condensadas primero en tres y luego en dos cintas, 2.º, *fibras circulares* profundas.

c) *Túnica celulosa*. — (Véase pág. 620.)

d) *Túnica mucosa*. — (Véase pág. 620.)

3.º **Vasos y nervios.** — Las *arterias* (*arterias cólicas*) proceden de la mesentérica superior (para el colon ascendente y la mitad derecha del colon transverso) y de la mesentérica inferior (para la mitad izquierda del colon transverso y el colon descendente). El colon ilio pélvico recibe *tres arterias sigmoideas* (izquierda, media y derecha).

Las *venas terminan*, por un trayecto inverso al de las arterias, en las dos mesentéricas. Los *linfáticos* van a los ganglios del borde adherente del intestino. Los *nervios* vienen del plexo solar y acompañan a las arterias.

4. RECTO

El recto (de la palabra latina *rectus*, recto, porque es mucho menos flexuoso que el colon) es la porción terminal del intestino grueso.

1.° Consideraciones generales.— Su límite inferior corresponde a la *línea anorrectal*, que pasa por el borde superior de las válvulas semilunares, su límite superior corresponde al punto en que el conducto intestinal deja de poseer un meso, a la altura de la tercera vértebra sacra. Su *longitud* es, por término medio, de 12 a 14 centímetros. Aplanado en estado de vacuidad, adquiere, en estado de repleción, un calibre que puede llegar a ser igual al del ciego, este calibre alcanza su máximo por encima de la próstata, en donde se encuentra una dilatación en forma de ampolla, la *ampolla rectal*. La pared rectal es, por lo demás, muy extensible. El recto ocupa sucesivamente, la pelvis menor (*porción intrapélvica*) y el perineo posterior (*porción extrapélvica o perineal*). Está sujeto en posición por el peritoneo, por sus vasos, por formaciones conjuntivas especiales y por su adherencia a las hojas aponeuróticas del perineo. La *dirección* del recto varía según el punto en que se le considere: cóncavo hacia delante encima del cóccix, cóncavo hacia atrás por debajo de este hueso. Presenta, además, curvaturas laterales poco pronunciadas.

2.° Conformación exterior y relaciones.— Visto exteriormente, el recto se presenta como un conducto cilindrico, deprimido por los órganos que le rodean y con uno o dos surcos transversales, que se traducen al interior por válvulas incompletas. Sus *relaciones* difieren según se trate de la porción pelviana o de la perineal.

A. PORCIÓN PELVIANA. Se extiende desde la tercera vértebra sacra a la punta del cóccix.

a) *Por detrás*, el sacro y el cóccix (*en la línea media*), los músculos piramidales, el simpático y el plexo sacro (*a los lados*) se relacionan con la pared posterior del recto, del que los separa un tejido celular laxo, por el cual corren las arterias sacras.

b) *A los lados*, el recto está en relación con la serosa peritoneal y, más abajo, con una capa celulograsosa, la aponeurosis perineal superior o profunda, y el elevador del ano.

γ) *Por delante*, las relaciones del recto varían según se trate del hombre o de la mujer. *En el hombre* se encuentran, de arriba abajo, el fondo de saco rectovesical, el fondo de la vejiga, las vesículas seminales (aisladas por la aponeurosis prostatoperitoneal) y, finalmente, la cara posterior de la próstata. La distancia que separa el fondo de saco rectovesical del ano varía de 5 a 6 centímetros si se halla la vejiga en estado de vacuidad y de 7 a 8 centímetros cuando se encuentra distendida. *En la mujer*, el recto está en relación sucesivamente con el

fondo de saco rectovaginal o fondo de saco de Douglas y con la pared posterior de la vagina.

B. PORCIÓN PERINEAL. — Comprendida en el espesor del perineo, está en relación, por su parte inferior, con el esfínter externo. Su longitud es de 3 centímetros en el hombre y de 2,5 centímetros en la mujer. Está en relación:

a) *Por detrás*, con el elevador del ano y el esfínter.

β) *A los lados*, con el elevador y la fosa isquiorrectal.

γ) *Por delante*, las relaciones varían según se trate del hombre o de la mujer. En el hombre, con el vértice de la próstata, el bulbo uretral y la porción membranosa de la uretra, de la cual está separado por el *triángulo rectouretral*. En la mujer, con la pared posterior de la vagina, de la cual está separado por el *triángulo rectovaginal*.

C. VAINA CELULOVASCULAR DEL RECTO. — Las relaciones precedentes son sólo relaciones mediatas. El recto pelviano, particularmente, está alojado en una vaina celulovascular, en el seno de la cual se ramifican los vasos antes de penetrar en las paredes del recto: esta vaina, por los lados, emite dos prolongaciones dispuestas en sentido frontal, que contienen en su espesor los vasos hemorroidales medios (*hojas laterorrectales*).

3.º Conformación interior. — El recto, en su interior, presenta dos especies de válvulas (*válvulas de Houston*) de dimensiones y número muy variables, una de ellas es bastante visible en el lado derecho del recto; es la *válvula de Kohlreusch*. Estas válvulas corresponden al adosamiento de la mucosa y de las fibras circulares. En la parte inferior del recto hay una serie de repliegues curvilíneos, de concavidad dirigida hacia arriba: las *válvulas semilunares de Morgagni*. Su número es de cinco a ocho; su profundidad no pasa de 3 a 4 milímetros. Están separadas entre sí por eminencias longitudinales: son las *columnas de Morgagni*.

4.º Constitución anatómica. — El recto se compone también de cuatro túnicas superpuestas: *serosa, muscular, celulosa y mucosa*.

a) *Túnica serosa.* — Está formada por el peritoneo y se halla en relación con la parte anterior y superior del recto solamente; se refleja, lateralmente, sobre los órganos vecinos, siguiendo una línea en forma de herradura oblicua hacia abajo y adelante.

b) *Túnica muscular.* — Comprende dos capas: una superficial, longitudinal, y otra profunda, circular.

a) Las *fibras longitudinales* resultan de la expansión en forma de anchos abanicos (uno anterior, otro posterior) de las fajas del colon ilioapélico. Al llegar a la parte inferior del recto, las *fibras superficiales* terminan en la aponeurosis perineal superior; las *fibras medias*, en una lámina fibrosa, que da, por otra parte, inserción al elevador, las *fibras profundas* van a fijarse a la piel del ano. A nivel del perineo, las fibras longitudinales son reforzadas por fibras procedentes del elevador, del músculo rectococcigeo y de la capa longitudinal de la uretra.

B) Las *fibras circulares* constituyen debajo de la ampolla una especie de anillo muscular, el *esfínter interno*, cuyo espesor mide de 5 a 6 milímetros, y la altura, de 4 a 5 centímetros, y que inferiormente esta en relación con la piel del ano.

c) *Túnica submucosa*. — No ofrece nada especial.

d) *Túnica mucosa*. — Se diferencia de la mucosa del colon por la presencia de formaciones especiales (*válvulas semilunares* y *columnas de Morgagni*), por el desarrollo de sus glándulas en tubos, por su menor adherencia a la túnica muscular y por el desarrollo considerable de su sistema nervioso.

5.º **Vasos y nervios.** — Las *arterias* se dividen en: 1.º, *hemorroidales superiores* (bifurcación de la mesentérica superior); 2.º, *hemorroidales medias* (procedentes de la iliaca interna); 3.º, *hemorroidales inferiores* (ramas de la pudenda interna), que distribuyen de arriba abajo la irrigación del recto. Es preciso añadir algunos ramos procedentes de la sacra media. Las *venas* forman, en el espesor de la capa celulosa, un rico plexo, el *plexo hemorroidal*, que a nivel de las válvulas semilunares presenta múltiples dilataciones ampollares, hemorroides iniciales. De ellas nacen ramúsculos que se deslizan de abajo arriba por debajo de la mucosa, perforan la túnica muscular para alcanzar la cara posterior del recto y terminan, finalmente, en la vena mesentérica inferior. Éstas son las *venas hemorroidales superiores*. Las venas procedentes de la parte inferior del recto constituyen el *sistema periesfínteriano*, o *venas hemorroidales inferiores*, van a la vena pudenda interna. Algunos ramos procedentes de la región de la ampolla terminan, con el nombre de *venas hemorroidales medias*, en la vena hipogástrica. Nótese que el sistema ascendente de las hemorroidales superiores y el sistema transversal de las hemorroidales inferiores comunican entre sí por una serie de anastomosis *supra*, *trans* y *subesfínterianas*. Los *linfáticos* van en parte a los ganglios presacros.

en parte a los ganglios superficiales de la ingle. Los nervios proceden de los nervios y ganglios hipogástricos y del plexo sacro (nervio hemorroidal inferior). Terminan en el recto de modo análogo al de los nervios del intestino delgado.

ARTÍCULO VII

ANO

El ano es el conducto, de 15 a 20 milímetros de altura, en que termina inferiormente el tubo digestivo.

1.º **Situación y límites.** — Está situado en el surco interglúteo, a 20 ó 25 milímetros por delante del cóccix (rótense que en la mujer es a la vez más superficial y algo más anterior que en el hombre) Limitado *hacia arriba* por una línea que pasa por el borde libre de las válvulas semilunares (*línea anorrectal*), lo está *hacia abajo* por una línea situada a 15 ó 20 milímetros por debajo de la precedente (*línea anoperineal*).

2.º **Conformación exterior e interior.** — El ano en estado de reposo queda reducido a una hendidura o a un simple punto. De su contorno o circunferencia parten cierto número de pliegues, *pliegues radiados del ano*, que se borran por la distensión. La piel que rodea el orificio anal (*margen del ano*) es delgada, colorada, húmeda y desprovista de pelos. Visto interiormente, el ano presenta, por encima de las válvulas semilunares, la *zona mucosa supraanal* o *zona intermedia*, territorio de transición entre el revestimiento del ano y la mucosa rectal propiamente dicha.

3.º **Constitución anatómica.** — El ano se compone esencialmente de un *aparato muscular*, tapizado por dentro por un *revestimiento cutáneo especial*.

a) *Aparato muscular.* Está constituido por el *esfínter interno*, el *esfínter externo* y *fibras longitudinales*, de las cuales unas pasan entre los esfínteres, y las otras se alojan en el propio espesor de los esfínteres, para venir a insertarse en la cara profunda de la piel. A este dispositivo se añade, para reforzarlo, cierto número de diferentes fibras musculares, que constituyen los *músculos retractor del ano* y *rectouretral*.

3) *Revestimiento cutáneo.* — El revestimiento cutáneo del ano es una *piel modificada*, que se diferencia de la piel ordinaria en que es más delgada, menos rica en papilas y completamente desprovista de pelos y glándulas (véanse los tratados de Histología).

4.° *Vasos y nervios.* — Las *arterias* del ano proceden de la hemorroidal inferior, rama de la pudenda interna. Las *venas* se confunden con las venas inferiores del recto. Los *linfáticos*, muy numerosos, terminan en tres o cuatro grandes troncos laterales, que van a los ganglios inguinales superficiales (grupo superointerno e inferointerno). Los *nervios* provienen del plexo sacro (nervio hemorroidal o anal) y del plexo hipogástrico. Se dividen en *motores* (para los músculos) y *sensitivos* (para el revestimiento cutáneo). Nótese en la región del ano la existencia de algunos corpúsculos de Pacini (PILLET).

CAPITULO II

ANEXOS DEL TUBO DIGESTIVO

Algunas glándulas se desarrollan en el trayecto del tubo digestivo y vierten en su cavidad líquidos especiales destinados a coadyuvar al proceso de asimilación de las sustancias alimenticias. Son las *glándulas salivales*, el *higado* y el *páncreas*. A estos órganos, francamente glandulares, añadiremos el *bazo*, cuyo desarrollo se halla relacionado íntimamente con el del tubo digestivo.

ARTICULO PRIMERO

GLANDULAS SALIVALES

Las glándulas salivales son de dos clases. unas, muy pequeñas, han sido estudiadas bajo el nombre de *glándulas labiales, molares, palatinas*; las otras están dispuestas alrededor de la cavidad bucal formando una especie de herradura pegada al maxilar inferior. Se las distingue, según su situación, en *parótidas, submaxilares y sublinguales*.

1. GLÁNDULA PARÓTIDA

Es la más voluminosa de las glándulas salivales; está situada detrás de la rama del maxilar inferior en una excavación profunda: *cavidad o excavación parotídea*

1° **Cavidad parotídea.** Está circunscrita por un revestimiento celular

Esta aponeurosis, o mejor esta capsula, moldeada sobre el tejido glandular y adherente al mismo, se halla en contacto por fuera con la aponeurosis cervical superficial por detrás con la aponeurosis prevertebral, por dentro en el alón faríngeo y paquete vascular (carótida

interna y yugular interna) La cápsula, gruesa por fuera y por abajo, es delgada por dentro; a este nivel, el tejido glandular parece hallarse directamente en contacto con la faringe (*prolongación faríngea de la parótida*).

La cápsula está además perforada en su parte inferior por la carótida externa y la yugular externa.

2.º Glándula parótida. La glándula parótida, revestida de su cápsula, se halla alojada en una excavación vertical, prismática, que presenta por lo tanto tres caras y dos bases. La *cara externa* o cutánea forma el orificio del compartimiento; éste está limitado por delante por el borde de la mandíbula, hacia atrás por las mastoides y el esternocleidomastoideo. La *cara anterior* corresponde al borde de la mandíbula y a los músculos masetero y pterigoideo interno. La *cara posterior* está formada por el vientre posterior del digástrico, los músculos y los ligamentos que se insertan en la apófisis estiloides.

La *base inferior* está constituida por la *cintilla maxilar*.

La *base superior* corresponde al conducto auditivo externo y a la vertiente posterior de la articulación temporomaxilar.

3.º Relaciones. - La glándula parótida llena por sí sola la cavidad antes descrita. Su *forma* es aproximadamente la de un prisma triangular. Su *peso* varía entre 25 y 50 gramos. Es de color grisáceo, de consistencia escasa y de aspecto lobulado. Presenta *relaciones exteriores y relaciones interiores*.

A. RELACIONES EXTERIORES. — Se consideran en la parótida (por razón de su forma) *tres caras, tres bordes y dos extremidades*.

a) *Caras* — Se dividen en externa, anterior y posterior. La *cara externa* está cubierta por la piel, el tejido celular subcutáneo, la aponeurosis superficial y algunas fibras del risorio de Santorini. La *cara posterior* entra sucesivamente en contacto con la apófisis mastoides, la apófisis estiloides y los músculos que se desprenden de la misma. La *cara anterior* abraza, a modo de conducto, el borde posterior del maxilar, del cual la separa una capa de tejido conjuntivo laxo. Por dentro del maxilar corresponde al músculo pterigoideo interno.

b) *Bordes* — Son el posterior, anterior e interno. El *borde posterior* está en relación con la apófisis mastoides y el esternocleidomastoideo. El *borde anterior* se extiende sobre la cara externa del masetero, nótese la *prolongación anterior o geniana*. El *borde interno* está en relación con la apófisis estiloides y el paquete vasculonervioso del

cuello (carótidas, yugulares y 9.º, 10.º, 11.º y 12.º nervios craneales), nótese la *prolongación interna o faríngea* (casi constante, de siete a ocho veces cada diez).

c) *Extremidades* — Son dos y se distinguen en superior e inferior. La *extremidad superior* está en relación con el conducto auditivo externo y la articulación temporomaxilar. La *extremidad inferior* está separada de la glándula submaxilar por el *tabique submaxiloparotídeo* (porción de la aponeurosis cervical superficial), reforzado por algunos tractos fibrosos que van del esternocleidomastoideo al ángulo del maxilar.

B RELACIONES INTERIORES. — Las relaciones interiores de la parótida se refieren a los vasos y nervios que la atraviesan. La *carótida externa* penetra en la glándula por su cara antero-interna y a.canza, en pleno tejido glandular, el cuello del cóndilo. Durante este trayecto da la auricular posterior y se divide luego en temporal superficial y maxilar interna. La *yugular externa* nace de la maxilar interna y de la temporal superficial, recibe la transversal de la cara y la auricular posterior y se desprende de la glándula en la mandíbula. En su trayecto intraglandular recibe de ordinario una anastomosis de la facial o de la yugular interna. Los *linfáticos* de la glándula terminan 1.º, en *ganglios profundos*, pegados a la carótida externa, 2.º, en *tres grupos ganglionares superficiales* (superior, anterior y posterior), situados debajo de la aponeurosis superficial. El *facial* emerge del agujero estilomastoideo y se divide en el espesor de la parótida. El *auriculo-temporal* atraviesa su parte superior y termina en la región temporal.

4.º *Conducto excretorio*. — El conducto excretorio de la parótida o *conducto de Sténon* está constituido por la reunión (por vía dicotómica o por vía colateral) de catorce a dieciséis conductos, que resumen las vías de excreción de los lóbulos. Emerge de la glándula en el punto de unión del tercio superior con los dos tercios inferiores del borde anterior, corre después sobre la cara externa del masetero, con la arteria transversal de la cara, rodea la bola grasosa de B.chat, sigue durante algún tiempo la cara externa del buccinador, lo perfora junto a los molares mayores se desliza debajo de la mucosa bucal y se abre finalmente en la boca por un estrecho orificio en forma de hendidura situado a nivel del segundo molar superior. En este trayecto (representado por una línea que fuese del tragus a la comisura bucal) se ve algunas veces junto al conducto un lóbulo glandular aislado, el *lóbulo accesorio de la parótida*.

5.º Constitución anatómica. — La parótida, glándula arracimada, está constituida por un número considerable de *acinos glandulares*, agrupados en *lóbulos primitivos* y en *lóbulos compuestos*, cuyo producto de secreción es evacuado por conductos que llevan sucesivamente los nombres de *conductos de Bell*, *conductos intralobulares*, *conductos lobulares*, y cuya desembocadura común es el *conducto de Sténon*. En cuanto a su naturaleza, las células glandulares pertenecen al tipo de las células serosas. (Para los detalles de estas formaciones, véanse los tratados de Histología.)

6.º Vasos y nervios. — Las arterias de la parótida proceden de la carótida externa y especialmente de las ramas que esta arteria suministra a este nivel (auricular posterior y transversal de la cara). Las *venas* terminan en la yugular externa. Los *linfáticos* van a los ganglios parotídeos, y de allí a los ganglios cervicales profundos. Los *nervios* los proporcionan el auriculotemporal, la rama auricular del plexo cervical y el simpático. Constituyen, en el interior de la glándula, *redes perilobulares* y *periacinosas*.

2. GLÁNDULA SUBMAXILAR

Ocupa, en la cara interna del maxilar inferior, un espacio comprendido entre el vientre anterior y el vientre posterior del digástrico: es la *cavidad submaxilar*.

1.º Cavidad o excavación submaxilar. — Está constituida por el desdoblamiento, a nivel del hueso hioides, de la aponeurosis cervical superficial. De las dos hojas de este desdoblamiento, la *profunda*, muy delgada, va a insertarse en la línea oblicua interna del maxilar inferior, tapizando la cara inferior de los músculos *hiogloso* y *milohiideo*, la *superficial*, más gruesa, va a insertarse en el borde inferior del maxilar.

2.º Glándula submaxilar propiamente dicha. — De color gris rosado y de un peso que varía entre 7 y 8 gramos, la glándula submaxilar tiene una forma prismática triangular y presenta, por consiguiente, *tres caras* y *dos extremidades*.

A CARAS. — Se dividen en externa, interna e inferior. La *cara externa* corresponde a la fosita submaxilar del maxilar inferior, de la cual la separan los vasos submentonianos y los ganglios submaxilares. La *cara interna* corresponde a una fosita cuyo borde inferior está re-

presentado por el digastrico y por el estilohioideo, y cuyo fondo corresponde al hiogloso y al milohioideo. Entre la glándula y el hiogloso pasan la *vena lingual* y el *hipogloso mayor*; la *arteria lingual* corre por la cara profunda del músculo. De esta cara interna se desprenden. 1.º, una *prolongación posterior*, que algunas veces entra en contacto con la extremidad inferior de la parótida; 2.º, una *prolongación anterior*, adelgazada, que acompaña al hipogloso en el intersticio comprendido entre el hiogloso y el milohioideo, para continuarse algunas veces en la glándula sublingual. Esta última prolongación puede quedar aislada y constituir una *glándula submaxilar accesoria*, o, mejor dicho, un *lobulo accesorio de la submaxilar*. La cara inferior de la glándula está en relación con la piel, de la cual la separan la aponeurosis superficial, el cutáneo y, finalmente, el tejido celular subcutáneo.

B. EXTREMIDADES. De las dos extremidades, una es anterior y la otra posterior. La *extremidad anterior* descansa sobre el milohioideo. La *extremidad posterior*, separada de la parótida por el tabique submaxiloparotideo, está rodeada por la *arteria facial*, que cruza de abajo arriba su cara interna y se junta, a nivel de su borde superior, con la *vena facial*, para hacerse, como ésta, superficial.

3.º Conducto excretorio. — El conducto excretorio de la glándula maxilar, o *conducto de Wharton* (4 ó 5 centímetros de longitud por 2 ó 3 milímetros de diámetro), nace en la parte media de su cara interna. Corre al principio por la cara externa del hiogloso; después, cruzado por la *arteria sublingual* y el *nervio lingual*, que pasan por su lado externo, se desliza entre la cara interna de la sublingual por fuera, los músculos geniogloso y lingual inferior por dentro. Se adosa, en la línea media, a su homólogo del lado opuesto, se desliza debajo de la mucosa bucal y va, finalmente, a abrirse a los lados del frenillo de la lengua, en el vértice de un tubérculo (*ostium umbilicale*).

4.º Constitución anatómica. — La submaxilar está constituida bajo el mismo tipo fundamental de la parótida y no insistiremos, por lo tanto, sobre este particular. Difiere de ella, sin embargo, en que sus células secretorias pertenecen a dos tipos: el *tipo seroso* y el *tipo mucoso*. De los ácinos que constituyen la glándula, unos son serosos otros mucosos y otros mixtos (véanse los tratados de Histología). En cuanto al *conducto de Wharton*, su constitución difiere de la del conducto de Sténon en que posee *elementos musculares* que no tiene este último.

5.° Vasos y nervios. — Las *arterias* de la glándula submaxilar vienen de la *facial* y de la *submentoniana*. Las *venas* van a las venas submentoniana y facial. Los *linfáticos* van a los ganglios submaxilares y luego a los cervicales profundos. Los *nervios* provienen, por medio del ganglio submaxilar, del *lingual mixto* (lengua y cuerda del tímpano reunidos)

3. GLÁNDULA SUBLINGUAL

Es la más pequeña de las glándulas salivales y está situada en el suelo de la boca, a cada lado del frenillo de la lengua. Su peso es aproximadamente de 3 gramos

1.° Conformación exterior y relaciones. — Tiene la forma de una oliva, aplanada en sentido transversal y con el eje mayor de dirección anteroposterior. Se consideran en ella *dos caras, dos bordes y dos extremidades*. Su *cara externa* se amolda a la fosita sublingual del maxilar inferior. Su *cara interna* está en relación con los músculos lingual inferior y genioglosa, de los cuales la separan el conducto de Wharton, el nervio lingual y la vena ranina. Su *borde inferior* descansa sobre el espacio angular que forman al separarse los músculos milohioideo y genioglosa. Su *borde superior*, más grueso, levanta la mucosa bucal, formando a cada lado del frenillo las *carúnculas sublinguales*. Su *extremidad posterior* se adhiere a la prolongación anterior del submaxilar. Su *extremidad anterior* está en relación con la apófisis geni

2.° Conductos excretorios. — Son múltiples y su disposición ofrece la mayor variedad. Se describen por lo general,

a) Un *conducto principal, conducto de Rivinus o conducto de Bartholin*, que se adosa al conducto de Wharton y va a abrirse en el suelo bucal, algo por fuera de. ostium umbilical.

b) *Conductos accesorios* (cuatro o cinco) que corresponden a simples granos glandulares irregularmente dispuestos alrededor de la glándula principal (*glándulas sublinguales accesorias*), *conductos de Walther*, que se abren aisladamente en el suelo bucal, a nivel de la carúncula sublingual.

3.° Constitución anatómica. — La sublingual, *glándula mixta*, presenta una estructura fundamental muy análoga a la glándula submaxilar (véanse los tratados de Histología).

4.º Vasos y nervios. — Las *arterias* provienen de la lingual y la submentoniana. Las *venas* van a la vena ramina, y de allí, a la yugular externa. Los *linfáticos* van a los ganglios submaxilares. Los *nervios* tienen el mismo origen que los de la glándula submaxilar.

ARTÍCULO II

HIGADO

El hígado es la más voluminosa de las vísceras y desempeña la doble función de secretar la *bilis* y de elaborar *glucógeno*.

1.º Consideraciones generales. — El hígado está situado en la parte superior del abdomen, debajo del diafragma, encima del estómago y de la masa intestinal.

Se mantiene en esta posición gracias a los siguientes *medios de fijación*: 1.º, la *vena cava inferior*, a la cual está sólidamente unido por las venas suprahepáticas, 2.º, el cordón fibroso, que con el nombre de *ligamento redondo del hígado* reemplaza en el adulto la vena umbilical del feto; 3.º, repliegues peritoneales, que constituyen los *ligamentos del hígado*. El conjunto de estos medios de fijación permite al hígado, por lo demás, cambios de postura o movimientos fisiológicos o patológicos bastante extensos.

El *peso* medio del hígado en el cadáver varía de 1.450 a 1.500 gramos. En el vivo, este peso aumenta por la cantidad de sangre contenida en el órgano (400 gramos aproximadamente) y varía según las condiciones en que se verifica la circulación hepática (influencia de la digestión, del embarazo y de las afecciones cardiovasculares).

Su *coloración* es rojoparda. Visto de cerca, parece estar constituido por una serie de granulillos de diferente color en su centro y en su periferia (*lobulillos hepáticos*).

Su *consistencia* es bastante dura, sin embargo, se *amolda* regularmente a los órganos vecinos y presenta una friabilidad muy notable.

2.º Conformación exterior y relaciones. — El hígado puede ser comparado a un ovoide, de eje mayor transversal y con su extremidad mayor dirigida a la derecha, del cual se hubiera separado por medio de una sección oblicua la porción inferior izquierda. Se pueden considerar en él dos caras, dos bordes y dos extremidades.

a) *Cara anteroposterior.* Limitada por los bordes y las extremidades, constituye una superficie convexa, en la cual se inserta el ligamento suspensorio; esta inserción forma el límite de los dos lóbulos, *derecho e izquierdo*. Esta cara está en relación, en toda su extensión, con el diafragma y, por medio de éste, con el corazón y las pleuras. Se pone en contacto con la pared abdominal a nivel de la región epigástrica. *Por arriba*, la cara superior del hígado remonta hasta la quinta costilla derecha en la espiración, *por abajo*, no excede el reborde de las costillas falsas. En la inspiración rebasa estas costillas en una medida variable.

b) *Cara posteroinferior* — Mira oblicuamente abajo y a la izquierda; es comúnmente cóncava.

Presenta dos surcos anteroposteriores: uno, izquierdo, el *surco de la vena umbilical y del conducto venoso*, el otro, derecho, el *surco de la vesícula biliar y de la vena cava*. Un surco transversal los une, es el *surco transverso*, algunas veces incompleto a causa de un puente de sustancia hepática. El *surco de la vena umbilical* aloja, en su mitad anterior, la vena umbilical del feto y el cordón fibroso que la reemplaza en el adulto, su mitad posterior está ocupada por un cordón fibroso, *desugio del conducto de Arancio* (que va, en el feto, de la rama izquierda de la vena porta a la vena cava inferior). El *surco de la vesícula biliar* comprende: 1º, una porción anterior, *ovilde la fonsa cística*, en la cual se aloja la vesícula biliar; 2º, una parte posterior profundamente excavada, ocupada por la vena cava. El *surco transverso* va del surco izquierdo al surco derecho. Invade este último y se prolonga sobre el lóbulo derecho de la cara inferior. Todos los conductos, vasos y nervios que van al hígado o salen del mismo se hunden en el surco transverso, que de este modo se convierte en el *hilio del hígado*.

Los surcos precedentes dividen la cara inferior del hígado en cuatro lóbulos. El *lóbulo cuadrado (eminencia porta anterior)*, más o menos abombado, está por delante del surco transverso. El *lóbulo de Spiegel (eminencia posterior)* está por detrás de este surco. Más extenso que el precedente, presenta dos prolongaciones: una, *posterior*, pasa por detrás de la vena cava y le forma un semiconducto y aun algunas veces un conducto completo; la otra, *anterior (colliculus caudatus de Haller)*, se introduce entre la vena cava y la vena porta, para alcanzar el lóbulo derecho. El *lóbulo derecho* comprende toda la porción de la cara inferior situada por fuera del surco de la vesícula. Presenta, de delante atrás, tres *facetas o impresiones* una anterior,

colica, otra *media*, *renal*, y la otra *posterior*, *suprarrenal*. El *lóbulo izquierdo* (situado a la izquierda del surco de la vena umbilical) es triangular y cóncavo (*faceta o impresión gástrica*).

c) *Borde anterior*.—Delgado, cortante está en relación, de derecha a izquierda, con las falsas costillas derechas, el hueco epigástrico y la sexta y séptima costillas izquierdas. Presenta dos *escotaduras*: una, próxima a la línea media, corresponde a la inserción del ligamento suspensorio; la otra, situada a la izquierda, está ocupada por la vesícula biliar.

d) *Borde posterior*.—Va haciéndose más delgado de derecha a izquierda y está en relación sucesivamente con el diafragma (al cual lo une un tejido conjuntivo laxo), con la columna vertebral, que termina en él una *escotadura* a nivel de la cual el hígado se pone en contacto con la aorta, la vena cava y el esófago. A nivel del borde posterior se inserta el *ligamento coronario*.

e) *Extremidad derecha*.—Voluminosa, convexa, lisa, corresponde a la inserción del *ligamento triangular derecho*.

f) *Extremidad izquierda*.—Delgada y aplanada, se extiende sobre la *tuberosidad mayor* del estómago; está sujeta al diafragma por el *ligamento triangular izquierdo*.

3.º **Constitución anatómica.**—El hígado, desde el punto de vista de su constitución anatómica, ofrece a nuestra consideración. 1.º, *cubiertas*; 2.º, un *tejido propio*; 3.º, *conductos excretores*.

A. **ENVOLTURAS.**—Se reducen a una cubierta superficial, *serosa*, que tapiza una cubierta profunda, *fibrosa*.

a) *Envoltura serosa*. El peritoneo, que cubre el hígado en la mayor parte de su extensión, forma, además, algunos *pliegues o ligamentos*, tales como el ligamento suspensorio, el ligamento coronario y el epiplón gastrohepático.

a) El *ligamento suspensorio* o *ligamento falciforme del peritoneo* es una lámina delgada, de dirección anteroposterior; sagital cuando el hígado está deprimido, gira (de tal modo que su cara derecha se hace inferior, cuando el hígado ocupa su sitio. Su *borde superior*, convexo, corresponde al diafragma. Su *borde inferior*, cóncavo, se inserta en la cara superior del hígado, siguiendo aproximadamente una línea que desde la extremidad anterior del surco de la vena umbilical fuese a la vena cava inferior. Su *extremidad anterior*, libre, redondeada, aloja la vena umbilical del feto y el cordón que la reemplaza en el adulto; obtusa, está en relación con la vena cava. Este ligamento

está constituido por el adosamiento de las dos hojas peritoneales, que se separan, arriba, para tapizar el diafragma, y abajo, para extenderse sobre el hígado.

β) El *ligamento coronario* es transversal y se extiende desde el borde posterior del hígado al diafragma. Comprende dos hojas que proceden respectivamente de las caras superior e inferior del órgano, para reflejarse por una parte sobre el diafragma y por otra sobre la pared posterior del abdomen. Estas dos hojas permanecen separadas en su región media (vena cava), se adosan a derecha e izquierda de esta vena y constituyen en las extremidades derecha e izquierda de la glándula, dos láminas triangulares horizontales: el *ligamento triangular derecho* y el *ligamento triangular izquierdo*.

γ) El *epiplón gastrohepático* o *epiplón menor* es una hoja serosa que une la curvatura menor del estómago y la primera porción del duodeno, va al surco transversal del hígado y a la parte del surco de la vena umbilical y del conducto venoso situada detrás del surco transversal. Por abajo, las dos hojas que constituyen el epiplón menor se separan, para extenderse sobre las dos caras del estómago. Por arriba, se separan igualmente para tapizar la cara inferior del hígado, formando una especie de puente sobre los órganos alojados en los surcos de dicha cara inferior (vena umbilical, vena cava y vejiga biliar).

δ) Desde la cara inferior del hígado, el peritoneo, pasando sobre el riñón y el colon, se levanta, constituyendo dos ligamentos (no constantes), el *ligamento hepatorenal* y el *hepatocólico*.

b) *Cubierta fibrosa* — La envoltura fibrosa del hígado, o *capa de Glisson*, es una membrana delgada, transparente, que rodea primeramente el hígado y luego envía al interior de la glándula una serie de prolongaciones tubulares íntimamente unidas al parénquima: cada una de ellas contiene un conducto biliar, una arteriola hepática y una ramificación de la vena porta, sumergidas en una ganga de tejido conjuntivo laxo bastante abundante.

B. *Tejido propio del hígado*. — El hígado es un compuesto de elementos glandulares simples, cada uno de los cuales es un hígado minúsculo: el *lobulillo hepático*.

El lobulillo hepático es un ovoide con carillas, de 1,5 a 2 milímetros de longitud aproximadamente, una de cuyas extremidades, más voluminosa, o *base*, es libre y la otra, *vértice*, deja escapar un vaso venoso que recorre el lobulillo en toda su extensión. En el lobulillo, la vena en cuestión ha recibido el nombre de *vena intralobulillar*, al salir del lobulillo toma el de *vena supralobulillar*.

Los lobulillos, muy numerosos, se amontonan unos junto a otros, y a causa de su poliedrismo, determinan al corte, a nivel del punto en que tres lobulillos se ponen en contacto, un espacio prismático triangular. llámase *espacio de Kiernan* o *espacio porta*, y se prolonga entre las caras de los lobulillos bajo la forma de fisura, las *fisuras de Kiernan*. Tanto los espacios como las fisuras están rellenos de tejido conjuntivo poco denso.

El lobulillo comprende diversos elementos histológicos: *vasos*, *elementos celulares* (*células hepáticas*), *conductos excretorios* y *tejido conjuntivo intralobulillar* (véanse, para la descripción de estos elementos, los tratados de Histología)

4° **Vasos y nervios.** — El hígado presenta *dos clases de vasos*: unos *aferentes*, arteria hepática y vena porta; otros *eferentes*, venas suprahepáticas y vasos linfáticos

a) *Vena porta.* — Constituida por la unión de las venas mesentérica y esplénica, recorre el epiplón gastrohepático en compañía de la arteria hepática, que corre sobre su cara anterior, y del conducto coledoco, que ocupa su lado externo. Al llegar al hilio, la vena porta se divide en dos ramas: 1.ª, una *rama derecha* (engrosada con la vena cística), que es corta y cuyas ramas penetran en el lóbulo derecho y mitad derecha de los lóbulos cuadrado y de Spiegel; 2.ª, una *rama izquierda*, más larga, en la cual se inserta, por delante, el vestigio fibroso de la vena umbilical del feto. Ambas ramas, derecha e izquierda, ocupan la pared profunda del surco transversal

Las ramas secundarias de la vena porta recorren las vainas tubulosas que suministra al hígado la cápsula de Glisson. Estas ramas dan origen a *ramas de segundo orden*, de un modo singular, pues vasos de un volumen muy diferente nacen unos al lado de otros de un mismo tronco venoso. Reciben en pleno hígado afluentes de dos especies: *venas capsulares* (venas procedentes de la cápsula de Glisson) y *venas vasculares* (nacidas en los conductos biliares y en los gruesos troncos arteriales y venosos)

Las últimas ramificaciones de la vena porta son las *venas interlobulillares*, que avanzan entre los lobulillos. se dividen cada una en cinco o seis venillas, que se pierden en los lobulillos.

Debemos referir a la vena porta otros grupos vasculares, que, bajo el nombre de *venas portas accesorias*, llevan al hígado sangre venosa. Estos grupos son los siguientes: *grupo gastrohepático* (que viene del epiplón menor), *grupo cístico*, *grupo diafragmático*, *grupo*

paraumbilical (venillas de la pared abdominal que se dirigen al hígado siguiendo el cordón fibroso de la vena umbilical)

b) *Arteria hepática* — La arteria hepática nace del tronco celíaco. Su trayecto comprende dos segmentos: el primero, horizontal, se extiende desde el tronco celíaco hasta el origen de la gastroduodenal (3 centímetros); el segundo, ascendente, termina en el hilio del hígado.

En el primer segmento, la hepática, adosada al principio al pilar derecho del diafragma, pasa por el costado izquierdo de la vena cava inferior y levanta el peritoneo parietal formando la *hoz de la arteria hepática*. Este pliegue se opone al de la coronaria situada por encima de él (abertura del *foramen bursae omentalis*). Después de haber estado en contacto con el borde superior del páncreas, la arteria hepática se endereza.

En el segundo segmento, ascendente, la arteria camina por la cara anterior de la vena porta, a la izquierda del colédoco, en el borde libre del epiplón menor.

Después de haber despedido una arteria pancreática superior derecha y ramas duodenales, emite la arteria gastroduodenal, destinada al estómago, el duodeno y el páncreas. En el epiplón menor, la arteria hepática desprende la arteria pilórica.

Llegada a nivel del hilio, la arteria se divide en dos ramas terminales. La rama derecha, la más voluminosa, da la *arteria cística*, que aparece en el área triangular formada por la reunión del conducto hepático y el conducto cístico y arriba el hígado. La rama izquierda sube por delante de la bifurcación izquierda de la vena porta, a la izquierda de la porción inicial del conducto hepático.

Las dos ramas penetran en el hígado y ambas se ramifican y emiten ramas que, en compañía de un ramo de la vena porta, un conducto biliar, ocupan las vainas tubulosas de la cápsula de Glisson. Las últimas ramificaciones se desvanecen en ramos muy tensos, para los conductos vasculares, para los troncos vasculares, para la cápsula (a la que proporcionan una verdadera red) y para los lóbulos hepáticos (*arterias interlobulares*). Existen *arterias hepáticas accesorias*, que no son sino arteriolas procedentes de la coronaria, la mamaria interna y las diafragmáticas accesorias.

c) *Vena umbilical* — En el feto, sus funciones son llevar al hígado y a la vena cava inferior la sangre arterial recogida en las redes placentarias. Viene del ombligo y sigue el ligamento suspensorio, alcanza el surco transversal y suministra numerosas colaterales ter-

minales: 1.º, el *conducto de comunicación con la vena porta*, rico en colaterales. 2.º, el *conducto de Arancio*, que se une a la vena cava inferior. En el adulto, la vena umbilical y el conducto de Arancio se transforman en cordones fibrosos. el conducto de comunicación con la vena porta se convierte en rama izquierda de la vena porta.

d) *Venas hepáticas o suprahepáticas*. — Nacen de la confluencia de las *venas intralobulillares*, que se han convertido en *supralobulillares* y finalmente en *suprahepáticas*. Igual irregularidad de ramificaciones que la que observamos en la vena porta, siendo el modo colateral el más frecuente. Formadas de este modo, las venas suprahepáticas se dirigen hacia el canal que en el borde posterior del hígado aloja la vena cava inferior, formando dos grupos: 1.º, un *grupo superior* de dos venas voluminosas, una derecha y otra izquierda; 2.º, un *grupo inferior*, de diez a quince vasos mucho más pequeños. Al igual que las ramas de la vena porta, las venas suprahepáticas no presentan ni válvulas ni anastomosis. Difieren de ellas 1.º, en que corren, lo más a menudo, nguiendo una dirección anteroposterior, por fuera de la vaina de Glisson, en pleno tejido hepático, 2.º, en que poseen una túnica muscular mucho más espesa.

e) *Linfáticos* — Unos, *superficiales*, constituyen debajo de la serosa una rica red y terminan en el conducto torácico, en los ganglios supradiaphragmáticos y en los ganglios del hilio. Otros, *profundos*, van a los ganglios del hilio siguiendo las ramificaciones de la vena porta o bien acompañando a las venas suprahepáticas, para terminar finalmente en los ganglios supradiaphragmáticos.

f) *Nervios* — Los nervios provienen del neumogástrico izquierdo y el plexo solar. Forman dos plexos, uno anterior y otro posterior. El *plexo hepático anterior* sube hasta el epiplón menor, por delante de la vena porta, a la izquierda de las vías biliares. En el curso de su trayecto emite los nervios pilóricos. Más arriba proporciona uno o dos filetes a la vesícula (nervios internos de la vesícula). Antes de penetrar en el hígado, el plexo emite filetes delgados y cortos con destino a las vías biliares. El *plexo posterior* está formado por tres o cuatro gruesos troncos procedentes del plexo celíaco. Cruza la cara posterior de la vena porta y luego pasa a la cara posterior de las vías biliares. Emite un ramo importante, el *nervio posterior del colédoco*, que se anastomosa con el plexo anterior. Más arriba emite el nervio externo de la vesícula.

El hígado recibe todavía del neumogástrico izquierdo un ramo nervioso, el *nervio gastrohepático*, que se anastomosa con el plexo

hepático anterior. Todos estos nervios penetran en el parénquima hepático.

5.º **Aparato excretorio de la bilis.** — La bilis corre sucesivamente por los conductos biliares intrahepáticos (*conductos biliares*), reducidos en el hilio a dos o tres conductos; luego, fuera del hígado, por un conducto único, del cual pende un reservorio especial (*vesícula biliar y conducto cístico*) y que lleva, por encima de la desembocadura de este último, el nombre de *conducto hepático*, y por debajo, el de *conducto colédoco*.

A. **CONDUCTOS BILIARES INTRAHEPÁTICOS.** — Procedentes de los lobulillos, se dirigen todos hacia el hilio (reuniéndose unos con otros, a manera de venas) y allí forman el *conducto hepático* (véanse los tratados de Histología).

B. **CONDUCTO HEPÁTICO.** — Nace, a nivel del hilio, de la reunión de dos o tres conductos biliares terminales y recorre el epiplón gastrohepático por delante y por fuera de la vena porta. Su *diámetro* es de 4 ó 5 milímetros; su *longitud*, de 3 centímetros por término medio, pero esta longitud es muy variable (desembocadura más o menos elevada del conducto cístico, confluencia más o menos pronta de los conductos biliares). En su origen cruza, por su cara anterior, la rama derecha de la arteria hepática y la rama derecha de la vena porta; continúa luego por el lado anteroexterno de la vena porta; el conducto cístico se adosa a su lado derecho antes de unirse a él. Está constituido por dos túnicas: una *túnica externa*, conjuntivomuscular; una *túnica interna*, mucosa, con epitelio cúbico.

C. **VESÍCULA BILIAR.** — Es un receptáculo membranoso, piriforme, con su eje mayor dirigido hacia abajo, adelante y a la derecha, adosado por el peritoneo en la fosita cística. Teniendo de 9 a 11 centímetros de longitud por 35 a 40 milímetros de anchura, su capacidad media es de 50 a 60 milímetros cúbicos (téngase en cuenta que, a causa de la extensibilidad de su pared, esta capacidad puede llegar a ser mayor).

a) **Conformación exterior y relaciones.** — Pueden distinguirse en ella:

a) El *fondo*, que corresponde a la escotadura cística del hígado, la cual rebasa para ir a ponerse en contacto con la pared anterior del abdomen (extremidad anterior del décimo cartílago costal derecho).

B) El *cuerpo*, cuya cara superior está unida por una capa conjuntiva a la cara inferior del hígado y cuya cara inferior está en

relación, según los casos, con el duodeno, el colon ascendente o el riñón derecho. Del cuerpo se desprende a veces un repliegue peritoneal que lo une al colon (*ligamento cisticocolico*).

y) El *cuello*, flexuoso y que recuerda con bastante exactitud la S itálica. Está limitado por dos surcos (superior e inferior), que lo separan del resto de la vesícula, por una parte, y del conducto cístico, por otra. Visto por su lado derecho, presenta un abultamiento (*pelvis de la vesícula*), al cual se opone, por su lado izquierdo, una escotadura donde se aloja el *ganglio cístico*. A esta escotadura corresponde interiormente una prominencia, el *promontorio*. Finalmente, la cavidad del *cuello* presenta de ordinario válvulas incompletas, constantes en sus extremidades. El *cuello* está en relación con la rama derecha de la vena porta, por abajo, descansa sobre la terminación de la primera porción del duodeno. Está contenido en el epiplón menor, en relación a este nivel con la división de la arteria cística en sus dos ramas interna y externa.

b) *Constitución anatómica*. — La vesícula biliar está formada, de fuera adentro: 1.º, por una *túnica serosa*, que cubre la vesícula en toda su extensión, a excepción de la cara superior del cuerpo, que está directamente en contacto con el hígado; el fondo, rodeado por el peritoneo en todo su contorno, está separado del hígado por un espacio angular, el *ángulo hepatocístico*; 2.º, por una *túnica fibrosa*, reforzada en su cara interna por una red de fibras musculares de manojos entrelazados; 3.º, por una *túnica mucosa*, que forma *pliegues* (de los cuales unos son *permanentes*, y los otros, *temporales*, desaparecen por la distensión) que limitan una serie de *aréolas*.

c) *Vasos y nervios*. — Las *arterias* de la vesícula vienen de la cística, la cual está dividida en dos ramos (*interno y externo*) constantemente anastomosados. Algunas de sus ramas (*ramas císticohepáticas*) van al parénquima hepático, y viceversa, la vesícula recibe ramas procedentes de las ramificaciones intrahepáticas de la arteria hepática (*ramas hepatocísticas*). Las *venas* de la cara libre van a la vena porta, las de la cara adherente se ramifican por la substancia hepática (*venas portas accesorias*). Los *linfáticos*, agrupados en las caras interna y externa, van en parte al ganglio cístico y en parte a los ganglios del surco transversal. Los *nervios*, emanados del plexo solar, acompañan a la arteria cística y constituyen en el espesor de la vesícula verdaderos plexos. Las fibrillas terminales son: 1.º, *motoras* (para la túnica muscular); 2.º, *sensitivas* (para la mucosa); 3.º, *vasomotoras* (para los vasos).

D CONDUCTO CÍSTICO. Continuación de la vesícula, se une al conducto hepático para constituir el conducto colédoco. Su longitud es aproximadamente de 30 a 45 milímetros; su diámetro mide de 3 a 4 milímetros; su calibre es irregular.

Avanza, por el epiplón gastrohepático, por delante y afuera de la vena porta; separado al principio del conducto hepático, se junta luego con él en ángulo agudo, y hasta se le ve adosarse al mismo en un trecho más o menos largo. Su forma es irregular flexuosa alternativamente estrechada y dilatada. Visto interiormente, presenta, sin embargo, en los segmentos estrechados, unas válvulas (*válvulas de Heister*), de forma semilunar más o menos pronunciada y que jamás se continúan unas con otras. Estas válvulas, más numerosas en la mitad superior del conducto, dificultan considerablemente el cateterismo del conducto desde la vesícula biliar.

La estructura, la vascularización y la enervación del conducto cístico recuerdan con bastante exactitud las de la vesícula.

E. CONDUCTO COLÉDOCO.— Es continuación a la vez de los conductos cístico y hepático. Se dirige oblicuamente abajo y adentro hacia el duodeno, pasa por detrás del mismo, encuentra la cabeza del páncreas y va a abrirse en el duodeno, en la parte posterointerna de su segunda porción. Comprende, pues, de este modo, cuatro segmentos, *supraduodenal* y *retroduodenal*, *pancreático* e *intraparietal*. El conjunto del conducto se presenta en forma de cavidad abierta hacia la derecha. Largo aproximadamente de 6 a 8 centímetros, su diámetro decrece de manera progresiva (de 13 a 6 milímetros). Es fácilmente dilatable (distensión por cálculos).

a) *Relaciones.*— La extremidad superior del colédoco, algo apartada de la línea media, corresponde a la parte superior de la primera lumbar; su extremidad inferior corresponde a la parte media de la tercera lumbar.

a) La *porción supraduodenal* es de longitud variable (adosamiento más o menos prolongado de los conductos cístico y hepático). Corresponde al borde libre del epiplón menor, aplicado delante del lado derecho de la vena porta, de la cual se separa más o menos en su parte inferior.

β) La *porción retroduodenal* corresponde: *por dentro*, a la vena porta; *por detrás*, a la lámina de Treitz, a la vena cava inferior y a algunos ganglios. Puede también estar en relación con el *tubérculo duodenal*, prolongación superior del páncreas. La arteria gastroduodenal y en particular una de sus ramas, la arteria pancreatoduodenal.

denal superior derecha, pasa por delante del colédoco; la arteria gastropiploica derecha queda a la izquierda del conducto.

γ) La *porción pancreática*, comprendida entre el semicírculo (o concavidad dirigida hacia la izquierda) que describen las tres primeras porciones del duodeno, recorre una especie de semiconducto que le forma la cabeza del páncreas.

δ) La *porción intraparietal* corresponde a la pared postero-interna de la segunda porción del duodeno; perfora oblicuamente las túnicas del intestino y desemboca en un receptáculo excavado en plena mucosa, la *ampolla de Vater*. Es esta ampolla una cavidad conoidea que está en relación con los orificios superpuestos de los conductos colédoco y pancreático. Su base está abrazada por un verdadero esfínter (esfínter de Oddi), su cúspide presenta un orificio redondeado; nótese en la superficie interior la presencia de pequeños repliegues valvulares. El relieve formado en la cavidad duodenal por la ampolla de Vater lleva el nombre de *carúncula mayor* de SANTORINI. La *carúncula menor*, formación análoga situada encima de la precedente, está en relación con el conducto excretorio accesorio del páncreas. Una válvula connivente cubre de ordinario la carúncula mayor, que un repliegue mucoso (*frenillo*) prolonga inferiormente sobre la pared duodenal.

b) *Constitución anatómica*. — El conducto colédoco se compone: 1.º, de una *túnica externa*, fibromuscular, más pronunciada hacia la ampolla; 2.º, de una *túnica interna*, mucosa (capa única de células cilíndricas de meseta estriada, mezcladas con algunas células caliciformes), provistas de criptas endoglandulares y de algunas raras glándulas tubulosas.

El esfínter de Oddi está en relación con el engrosamiento o condensación de las fibras circulares de la capa muscular.

c) *Vasos y nervios*. — El colédoco presenta, por lo que toca a sus vasos y nervios, una gran analogía con el conducto hepático. Las arterias proceden de la hepática. Las venas van a la vena porta. Los linfáticos terminan en los ganglios del hilio, del epipión menor y del páncreas. Los nervios emanan del plexo hepático.

ARTÍCULO III

PÁNCREAS

El páncreas es una glándula voluminosa anexa al duodeno y presenta una notable analogía con las glándulas salivales.

1.ª Consideraciones generales. — Está situado en el abdomen superior, algo a la izquierda de la línea media, detrás del estómago entre el bazo y el duodeno. La cabeza, enclavada en el asa duodenal, es la única parte fija del órgano. Su dirección es horizontal en su mitad derecha y oblicua hacia arriba y atrás en su mitad izquierda. Es ligeramente curvo y su concavidad mira hacia la columna vertebral. Su peso medio es de 70 gramos. Su coloración es de un blanco gris.

2.ª Conformación exterior y relaciones. — Se distinguen en el páncreas cuatro partes: *cabeza, istmo o cuello, cuerpo y cola*.

a) *Cabeza.* — La cabeza es el segmento más voluminoso del órgano. Ocupa el asa duodenal, prolongándose a la vez sobre la cara anterior y posterior del duodeno, en el espesor del cual se alojan cierto número de gránulos glandulares. La cara anterior está excavada inferiormente por un semiconducto vertical para los vasos mesentéricos superiores. Está cubierta por el peritoneo parietal, en el cual, a este nivel, se inserta el mesocolon transversal. La línea de inserción de este meso determina dos porciones: *supramesocólica* y *submesocólica*. La porción *supramesocólica* está en relación por medio de la trascavidad de los epíplones, con la cara posterior del estómago y del píloro. La porción *submesocólica* está en relación con las asas del intestino delgado. En la primera porción se nota el origen de la gastroepiploica derecha y la pancreatoduodenal inferior derecha; por debajo de la raíz del mesocolon circulan la arteria cólica superior derecha y las venas de la parte derecha del colon transversal y las asas del intestino delgado. La cara posterior, reforzada con la lámina de Treitz, presenta relaciones vasculares importantes. Además de las ramas arteriales y venosas de los vasos pancreatoduodenales aplicados contra el tejido pancreático, se ven en un primer plano los órganos siguientes: vena porta, terminación de la vena esplénica y de la mesentérica superior, arteria mesentérica superior, en un segundo plano, la vena cava inferior, las dos arterias y las dos venas renales, sobre todo la vena renal derecha. En su parte extrema inferior, la cabeza del páncreas emite una prolongación o apéndice retorcido en forma de voluta, que es el *processus uncinatus*.

b) *Istmo.* El istmo o cuello, muy aplanado de delante atrás, presenta en su cara posterior un semiconducto destinado a la vena mesentérica inferior y a la vena porta que la continúa. La cara anterior corresponde a la cavidad posterior de los epíplones. El borde superior presenta una escotadura, la *escotadura duodenal superior*, y una pro-

minencia, el *tuber omentale*; está en relación con la arteria hepática y la vena porta. El *borde inferior* cubre los vasos mesentéricos superiores, que a su paso determinan una especie de escotadura, la *escotadura duodenal inferior*.

c) *Cuerpo*.— El cuerpo corresponde a la primera y segunda lumbares. Su *cara posterior* está en relación, de derecha a izquierda, con la aorta, la mesentérica inferior, la cápsula suprarrenal y el riñón izquierdo. La *cara anterior* es cruzada oblicuamente por el ángulo duodenoyeyunal y corresponde en todos sus puntos a la cara posterior del estómago, la cual determina en ella una verdadera marca o impresión, la *impresión gástrica*. El *borde superior* se pone en contacto con el tronco celíaco en la línea media, y lateralmente con el pilar izquierdo del diafragma, el riñón y la cápsula suprarrenal izquierdos. Va acompañado de una vena esplénica, que a este nivel se labra un verdadero semiconducto, y de la arteria esplénica, más elevada y más flexuosa. El *borde inferior*, más grueso que el precedente, corresponde a la inserción del mesocolon transversal.

d) *Cola*.— La cola, afilada y redondeada según los individuos, entra en contacto con el hilio del bazo o está unida al mismo por un repliegue peritoneal, en cuyo espesor se alojan los vasos esplénicos es el *epiplón pancreaticoesplénico*.

3° **Aparato excretorio**.— Está constituido por dos conductos: un *conducto principal* (*conducto de Wirsung*) y un *conducto accesorio*

a) El *conducto de Wirsung* se extiende de una a otra extremidad del órgano, cuyo eje ocupa. A nivel de la cabeza, tuerce hacia abajo, y atrás, se pone en contacto con el *conducto colédoco* y va a abrirse junto con éste en la *ampolla de Vater*, para verter su producto en el duodeno por la *carúncula mayor* de SANTORINI.

β) El *conducto accesorio* toma su origen en la propia cavidad del conducto principal, a nivel del punto en que este último cambia de dirección; desde allí atraviesa la cabeza del páncreas y va a desembocar en el duodeno, a nivel de un tubérculo cónico, la *carúncula menor* de SANTORINI. El diámetro de este conducto crece de derecha a izquierda y la circulación se verifica en el mismo sentido; es avalvular y puede ser considerado como una simple vía de derivación

4° **Constitución anatómica**.— El páncreas es una glándula arracimada, y por esta razón se le puede descomponer sucesivamente

en lobulillos secundarios, lobulillos primitivos y *dcinos*. Estos elementos están separados por *tejido conjuntivo*, en cuyo interior se encuentran repartidos unos corpúsculos especiales, los *islotas de Langerhans* o *puntos foliculares* de RENAULT (véanse los tratados de Histología)

5.º Vasos y nervios. — Las *arterias* vienen de la *esplénica*, de la *pancreaticoduodenal superior* (rama de la hepática) y de la *pancreaticoduodenal inferior* (rama de la mesentérica superior). La anastomosis de las diversas ramas precedentes rodea la glándula de un verdadero círculo arterial, el *círculo peripancreático*. Las *venas* terminan unas en las venas mesentérica y esplénica, y otras directamente en el propio tronco de la vena porta. Los *linfáticos* nacen en el seno de las redes perilobulares y alcanzan la superficie exterior de la glándula para terminar en unos grupos ganglionares situados a lo largo de los vasos esplénicos y mesentéricos superiores, junto a la segunda porción del duodeno, en el epiplón pancreaticoesplénico. Los *nervios* emanan del plexo solar, acompañan a los vasos y vienen a constituir, en la glándula, un *plexo interlobulillar* y *plexos periácinosos*, provistos de *células ganglionares* especiales.

LIBRO VIII

APARATO DE LA RESPIRACION Y DE LA FONACION

Comprende: 1.º, un conducto aerífero formado por la *laringe*, la *tráquea* y los *bronquios*; 2.º, el órgano esencial de la respiración, el *pulmón*, rodeado por una membrana serosa, la *pleura*

ARTÍCULO PRIMERO

LA LARINGE

La laringe, porción diferencial del conducto aerífero, es el órgano esencial de la fonación

1.º **Consideraciones generales.** — Está situada en la parte media del cuello, debajo de la lengua, delante de la faringe y a la altura de las 5.ª, 6.ª y 7.ª vértebras cervicales. A pesar de su continuidad con la faringe y la tráquea, es *móvil* en las direcciones vertical, antero-posterior y transversal. Sus *dimensiones* (44 milímetros en sentido vertical, 43 milímetros en el transverso y 30 milímetros en el antero-posterior, en el hombre) varían según los *individuos*, según el *sexo* (la mujer tiene la laringe más pequeña) y según las *edades*: en la época de la pubertad, la laringe presenta un brusco crecimiento, mucho más notable en el hombre, en el cual se acompaña de modificaciones conocidas con el nombre de *muda*.

2.º **Conformación exterior.** — La laringe puede ser comparada a una pirámide triangular, presenta, pues tres *caras*, tres *bordes*, una *base* y un *vértice*

a) *Caras*. — Se distinguen en posterior y anterolaterales. La *cara posterior* está abultada en su parte media (prominencia del cricoides y de los aritenoides), escotada en su parte superior (*escotadura interaritenoidea*) y limitada abajo por el repliegue aritenoideo. Lateralmente presenta dos canales (*canales o semiconductos faringoiaríngeos*), limitados arriba por los *repliegues faringoepiglóticos*. Las *caras anterolaterales* corresponden al cricoides y al ala del tiroides revestidos por el cuerpo tiroides.

b) *Bordes*. — Tres: uno *anterior* (formado por el cartilago cricoides y el ángulo saliente del cartilago tiroides) y dos *posteriores* (bordes posteriores del cartilago tiroides).

c) *Vértice*. — El vértice de la pirámide laríngea, notablemente truncado, corresponde al nacimiento de la tráquea a nivel de la séptima cervical. Está formado por un orificio redondo.

d) *Base*. — La *base*, situada detrás de la lengua, ofrece a nuestra consideración, de delante atrás: 1.º, el borde superior del cartilago tiroides; 2.º, un *paquete adiposo preglótico*; 3.º, la *epiglottis*, con sus repliegues mucosos; 4.º, la abertura superior de la laringe. Esta abertura está limitada: *delante*, por la epiglottis, *detrás*, por los cartilagos aritenoides; *lateralmente*, por los repliegues aritenoepiglóticos, con las dos prominencias que forman en su borde libre los tubérculos de Wrisberg (anterior) y de Santorini (posterior).

3.º **Conformación interior**. — Vista interiormente, la laringe presenta una zona estrechada, la *glottis*, con dos zonas más espaciosas, una *supraglótica* y otra *subglótica*.

a) *Glottis*. — Corresponde a una hendidura media anteroposterior, limitada por unas cintas membranosas, las *cuerdas vocales*.

Las *cuerdas vocales* son dos a cada lado (*superior e inferior*). Las *cuerdas vocales superiores* son dos láminas aplanadas en forma de cinta, inclinadas hacia dentro, adherentes por delante al cartilago tiroides (ángulo entrante), por detrás al cartilago aritenoides (cara anterior) y lateralmente al repliegue aritenoepiglótico. Su importancia es casi nula. Las *cuerdas vocales inferiores* se insertan, por delante, en el cartilago tiroides (ángulo entrante), debajo de las precedentes, y por detrás en el aritenoides (apófisis interna). Son gruesas, prismáticas, desempeñan un papel importante en la fonación y contienen un fascículo voluminoso del músculo tiroaritenoideo.

El triángulo de base posterior formado en la línea media por las cuerdas vocales superiores, más ancho, permite ver el triángulo

homólogo formado por las cuerdas vocales inferiores. El espacio comprendido entre las cuerdas vocales o *glotis* consta de dos porciones: 1.ª, una *porción anterior, más larga*, la *glotis interligamentosa*, triángulo isósceles de base posterior, más o menos ancho, según estén las cuerdas más o menos próximas a la línea media y de una longitud media de 20 milímetros; 2.ª, una *porción posterior*, la *glotis intercartilaginosa*, correspondiente al espacio interaritenoides; este segmento de la glotis tiene una longitud media de 6 a 7 milímetros, su forma recuerda sucesivamente la de un triángulo, de un rectángulo y un trapecio, según sea la actitud de los aritenoides.

A la glotis corresponden dos divertículos laterales, los *ventrículos de la laringe*, comprendidos a derecha e izquierda entre la cuerda superior y la inferior correspondiente. Prolongados en sentido anteroposterior, comunican con la glotis por un orificio también prolongado de delante atrás, y presentan una prolongación anterior de magnitud variable, el *apéndice*, homólogo de los sacos laringeos que se observan en algunos animales.

b) *Zona supraglótica*. La zona supraglótica o *vestibulo de la laringe* está limitada por cuatro paredes: 1.ª, una *pared anterior*, la epiglotis, cóncava transversalmente, primero convexa y luego cóncava verticalmente, formada por un paquete adiposo medio (*rodete epiglótico*) y terminada inferiormente por una depresión también media, la *fosa central de Merkel*, 2.ª, una *pared posterior*, que corresponde a los aritenoides y al espacio interaritenoides; 3.ª, dos *paredes laterales*, formadas por los repliegues aritenoepiglóticos.

c) *Zona subglótica*.—La zona subglótica está formada, abajo, por el anillo del cricoides, arriba, por la cara inferior de las cuerdas vocales inferiores.

4.º **Constitución anatómica.**—La laringe está constituida por cartílagos, unidos por *articulaciones*, movidos por *músculos* y revestidos de una *capa mucosa*.

A **CARTÍLAGOS.**—Son seis: *tres impares* (cricoides, tiroides y epiglotis) y *tres pares* (aritenoides, cartílagos corniculados y cartílagos de Wrisberg). En conjunto, nueve cartílagos.

a) *Cartílago cricoides*.—Impar, situado en la parte inferior de la laringe, tiene la forma de un anillo o sortija con su placa o engarce posterior. Su *superficie interior* es lisa. Su *superficie exterior* presenta una prominencia media anterior, una cresta media posterior (destinada a inserciones musculares) y dos carillas laterales articuladas con las

astas menores del tiroideas. Su *borde inferior* se articula por tres prominencias (anterior y laterales) con el primer anillo de la tráquea. Su *borde superior*, oblicuo abajo y adelante, presenta por atrás dos carillas destinadas a articulaciones con los aritenoides.

b) *Cartilago tiroides* — Está formado por dos láminas unidas en ángulo diedro de seno posterior. Su *cara anterior* presenta una prominencia angulosa, *ángulo saliente del tiroides* o *bocado de Adán*, y a cada lado una cresta oblicua, en la cual se insertan los músculos tirohioideo y esternohioideo. Su *cara posterior* presenta un *ángulo entrante*, en el cual se insertan las cuerdas vocales, y dos superficies laterales planas. Su *borde inferior*, sinuoso, presenta una *escotadura tiroidea media*. Sus *bordes posteriores* se prolongan hacia arriba y abajo en forma de *astas superiores e inferiores*; estas últimas se articulan con el cricoides.

c) *Cartilago aritenoides* — Son dos; su forma es piramidal. Su *base*, oblicua abajo y afuera, ofrece una *fosita articulada* con el cricoides y dos *apófisis*: una, la *apófisis vocal*, anterior e interna, la otra, la *apófisis muscular*, posterior y externa, más corta y más voluminosa. El *vértice* de los aritenoides se inclina hacia dentro. Las tres *caras* son: una *interna*, correspondiente a la glotis interna cartilaginosa; otra *posterior*, excavada en forma de fosita, para la inserción del músculo aritenohioideo, y la última, *anteroexterna*, en la cual se insertan, por sus extremidades posteriores, las cuerdas vocales. De los tres bordes mencionados, sólo el externo merece especial mención por su forma de *S* *italica*.

d) *Cartílagos corniculados*. — Son pequeños cartílagos cónicos, incurvados hacia dentro y coronando los aritenoides.

e) *Cartílagos de Wrisberg*. — Cilíndricos y aplanados, están colocados verticalmente a cada lado, en el espesor del repliegue aritenopiglótico.

f) *Epiglotis*. — Fibrocartilago impar y medio, ovalado, con una *base superior*, ligeramente escotada, y un *vértice inferior*, afilado o puntiagudo, formando lengüeta con el ángulo entrante del tiroides. Su *cara anterior* está unida a la base de la lengua por medio de los repliegues mucosos *glosopiglóticos* (medio y laterales), separados por fositas (*valleculas*); está separada del hueso hioides por un paquete celuloadiposo, el *paquete adiposo preglótico*. Su *cara posterior*, cubierta por la mucosa laríngea, es lisa en su parte media acribillada lateralmente de orificios glandulares. Sus dos *bordes* prestan inserción a repliegues mucosos (*faringo y aritenopiglóticos*).

B. ARTICULACIONES. Son *intrínsecas* (entre los cartílagos laríngeos) y *extrínsecas* (entre la laringe de una parte y el hueso hioides y la tráquea de otra).

a) *Unión del tiroides con el hueso hioides* — La *membrana tirohiodea* une el borde superior del tiroides a la cara posterior en toda la extensión de estas dos formaciones. Linda, por delante del hueso hioides, con la *bolsa serosa de Boyer*, y, por detrás, con el paquete adiposo preglótico. Sus bordes laterales están reforzados por los *ligamentos tirohiodeos laterales*, cordones fibrosos que contienen a menudo un núcleo cartilaginoso, el *cartilago hordeshorme*.

b) *Unión del cricoides con la tráquea*. — Un ligamento fibroso, anular, reforzado en la línea media por un cordón.

c) *Unión del cricoides con el tiroides*. Entre las astas menores del tiroides y las carillas laterales del cricoides se extiende lateralmente una *cápsula fibrosa*, reforzada por los *ligamentos cricotiroideos anterior y posterior*, provista de una sinovial y que permite al tiroides un movimiento de bascula y deslizamiento sobre el cricoides. En la línea media se encuentra una membrana resistente, triangular, subyacente a la mucosa, la *membrana cricotiroidea*.

d) *Unión del cricoides con el aritenoides*. — Los aritenoides y el cricoides entran en contacto por medio de *dos cartilas*, cuyos ejes mayores ofrecen orientación opuesta. Están separados por una *sinovial* y unidos por un *ligamento capsular*. Los movimientos de esta articulación son tales: 1.º, que las apófisis (muscular y vocal) se mueven en sentido diametralmente opuesto, 2.º, que la inclinación hacia atrás de la apófisis muscular es causa de la inclinación hacia fuera del vértice del aritenoides.

e) *Unión de los aritenoides con los cartílagos corniculados*. Una *cápsula fibrosa* muy delicada, provista de *sinovial*, une las carillas de los cartílagos en contacto.

f) *Unión de la epiglottis con el tiroides* — La epiglottis está sujeta al ángulo entrante del tiroides por medio de una delgada lengüeta fibrosa, el *ligamento tiroepiglótico*.

g) *Unión de los aritenoides con el tiroides* — Los medios de unión consisten en ligamentos *superiores e inferiores*. Los *ligamentos tiroaritenoides superiores* son aplanados y delgados, ocupan el espesor de la cuerda vocal superior y van del ángulo entrante del tiroides a la cara anteroexterna del aritenoides. Los *ligamentos tiroaritenoides inferiores*, más gruesos, se fijan por medio de los núcleos cartilaginosos (*nódulos glóticos anterior y posterior*) al ángulo entrante

del tiroides, por una parte, y a la apófisis vocal del aritenoides, por otra. Dichos ligamentos, alojados en el espesor de la cuerda vocal inferior, se ponen en contacto, por dentro, con la mucosa laríngea, y por fuera, con el músculo tiroaritenosoideo.

h) *Unión de los aritenoides con la epiglottis* — Los ligamentos aritenoepiglotícos son hojas o láminas fibrosas anchas y delgadas, que se insertan, por delante, en los bordes de la epiglottis, y por detrás, en la cara anteroexterna de los aritenoides.

C. MÚSCULOS DE LA LARINGE. — Los músculos intrínsecos de la laringe (los extrínsecos se describen en otra parte) son seis, cinco pares y uno solo impar.

a) *Músculo cricotiroides* — Es un músculo triangular, que se inserta, por su vértice, en la cara anterior del cartilago cricoide, y por su base, desplegada en forma de abanico, en el borde inferior del tiroides. Puede subdividirse en dos manojos, uno interno o recto y otro externo u oblicuo. Su contracción imprime al tiroides un movimiento de báscula hacia delante sobre el cricoide; es, por lo tanto, *tensor de las cuerdas vocales*.

b) *Músculo cricoaritenosoideo posterior* — Es un músculo que se inserta en la cara posterior del engarce o placa del anillo cricoideo, por una parte, y en la apófisis muscular del aritenoides, por otra. Moviendo hacia abajo y atrás esta apófisis, este músculo es *dilatador de la glotis*.

c) *Músculo cricoaritenosoideo lateral* — Se inserta 1.º, por delante, en el borde superior del cricoide, delante de la articulación cricotiroides; 2.º, por detrás, en la apófisis externa del aritenoides. Su contracción mueve hacia delante la apófisis muscular; es, por lo tanto, *constrictor de la glotis*.

d) *Músculo tiroaritenosoideo*. — Está situado encima del precedente, en el espesor de la cuerda vocal inferior. Fijo por delante al ángulo entrante del tiroides, se divide por atrás en dos manojos: uno, interno (*el manajo propio de la cuerda vocal*), voluminoso, prismático, da a la cuerda su grosor, y se inserta por atrás en la apófisis vocal; el otro, externo, aplanado, va a insertarse en el borde externo del aritenoides. Sus fibras más elevadas se pierden en el repliegue aritenoepiglotico (*músculo tromembranchoso*); las más inferiores, que por delante tienen su origen en el ligamento cricotiroides, forman a veces un manajo distinto, el *aristidesmiano*. Los músculos tiroaritenosideos son *constrictores de la glotis*; su contracción provoca, además, la tensión y la hinchazón de las cuerdas vocales (*estrangul viviente* de BÉCLARD).

e) *Músculos aritenoepiglóticos*. — Son delgadas láminas musculares que van del vértice del aritenoides a los bordes laterales de la epiglottis. Son *depresores de la epiglottis*.

f) *Músculo ariaritenoides*. — Es el único músculo impar, medio y simétrico de la laringe. Comprende: 1.º, una *porción transversal*, que va de borde externo de un aritenoides al borde externo del otro, 2.º, una *porción oblicua*, constituida por dos manojos, uno derecho y otro izquierdo, que van del vértice de un aritenoides a la apófisis externa del otro, cruzándose en la línea media. Los ariaritenoides aproximan los aritenoides, son, pues, *constructores de la glotis*.

D *MUCOSA DE LA LARINGE*. — Reviste toda la superficie interna de la laringe y se continua, al exterior, con la mucosa faríngea, de una parte, y la mucosa traqueal de otra.

a) *Caracteres generales*. Es tersa, lisa y rosada: adherente a nivel de las cuerdas vocales y de la epiglottis, está reforzada, en la cara externa de los repliegues aritenoepiglóticos, por una capa de tejido celular laxo, el *tejido celular submucoso*.

b) *Estructura*. — Se compone de epitelio y corion o dermis. El *epitelio*, a nivel de la epiglottis y de los pliegues aritenoepiglóticos de las cuerdas vocales inferiores (borde libre) es pavimentoso estratificado; en otras partes es *cilíndrico*, de células cilíadas, mezcladas con escasos elementos caliciformes, descansando sobre una tenue membrana limitante. El *corion*, formado por elementos conjuntivos, con numerosas fibras elásticas, está infiltrado de células linfoides. Presenta algunas papilas en el borde libre de las cuerdas vocales inferiores.

c) *Glándulas*. — A la mucosa de la laringe van anexas glándulas son glándulas mucosas. Se distinguen los grupos siguientes: 1.º, *glándulas epiglóticas*, situadas en la cara posterior de la epiglottis, 2.º, *glándulas prearitenoides*, situadas en los repliegues aritenoepiglóticos y en las cuerdas vocales superiores (forman, en conjunto, una especie de L mayúscula de seno anterior); 3.º, *glándulas de las cuerdas inferiores*, distribuidas en hileras sobre sus dos caras.

d) *Folículos linfáticos*, más abundantes a nivel de la epiglottis y del ventrículo, en donde forman un núcleo importante (*amígdala laríngea de FRANKEL*)

5.º *Vasos y nervios*. — a) *Arterias*. — Son tres: 1.º, la *arteria laríngea superior*, rama de la tiroidea superior, riega la epiglottis, la región supraglótica y la cuerda vocal superior, 2.º, la *arteria laríngea inferior*, otra rama de la tiroidea superior, se distribuye por la re

gión subglótica y la cuerda vocal inferior; 3.^a, la *arteria laringea posterior*, rama de la tiroidea inferior, vasculariza los músculos cricoaritenideo posterior y ariaritenideo.

b) *Venas* - Las venas se condensan en dos troncos homólogos de las arterias (*venas laringeas superiores, inferiores y posteriores*). Terminan, en su mayor parte, ya en las venas tiroideas superiores, ya en las venas tiroideas inferiores. Algunas van directamente a la vena lar interna.

c) *Linfáticos*. — Muy numerosos en la submucosa, se reúnen en vasos, de los cuales unos, los *superiores*, van a los ganglios del grupo esternocleidomastoideo, y los otros, los *inferiores*, siguiendo el trayecto de la arteria laringea inferior, van a los ganglios *prelaringeos*, situados delante del cartilago cricoides.

d) *Nervios* — Su estudio es muy complejo y descansa o se funda en datos anatómicos y nociones fisiológicas. El *laringeo superior*, nacido de un ganglio plexiforme, se divide, a la altura del hueso hioides, en dos ramas: una, *superior*, se distribuye por la epiglotis y la mucosa supraglótica; la otra, *inferior (laringeo externo)*, inerva el cricotiroides y la mucosa subglótica. El *laringeo inferior o recurrente*, nacido del neumogástrico en el tórax, se distribuye por el resto de los músculos de la laringe y se anastomosa con el laringeo superior por medio de la *anastomosis de Galeno* (presenta en su trayecto células nerviosas ganglionares).

Los nervios de la laringe presentan *terminaciones motoras, vasculares, sensitivas y sensoriales*. Las motoras y vasculares no presentan aquí nada de particular. Las sensoriales están constituidas por corpúsculos (*corpúsculos de Versen*), análogos a las papilas gustativas.

ARTICULO II

CONDUCTO TRAQUEOBRONQUIAL

El conducto traqueobronquial comprende dos segmentos: la *traquearteria* y los *bronquios*.

1. TRAQUEARTERIA

La traquearteria, o simplemente tráquea, es un conducto resistente, a la vez fibromuscular y cartilaginoso, comprendido entre la laringe y el origen de los bronquios.

1.º **Consideraciones generales.** — La traquearteria se extiende desde la sexta cervical a la tercera dorsal. Ocupa sucesivamente el cuello y el tórax. Ligeramente oblicua de delante atrás casi rectilínea, la tráquea es extensible, elástica y móvil, al menos en su porción cervical. Su forma es la de un tubo aplanado del todo en su cara posterior y ligeramente aplanado lateralmente. Su cara izquierda presenta dos depresiones: una inferior (*impresión aórtica*) y otra superior (*impresión tiroidea*). Sus dimensiones medias son las siguientes: longitud, de 11 a 12 centímetros; ancho, de 18 a 22 milímetros; profundidad o grueso de 14 a 18 milímetros. La tráquea, elástica, puede, en ciertos casos, prolongarse o acortarse, pudiendo llegar a 3 ó 4 centímetros la diferencia entre sus dimensiones externas. La tráquea en el individuo vivo no presenta iguales dimensiones que en el cadáver; en el primer caso, las extremidades posteriores de los anillos cartilaginosos llegan a ponerse en contacto y el segmento posterior se dobla formando un rodete longitudinal, por lo menos en estado de respiración tranquila; las dimensiones transversales de la tráquea resultan, por lo mismo, reducidas.

2.º **Relaciones.** — Las relaciones de la tráquea varían según se trate de su *porción cervical* o de su *porción torácica*.

A. **PORCIÓN CERVICAL.** — La porción cervical está en relación

α) *Por delante:* 1.º, con el istmo del tiroides, las venas tiroideas inferiores, la arteria tiroidea de Neubauer; 2.º, con los músculos esternotiroides y esternohioides, unidos en la línea media a sus homólogos por un repliegue fibroso; 3.º, por último, muy inferiormente, con el tronco venoso braquiocefálico izquierdo.

β) *Por detrás,* con el esófago, del cual la separa un tejido celular laxo.

γ) *A los lados,* con los lóbulos laterales del tiroides, los recurrentes, el paquete vasculonervioso del cuello, cuyas relaciones son cada vez menos inmediatas a medida que se va subiendo.

B. **PORCIÓN TORÁCICA.** La porción torácica está en relación

α) *Por delante,* con el tronco venoso braquiocefálico izquierdo, el esternotiroides y la primera pieza del esternón; más abajo, con el cayado de la aorta y los troncos que se desprenden del mismo (tronco braquiocefálico arterial y carótida izquierda).

β) *Hacia atrás,* con el esófago.

γ) *En el lado izquierdo,* con la pleura mediastínica izquierda, el recurrente izquierdo y el cayado de la aorta.

b) *En el lado derecho*, con la pleura mediastínica derecha, la vena cava superior y la ácigos mayor.

c) *A nivel de su bifurcación*, la tráquea, enlazada por un rico plexo nervioso (*el plexo pulmonar*), entra en contacto con la cara posterior de la arteria pulmonar

3.º **Constitución anatómica.** — La tráquea se compone de dos *tunicas* una externa, *fibrocartilaginosa*, y otra interna, *mucosa*

a) *Túnica fibrocartilaginosa.* — La túnica fibrosa de la tráquea es un cilindro hueco, constituido por fibras conjuntivas y elásticas (que se continúa con el pericondrio del cricoides por una parte y la túnica fibrosa de los bronquios por otra), y en cuyo espesor están alojados *anillos cartilagosos*. Estos últimos, en número de quince a veinte, son anillos incompletos de cartílago hialino, de superficie externa plana y superficie interna cóncava, dispuestos más o menos regularmente unos encima de otros. El superior se articula a veces con el cricoides por medio de dos pequeñas apófisis laterales; el inferior, acodado sobre un plano sagital, forma el *espolón* de la bifurcación traqueal. En la parte posterior de la tráquea existe un plano de fibras musculares, el *músculo traqueal*, cuyos manojos, en su mayor parte transversales, se insertan por medio de pequeños tendones en las extremidades de los cartílagos, y quedan separados de la mucosa por verdaderas cintas elásticas de color blanco amarillento

b) *Túnica mucosa.* La mucosa delgada transparente, muy adherente, se compone: 1.º, de un *epitelio* estratificado, de células profundas, poliédricas, y células superficiales, cilíndricas ciliadas, mezcladas con células cuneiformes mucosas; 2.º, de un *corion*, más o menos grueso, cubierto de una basal y más o menos infiltrado de glóbulos blancos.

c) *Glándulas.* Ocupan los intervalos de los anillos cartilagosos y la porción posterior de la tráquea. Estas últimas, las más voluminosas, están situadas, ya debajo de la mucosa, ya fuera de la túnica muscular. Son glándulas arracimadas: se componen de ácinos con células mucosas de Gianuzzi

4.º **Vasos y nervios.** — Las *arterias* provienen de las tiroideas, de las tímicas, de la bronquial izquierda. Las *venas* terminan, por medio de troncos colectores longitudinales, en las esofágicas y tiroideas. Los *linfáticos* constituyen dos redes, *mucosa* y *submucosa*, y terminan en los ganglios periesofágicos. Los *nervios*, nacidos del pneumo-

gástrico y del simpático, se distribuyen por la mucosa, por los músculos y por las glándulas.

4. BRONQUIOS

Los bronquios, en número de dos, uno derecho y otro izquierdo, resultan de la bifurcación de la tráquea.

1.º **Forma y dimensiones.** — Cada uno de ellos representa un cilindro hueco, algo aplanado de delante atrás. Los dos bronquios difieren entre sí: 1.º, por su *dirección*: el bronquio derecho se acerca mucho más a la vertical que el izquierdo; 2.º, por su *longitud*: el bronquio izquierdo es más largo (45 a 50 milímetros) que el derecho (30 a 25 milímetros); 3.º, por su *calibre*: el diámetro del bronquio derecho es, por término medio, de 15 a 16 milímetros; el del bronquio izquierdo, de 10 a 11 milímetros.

2.º **Relaciones.** — Dos clases: 1.ª, relaciones que le son *comunes*; 2.ª, relaciones que son *especiales* a cada uno de ellos.

a) *Relaciones comunes* — Los bronquios están en contacto: *por delante*, con la arteria pulmonar y las venas pulmonares, que se yuxtaponen de delante atrás; *por detrás*, con los vasos bronquiales. Los vasos linfáticos y los nervios están irregularmente sumergidos en el tejido conjuntivo peribronquial.

b) *Relaciones particulares* — El *bronquio derecho* está en contacto con la vena superior, por delante; con la ácigos, por detrás; hacia arriba, está rodeado por esta última. El *bronquio izquierdo* está rodeado por el cayado de la aorta; está, además, en contacto con el esófago, el conducto arterial y el plexo cardíaco.

3.º **Constitución anatómica.** — Recuerda en todas sus partes la de la tráquea (véase *Tráquea*).

4.º **Vasos y nervios.** — Las *arterias* proceden de las arterias bronquiales. Las *venas bronquiales* derecha e izquierda desembocan, la *primera*, en la ácigos mayor o en el tronco común de las venas intercostales; la *segunda*, en la ácigos menor o en el tronco venoso braquiocefálico izquierdo. Los *nervios*, ricos en ganglios, emanan del plexo pulmonar posterior.

ARTÍCULO III

PULMONES

El pulmón, órgano esencial del aparato respiratorio, es el sitio en que se verifican las importantes funciones de la hematosis.

1.º **Consideraciones generales** — En número de dos, están situados en la caja torácica y separados entre sí por el conjunto de órganos que constituyen el mediastino

a) Sus *dimensiones* son las siguientes, hallándose el pulmón en un estado intermedio entre la espiración y la inspiración. altura, 25 centímetros, diámetro anteroposterior, 16 centímetros; diámetro transversal en la base, 10 centímetros el derecho y 7 centímetros el izquierdo.

b) Su *volumen* en el cadáver (espiración) es aproximadamente de 1.600 centímetros cúbicos en el hombre y 1.300 en la mujer; nótese que el volumen del pulmón derecho aventaja siempre al pulmón izquierdo en $\frac{1}{5}$ ó $\frac{1}{6}$. El volumen del pulmón varía: 1.º, según las edades (el pulmón es muy pequeño en el recién nacido que no ha respirado; 2.º, según el sexo (el hombre tiene los pulmones más voluminosos que la mujer); 3.º, según los individuos

γ) El *peso absoluto* de los pulmones es, en el feto, de 65 gramos, en el adulto de 1.100 a 1.300 gramos. El *peso específico* varía según se hayan establecido o no las funciones respiratorias; un pulmón que ha respirado sobrenada sumergido en el agua.

δ) La *capacidad pulmonar* se mide por el volumen de aire que contienen los alvéolos. Ese aire se compone de aire en *circulación*, de aire de *reserva* (que puede ser lanzado del pulmón por una espiración forzada) y de aire *residual* (que persiste en el pulmón, aun después de una espiración forzada). El volumen total representa tres litros y medio, del cual una séptima parte solamente pertenece al aire en circulación.

e) El *color* de los pulmones es rojo obscuro en estado fetal, rosado en el recién nacido, grisáceo en el adulto, y en el viejo se convierte por razón de la *antracosis fisiológica*, en gris apizarrado. En este último, como el depósito de materia negruzca se verifica con mayor predominio o en mayor cantidad en el límite de los lobulillos, la superficie externa del pulmón presenta una serie de polígonos de un tinte negruzco.

b) El pulmón tiene una *consistencia blanda*, cede a la menor presión con un ruido especial, llamado *crepitación*. Es muy elástico y, distendido, recobra fácilmente sus dimensiones primitivas. En el cada ver, el vacío pleural mantiene el pulmón distendido en contacto de la pared torácica; pero una vez cesa el vacío, el pulmón, reaccionando sobre sí mismo, recobra su primer volumen en virtud de su propia elasticidad.

2° **Configuración exterior y relaciones.** — El pulmón tiene la forma de un semicono, de eje mayor vertical, con su superficie plana vuelta hacia el mediastino y su superficie convexa en contacto con la pared torácica.

a) *Cara externa.* — Convexa, tersa y lisa, aparece algunas veces deprimida en forma de surco por el contacto de las costillas (*impresiones costales*). Presenta una cisura o hendidura profunda, dirigida oblicuamente de arriba abajo y de atrás adelante: es la *cisura oblicua*; única a la izquierda, esta cisura se bifurca a la derecha, formando una segunda cisura, la *cisura horizontal*. Estas cisuras dividen los pulmones en lóbulos (*cisuras interlobulares*). El pulmón izquierdo comprende dos lóbulos (*superior e inferior*); el pulmón derecho, tres (*superior, medio e inferior*). La presencia en la base del pulmón derecho de un lóbulo supernumerario, el *lóbulo ácigos*, tiene el valor de una anomalía reversiva.

b) *Cara interna.* — La cara interna, *cara mediastínica*, presenta el *hilio del pulmón*, zona de una altura de 5 centímetros y de 3 centímetros de ancho, situada en el límite del cuarto posterior con los tres cuartos anteriores, por donde pasan los elementos del *pedículo pulmonar* (bronquios, arterias, venas, etc.). La porción de la cara interna situada detrás del hilio, *porción retrahiliar*, corresponde al mediastino posterior. La *porción prehiliar* entra en contacto con los órganos del mediastino anterior, está fuertemente deprimida en el pulmón izquierdo (*lecho del corazón*). El neumogástrico y el frénico entran en relación con la cara interna en toda su extensión.

c) *Borde posterior.* — Grueso, ocupa el canal costovertebral (cuerpos vertebrales y extremidades costales) y se pone en contacto, a este nivel, con la cadena del simpático.

d) *Borde anterior.* — Delgado y sinuoso es mucho más corto que el posterior; se detiene en la quinta o sexta costilla. A la izquierda presenta una especie de escotadura, *escotadura cardíaca del pulmón izquierdo*. Corresponde de arriba abajo al esternón, a los cartí-

lagos costales y a los vasos mamarios internos. Los bordes anteriores de los pulmones pueden ponerse en mutuo contacto en la línea media.

e) *Vértice*. — Redondeado, está en relación con la primera costilla, la subclavia y algunas de sus ramas. Es más elevado el de la derecha que el izquierdo (de 0,5 a 1 centímetro)

f) *Base*. Muy ancha, está en relación en toda su extensión con la cúpula diafragmática. Su borde, adelgazado, ocupa más o menos completamente el *seno costodiafragmático*.

3.ª **Constitución anatómica.** — El pulmón está constituido: 1.ª, por una serie de órganos de pequeña magnitud, los *lobulillos pulmonares*; 2.ª, por conductos ramificados, que, con el nombre de *bronquios intrapulmonares*, continúan el conducto acrífero hasta los lobulillos; 3.ª, por *tejido conjuntivo*, que une entre sí lobulillos, vasos y ramificaciones bronquiales.

A **LOBULILLOS PULMONARES.** — Son pequeños sacos membranosos, pegados entre sí y unidos por tejido conjuntivo bastante escaso. Su volumen es, por término med.o, de un centímetro cúbico.

a) *Disposición general.* Piramidales en la periferia, en donde constituyen los *campos poligonales*, visibles en la superficie exterior de los lóbulos, son más o menos ovoides en el centro del órgano. Por una de sus extremidades se continúan con el *bronquio supralobulillar*, que le es aferente. Jamás comunican entre sí; en un lobulillo examinado aisladamente se observa que el *bronquio supralobulillar* se continúa en el lobulillo (*bronquio intralobulillar*), emitiendo primero *colaterales* y bifurcándose después. Colaterales o ramas de bifurcación terminales se subdividen dicotómicamente en cierto número (veinte a treinta) de ramificaciones terminales, cada una de las cuales termina en un *ácino*, y se llaman bronquiólos acinosos. Los cortes practicados a diferentes alturas presentan, ya el bronquio intralobulillar, ya un número de colaterales que varía según la altura del punto observado. Cada *ácino*, que tiene de largo de 1 a 2 milímetros, presenta, después del *estrechamiento* del bronquíolo, una dilatación (*vestíbulo*), de la cual parten cuatro o cinco *conductos alveolares*, que terminan en cavidades más vastas, laterales o terminales, con relación al eje del acino, los *infundíbulos*. Tanto los conductos alveolares como los infundíbulos están tapizados de celid llas semejantes a las de un panal de abejas, los *alvéolos* (250 por un milímetro cúbico de pulmón). La superficie pulmonar, calculada de ese modo, viene a representar por término medio una superficie de 80 metros cuadrados.

b) *Estructura*. — Cada alvéolo (pulmón elemental) se compone de pared y de epitelio. La *pared*, delgada, transparente, anhistá, está reforzada exteriormente por un sistema de *fibras elásticas*, cuya disposición es variable (*fibras de orificio*, *fibras comunes*, *fibras en saco*). El *epitelio* está formado por una sola fila de células aplanadas, poligonales, que cubren la red capilar (véanse los tratados de Histología).

c) *Tejido conjuntivo del lobulillo*. — El tejido conjuntivo está repartido, por una parte, alrededor del bronquio intralobulillar, y, por otra, en la periferia del lobulillo. Constituye tabiques penetrantes que dividen el lobulillo en otros lobulillos más pequeños, pero sin prolongarse dentro de los ácinos, en los cuales el elemento conjuntivo no está representado más que por la túnica adventicia de los vasos.

d) *Vasos*. — El lobulillo presenta vasos sanguíneos y linfáticos. La arteria pulmonar envía, bajo el nombre de *arteria lobulillar*, un vaso que se adosa al bronquio intralobulillar, ramificándose como él. Al llegar al ácino, las últimas ramificaciones se esparcen por la superficie del alvéolo en forma de red muy apretada de *capilares* muy finos y de carácter terminal. Las *venas* que siguen a estos capilares se dirigen a la periferia del lobulillo (*venas perilobulillares*), para constituir por su reunión las *venas pulmonares*. Los *linfáticos*, de origen lobulillar mal determinado, alcanzan los espacios interlobulillares. Los *nervios* terminan en la pared de los alvéolos.

B. BRONQUIOS INTRAPULMONARES. — Cada bronquio intrapulmonar o *bronquiotronco* recorre el pulmón al cual está destinado, suministrando *colaterales primarios* insertados en ángulo tanto más pequeño cuanto más voluminosos son. En su extremidad distal, únicamente el bronquiotronco suministra ramos por vía dicotómica.

a) *Modo de distribución de los colaterales*. — El modo de distribución de estos *colaterales primarios* (en los cuales nacen *colaterales de segundo orden*) depende de las relaciones del bronquiotronco y la arteria pulmonar. La arteria pulmonar ocupa sucesivamente la cara anterior, el lado externo y la cara posterior del bronquiotronco, dividiendo así a éste en una *porción eparterial* y una *porción hiparterial*. Los colaterales primarios, por lo tanto, se distinguen, por razón del punto en que nacen en *eparteriales* e *hiparteriales*.

b) *Árbol bronquial derecho*. — El árbol bronquial derecho presenta en primer lugar un bronquio eparterial, destinado al lóbulo superior derecho; uno de sus ramos, dirigido hacia el vértice del pulmón y perfectamente diferenciado, ha recibido el nombre de *bronquio apical*. A este primer bronquio sigue una serie de ocho bronquios

hiparteriales, de los cuales cuatro son *ventrales* y cuatro *dorsales*, que se distribuyen por los lóbulos medio e inferior. *Bronquios accesorios*, variables en número y dirección, se juntan a los precedentes, uno de ellos es conocido con el nombre de *bronquio cardíaco*.

c) *Árbol bronquial izquierdo*. — El árbol bronquial izquierdo sólo emite bronquios hiparteriales. El primero de estos bronquios se distribuye en el lóbulo superior izquierdo y forma un *bronquio apical*.

d) *Constitución anatómica*. — Los bronquios se componen: 1.º, de una túnica externa, fibrocartilaginosa; 2.º, de una túnica interna, mucosa; 3.º, de glándulas. La *túnica fibrocartilaginosa* está formada de tejido conjuntivo, rico en fibras elásticas; contiene en su espesor *elementos cartilaginosos* pequeños e irregulares. Está tapizada por dentro de una capa muscular (capa de los *musculos de Reussesen*), de dirección generalmente circular y que cesa a nivel de los bronquios intrapulmonares. La *túnica mucosa* está constituida por un epitelio forrado de un corion: el *epitelio*, cilíndrico, de pestañas vibrátiles, está mezclado con células caliciformes (se convierte en cúbico a nivel de los bronquiólos); el *corion* es rico en redes elásticas y está infiltrado de glóbulos blancos. Las *glándulas* (glándulas mucosas, arracimadas tienen su alojamiento entre las capas fibrosas y musculares y se abren en la superficie de la mucosa bronquial.

e) *Vasos*. — Las *arterias* son suministradas por la arteria bronquial. Las *venas* van a los troncos homónimos, excepto las ramas de pequeño calibre, cuyas redes venosas son tributarias de las venas pulmonares. Los *linfáticos*, nacidos de los dominios de la mucosa, van a los ganglios bronquiales. Los *nervios* siguen las divisiones bronquiales. Terminan a la vez en los elementos musculares y en la capa epitelial.

C. *Tejido conjuntivo*. — Constituyen la trama intersutural del pulmón; más abundante a nivel del hilio y debajo de la pleura, está infiltrado, en el viejo, de granulaciones carbonosas.

4.º *Vasos y nervios*. — Los vasos del pulmón son unos *funcionales* (vasos de la *hematosis*), otros *nutricios*.

a) *Vasos de la hematosis*. — Estos son las arterias pulmonares (vasos aferentes) y las venas pulmonares (vasos eferentes).

α) Las *arterias pulmonares*, en número de dos, una derecha y otra izquierda, se dirigen hacia el hilio, cruzando la cara anterior y luego la externa del tronco bronquial. Cada tronco arterial se ramifica como el bronquio correspondiente, de suerte que cada bronquio va acompañado de un ramo de la arteria pulmonar. Una vez llegado

al lobulillo correspondiente, este ramo lo penetra para capilarizarse en él. Excepción hecha de lo que se refiere a la mucosa de los mas pequeños bronquios extralobulillares, a arteria pulmonar se distribuye exclusivamente por el epitelio alveolar.

β) Las venas pulmonares proceden unas de los capilares alveolares, cuyos troncos venosos se reúnen en la periferia del lobulillo (*venas interlobulillares*); otras (*venas bronquiopulmonares* de LEFORT), de las redes capilares de las últimas ramificaciones bronquiales. A las venas precedentes se añaden ramillos venosos que toman origen en la pleura (*venas pleuropulmonares*). Condensadas en troncos cada vez más voluminosos, únicos para cada ramo correspondiente de la arteria pulmonar, y ocupando en el bronquilo la cara opuesta, las venas llegan al hilio; allí forman cuatro troncos, dos derechos y dos izquierdos, los cuales se abren en la aurícula izquierda.

b) *Vasos nutricios*. — Están constituidos por las arterias y las venas bronquiales.

a) Las arterias bronquiales (una arteria para cada pulmón) penetran a nivel del hilio, en donde ocupan la parte posterior de los bronquios. Siguen, en el pulmón, a las ramificaciones bronquiales, dando ramos a los bronquios, a las divisiones de las arterias y venas pulmonares, a los ganglios linfáticos y a la pleura. Se han observado anastomosis entre las arterias bronquiales y las pulmonares.

β) Las venas bronquiales sólo reciben la sangre de las bronquiales gruesas y medianas, del tejido conjuntivo intersticial, de los vasa vasorum y de las pleuras. Se anastomosan parcialmente con las venas pulmonares; luego, en número de dos o tres troncos para cada pulmón se colocan en el hilio, detrás del bronquio correspondiente, para abrirse, a la derecha en la ácigos mayor, y a la izquierda, en la ácigos menor.

c) *Linfáticos*. Unos son superficiales o subpleurales, otros son profundos. Unos y otros llegan al hilio y allí terminan en los ganglios broncopulmonares. Estos ganglios, de los cuales los profundos están situados en pleno parénquima, presentan una coloración negruzca debida a las partículas carbonosas o pigmentarias que contienen.

d) *Nervios*. — Proceden del plexo pulmonar anterior y posterior (a cuya constitución concurren a la vez ramos del neumogástrico y del simpático) y acompañan las ramificaciones bronquiales vasculares. Unos están destinados a los vasos, otros a los conductos bronquiales, en los cuales constituyen dos plexos: *plexo submucoso* y *plexo subepitelial*. Tienen en su trayecto ganglios microscópicos.

ARTÍCULO IV

P L E U R A S

Se designan con este nombre dos sacos serosos (uno derecho y otro izquierdo), independientes, que están en relación con los pulmones, cuyo deslizamiento dentro de la caja torácica facilitan.

1.º **Disposición general.** — Cada pleura se compone de dos hojas, una *visceral* y otra *parietal*, entre las cuales se halla comprendido un espacio virtual, la *cavidad pleural*.

A. **HOJA VISCERAL.** — La hoja visceral cubre toda la superficie del pulmón, suministrando prolongaciones en las cisuras interlobulillares. Está adherida en toda su extensión al tejido pulmonar por medio de una delgada capa de tejido conjuntivo, el *teido subpleural*.

B. **HOJA PARIETAL.** La hoja parietal corresponde a las paredes de la caja torácica. Pueden estudiarse en ella cuatro porciones: *pleura diafragmática*, *pleura cervical*, *pleura mediastínica* y *pleura costal*.

a) *Pleura diafragmática.* — Es delgada y está íntimamente adherida al diafragma.

b) *Pleura cervical.* — La pleura cervical o *cúpula pleural* constituye una especie de bóveda que rebasa en 2 ó 3 centímetros la primera costilla y se pone en íntimo contacto con la arteria subclavia. Está mantenida en posición por un sistema musculoligamentoso, compuesto de un manojó superficial (*ligamento pleurotransversal*) y un manojó profundo (*ligamento costopleural*), al cual se añade a veces un *ligamento vertebropleural*.

c) *Pleura mediastínica* — Tapiza las caras laterales del mediastino, interrumpiéndose a nivel del pedículo para formar a este último un manguito seroso. Por encima del pedículo, va directamente de la columna vertebral al esternón; por debajo, se adosa a sí misma, constituyendo el *ligamento del pulmón*. Entra en relación: 1.º, a la derecha, con el esófago, el tronco arterial braquiocéfálico, la tráquea, la vena cava superior, la ácigos mayor, el pericardio y el frénico derecho; 2.º, a la izquierda, con el esófago, la aorta, el pericardio y el frénico izquierdo.

d) *Pleura costal* — Gruesa y reforzada con una hoja aponeurótica, tapiza la cara interna del esternón, de las costillas y de los espacios intercostales hasta las articulaciones costovertebrales, para pro-

longarse. 1.º, a la izquierda, sobre la cara izquierda de la aorta; 2.º, a la derecha, sobre el lado derecho del esófago, formando entre la columna y este último órgano un fondo de saco más o menos marcado. el fondo de saco retroesofágico (anotemos su importancia en las intervenciones practicadas en el mediastino posterior). En la parte inferior del tórax existen entre la aorta y el esófago, dos fondos de saco análogos, uno a la derecha y otro a la izquierda, adosados entre sí en el plano sagital. Estos dos fondos de saco están unidos por una lámina fibrosa el ligamento interpleural de MOROSOW. La pleura costal se continúa: por una parte, con la pleura cervical; por la otra, con la pleura diafragmática, formando con esta última un canal angular que va del apéndice xifoides a la columna vertebral, el seno costodiafragmático. Por delante, la pleura costal forma, uniéndose a la pleura mediastínica un canal análogo al precedente, el seno cosomediastínico. Los dos citados senos jamás están completamente ocupados por el pulmón y, por consiguiente, sus hojas se juntan o adosan en una extensión más o menos considerable (*parte inhabitada*).

C MODO DE CONTINUAR LAS DOS HOJAS. — La hoja visceral y la hoja parietal se continúan mutuamente a nivel de la *varna serosa del pedículo*. Esta varna, de longitud nula, puesto que en estado normal la cara interna del pulmón está íntimamente adosada a la cara lateral del mediastino, se prolonga hacia abajo, formando un repliegue triangular debido al adosamiento de las láminas serosas que rodean el pedículo. Este repliegue, *ligamento triangular del pulmón*, está adherido: 1.º, por su vértice, a la parte inferior del pedículo; 2.º, por su base, al diafragma; 3.º, por sus bordes interno y externo, por una parte al mediastino, y por otra, a la cara interna del pulmón.

2.º Topografía toracopulmonar. — Comprende las relaciones de las paredes torácicas: 1.º, con los senos de la pleura, 2.º, con los pulmones, 3.º, con las ciruras.

a) Relaciones entre la pared torácica y los senos de la pleura. — La línea que sigue la pleura costal, al reflejarse para hacerse primero mediastínica y luego diafragmática, comienza, arriba, a nivel de la articulación esternocavicular.

a) A la derecha desciende, traspassando la línea media, hasta 1 ó 2 centímetros por encima del apéndice xifoides, alcanza la extremidad anterior de la octava costilla, tiene a nivel de la undécima un punto declive (a 10 u 11 centímetros de la línea media) y va a ter

minar junto al raquis, a la altura del borde superior de la primera vértebra lumbar.

β) A la izquierda sigue el borde izquierdo del esternón, se separa del mismo a nivel del cuarto cartilago costal, alcanza la extremidad anterior de la octava costilla, y a partir de este punto sigue un trayecto análogo al precedente. Estando primeramente en contacto, las líneas de reflexión derecha e izquierda se separan entre si a partir del cuarto cartilago, describiendo sobre la pared torácica y el pericardio una especie de triángulo, de vértice superior, desprovisto de pleura.

b) Relaciones de la pared torácica con los bordes anterior e inferior del pulmón. — Estas relaciones varían según se considere el pulmón en estado de inspiración o de espiración

a) En estado de espiración, el borde anterior del *pulmón derecho* queda separado del seno al principio por un espacio de 10 a 15 milímetros, que luego se hace progresivamente más considerable; su máximo es de 7 a 9 centímetros en la línea axilar. El borde anterior del *pulmón izquierdo*, separado precisamente por una distancia de 10 a 12 milímetros del seno correspondiente, se separa luego bruscamente del mismo a partir del cuarto cartilago costal, formando una ancha escotadura (*escotadura cardíaca*). A partir del sexto cartilago costal, el borde anterior del pulmón izquierdo sigue igual trayecto que el pulmón derecho.

β) Durante la inspiración, el borde anterior del pulmón tiende a aproximarse al seno correspondiente, sin alcanzarlo; sin embargo, el seno presenta hasta en la inspiración fisiológica una *porción inhabitada*, que en el seno costodiafragmático mide de 3 a 4 centímetros de altura

c) Relaciones de la pared torácica con las cisuras interlobulares. — La *cisura oblicua derecha* empieza por detrás, a nivel de la extremidad posterior de la cuarta costilla para terminar por delante en el quinto espacio intercostal. La *cisura oblicua izquierda* empieza, por detrás, a nivel de la extremidad posterior de la cuarta costilla y termina por delante en la inserción condral de la sexta. La *cisura horizontal del pulmón derecho* se separa de la cisura oblicua a nivel del cuarto espacio intercostal y va a terminar en la extremidad anterior del tercer espacio intercostal.

3° Estructura. — La pleura se compone: 1°, de una *capa superficial endotelial* (provista de estomas); 2°, de una *capa profunda conjuntiva* rica en fibras elásticas.

4.º **Vasos y nervios.** — Las *arterias* son de origen variable según el punto que se considere: diafragmáticas, mediastínicas, bronquiales, mamarias internas, intercostales. Las *venas* terminan en las *ácigos*. Los *linfáticos* constituyen dos redes, *intraserosa* y *subserosa*. Los *nervios* proceden: 1.º, para la *pleura parietal*, de los intercostales, del neumogástrico, del simpático y del frénico; 2.º, para la *pleura visceral*, del plexo pulmonar. Están provistos de células ganglionares.

LIBRO IX

APARATO UROGENITAL

El aparato urogenital comprende el conjunto de órganos en cargados de las dos importantes funciones urinaria y genital. Estudiaremos sucesivamente: 1.º, los *órganos urinarios* en el hombre y en la mujer; 2.º, los *órganos genitales del hombre*; 3.º, los *órganos genitales de la mujer*. Al aparato genital hay que añadir las *mamas*, órganos destinados a secretar la leche.

CAPITULO PRIMERO

ORGANOS URINARIOS

El aparato urinario se compone esencialmente: 1.º, de una glándula que secreta la orina, el *riñón*; 2.º, de un *conducto excretorio*, 3.º, de un receptáculo, la *vejiga*; 4.º, de un conducto que pone en comunicación la vejiga con el exterior, la *uretra*.

ARTÍCULO PRIMERO

RIÑONES

Los riñones, en número de dos, uno derecho y otro izquierdo, son órganos glandulares destinados a secretar la orina.

1.º Consideraciones generales.— Están situados a los lados del raquis, a la altura de las dos últimas dorsales y de las dos o tres primeras lumbares. Nótese que el riñón derecho está colocado algo más abajo que el izquierdo. Los riñones están de tal manera orientados, que su eje mayor se dirige oblicuamente de arriba abajo y de dentro afuera, están, por lo tanto, más próximos por su extremidad superior (6 ó 7 centímetros) que por su extremidad inferior (10 u 11 centímetros). Están sujetos en su posición: 1.º, por sus vasos, 2.º, por el peritoneo; 3.º, por la fascia renal, que rodea completamente al riñón, formándole un compartimiento, el *compartimiento renal*, con su hoja anterior o prerrenal y su hoja posterior o retrorrenal (*fascia de Zuckerhandl*). Este compartimiento está fijo o sujeto por tractos conjuntivos a las partes vecinas, y por otro lado, el riñón está sujeto al mismo por otros tractos conjuntivos más o menos cargados de grasa (*capsula adiposa del riñón*); de aquí su fijeza. Hay que notar que el compartimiento renal está abierto, por dentro, del lado de los grandes vasos, y hacia abajo, del lado de la fosa iliaca. El riñón puede, de este modo, salir de su cavidad y convertirse en *riñón flotante*. Por otra parte, el riñón puede estar dislocado congénitamente (*ectopia renal*) y ocupar entonces, según los casos, la cara anterior de la columna vertebral, el ángulo sacrovertebral, el estrecho superior de la pelvis, etc. Los riñones son dos. Anormalmente puede existir uno solo, como también puede darse el caso de haber uno suplementario. Desde el punto de vista de sus *dimensiones*, el riñón, por término medio, mide 12 centímetros de largo por 7 de ancho y 3 ó 4 de grueso. El izquierdo es generalmente algo más voluminoso que el derecho. Su *peso* es de 125 a 155 gramos. Presenta una *coloración* rojoparda tirando algo a amarillo. Es de *consistencia* firme, mucho más firme que la del hígado o del bazo.

2.º Conformación exterior y relaciones.— Prolongado de arriba abajo, aplanado de delante atrás, escotado hacia dentro, el riñón ha sido comparado a una habichuela. Se consideran en él *dos caras* (anterior y posterior), *dos bordes* (interno y externo) y *dos extremidades* (superior e inferior)

a) *Cara anterior.*— Mira hacia delante y algo afuera. Ligeramente abombada, tersa y lisa, está cubierta en la mayor parte de su extensión por el peritoneo (reforzado por la *hoja de Toldt*). La *del riñón derecho* está en relación: 1.º, con la cara inferior del hígado (con *ligamento hepatorenal* o sin él); 2.º, con la terminación del

colon ascendente y la porción inicial del colon transverso; 3°, con la porción segunda del duodeno; 4°, con la vena inferior *La del riñon izquierdo* está en relación sucesivamente, de arriba abajo. 1°, con la cola del páncreas; 2°, con la tuberosidad mayor del estómago; 3°, con la porción terminal del colon transverso y con la porción superior del colon descendente.

b) *Cara posterior.* Mira hacia atrás y adentro. Casi plana, tersa y lisa, corresponde, por su parte media, a la duodécima costilla y al agamiento arqueado del diafragma. Por debajo de la duodécima costilla está en relación con el cuadrado de los lomos y el transverso del abdomen del cual está separada por una capa celulosa (*masa celuloadiposa pararenal*), por la cual discurren tres nervios: el duodécimo nervio intercostal y los abdominogenitales mayor y menor. Por encima de la duodécima costilla, el riñón está en relación con el diafragma (es de notar la presencia del *hiato costodiafragmático*) y, más allá del diafragma, con el fondo de saco inferior de la pleura, el pulmón y la pared torácica. Tanto por encima como por debajo de la duodécima costilla, cubren también la cara posterior del riñón, además de las capas o planos ya indicados, los músculos espinales y sus tres hojas aponeuróticas (anterior, media y posterior).

c) *Borde externo.*—Convexo, regularmente redondeado, rebasa algo en su parte inferior el borde externo del cuadrado de los lomos. Está en relación: a la derecha, con el hígado; a la izquierda, con el bazo y el colon descendente.

d) *Borde interno.*—El borde interno descansa sobre el psoas. Saliente por arriba y por abajo, presenta en su parte media una fuerte escotadura, con hendidura longitudinal, que constituye el *hilio del riñón*. Esta hendidura, alta de 3 a 4 centímetros (con labio anterior y labio posterior), nos conduce a una excavación profunda, el *seno del riñón*. Las paredes del seno presentan dos clases de prominencias: unas, dispuestas en forma de cono, que son las *pápilas del riñón*, otras, situadas entre las precedentes, que son las *eminencias interpapilares*.

e) *Extremidad superior.*—La extremidad superior (o *polo superior*), redondeada y roma, está en relación con la cara interna de la undécima costilla: está coronada por la cápsula suprarenal.

f) *Extremidad inferior.*—La extremidad inferior (o *polo inferior*) descansa sobre el psoas y el cuadrado de los lomos. Está en relación ordinariamente con un plano horizontal que pasa por la apófisis transversa de la tercera vertebra lumbar. El intervalo que

la separa de la cresta ilíaca es de 5 centímetros a la izquierda y de 3 a 4 centímetros a la derecha.

3.º **Constitución anatómica.** El riñón se compone esencialmente. 1.º, de una *cubierta fibrosa*, 2.º, de un *tejido propio*; 3.º, de una *estrroma*.

A. **CUBIERTA FIBROSA.** — Reviste irregularmente toda la superficie exterior del órgano. A nivel del hilio, se introduce en el seno, al cual tapiza igualmente en toda su extensión. Su coloración es blanquecina. Es delgada (100 a 200 μ), pero muy resistente.

B. **TEJIDO PROPIO.** — El riñón, incidido paralelamente en sus dos caras, presenta dos sustancias: una sustancia central o *medular* y una sustancia periférica o *cortical*.

a) **Substancia medular.** — La sustancia medular, muy firme o resistente, de un color rojo más o menos oscuro, se presenta a primera vista como formada por cierto número de pequeñas superficies triangulares, que se designan con el nombre de *pirámides de Malpighi*. Estas pirámides, en número de diez o doce (unas *simples*, otras *compuestas*) para todo el riñón, presentan cada una de ellas: 1.º, una *superficie exterior*, que está en relación con las columnas de Bertin (véase el siguiente párrafo); 2.º, una *base*, que está en relación con la sustancia cortical; 3.º, un *vértice* (simple, blando o trífido), que forma una papila y posee en su cúspide una serie de pequeños orificios, los *poros urinarios* (que forman, en conjunto, el *área cribosa* de la papila).

b) **Substancia cortical.** — La sustancia cortical, menos dura de una colaboración más o menos amarillenta, está colocada alrededor de la sustancia medular. La sustancia cortical envía a esta última, en el intervalo de las pirámides, unas prolongaciones que van hasta el seno: son las *columnas de Bertin*. Desde el punto de vista de su estructura, la sustancia cortical comprende dos órdenes de formaciones: 1.º, las *pirámides de Ferrein*, continuación de las pirámides de Malpighi (en número de 400 a 500 para cada pirámide de Malpighi); 2.º, el *laberinto*, sustancia blanda que llena el espacio comprendido entre las pirámides de Ferrein y comprende, además de numerosos vasos, los corpúsculos de Malpighi y la porción inicial de los tubos uriníferos.

c) **Lóbulos del riñón** — Al igual que el pulmón y el hígado, el riñón se descompone, en algunos animales (*celáceos*), en cierto número de *lóbulos*. En el hombre, esta lobulación no es aparente al ex-

terior, pero no por esto deja de existir, y cada lóbulo está representado por una pirámide de Malpighi, con toda la substancia cortical que está en relación con ella. Los lóbulos, a su vez, se dividen en lobulillos: cada lobulillo (hay 400 ó 500 para cada lóbulo) está representado por una pirámide de Ferrein, con toda la substancia cortical que la rodea. Finalmente, cada lobulillo se puede descomponer en cierto número de elementos más pequeños, de forma tubular, elementos primordiales del riñón, que son los tubos uriníferos.

d) *Tubo urinífero considerado aisladamente* Cada tubo urinífero, que tiene de largo 6 a 8 centímetros, se extiende de un corpúsculo de Malpighi o uno de los orificios del área cribosa. Al principio, al salir de un corpúsculo, presenta una parte estrechada llamada *cuello*. Luego se ensancha y se hace fuertemente flexuoso (*tubuli contorti*). Después describe una curva en forma de asa, el *asa de Henle*, con una rama descendente estrecha y una rama ascendente ancha. El tubo urinífero se hace de nuevo flexuoso (*tubo intermedio*), después, por un tubo más estrecho llamado *conducto de unión*, se introduce en un largo tubo rectilíneo, el *conducto colector*, que desciende sucesivamente a la pirámide de Ferrein y a la pirámide de Malpighi, para terminar (después de haberse reunido con cierto número de conductos similares) en el área cribosa (Para la estructura de los corpúsculos de Malpighi y del tubo urinífero, véanse los tratados de Histología.)

C **ESTROMA DEL RIÑÓN.** — Los elementos propios del riñón están sumergidos en una especie de ganga, en parte conjuntiva, en parte muscular, que se designa con el nombre de *estroma del riñón*. Las fibras musculares (fibras lisas) se encuentran: 1.º, en el borde de la base de la papila (*músculo anular*), 2.º, en la cara externa de las pirámides, 3.º, en la superficie exterior del riñón.

4.º **Vasos y nervios.** — El riñón es una de las vísceras más ricas en vasos arteriales y venosos.

A. **ARTERIAS.** — Conviene examinarlas separadamente en el riñón propiamente dicho y en su *capsula adiposa*.

a) *Arterias del riñón propiamente dicho.* Proceden de la renal. La renal, al llegar al hilio, se divide en tres o cuatro ramas (generalmente tres, de las cuales una es superior, otra posterior y otra inferior), que, penetrando en el seno, se dividen y subdividen allí en numerosas ramas secundarias. Las últimas divisiones penetran en las eminencias interpapilares y casi inmediatamente después cada una de

ellas se divide en dos ramas divergentes, que se dirigen aisladamente a los lados de las dos pirámides de Malpighi más próximas.

Cada pirámide de Malpighi recibe de este modo, de diferentes orígenes, cierto número de ramas, que tienen la significación de *arterias lobulares*; estas arterias se dirigen hacia la base de la pirámide, donde se dividen y subdividen en numerosas ramas que se flexionan sobre la base de la pirámide y forman las *arterias arciformes*. Estas arterias arciformes, que, según los autores antiguos, se anastomosan en red (*bóveda arterial*), se considera hoy que son *terminales*, y, por consiguiente, no se anastomosan. Las arterias arciformes no dan ninguna colateral descendente (que vaya al hilio). Del lado de la periferia, por el contrario, emiten numerosas ramas ascendentes, *arterias interlobulillares*, de donde emergen (con algunos ramos destinados a la cápsula) los vasos *aferentes del glomérulo*.

El *vaso aferente* penetra en el corpúsculo de Malpighi y se resuelve inmediatamente formando un paquete de capilares (cuyo conjunto constituye el *glomérulo*). Después se reconstituye de nuevo y bajo el nombre de *vaso eferente del glomérulo* (que es más bien una *arteria* que una *vena*) sale del corpúsculo de Malpighi y va a ramificarse por los tubos uriníferos.

b) *Arterias de la cápsula adiposa*. — Las arterias destinadas a la cápsula adiposa del riñón proceden de diversos orígenes. 1.º, de las arterias interlobulillares; 2.º, del propio tronco de la renal o de sus primeras ramas. 3.º, de las arterias capsulares, y principalmente de la cápsula inferior.

B. VENAS. — También aquí examinaremos separadamente las venas del riñón y las de la cápsula celuloadiposa.

a) *Venas del riñón propiamente dicho*. — Presentan aproximadamente igual disposición que las arterias. Desde luego, existe, junto a la bóveda arterial suprapiramidal, una *bóveda venosa suprapiramidal*. A esta bóveda concurren: 1.º, por arriba, venas descendentes, las *venas interlobulillares*, las cuales nacen a nivel de la cápsula por pequeños grupos convergentes, dispuestos en forma de estrellas, las *estrellas de Verheyen*, 2.º, venas ascendentes (*venae rectae*), que avanzan de abajo arriba en el espesor de la pirámide. De la bóveda venosa suprapiramidal parten venas voluminosas que, descendiendo a la superficie de la pirámide, llegan al seno y allí se unen entre sí de modo que vienen a condensarse en un solo tronco, la *vena renal*, la cual desemboca en la vena cava inferior.

b) *Venas de la cápsula adiposa.* — Muy numerosas y muy desarrolladas, forman en toda la extensión de la cápsula una vasta red, que se condensa en el borde externo del riñón formando un extenso arco, el *arco venoso exorrenal*. Esta red está en conexión: 1.º con la vena renal; 2.º, con la red venosa intrarrenal (por medio de venas que perforan la cápsula). 3.º, con todas las redes venosas próximas (red de la cápsula suprarrenal, red del colon, red diafragmática, red del uréter, red de la pared abdominal posterior, venas espermáticas, etc.) De ahí la facilidad de las *circulaciones suplementarias* en caso de obliteración de una o varias venas.

C. *LINFÁTICOS.* — Los linfáticos se dividen en superficiales y profundos: los *linfáticos profundos* llegan al seno adosados a los vasos sanguíneos (cuatro o cinco ordinariamente), los *linfáticos superficiales* recorren la superficie del órgano, dirigiéndose hacia el hilio. Unos y otros van a los ganglios yuxtaaórticos derechos e izquierdos.

D. *NERVIOS.* — Los nervios emanan del plexo solar, del esplácnico menor y del cordón del gran simpático. Se dirigen al riñón adosados a las arterias. En el trayecto de estos nervios existen numerosos ganglios.

ARTÍCULO II

CONDUCTO EXCRETORIO DEL RIÑÓN

La orina, a su salida del riñón, es recibida en un sistema de conductos excretorios que la conducen a la vejiga.

1.º *Conformación exterior y relaciones.* — El conducto excretorio de la orina comprende, de arriba abajo: 1.º, los *calices*; 2.º, la *pelvis*, 3.º, el *uréter*.

A. *CÁLICES* — Los cálices, que siguen a las papilas del riñón, presentan la forma de pequeños tubos membranosos, de 1 centímetro de largo y de 6 a 12 milímetros de ancho: existen nueve de ellos por término medio. Cada uno presenta, con una *superficie exterior* y una *superficie interior*, dos extremidades, una *extremidad superior*, que abraza la base de la papila correspondiente; una *extremidad inferior*, que se abre en la *pelvis*. Hay que observar, sin embargo, que los cálices, en lugar de abrirse aisladamente en la *pelvis* renal, se reúnen primeramente entre sí, para formar conductos colectores más voluminosos, llamados *calices grandes* o *brazos de la pelvis*. Existen, por

lo común, tres cálices grandes: 1.º, el *cáliz grande superior*, oblicuo hacia abajo y adentro, que recoge los tres o cuatro cálices más elevados; 2.º, el *cáliz grande inferior*, oblicuo hacia arriba y adentro, que recoge los tres o cuatro cálices inferiores; 3.º, el *cáliz grande medio*, horizontal, continuación de los dos cálices medios.

B. PELVIS RENAL. — Receptáculo infundibuliforme, aplanado de delante atrás, que tiene de 20 a 30 milímetros de alto por 14 a 20 milímetros de ancho, y se halla situado inmediatamente detrás de la arteria renal.

a) *Conformación exterior* — Se consideran en ella: 1.º, una *base* que mira hacia el fondo del seno y recibe los tres cálices grandes; 2.º, un *vértice*, que se continúa con el *uréter* (a veces entre la base y el vértice hay un estrechamiento llamado *cuello*); 3.º, dos *caras*, una anterior, otra posterior, planas cuando la pelvis está vacía, abombadas cuando está llena; 4.º, dos *bordes*, uno superior, otro inferior, el primero muy oblicuo y el segundo casi horizontal.

b) *Relaciones.* — La pelvis está situada, parte en el seno (*porción intrarrenal*) y parte fuera del mismo (*porción extrarrenal*). En su *porción intrarrenal* está en relación: 1.º, *por delante*, con las ramificaciones de los vasos renales; 2.º, *por detrás*, con la pared posterior del seno, de la cual está separada por la rama posterior de la arteria renal. En su *porción extrarrenal* está en relación: 1.º, *por delante*, con la fascia pre renal y el peritoneo, y además, a la derecha, con el duodeno; 2.º, *por detrás*, con la fascia retro renal y el músculo psoas.

C. URÉTER. — Largo conducto cilíndrico (26 a 30 centímetros de largo por 5 ó 6 milímetros de diámetro) que se extiende del vértice de la pelvis renal a la vejiga.

a) *Trayecto y división.* — El uréter se dirige primero verticalmente hacia abajo, hacia el ángulo de bifurcación de la arteria ilíaca primitiva. De allí desciende a la pelvis. Después, dirigiéndose oblicuamente hacia fuera, alcanza la parte inferior de la vejiga, atraviesa oblicuamente su pared y se abre en su concavidad. El uréter comprende, por lo tanto, por razón de las cuatro regiones que atraviesa, las cuatro porciones siguientes: *porción abdominal o lumbar*, *porción ilíaca*, *porción pelviana* y *porción vesical*.

b) *Forma y calibre.* — Tiene la forma de un tubo cilíndrico, algo aplanado de delante atrás y mal calibrado. Presenta sucesivamente de abajo arriba: 1.º, el *infundíbulo*; 2.º, el *cuello o istmo*, 3.º, el *huso principal*, 4.º, el *estrechamiento marginal* (a nivel de los ilíacos), 5.º, el *huso pelviano*.

c) *Relaciones.* — Conviene examinarlas separadamente en cada una de las cuatro porciones:

a) *En su porción abdominal* (9 a 11 centímetros), el uréter está en relación: 1.º, *por detrás*, con el psoas, del cual está separado por el tejido celuloadiposo retroureterico; 2.º, *por dentro*, con la aorta a la izquierda y la vena cava inferior a la derecha, con el gran simpático y con los ganglios lumbares; 3.º, *por fuera*, primero con el riñón, después con la porción vertical del colon; 4.º, *por delante*, con el peritoneo, de cual está separado a trechos por el duodeno y por los vasos espermáticos.

β) *En su porción iliaca* (3 a 4 centímetros) está en relación. 1.º, *por detrás*, con los vasos ilíacos, a los cuales cruza y rodea; 2.º, *por dentro*, con la parte inferior de la columna lumbar, de la cual está separado por un espacio de 20 a 25 milímetros; 3.º, *por fuera*, con los vasos espermáticos o uteroováricos; 4.º, *por delante*, con el peritoneo (es de notar que está cruzado: a la izquierda, por el colon ilio-pélvico y su meso; a la derecha, por el segmento terminal del ileon y la porción inferior del mesenterio).

γ) *En su porción pelviana* (13 a 14 centímetros), el uréter se subdivide en dos porciones, una descendente y otra transversal. Las relaciones son diferentes según se trate del hombre o de la mujer. *En el hombre*, la porción descendente descansa sobre la arteria ilíaca interna, siguiendo su cara anterior a la derecha y su cara interna a la izquierda; la porción transversal se desliza primero sobre la cara anterior umbilicoprevesical, cruza por detrás del conducto deferente y la arteria deferencial, pasa entre la base de la vesícula seminal y la pared vesical y se introduce en el espesor de esta pared. *En la mujer*, la porción descendente se parece bastante a la del hombre (recorre la parte posterior de la fosa ovárica); la porción transversal avanza al principio por la base del ligamento ancho, alcanza luego el borde de la vagina, algo por debajo del fondo de saco lateral, pasa entonces sobre la pared vaginal anterior y, finalmente, desaparece en la pared vesical (nótese que, en la base del ligamento ancho, el uréter está cruzado hacia delante por la arteria uterina, a 15 milímetros del cuello). A este nivel, *por fuera del entrecruzamiento*, la uterina emite la arteria vaginal larga, y en cambio, *por dentro del entrecruzamiento*, la arteria cervicovaginal.

δ) *En su porción vesical* (10 a 15 milímetros), el uréter atraviesa oblicuamente la túnica muscular, luego se desliza entre esta última

y la mucosa, y se abre finalmente en el fondo de la vejiga por un orificio redondeado o bien en forma de hendidura.

D. CONSTITUCIÓN ANATÓMICA DEL CONDUCTO EXCRETORIO. — Se compone de *tres tunicas concentricas*, que son, de fuera adentro: *túnica conjuntiva*, *túnica muscular* y *túnica mucosa*.

a) *Túnica conjuntiva*. — Llamada también *túnica adventicia*, se continúa, por arriba, con la cubierta del riñón, y por abajo, con la cubierta celulosa que rodea la vejiga.

b) *Túnica muscular*. — Dos planos de fibras: 1.º, un *plano superficial*, formado por fibras circulares; 2.º, un *plano profundo*, formado por fibras longitudinales. En la parte inferior del conducto existe, además, por fuera de las fibras circulares, un nuevo plano de *fibras longitudinales*.

c) *Túnica mucosa*. — Tensa y lisa, de coloración grisácea, se continúa, por arriba, con la mucosa que cubre las papilas renales, y por abajo, con la mucosa de la vejiga.

1.º Vasos y nervios. — Las *arterias* proceden: 1.º, para los cálices y la pelvis del riñón, de la renal; 2.º, para las porciones abdominales e ilíaca del uréter, de la renal y de la espermática; 3.º, para la porción pelviana, de las ramas de la hipogástrica; 4.º, para la porción vesical, de las arterias vesicales. Las *venas* forman, detrás de la pelvis del riñón, un *plexo venoso retroperitoneal*, en relación con la renal y las venas de la cápsula adiposa. Las venas de la porción abdominal terminan en las espermáticas o en las uteroováricas, las de la porción pelviana van a la ilíaca interna o ilíaca primitiva. Los *linfáticos* (poco conocidos todavía) terminan: los de la pelvis, en un *ganglio retroperitoneal*; los del uréter, en los ganglios yuxtaaórticos e hipogástricos. Los *nervios* emanan del plexo renal, del plexo espermático y del plexo hipogástrico.

ARTÍCULO III

VEJIGA

La vejiga es un receptáculo musculomembranoso, destinado a recoger la orina que llega por el uréter y expulsarla luego al exterior.

1.º Consideraciones generales. — La vejiga está situada en la excavación pelviana, detrás de, pubis. En el feto, su parte superior se

remonta al abdomen, pero después del nacimiento la vejiga desciende poco a poco (o, mejor dicho, *aparente* descender) y va a cobijarse por entero, por lo menos cuando está vacía, detrás de la sínfisis pubiana.

a) *Medios de fijación.* — La vejiga está mantenida en posición: 1.º, por su continuidad con la uretra y por la inserción de cierto número de sus fibras en la próstata (órganos fijos); 2.º, por el uraco y los cordones fibrosos de las arterias umbilicales, que, desde su vértice, van al ombligo (*ligamentos superiores*). 3.º, por los *ligamentos anteriores* o *ligamentos pubovesicales*, que desde su parte antero-inferior van a la cara posterior del pubis; 4.º, por el peritoneo, que la cubre a modo de casquete y se refleja luego sobre las formaciones próximas.

b) *Forma y dirección.* — La vejiga tiene una forma prolongada en el feto y una forma globulosa u ovoide en el adulto.

Esta forma varía, por lo demás, en el adulto, según que esté la vejiga llena o vacía. En *estado de vacuidad*, la vejiga se presenta bajo dos aspectos principales, constituyendo o bien el *tipo esférico* (poco frecuente) o el *tipo aplanado* (mucho más frecuente). En *estado de plenitud* tiene la forma de un ovoide, cuya extremidad gruesa es postero-inferior, y la pequeña mira hacia arriba y adelante. Su eje mayor se dirige oblicuamente de arriba abajo y de delante atrás.

c) *Dimensiones.* — La vejiga, estando medianamente dilatada, presenta las siguientes dimensiones: diámetro vertical, 11 ó 12 centímetros; diámetro transversal, 8 ó 9 centímetros, diámetro anteroposterior, 6 ó 7 centímetros. Como puede verse, el diámetro vertical es el mayor de los tres. Sin embargo, algunas veces, sobre todo en la mujer, el diámetro transversal es el más largo (*tipo transversal*). La *capacidad media* de la vejiga está representada por la cantidad de orina que contiene cuando sentimos necesidad de orinar; esta cantidad varía de 150 a 250 gramos. La *capacidad fisiológica máxima* es la cantidad que contiene cuando su esfínter no puede ya luchar contra la reacción de las paredes que tienden a expulsarla; esta cantidad es de 300 a 350 gramos. Por lo demás, esta capacidad es muy variable según los individuos: *en el cadáver*, la vejiga está medianamente dilatada con 500 ó 550 gramos de líquido, pero puede, sin romperse, recibir 800, 900 y 1 000 gramos, la rotura se produce generalmente entre 1 300 y 1 500 gramos. *en estado patológico*, se han visto vejigas que contenían 5 y 6 litros y aún más (10 a 20 litros).

1.º Conformación exterior y relaciones. — La vejiga, que tiene la forma de un ovoide, ofrece a nuestra consideración. 1.º, la *base*; 2.º, el *vértice*; 3.º, el *cuerpo*, con *cuatro cavas* (anterior, posterior y laterales)

a) *Cara anterior.* — Se extiende, en altura, desde los ligamentos pubovesicales hasta el vértice de la vejiga. Corresponde a la pared anterior de la pelvis cuando la vejiga está vacía, y cuando está llena corresponde, además, a la pared anterior del abdomen

Entre la vejiga y la pared abdominopelviana hay un espacio ocupado por una capa de tejido celular laxo: es el *espacio prevesical*. Este espacio, de forma triangular, presenta: 1.º, un *vértice*, que está en relación con el ombligo. 2.º, una *base*, que descansa sobre el suelo de la pelvis; 3.º, una *pared anterior*, representada por la pared anterior del abdomen y de la pelvis, desde el ombligo hasta el suelo pelviano. 4.º, una *pared posterior*, representada por una lámina fibrosa (a la cual podríamos llamar *aponeurosis umbilicoprevesical*) que partiendo del ombligo, desciende por delante del uraco y de la vejiga, para terminar, hacia abajo, por una base muy ancha, en los ligamentos pubovesicales y en el suelo pelviano, entre ambas escotaduras ciáticas; 5.º, dos *bordes laterales*, que se dirigen oblicuamente del ombligo a la escotadura ciática, siguiendo poco más o menos el trayecto de la arteria umbilical (o del cordón fibroso que la reemplaza en el adulto).

Es digno de observar que el peritoneo, que tapiza la pared anterior del abdomen, se porta de un modo diferente a nivel de la vejiga, según ésta se halle vacía o llena: en el primer caso, el peritoneo, al llegar a la sínfisis, se refleja hacia arriba (*fondo de saco prevesical*), para alcanzar primero el vértice de la vejiga, y luego, desde allí, su cara posterior. Se admite teóricamente que el fondo de saco se eleva al propio tiempo que la vejiga se llena, y que está situado a 3 ó 4 centímetros por encima de la sínfisis, después de una inyección intravesical de 500 a 700 gramos. Pero siempre será preciso tener en cuenta las variaciones individuales, que son muy frecuentes.

b) *Cara posterior.* — De dimensiones variables, según esté la vejiga llena o vacía, está en relación: 1.º, en el hombre, con el recto, 2.º, en la mujer, con el útero y los ligamentos anchos. Está separada de estos órganos por un fondo de saco peritoneal, al cual descienden asas intestinales.

c) *Caras laterales.* — Las caras laterales, cubiertas por arriba por el peritoneo y libres por abajo, están en relación: 1.º, en su *porción peritoneal*, con las asas intestinales, 2.º, en su *porción infraperitoneal*,

con las paredes laterales de la pelvis (elevador del ano y obturador interno). Sobre estas caras laterales avanzan oblicuamente, cruzándose en X, el conducto deferente y la arteria umbilical (Nótese que, en el punto de cruce, la arteria es interna)

d) *Vértice (o polo vesical)*. — Situado más o menos alto, según el estado de distensión de la vejiga, da origen al uraco, que lo continúa hacia arriba.

e) *Base*. — Se extiende desde el orificio posterior de la uretra hasta el fondo de saco vesicorrectal *en el hombre*, y hasta el fondo de saco vesicouterino *en la mujer*. Está en relación: 1.º *en el hombre*, con la próstata, las vesículas seminales, los dos conductos deferentes (que limitan o separan el *triángulo interdeferencial*) y el recto, del cual está separada por la aponeurosis prostatoperitoneal; 2.º *en la mujer*, con el cuello uterino, con la pared anterior de la vagina, que le está ínnimamente adherida (*tabique vesicovaginal*).

3.º *Conformación interior*. — Igual conformación general e iguales divisiones topográficas que en la superficie exterior.

a) Las *paredes, tersas y lisas* en el feto, se hacen más tarde *reticuladas y areoladas* (*vejigas de columnas y vejigas de células de los viejos*).

b) La *base de la vejiga* presenta: 1.º, el *triángulo de Lieutaud*, región uniforme y lisa, triangular, de base posterior (midiendo cada uno de sus lados 22 milímetros cuando la vejiga está vacía, 45 milímetros cuando está llena), cuyos tres ángulos están marcados por tres orificios (en los dos ángulos posteriores, los orificios inferiores de los uréteres, en el ángulo anterior, el orificio posterior de la uretra); 2.º, el *fondo o bajo fondo de la vejiga*, depresión elipsoide, situada detrás del trigono y separada de este último por el *rodete interuretral* (que corresponde a la vagina *en la mujer*, y *en el hombre* al triángulo interdeferencial, a los conductos deferentes y a las vesículas seminales).

γ) El *vértice* nos presenta una pequeña depresión en embudo, en cuyo fondo se ve un diminuto orificio que conduce al conducto del uraco.

4.º *Constitución anatómica*. — La pared vesical se compone de tres túnicas: 1.º, túnica externa, *serosa*; 2.º, túnica media, *muscular*; 3.º, túnica interna, *mucosa*.

a) *Tunica serosa*. — La túnica serosa, dependencia del peritoneo reviste únicamente la cara posterior y la parte más elevada de

sus caras laterales. Desde la vejiga, el peritoneo se refleja: 1.°, hacia delante, sobre la pared abdominal anterior, 2.°, a derecha e izquierda, sobre las paredes laterales de la pelvis, 3.°, hacia atrás, sobre el útero en la mujer, sobre el recto en el hombre (*fondo de saco vesicouterino, fondo de saco vesicorrectal*). Es de notar que el peritoneo está intimamente adherido a la pared vesical subyacente.

b) *Túnica muscular*. — Está formada por fibras musculares lisas (*músculo vesical*), dispuestas en *tres capas* concéntricas.

a) La *capa exterior* está constituida por fibras longitudinales, esto es, dispuestas paralelamente al eje de la vejiga; las *fibras anteriores* van a insertarse en el pubis por dos manojos apañados, los *ligamentos anteriores de la vejiga*, las *fibras posteriores* se fijan en la base de la próstata, en el hombre, y en el tejido celular que une la vejiga a la vagina, en la mujer, las *fibras laterales* se insertan en parte en la próstata, y en parte en la aponeurosis perineal media.

β) La *capa media* está formada por fibras circulares. Alrededor del cuello y en la porción inicial de la uretra, forman el *esfínter vesical*, o mejor dicho, *esfínter interno de la uretra* (véase *Uretra*).

γ) La *capa interior* está formada por fibras longitudinales, fuertemente anastomosadas entre sí (*capa plexiforme*). A la hipertrofia de estos manojos se deben las *vejigas de columnas* y las *vejigas de células*. Hay que notar que, a nivel del trigono, la capa interna está formada por fibras finas, transversalmente dirigidas, formando un plano regular y homogéneo.

c) *Túnica mucosa*. — Tapiza en toda su extensión la superficie interior de la vejiga; se continúa por una parte con la mucosa del uréter y por otra con la mucosa de la uretra. De un grosor de un tercio de milímetro, es blanquecina en el niño, cenicienta en el adulto, rosada y aun tal vez rojiza en los individuos viejos. Su superficie externa se amolda exactamente sobre todas las desigualdades de su túnica muscular, a la cual está unida por una capa de tejido conjuntivo laxo. Su superficie interna, en contacto con la orina, presenta, cuando la vejiga está vacía, numerosos pliegues, que se borran a medida que el receptáculo se va llenando. Histológicamente considerada, consta: 1.°, del *corion*; 2.°, de un *epitelio* mixto estratificado 3.° de *glándulas* escasas y rudimentarias (véanse los tratados de Histología).

5.° *Vasos y nervios*. a) Las *arterias*, muy numerosas, se dividen (según la región por la cual se distribuyen) en: 1.°, *superiores*, suministradas por la parte que quedó permeable de la umbilical;

2.º, *inferiores*, procedentes de la hipogástrica; 3.º *posteriores*, procedentes de la hemorroidal media; 4.º, *anteriores*, todas ellas pequeñas, suministradas por la pudenda interna e la obturatriz. Estas diferentes arterias forman una *red perivesical*, una *red submucosa* y una *red mucosa*.

B) Las *venas* forman igualmente tres redes. 1.º, una *red mucosa*, de mallas poligonales. 2.º, una *red intramuscular*, cuyas venas están dispuestas, en su mayor parte, paralelamente a los manojos musculares; 3.º, una *red perivesical* o *superficial*. Las venas de esta última red se dividen en: *anteriores* que descienden al plexo de Santorini; *posteroinferiores*, que van a parar al plexo seminal; *laterales*, que descienden al plexo vesicoprostatico. Finalmente, todas estas venas terminan en la hipogástrica.

γ) Los *linfáticos* forman una *red mucosa* y una *red muscular*. Los troncos que emanan de ellas se dirigen hacia la superficie exterior de la vejiga (red perivesical) y vuelven a descender hacia la base, para terminar: 1.º, los *anteriores*, en los *ganglios perivesiculares*; 2.º, los *laterales*, en los *ganglios laterovesicales*, y de allí, en los *ganglios iliacos externos* y los *ganglios hipogástricos*; 3.º, los *posteriores*, en los *ganglios hipogástricos* y en los *ganglios del promontorio*.

δ) Los *nervios* emanan de los *ganglios hipogástricos*, que a su vez se anastomosan con las ramas anteriores de los tercero y cuarto nervios sacros. Se anastomosan entre sí de tal modo, que vienen a formar, en el espesor de la pared vesical, un vasto plexo (con numerosos ganglios pluri o unicelulares). Terminan en la mucosa (*filetes sensitivos*), en los músculos (*filetes motores*), y en los vasos (*filetes vasculares*).

ARTÍCULO IV

URETRA

La uretra es un conducto por el cual la orina, después de una permanencia más o menos prolongada en la vejiga, es expulsada al exterior. La estudiaremos separadamente en cada uno de los dos sexos.

1. LA URETRA EN EL HOMBRE

En el hombre, la uretra es un largo conducto que se extiende desde el cuello de la vejiga hasta la extremidad libre del pene; sirve a la vez para la evacuación de la orina y de la esperma.

1.º **Consideraciones generales.** — La uretra está situada parte en la pelvis y parte fuera de la misma.

a) **Dirección.** — Al abandonar la vejiga, se dirige oblicuamente hacia abajo y adelante. Al llegar debajo de la sínfisis, se dobla hacia delante y arriba hasta el nivel de la raíz del pene. Una vez allí, se dobla de nuevo (*ángulo prepubiano*), para hacerse luego verticalmente descendente. Describe, por lo tanto, dos curvas: una *curva posterior*, de concavidad dirigida hacia abajo y adelante, y una *curva anterior*, de concavidad dirigida hacia abajo y atrás. Esta segunda curvatura es sabido que desaparece en el momento de la erección.

b) **Divisiones.** Desde el punto de vista de su situación, la uretra se divide en *uretra superior* o *intrapélvica* y *uretra inferior* o *extrapélvica*, constituyendo el límite de separación entre estas dos porciones la aponeurosis perineal media. Según sus relaciones periféricas, se divide en tres porciones: 1.ª, *uretra prostática*, contenida en la próstata; 2.ª, *uretra membranosa*, situada entre la próstata y el bulbo; 3.ª, *uretra esponjosa*, situada en el centro del cuerpo esponjoso. Finalmente, desde el punto de vista de su movilidad, distinguiremos la *uretra fija* y la *uretra móvil*, extendiéndose la primera de la vejiga al ángulo prepubiano y correspondiendo la segunda a la porción libre del pene.

c) **Longitud.** — La uretra, en el adulto, mide por término medio 16 centímetros (se pueden observar uretras de 14 y de 20), de los cuales 30 milímetros corresponden a la porción prostática, 10 milímetros a la porción membranosa y 12 centímetros a la porción esponjosa. Nótese que, en el viejo, la longitud de la uretra aumenta en 2 ó 3 centímetros.

d) **Topografía de la uretra fija.** — La uretra está representada por una curva de concavidad anterointerna, que empieza en el cuello de la vejiga y termina en el ángulo prepubiano. Mide, por término medio, de 65 a 70 milímetros de largo: la recta que une sus dos extremidades (cuerda del arco) es de 55 milímetros. La uretra es al principio descendente, después ligeramente ascendente: desciende a 32 milímetros por debajo de su punto de origen y luego remonta 6 milímetros solamente. El punto más declive está situado delante de la aponeurosis perineal media, a 18 milímetros por debajo de la sínfisis. Por lo que toca al cuello y al ángulo prepubiano, están colocados, el primero a 25 milímetros del ángulo de la sínfisis (detrás y encima), el segundo a 31 milímetros de este mismo ángulo (delante y debajo). Considerada según su forma general, la uretra fija se compone de un

segmento inicial, aproximadamente rectilíneo, y de un *segmento terminal*, igualmente rectilíneo, reunidos entre sí por una curva de unión. Trazando dos tangentes por el lado externo de estos dos segmentos y prolongándolas una hacia otra, se las ve reunirse detrás del conducto de la uretra, formando un ángulo que podríamos llamar *ángulo de curvatura de la uretra fija*. Este ángulo, muy variable, es, por término medio, de 63°.

* * **Conformación exterior y relaciones.** — Prescindiendo de los dos engrosamientos, el *glándula* y el *bulbo*, que pertenecen al cuerpo esponjoso, la uretra tiene una forma bastante regularmente cilíndrica. Sus relaciones varían según las porciones que se consideren.

a) *Uretra prostática*. — Atraviesa la próstata desde la base del vértice. Si bien ocupa el plano medio, no se confunde con el eje de la glándula en su porción superior y en la mayor parte de su extensión, está siempre situada por delante de dicho eje, lo cruza en X algo por encima del vértice (formando un ángulo de 15 a 20°) y entonces se hace posterior con respecto al mismo. Es de notar que en el tercio superior de la próstata la uretra corre por el punto de unión del quinto anterior con los cuatro quintos posteriores de la glándula. Como relaciones lejanas de la uretra prostática, debemos señalar las mismas que las de la próstata.

b) *Uretra membranosa*. — Se extiende desde el vértice de la próstata a la parte posterosuperior del bulbo. Atraviesa la aponeurosis perineal media y se halla de este modo subdividida en tres segmentos: 1.º, un *segmento superior*, situado encima de la aponeurosis (rodeado por el *esfínter estriado*), en relación con el músculo de Wilson, el plexo de Santorini, el elevador del ano y la aponeurosis prostatoperitoneal; 2.º, un *segmento medio*, comprendido entre las dos hojas de la aponeurosis peritoneal media, en relación con el músculo de Guthrie (que lo rodea) y las glándulas de Cowper (situadas debajo de él); 3.º, un *segmento inferior*, debajo de las aponeurosis, en relación con el bulbo (en el cual penetra muy oblicuamente por su parte posterosuperior).

c) *Uretra esponjosa*. — Corre por debajo del pene, a lo largo del canal anguloso que forman, al adosarse entre sí, los dos cuerpos cavernosos. Corresponde por arriba, con los cuerpos cavernosos; por abajo, con la fascia penis. Termina en el vértice del glándula por un orificio en forma de hendidura vertical de 6 a 8 milímetros de alto, el *meato urinario*.

3.º **Calibre.** — Es conveniente, bajo este concepto, estudiar el conducto: 1.º, en estado de reposo; 2.º, en el momento de la micción.

a) *En estado de reposo* — La cavidad uretral, puramente virtual, se presenta entonces, observada en cortes transversales, bajo la forma de una hendidura. Esta hendidura, variable según los diferentes niveles, es: 1.º, vertical, a nivel del glande; 2.º, en forma de T invertida (J), en la base del glande y detrás del mismo; 3.º, después (por la desaparición gradual del palo vertical de la T) se hace transversal; 4.º, curva de concavidad posterior, a nivel del verumontánium; 5.º, de nuevo transversal, detrás del mismo; 6.º, circular, más o menos estrechada, a nivel del cuello. (Nótese que, en el viejo, el orificio del cuello está elevado por el lóbulo medio de la próstata, convirtiéndose en la *úvula vesical* de LIEUTAUD)

b) *En el momento de la micción.* La cavidad uretral es entonces real y tiene su *calibre fisiológico*. Presenta la forma de un cilindro, pero de un cilindro muy mal calibrado; de delante atrás encontramos: 1.º, *cuatro segmentos estrechados*, el meato, la parte media de la uretra esponjosa, el cuello del bulbo y el orificio del cuello; 2.º, en el intervalo de esos cuatro segmentos estrechados, *tres segmentos dilatados*, la fosa navicular, el fondo de saco del bulbo y la porción prostática entera. Nótese que el punto más estrecho (aparte el meato y la porción membranosa) está situado en la porción peniana, a 9 ó 10 centímetros del meato, y mide por lo menos 7 milímetros. Nótese también que las paredes de la uretra son muy extensibles y que el conducto, artificialmente dilatado, puede llegar hasta 9 milímetros de diámetro, o sea tener una circunferencia de 28 milímetros.

4.º **Conformación interior.** — Es sencilla. Unicamente ofrece a nuestra consideración un corto número de detalles, que examinaremos en cada una de las tres porciones.

a) *Uretra prostática.* — Presenta el verumontánium, los orificios de las glándulas prostáticas y el utrículo prostático. El *verumontánium* es una prominencia oblonga (12 a 14 milímetros de largo por un milímetro de ancho y 1 ó 2 milímetros de altura), situada en la parte media de la pared posterior de la uretra prostática. Se distinguen en ella: 1.º, una *extremidad superior*, redondeada, de la cual parten los *frenillos del veru*; 2.º, una *extremidad inferior* que va aplanándose gradualmente y cuya continuación forma la *cresta uretral*; 3.º, una *base*, formando cuerpo con la pared uretral. 4.º, un *vértice*, que presenta en la línea media el orificio del utrículo prostático, y a los

lados, los dos orificios de los conductos eyaculadores. A la derecha e izquierda del veru, los *dos canales laterales*. El *utrículo prostático*, que se abre en el vértice del veru, es un conducto impar y situado en la línea media, de unos 10 a 12 milímetros de largo que en plena próstata se dirige hacia la base de este órgano, alcanzándola algunas veces. Es una formación rudimentaria, homóloga, no del útero, sino de la vagina (*vagina masculina*). Los orificios de las *glandulas prostáticas* ocupan todo el contorno de la uretra; pero los más voluminosos de ellos se ven en los canales laterales y encima de la extremidad superior del verumontánium.

b) *Uretra membranosa*. — Pliegues longitudinales, continuación de la cresta uretral. Numerosos orificios de las glándulas de Littré, principalmente en la pared superior del conducto

c) *Uretra esponjosa*. — Encontramos en ella: 1°, en la parte anterior del fondo de saco del bucho, los dos orificios de las *glándulas de Cowper*, 2°, las *lagunas de Morgagni* depresiones en fondo de saco de abertura anterior, limitadas hacia la luz del conducto por un pequeño repliegue semilunar — se las divide en *grandes lagunas* o *foramina* (que ocupan la pared superior en número de doce o catorce) y *pequeñas lagunas* o *foraminula* (situadas por fuera de las precedentes y dispuestas en series lineales longitudinales); 3°, la *valvula de Guérin*, situada en la pared superior, a 1 ó 2 centímetros del meato, limitando debajo de ella un fondo de saco de 6 a 12 milímetros de profundidad, el *seno de Guérin*

5° **Constitución anatómica.** — Las paredes de la uretra están constituidas por *tres tunicas* concéntricas, que son, de dentro afuera. *túnica mucosa*, *túnica vascular* y *túnica muscular*

A **TÚNICA MUCOSA.** — Cubre el conducto en toda su extensión; se continúa hacia atrás con la mucosa vesical, hacia delante con la mucosa del glande, y a nivel del verumontanum con la mucosa de los conductos eyaculadores. Es blancoamarillenta en las dos porciones prostática y membranosa, rosada en la porción esponjosa, gruesa de 5 milímetros, de consistencia floja, muy extensible y muy elástica. Su *cara externa* se adhiere íntimamente a la túnica vascular. Su *cara interna*, libre, presenta pliegues longitudinales (*pliegues de vacuidad*), que desaparecen cuando el conjunto pasa del estado de vacuidad al estado de distensión. Histológicamente considerada, la mucosa uretral se compone 1° de un *corion*, 2° de un *epitelio* estratificado, y

3.º, de *glandulas*, que se presentan bajo dos formas: folículos y glándulas arracimadas.

B. *TÚNICA VASCULAR*. — Es una *submucosa modificada*, caracterizada: 1.º, por su riqueza en fibras elásticas; 2.º, por la presencia de numerosas cavidades venosas, profundamente anastomosadas entre sí. En las dos porciones prostática y membranosa, esta capa es poco gruesa (*tejido cavernoso rudimentario*). En la porción esponjosa, por el contrario, presenta un desarrollo considerable, y adquiere al propio tiempo todos los caracteres de las formaciones eréctiles; éste es el *cuerpo esponjoso de la uretra*.

C. *TÓNICA MUSCULAR*. — Fibras musculares lisas, dispuestas en dos planos: 1.º, *plano interno*, formado por fibras *longitudinales*; 2.º, *plano externo*, formado por fibras *circulares*.

a) *Fibras longitudinales*. — Son continuación de las fibras de la capa plexiforme de la vejiga. Muy desarrolladas en la porción prostática, van atenuándose en la porción membranosa, y en la porción esponjosa se confunden con los elementos musculares del cuerpo esponjoso.

b) *Fibras circulares*. — Continúan las fibras circulares de la vejiga. Atrás, en el cuarto superior de la uretra prostática, forman en su conjunto un ancho anillo, el *esfínter liso de la uretra* (10 a 12 milímetros de largo por 6 ó 7 de grueso), que preside la oclusión del orificio que pone en comunicación la vejiga con la uretra. En los tres cuartos inferiores de la uretra prostática, las fibras circulares son raras y poco visibles. En la uretra membranosa, la capa de las fibras circulares se reconstituye, gruesa y compacta. Finalmente, en la uretra esponjosa, sus elementos, profundamente disociados, se confunden con los del cuerpo esponjoso.

6.º *Vasos y nervios*. — Las *arterias* proceden: 1.º, las de la *uretra prostática*, de las arterias de la próstata; 2.º las de la *uretra membranosa*, de la hemorroidal inferior y de la vesical inferior; 3.º, las de la *uretra esponjosa*, de la bulbouretral, de la cavernosa y de la dorsal del pene. Las *venas* van, según las regiones, a la vena dorsal profunda, al plexo de Santorini, al plexo vesicoprostático y a la vena pudenda interna. Los *linfáticos* forman una rica red en toda la extensión del corion mucoso. Los pequeños troncos que de allí parten se mezclan, los de la *uretra prostática* con los linfáticos de la próstata; los de la *uretra membranosa*, así como los de la *porción bulbar*, atravesando la aponeurosis perineal media, van a los ganglios ilíacos ex-

ternos y a todos los ganglios vecinos de la pudenda interna; los del resto de la *uretra esponjosa* van a los vasos de la base del glande y luego, desde allí, a los ganglios superficiales de la ingle. Los nervios proceden: 1.º, los de la *uretra prostática* y la *uretra membranosa*, del plexo hipogástrico; 2.º, los de la *uretra esponjosa*, del nervio perineal superficial y del nervio dorsal del pene, ramas del pudendo interno.

2. LA URETRA EN LA MUJER

La uretra de la mujer, muy corta, representa únicamente las porciones prostática y membranosa de la uretra del hombre.

1.º **Consideraciones generales.**—Mide 35 milímetros de largo por 7 u 8 milímetros de diámetro (muy dilatable, admite fácilmente sondas de 10 a 12 milímetros). Se dirige oblicuamente hacia abajo y adelante (como la vagina), describiendo una ligera curva de concavidad anterosuperior.

2.º **Conformación exterior y relaciones.**—Ofrece el aspecto de un cordón bastante regularmente cilíndrico, con un *cuerpo* y *dos extremidades*, representada cada una de ellas por un orificio. El *cuerpo* atraviesa la aponeurosis perineal media y de ahí su división en dos porciones, porción *intrapelviana* y porción *extrapelviana*. Está en relación: 1.º, *por detrás*, con la pared anterior de la vagina, a la cual está íntimamente adherida en sus tres cuartos inferiores (*tabique uretrovaginal*); 2.º, *por delante*, con el plexo de Santorini y el constrictor de la vagina, 3.º, *hacia los lados*, con el plexo de Santorini, el músculo de Wilson y el músculo de Guthrie, el constrictor de la vagina y la raíz de los cuerpos cavernosos del clitoris. El *orificio superior* o *cuello*, redondeado o irregularmente estrechado, está situado a 2 u 3 centímetros por detrás de la sínfisis del pubis, en el trayecto de una horizontal que pasara por su parte media. El *orificio inferior* o *meato* está situado en la parte posterior del vestíbulo, delante del tubérculo vaginal. Su forma es variable: tan pronto dispuesto en forma de hendidura longitudinal, tan pronto redondeado o más o menos estrechado; ya superficial ya más o menos hundido o profundo.

3.º **Conformación interior.**—Vista en cortes transversales, la uretra tiene la forma de una hendidura (transversal en su parte superior, longitudinal en su parte inferior, estrechada en su parte media).

Vista anteriormente, después de incidida su pared, presenta: 1.º, pliegues longitudinales, que se borran por la distensión, 2.º, en la pared posterior, una pequeña cresta media, 3.º, lagunas de Morgagni; 4.º, orificios glandulares.

4.º **Constitución anatómica.** — Dos tunicas: una interna, *mucosa*; otra externa, *muscular*.

a) *Tunica mucosa* — Delgada, elástica, blanquecina o rosada, unida a la tunica muscular por una capa de tejido conjuntivo laxo. Histológicamente, se compone 1.º, de un *corion*; 2.º, de un *epitelio*, 3.º, de *glándulas* (dos formas: folículos y glándulas arracimadas).

b) *Tunica muscular*. — Fibras lisas, dispuestas en dos planos: plano interno, de fibras *longitudinales*; plano externo, de fibras *circulares*. Las *fibras longitudinales* se continúan hacia arriba con la capa plexiforme de la vejiga. Las *fibras circulares* continúan igualmente las fibras circulares vesicales, y forman, en su parte superior, el *esfínter liso de la uretra*. Nótese que a los elementos musculares se juntan numerosas fibras elásticas y gruesos conductos venosos anastomosados entre sí.

5.º **Vasos y nervios.** — Las *arterias* proceden de la pudenda interna, de la vesical inferior y de la vaginal. Las *venas* van a los plexos de Santorini, vaginal y vulvar. Los *linfáticos* terminan en los ganglios laterales de la excavación pelviana. Los *nervios* emanan del pudendo interno y del plexo hipogástrico.

CAPÍTULO II

ORGANOS GENITALES DEL HOMBRE

El aparato genital del hombre se compone esencialmente de dos partes: 1.º, un órgano glandular, el *testículo*, encargado de la elaboración del líquido fecundante, la *esperma*; 2.º, de conductos destinados a transportar este líquido a la *bolsa copulatrix* de la mujer y que constituye lo que llamamos *vas espermáticas*. A estas partes esenciales hay que añadir: 1.º, las *bolsas* o *escroto*; 2.º, un órgano copulador, el *pene*; 3.º, cierto número de *glándulas*; 4.º, los *músculos* y *aponeurosis del perineo*.

ARTÍCULO PRIMERO

TESTICULOS

Los testículos son dos órganos glandulares, a los cuales incumbe la importante función de secretar el elemento principal de la *esperma*, los *espermatozoides*.

1.º **Consideraciones generales.** — Los testículos, como los ovarios, están primitivamente situados en la región lumbar, a derecha e izquierda de la columna vertebral. Sólo al final del tercer mes descienden (*migración de los testículos*) hacia el conducto inguinal, lo alcanzan, atraviesan a su nivel la pared abdominal y van a ocupar su sitio en el fondo de las bolsas. (Nótese que el testículo izquierdo desciende ordinariamente algo más abajo que el derecho)

a) *Ectopia testicular* — El testículo puede detenerse en su descenso, dando lugar de este modo a lo que se llama *ectopia testicular*. Existen cinco variedades de ectopia, según la región en la cual se fija el testículo: *ectopia abdominal*, *ectopia inguinal*, *ectopia crural*, *ectopia genitocrural* y *ectopia perineal*. Cualquiera que sea la variedad,

falta el testículo en las bolsas, es lo que se llama *criptorquidia*. Esta puede ser *unilateral* o *bilateral*, *parcial* o *total* (según que la ectopia sea sólo del testículo o del testículo y el epidídimo a la vez). Nótese que el testículo ectópico es un órgano funcionalmente muerto, pues no produce espermatozoides. El individuo afecto de criptorquidia bilateral es, por lo tanto, infecundo.

b) *Dimensiones y peso*. — El testículo, en el adulto, mide, por término medio, 40 a 45 milímetros de largo, por 25 milímetros de ancho y 30 milímetros de alto. Su peso es de 18 a 22 gramos, de los cuales 4 corresponden al epidídimo.

c) *Color y consistencia*. — Coloración blancoazulada, tirando algo a rojo cuando el órgano está repleto de sangre. Consistencia firme y elástica, como la del globo ocular.

1.º *Conformación exterior y relaciones*. — Cada testículo se compone de dos partes: una parte principal, el *testículo propiamente dicho*, y una parte accesoria situada en su parte posterosuperior, el *epidídimo*.

A *TESTÍCULO PROPIAMENTE DICHO*. — Tiene la forma de un ovoide aplanado en sentido transversal. Ofrece a nuestra consideración dos *caras laterales*, dos *bordes* y dos *extremidades*.

a) *Caras laterales*. — Se distinguen en *externa* (convexa) e *interna* (casi plana). Ambas son tersas y lisas.

b) *Bordes*. — Se dividen en: 1.º, *anteroinferior*, convexo; 2.º, *posteriosuperior*, recto, que corresponde al epidídimo (en su parte media, el *hilio* del órgano).

c) *Extremidades*. — Se distinguen en: 1.º, *anterior* (o polo *anterior*), que presenta a veces una pequeña eminencia, la *hidatide de Morgagni*, 2.º, *posterior* (polo *posterior*), unida al escroto por el *ligamento escrotal* del testículo (mitad fibroso, mitad muscular).

B. *EPIDÍDIMO*. — Cuerpo prolongado de delante atrás, aplanado de arriba abajo, coronando el borde posterior del testículo a modo de cimera de casco (nótese que invade algo su cara externa). Mide 5 centímetros de longitud por 12 milímetros de ancho y 5 de espesor. Se observan en él, de delante atrás: 1.º, *cabeza*; 2.º, *cuerpo*; 3.º, *cola*.

a) *Cabeza*. — Es la parte más voluminosa del epidídimo, redondeada y lisa, situada encima del polo anterior del testículo, al cual está, además, unida por la vagina, por tejido conjuntivo y, sobre todo, por los conductos seminíferos (*conos eferentes*), que del testículo van al epidídimo.

b) *Cuerpo*. — Aplanado de arriba abajo, presenta: 1.º, una *cara superior*, convexa; 2.º, una *cara inferior*, cóncava, separada del testículo por un fondo de saco de la vaginal; 3.º, *borde externo*, delgado, que flota libremente en la cavidad vaginal; 4.º, un *borde interno*, más grueso, que corresponde a paquete vascular, al cual está unido por el *mesoepidídimo*.

c) *Cola*. — Descansa sobre la extremidad posterior del testículo, a la cual está unida por una capa de tejido celular. Se continúa por el conducto deferente.

3.º *Constitución anatómica*. — El testículo se compone: 1.º, de una cubierta o envoltura, la *albugínea*; 2.º, de un *tejido propio*.

A. *ALBUGÍNEA*. — Membrana fibrosa, de color blanco azulado, de un milímetro de grueso, que rodea completamente el testículo. Su *superficie exterior* es tersa y lisa. Su *superficie interior* da numerosos tabiques que se hunden en el tejido propio y que uniéndose por sus bordes, descomponen o dividen la cavidad circunscrita por la albugínea en una serie de espacios o *cavidades secundarias* de forma piramidal. A nivel del borde posterosuperior y en la parte media de ese borde, presenta un engrosamiento de forma piramidal: es el *cuerpo de Highmore*. El epidídimo está rodeado también por una albugínea, pero ésta es más tenue y menos resistente que la del testículo.

B. *TEJIDO PROPIO*. — Su forma es igual a una pulpa blanda, se mullida, de color moreno amarillento. Esta pulpa está formada por conductos muy finos, que dividiremos en dos grupos: 1.º, los situados en el propio espesor del testículo o *conductos productores de la esperma*; 2.º, los de fuera del testículo o *conductos excretores de la esperma*.

a) *Conductos productores de la esperma*. — Estos conductos, conocidos con el nombre de *conductillos seminíferos*, llenan los espacios o cavidades arriba descritos, circunscritos por los tabiques de la albugínea. Forman de este modo pequeñas masas, los *lóbulos espermáticos*, los cuales se dividen en grandes, medianos y pequeños, se cuentan de 250 a 300, constituidos cada uno de ellos por tres o cuatro conductillos seminíferos. Los conductillos seminíferos nacen de la base de los lóbulos, ya formando red (LAUTH), ya por extremidades libres dispuestas en ciego. Desde allí se dirigen al cuerpo de Highmore, arrollándose y apilotonándose sobre sí mismos, de modo que sólo ocupan una extensión de 2 ó 3 centímetros, siendo así que, desarrollados, presentan una longitud veinticinco o treinta veces más considerable

Durante su trayecto se anastomosan entre sí, en un mismo lóbulo y también de uno a otro lóbulo. Hay que notar la presencia, en cada conductillo, de cierto número de divertículos en forma de ciego. Al llegar al lóbulo, se reúnen para formar un conducto único, conocido con el nombre de *conductos rectos*. Pero estos conductos rectos no producen ya espermatozoides y los volveremos a encontrar en los conductos excretorios.

b) *Conductos excretorios de la esperma.* La esperma, al salir de los conductillos seminíferos, para llegar al conducto deferente, atraviesa sucesivamente los conductos rectos, la red de Haller, los conos eferentes y el conducto epididimario.

a) Los *conductos rectos* (*ductuli recti*), llamados así por su dirección, son muy cortos (200 a 400 μ de largo por 20 a 25 μ de ancho). Poco después de su origen o nacimiento se introducen en el cuerpo de Highmore y se pierden en la red de Haller.

β) La red de Haller, formada por los conductos rectos, está situada en pleno cuerpo de Highmore. En el hombre está formada menos por conductos regularmente calibrados y anastomosados que por cavidades irregularmente profundas y anastomosadas de manera amplia entre sí.

γ) Los *conos eferentes* nacen de la red de Haller. En número de diez a quince, se desprenden de la albugínea, penetran en la cabeza del epidídimo y desembocan individualmente en la porción inicial del conducto epididimario. Cada uno de ellos, largo de 15 a 20 centímetros cuando está desarrollado, se aplozona sobre sí mismo, de manera que viene a presentar en su conjunto la forma de un pequeño cono (de ahí su nombre) de 15 a 20 milímetros de largo y cuyo vértice corresponde al cuerpo de Highmore y la base al epidídimo.

δ) El *conducto epididimario*, conducto colector común de todos los conos eferentes, nace a nivel de la cabeza del epidídimo y se extiende hasta la cola, donde toma el nombre de *conducto deferente*. Mide de 6 a 7 metros de longitud por 300 a 400 μ de diámetro. Al igual que los conductos precedentes, es flexuoso y está fuertemente aplozonado sobre sí mismo hasta el punto de ocupar tan sólo una extensión longitudinal de 5 centímetros.

c) *Restos o vestigios embrionarios.* — Es de notar en el testículo o en su proximidad, la existencia de cierto número de restos embrionarios: 1.º, las *hidátides de Morgagni* (*hidátide pedicular e hidátide sénil*), que se desarrollan en la parte anterior del testículo y del epidídimo, 2.º, el *organo de Giraldués*, situado en la parte anterior del cor-

dón espermático; 3.º, los *vasa aberrantia del epididimo* (*vas aberrans de Haller, vas aberrans de Roth*)

4.º **Vasos y nervios.** — a) Las arterias proceden de la *espermática* (arteria principal) y de la *deferencial* (arteria accesoria). La *arteria espermática*, rama de la aorta (después de haber suministrado, algo por encima del epididimo, dos colaterales, la *arteria epididimaria anterior* y la *arteria epididimaria posterior*, destinada a la parte anterior y la parte posterior del epididimo), sigue de delante atrás el borde superior del testículo, y un poco antes de alcanzar el polo posterior se divide en dos ramas terminales: una *interna*, para la cara interna del testículo; otra *externa*, para su cara externa (esta, menos voluminosa, puede ser tomada por una simple colateral). Estas dos ramas emiten numerosos ramos, unos que recorren el espesor de la albugínea, y otros que corren por debajo de ella. Finalmente, van a parar a los lóbulos espermáticos, para terminar en los conductillos. En cuanto a la *arteria deferencial* (rama de la vesical inferior), envía uno o dos ramos al polo posterior del testículo, y se anastomosa, en el epididimo, con la *arteria epididimaria posterior* para formar el *arco supraepididimario*.

β) Las *venas*, saliendo de los lóbulos espermáticos, convergen hacia el cuerpo de Highmore, unas directamente (son las *venas profundas*), las otras siguiendo la albugínea (son las *venas superficiales*). A nivel del cuerpo de Highmore forman cinco o seis troncos, que se dirigen verticalmente hacia arriba, cruzando el lado interno del epididimo (nótese que reciben las venas procedentes de la cabeza del epididimo). A este primer grupo se añade otro segundo, situado detrás, formado por tres o cuatro troncos, procedentes del cuerpo y de la cola del epididimo. Los dos grupos venosos pasan al cordón. (Véase ANGIOLOGÍA.)

γ) Los *linfáticos*, nacidos en el tejido intersutural del órgano por una red cerrada, se dirigen al cuerpo de Highmore, siguiendo el mismo trayecto que las venas. Una vez allí, se condensan en siete u ocho troncos, reciben los linfáticos del epididimo y pasan al cordón para llegar a los ganglios preaórticos, ganglios yuxtaaórticos y ganglios medios de la cadena iliaca externa.

δ) Los *nervios* proceden del plexo espermático y del plexo deferencial.

ARTÍCULO II

CUBIERTAS DEL TESTICULO O BOLSAS

Los testículos, una vez efectuada su emigración, quedan contenidos dentro de un sistema de cubiertas concéntricas que se designan con el nombre de *bolsas*.

1.ª Conformación exterior. — Las bolsas se presentan bajo el aspecto de una prominencia voluminosa, impar y situada en la línea media, delante de la sínfisis, en el espacio que dejan por delante los muslos, y sujeta por su extremo superior, libre en el resto. Esta eminencia de forma ovoidea, mide, en el adulto, 6 centímetros de alto por 5 centímetros de ancho y 4 centímetros de espesor. Pequeñas y consistentes en el niño, son en el viejo flácidas y pendientes. En su cara anterior se ve un surco medio, en cuyo fondo existe un *rafe* (indicio de la duplicidad primitiva del órgano).

2.ª Constitución anatómica. — Las bolsas se componen de *seis* *túnicas*, regularmente superpuestas, que son de fuera adentro: 1.ª, el *escroto*; 2.ª, el *dartos*; 3.ª, la *túnica celulosa*; 4.ª, la *túnica eritroides*; 5.ª, la *túnica fibrosa*; 6.ª, la *túnica vaginal*.

A Escroto. — No es otra cosa que la piel de las bolsas. Es delgada, de color obscuro, extensible y elástica, formando numerosos pliegues transversales. *Pelos* largos y rígidos; *glándulas sudoríparas* y *glándulas sebáceas* muy numerosas y muy desarrolladas.

B Dartos. — Es una hoja delgada, de color rojizo, formada por fibras musculares lisas, aplicada a la cara interna del escroto y adherida íntimamente a la misma. Existe en toda la extensión de las bolsas. Por arriba, el dartos se continúa: 1.ª, *por delante*, con el dartos del pene; 2.ª, *por detrás*, con el dartos perineal. A los lados se continúa con la lámina elástica, que por otra parte va a insertarse en las ramas isquiopúbicas y en el tejido celular del abdomen: es el *aparato suspensorio de las bolsas* (del cual el ligamento suspensorio del pene es sólo una dependencia). A nivel del rafe, el dartos en parte se continúa en la línea media con el del lado opuesto (es la *hoja superficial*) y en parte se refleja de delante atrás (es la *hoja profunda*), para formar en el espesor de las bolsas un tabique medio, el *septum*

scroti. Existen, pues, dos sacos dartoicos, uno para el testículo izquierdo y otro para el testículo derecho.

C. **TÚNICA CELULOSA.** Encima del dartos se encuentra una capa celulosa, la *fascia de Cooper*, que continúa libremente con el tejido celular subcutáneo del perineo, del pene y de la pared abdominal anterior. Representa, a nivel de las bolsas, el tejido celular subcutáneo y la aponeurosis superficial de la pared abdominal.

D. **TÚNICA ERITROIDES.** — Túnica muscular formada por la expansión del cremáster. El cremáster es un músculo estriado, que nace por arriba en la espinal del pubis (*fascículo púbico*), y en el arco crural (*fascículo ilíaco*), desciende después sobre la superficie exterior del cordón y se desparrama en forma de abanico sobre la cara anterior y la cara externa de las bolsas, para formar la túnica eritroides. Los manojos musculares de la eritroides terminan todos en la túnica fibrosa de las bolsas, unos por extremidades libres, otros formando una especie de asas de concavidad superior.

E. **TÚNICA FIBROSA.** — Reviste la forma de un saco que envuelve a la vez el cordón y el testículo. Delgada a nivel del cordón, se hace más gruesa a medida que desciende. Por arriba se continúa con la fascia transversalis del abdomen, de la cual no es más que una dependencia.

F. **TÚNICA VAGINAL.** — La túnica vaginal es una membrana serosa, dependiente del peritoneo, que presenta una *hoja parietal*, una *hoja visceral* y una *cavidad*.

a) *Hoja parietal.* — Está en relación con la túnica fibrosa, a la cual está unida por una delgada capa conjuntiva, el *tejido celular subvaginal*.

b) *Hoja visceral.* — Tapiza regularmente el borde anterior, la cara interna y la cara externa del testículo. De este modo llega al epidídimo, en donde se halla dispuesta de distinto modo, por dentro, por fuera, por delante y por detrás. *Por dentro*, la hoja visceral encuentra el paquete vascular, se adosa al mismo en una extensión de 10 milímetros, después se refleja hacia dentro, para continuarse con la hoja parietal. *Por fuera*, se insinúa debajo del cuerpo del epidídimo, formando el *fondo de saco subepididimario*; después se extiende sobre la cara posterior del epidídimo, alcanza el paquete vascular, y después de haberlo tapizado en una extensión de algunos milímetros, tuerce hacia fuera, para continuarse con la hoja parietal. *Por delante*, la hoja visceral reviste la cabeza del epidídimo, después tapiza la parte anterior del cordón en una extensión de 4 a 5 milímetros y se continua

con la hoja parietal. Por detrás, reviste la parte anterior y las partes laterales del ligamento escrotal y luego se convierte en parietal.

c) *Cavidad vaginal*. — Es el espacio, *virtual*, comprendido entre las dos citadas hojas de la vaginal.

d) *Significación morfológica*. — La túnica vaginal no es más que una porción del peritoneo que el testículo, al descender, ha arrastrado a las bolsas. Primitivamente, la cavidad vaginal y la cavidad peritoneal están unidas entre sí por un conducto, el *conducto peritoneo-vaginal*, el cual se oblitera poco a poco y aun acaba por desaparecer, no dejando en su sitio más que un pequeño cordón conjuntivo, el *ligamento vaginal*. Nótese que, al decimoquinto o vigésimo día que sigue al nacimiento, el conducto peritoneovaginal está cerrado por los dos lados en las tres cuartas partes de los casos.

3.º *Vasos y nervios*. — Las *arterias* se dividen en superficiales y profundas: las *superficiales* (destinadas al escroto y al darto) proceden de las pudendas externas, ramas de la femoral y de la perineal superficial, rama de la pudenda interna; las *profundas* (para la eritroides, la túnica fibrosa y la hoja parietal de la vagina) proceden de la funicular. Las *venas* se dividen en dos grupos: *grupo externo*, que va a la safena o directamente a la femoral; *grupo posterior*, que va a la pudenda interna. Los *linfáticos* tienen su terminación en los ganglios superointernos de la región de la ingle. Los *nervios* emanan: 1.º, de la rama perineal inferior del nervio pudendo interno; 2.º, de las ramas genitales de los tres nervios genitocrural y abdominogenitales mayor y menor (filetes sensitivos, filetes motores y filetes vasculares).

ARTÍCULO II

VIAS ESPERMATICAS

Al salir del conducto del epidídimo, la esperma recorre sucesivamente el *conducto deferente*, la *vesícula seminal* y el *conducto eyaculador*, el cual, en el momento de la eyaculación, la vierte en la uretra.

1. CONDUCTO DEFERENTE

El conducto deferente viene a continuación de la cola del epidídimo y se extiende hasta la vesícula seminal.

1.º Consideraciones generales. — Conducto cilíndrico en la mayor parte de su extensión, se ensancha y es irregularmente abollado en su parte terminal.

a) *Dimensiones.* — Mide de 33 a 45 centímetros de largo por 2 a 2,5 milímetros de diámetro. Es de notar que el diámetro aumenta gradualmente a medida que se aproxima a la vesícula.

b) *Consistencia.* — Consistencia firme y característica, debida al espesor de sus paredes.

c) *Trayecto.* — Desde la cola del epidídimo, en donde nace, el conducto deferente se dirige oblicuamente hacia arriba y adelante, hasta la pared media del epidídimo. Una vez allí, se endereza, para hacerse vertical y pasar al cordón. Atraviesa luego el conducto inguinal, penetra en la cavidad abdominal, desciende hasta la excavación pélvica y alcanza el fondo de la vejiga, donde termina.

2.º División y relaciones. — Podemos dividirlo en cuatro porciones: porción *epididimaria*, porción *funicular*, porción *inguinal* y porción *abdominopelviana*.

a) La *porción epididimaria*, que tiene de largo solamente 25 a 30 milímetros, recorre el lado interno del epidídimo, al cual está unida por un tejido celular laxo.

b) La *porción funicular* recorre el espesor del cordón, entre los dos grupos venosos (anterior y posterior) que proceden del testículo.

γ) La *porción inguinal* se aloja en el conducto inguinal, siempre en medio de las gruesas venas del cordón.

δ) La *porción abdominopelviana*, al salir del conducto inguinal, describe una curva que abraza la otra curva que describe en sentido opuesto la arteria epigástrica. Después pasa por dentro de los vasos ilíacos externos, recorre la cara lateral de la vejiga (en donde cruza oblicuamente la arteria umbilical), llega a su cara posterior, se aproxima gradualmente a la porción abdominopelviana del lado opuesto, la alcanza en la base de la próstata, e inmediatamente después se continúa con el conducto eyaculador. Nótese que, en su porción retrovesical, el conducto deferente ensanchado, irregular, más o menos abollado, ha recibido el nombre de *ampolla*. La ampolla, directamente aplicada *por delante* contra la vejiga, está *por detrás* en relación con el recto (del cual está separada por la aponeurosis prostatoperitoneal); *lateralmente*, sigue el lado interno de la vesícula seminal, *hacia dentro*, las dos ampollas están separadas entre sí por un espacio triangular de base superior, el *triángulo interdeferencial*.

3.º Constitución anatómica.—La pared del conducto deferente está formada por *tres túnicas concéntricas*, que son, de fuera adentro: 1.º, una *túnica celular*; 2.º, una *túnica muscular*, la más desarrollada de las tres, constituida por tres planos de fibras: un plano medio de fibras circulares entre dos planos (superficial y profundo) de fibras longitudinales; 3.º, una *túnica mucosa*, de color blanquecino, que presenta a nivel de la ampolla pliegues anastomosados y depresiones o aréolas (que recuerdan las de la vesícula seminal).

4.º Vasos y nervios. Las *arterias* del conducto deferente proceden de la deferencial, rama de la vesical inferior. Las *venas* (formando una rica red en la túnica conjuntiva) van unas a las venas del cordón y otras a los dos plexos seminal y vesicoprostático. Los *linfáticos* terminan, en parte, en los ganglios ilíacos externos, y en parte, en los hipogástricos. Los *nervios* emanan del plexo hipogástrico.

2. VESÍCULAS SEMINALES

Las vesículas seminales son receptáculos membranosos, extensibles y contráctiles, en los cuales se acumula la esperma a medida que se va elaborando.

1.º Consideraciones generales.—Estas vesículas son dos, una derecha y otra izquierda, y están *situadas* entre la vejiga y el recto. Cada una de ellas mide 5 ó 6 centímetros de largo por 16 milímetros de grueso. Por lo demás, su volumen es muy variable (en relación con la actividad funcional de la glándula genital): las vesículas son pequeñas en el niño; se atrofian en los viejos y también después de la extirpación de los testículos.

2.º Conformación exterior y relaciones.—Son cuerpos piriformes, ligeramente aplanados de delante atrás y que presentan, por lo tanto: 1.º, una *cara anterior*, que corresponde al fondo de la vejiga; 2.º, una *cara posterior*, en relación con el recto, del cual está separada por la aponeurosis prostatoperitoneal; 3.º, un *borde interno*, que recorre la ampolla del conducto deferente; 4.º, un *borde externo*, que corresponde al plexo venoso *vesicoprostático*; 5.º, una *base*, irregularmente redondeada, que corresponde al peritoneo, el cual, antes de reflejarse sobre el recto, cubre la vesícula en una extensión de 10 a 15 milímetros; 6.º, un *vértice* o *cuello*, que corresponde a la base

de la próstata y presenta un orificio ovalado, por el cual la vesícula se abre en el conducto eyaculador. Nótese que las vesículas seminales tienen una superficie exterior muy irregularmente abollada y, por otra parte, están sumergidas en una especie de atmósfera celulomuscular.

3.º **Conformación interior.** — La cavidad de la vesícula, muy irregular, se descompone en una multitud de *celdillas*, de forma, orientación y dimensiones muy diversas, comunicando todas entre sí y descomponiéndose cada una de ellas en celdillas muy pequeñas, las cuales a su vez se dividen en otras más pequeñas todavía (*celdillas de primer orden, de segundo orden y de tercer orden*)

4.º **Constitución anatómica.** La vesícula seminal está constituida por un largo tubo (15 centímetros de largo), que se ha enrollado y apilotonado sobre sí mismo. Este tubo, una vez desarrollado, permanece flexuoso, mal calibrado, dando lateralmente origen a numerosos divertículos. Por lo demás, se compone, al igual que la ampolla del conducto deferente, de *tres tunicas superpuestas*: 1.º una *tunica celulosa*, 2.º, una *tunica muscular* (con tres planos de fibras), 3.º, una *tunica mucosa*, de color blanquecino y gruesa de un milímetro

5.º **Vasos y nervios.** — Las *arterias* proceden de la vesical inferior y de la hemorroidal media. Las *venas* forman alrededor del órgano, el *plexo seminal* continuándose hacia delante con el plexo vesicoprostático. Los *unfáticos* terminan en parte en los ganglios ilíacos externos (grupo posterior) y en parte en los ganglios hipogástricos. Los *nervios* emanan del plexo hipogástrico

3. CONDUCTO EYACULADOR

Los conductos eyaculadores son *dos*, uno derecho y otro izquierdo, y resultan de la reunión de la ampolla del conducto deferente y de la vesícula seminal correspondiente. Conducen a la uretra la esperma acumulada en estos dos receptáculos.

1.º **Trayecto y dimensiones.** Poco después de su nacimiento penetran en el espesor de la próstata y van a abrirse, por dos pequeños orificios elípticos, en el verumontanum, a izquierda y derecha del utrículo. Miden de 15 a 25 milímetros de largo por un milímetro y medio de diámetro. Es de notar que este diámetro disminuye a

medida que nos aproximamos a la uretra; es, por lo tanto, ligeramente infundibuliforme.

2.º Relaciones. — En su porción inicial (algunos milímetros únicamente), los conductos eyaculadores son libres. En el resto de su extensión avanzan por el espesor de la próstata, en donde encuentran el utrículo prostático, que va a colocarse entre los dos. Conductos eyaculadores y utrículo están rodeados de una masa de tejido cavernoso.

3.º Constitución anatómica. — Igual estructura fundamental que los conductos deferentes: una *túnica celulosa*, una *tunica muscular* (cuyos tres planos se dejan separar más o menos a su entrada en la próstata) y una *túnica mucosa*.

4.º Vasos y nervios. — En su porción supraprostatica, los conductos eyaculadores reciben sus arterias de la vesical inferior. En su porción intraprostática, su circulación y su inervación se confunden con las de la misma próstata.

ARTÍCULO IV

PENE

El pene es el órgano de copulación en el hombre. tiene por función, en el acto del coito, llevar la esperma a las partes genitales de la mujer.

1.º Consideraciones generales. — El pene está situado inmediatamente encima de las bolsas, delante de la sínfis del pubis. Situado al principio en el espesor del perineo, se dirige oblicuamente hacia arriba y adelante. Al llegar a la sínfisis, se desprende de la región profunda, se hace libre y se rodea de una cubierta cutánea. Presenta dos porciones: una *porción perineal* y una *porción libre*. Esta última, en estado de flaccidez, se presenta péndula, formando con la primera el *ángulo del pene* o *peniano*, en estado de erección se eleva hacia el abdomen continuando entonces la dirección de la porción perineal. Sus *dimensiones* son: en estado de flaccidez, 10 u 11 centímetros de largo por 8 ó 9 de circunferencia; y en estado de erección, 15 ó 16 centímetros de largo por 11 ó 12 de circunferencia.

2.º Conformación exterior y relaciones. — Se consideran en el pene el *cuerpo* y *dos extremidades*.

A CUERPO — Es cilíndrico, algo aplanado de delante atrás, con una *cara superior*, otra *inferior* y dos *bordes laterales*.

B EXTREMIDAD POSTERIOR. — La extremidad posterior, o *raíz del pene* está fija: 1.º, por la inserción de los cuerpos cavernosos en las ramas isquiopúbicas; 2.º, por el *ligamento suspensorio*, impar y medio, que, partiendo de la línea alba y de la sínfisis, va a terminar a la vez en la cara superior y (por fibras que lo rodean lateralmente) en la cara inferior de los cuerpos cavernosos; 3.º, por el *ligamento fibroso del pene*, que va de la parte posterior del pene a la sínfisis y a la aponeurosis perineal media.

C EXTREMIDAD ANTERIOR. Está representada por el glande y su prepucio:

a) *Glande* — Eminencia conoide que ofrece a nuestra consideración: 1.º, el *vértice*, dirigido hacia delante (meato urinario). 2.º, la *base*, cortada a bisel a expensas de su cara inferior y excediendo del cuerpo del pene por la parte que llamamos *corona*; está correctamente limitada por un surco, el *surco coronario* o *balanoprepucial*. 3.º, la *superficie exterior*, lisa, que presenta en su parte inferior un surco medio, el *frenillo* y las *fontas laterales* del mismo.

b) *Prepucio* — Repliegue tegumentario dispuesto en forma de manguito alrededor del glande. Se consideran en él: 1.º, la *superficie exterior*, formada por la piel; 2.º, la *superficie interior*, formada por la mucosa y correspondiendo al glande; 3.º, la *circunferencia posterior*, adherente, que corresponde al surco balanoprepucial; 4.º, la *circunferencia anterior*, libre, que forma el *orificio prepucial*. Se llama *cavidad del prepucio* el espacio comprendido entre el prepucio y el glande. Las dimensiones longitudinales del prepucio son muy variables: unas veces rebasa el glande, otras termina detrás del meato. Nótese que el orificio prepucial es algunas veces más estrecho, que no deja pasar el glande (*fimosis*).

3.º Constitución anatómica. — El pene se compone. 1.º, de *formaciones eréctiles*; 2.º, de *envolturas* o *cubiertas*.

A. FORMACIONES ERÉCTILES. — Comprenden los dos *cuerpos cavernosos* y el *cuerpo esponjoso*.

a) *Cuerpos cavernosos.* — Presentan la forma de cilindros, adosados en la línea media a modo de escopeta de caza de doble cañón (nótese que en la línea media están de tal modo fusionados que sus paredes forman un tabique único, incompleto, pectiniforme, el *septum penis*). Los cuerpos cavernosos nacen por detrás, por dos

partes afiladas o *raíces*, que se fijan a las ramas isquiopúbicas. Por delante, cada uno de ellos termina por una punta roma, que el *ligamento anterior de los cuerpos cavernosos* une a la cápsula del glande. Entre estas dos extremidades, el cuerpo cilindroide que forman los dos cuerpos cavernosos presenta: 1.º, una *cara superior*, con el canal supracavernoso (para vasos y nervios); 2.º, una *cara inferior*, con el canal subcavernoso (para la uretra); 3.º, *dos caras laterales*, convexas y redondeadas. Desde el punto de vista de su estructura, los cuerpos cavernosos se componen: 1.º, de una envoltura propia, de naturaleza fibrosa, la *albugínea*, 2.º, de un sistema de trabéculas conjuntivas que circunscriben aréolas por las cuales circula la sangre, verdadero tejido eréctil (véanse los tratados de Histología).

b) *Cuerpo esponjoso*. — Órgano impar y medio, cilindroide, de 12 a 16 centímetros de largo, situado en la cara inferior del cuerpo cavernoso. Su *parte media* o *cuerpo esponjoso propiamente dicho* ocupa el canal subcavernoso. El conducto de la uretra lo atraviesa de delante atrás en toda su extensión. Su *extremidad posterior*, abultada en forma de pera, constituye el *bulbo*, que tiene por término medio 3 centímetros de largo. Corresponde: 1.º por su *vértice*, al ángulo de reunión de los dos cuerpos cavernosos; 2.º, por su *base*, al rate medio que forman los dos músculos transversos del perineo; 3.º, por su *cara superior*, a la aponeurosis perineal media; 4.º por su *cara inferior*, a la aponeurosis perineal superficial; 5.º, por sus *caras laterales*, a los dos músculos bulbocavernosos. Su *extremidad anterior* está representada por un nuevo engrosamiento, el *glande*, descrito más arriba. Hay que notar: 1.º, que el cuerpo esponjoso, debajo del glande, está dividido por una hendidura media en dos hojas o láminas, una derecha y otra izquierda, reunidas por el *ligamento inferior del glande*; 2.º, que estas dos láminas, al llegar al meato, tuercen hacia fuera y atrás hasta la corona del glande; 3.º, que el glande en definitiva, tiene una *porción directa* y una *porción refleja*, limitando entre los dos la *cúpula posterior del glande*. Igual estructura fundamental que el cuerpo cavernoso.

B. ENVOLTURAS O CUBIERTAS DEL PENE. — Son cuatro superpuestas según el siguiente orden, de fuera adentro:

a) *Cubierta cutánea*. — Se continúa *por detrás* con la piel del abdomen y de las bolsas, *por delante*, se refleja para formar la mucosa del prepucio. Piel fina, muy movable y de color obscuro. En su cara inferior tiene un *rafe medio*, continuación del de las bolsas.

b) *Cubierta muscular*. — Está formada por fibras musculares lisas, en su mayor parte longitudinales, otras transversales u oblicuas

que constituyen en su conjunto el *dartos del pene* (continuación del dartos de las bolsas).

c) *Cubierta celulosa*. — Capa de tejido celular laxo, muy rica en fibras elásticas, casi desprovistas de grasa, por la cual corren los vasos y nervios superficiales.

d) *Cubierta elástica*. — Hoja elástica (*fascia penis*) que descansa directamente sobre las formaciones eréctiles. *Por detrás*, la fascia penis se continua con el ligamento suspensorio y con la aponeurosis perineal superficial. *Por delante*, se adosa a la base del glande y al fondo de saco circular que forma la mucosa del prepucio al reflejarse sobre la corona. Es de notar que, no prolongándose la fascia penis sobre el prepucio, éste está formado por las tres primeras cubiertas del pene, estando la primera y la segunda replegadas sobre sí mismas, y siendo por lo mismo dobles. Por lo tanto, atravesando el prepucio con un alfiler, se encuentran sucesivamente, la piel, el dartos, el tejido celular, el dartos y la mucosa.

4.º *Vasos y nervios*. — a) *Arterias*. — Las arterias se dividen en arterias de las cubiertas y arterias de los órganos eréctiles. Las primeras proceden de las pudendas externas y de la perineal superficial. Las segundas están formadas. 1.º, *en el cuerpo esponjoso*, por la bulbo-uretral (rama de la pudenda interna) y por la dorsal del pene; 2.º, *en los cuerpos cavernosos*, por las dos arterias cavernosas y la dorsal.

b) *Venas*. — Las venas forman dos sistemas, sistema superficial y sistema profundo. El sistema venoso superficial tiene su origen en las cubiertas. La mayor parte de las venas que lo constituyen desaguan en la *vena dorsal superficial*, que corre por el dorso del pene, en el tejido celular subcutáneo, llega delante de la sínfisis y allí dobla hacia fuera para terminar en la safena, ya del lado derecho, ya del lado izquierdo (a veces en las dos, después de haberse bifurcado). El sistema venoso profundo tiene su origen en los órganos eréctiles (cuerpo esponjoso, bulbo glande y cuerpos cavernosos). De las numerosas venas que lo constituyen, unas van a la *vena dorsal profunda*, que corre por el dorso del pene, debajo de la fascia penis, y va a desaguar en el plexo de Santorini (tributario de las pudendas internas); otras (principalmente las que proceden del bulbo y de la parte posterior de los cuerpos cavernosos) desembocan directamente (después de haber atravesado la aponeurosis perineal media) en el plexo de Santorini. Nótese que las dos venas dorsales se anastomosan entre sí, primero detrás del glande y luego delante de la sínfisis.

c) *Linfáticos*. — Los linfáticos se dividen, como las venas, en *superficiales y profundos*: 1.º, *linfáticos superficiales*, que nacen de los tegumentos y terminan en su mayor parte en el *tronco linfático dorsal superficial*, y, por mediación de éste, en los ganglios inguinales superficiales (grupo superointerno); 2.º, *linfáticos profundos*, que tienen su origen en la mucosa del glande y se reúnen en un *tronco* o varios *troncos linfáticos dorsales profundos*, los cuales terminan, ya en los ganglios inguinales profundos, ya (por el conducto inguinal) en los ganglios ilíacos externos. Algunos linfáticos van a los ganglios prevesicales atravesando la aponurosis perineal media.

d) *Nervios*. — Los nervios, muy numerosos proceden 1.º, *los de las cubiertas*, de los ramos genitales del plexo lumbar y del nervio pudendo interno, rama del plexo sacro; 2.º *los destinados a los órganos eréctiles*, del gran simpático (por el plexo hipogástrico, y del sistema cerebroespinal (por el nervio dorsal del pene y el nervio perineal superficial, dos ramas del plexo sacro).

ARTÍCULO V

GLANDULAS ANEXAS AL APARATO GENITAL DEL HOMBRE

Al aparato genital del hombre van anexas dos glándulas: la *próstata* y las *glándulas de Cowper*.

1. PRÓSTATA

La próstata es un órgano de naturaleza glandular que se desarrolla alrededor de la porción inicial de la uretra.

1.º *Consideraciones generales*. — Está situada la próstata en la excavación pélvica, inmediatamente por debajo de la vejiga. Tiene la forma de un cono de base superior y aplanado de delante atrás. Es de color gris y de consistencia dura. Mide, en el adulto, 28 milímetros de largo por 40 milímetros de ancho y 25 milímetros de grueso. Su peso es de 20 a 25 gramos. Nótese que es rudimentaria en el niño, que crece rápidamente en la época de la pubertad y que se hipertrofia más o menos en el viejo.

2.º *Relaciones*. — Se dividen en intrínsecas y extrínsecas:

a) *Relaciones intrínsecas* — La próstata está atravesada de arriba abajo por la uretra, por los conductos eyaculadores y por el utrículo prostático (véanse estos órganos).

b) *Celda prostática* — La próstata, constituida en su periferia por un sistema conjuntivomuscular que se denomina cápsula prostática, está contenida en una celda cuyas paredes pertenecen a formaciones distintas:

a) El fondo está formado por el plano perineal.

β) La pared anterior está representada por una delgada lámina conjuntiva, la *lámina prostática*.

γ) La pared posterior es constituida por la *aponeurosis prostatoperitoneal*.

δ) Las paredes laterales están formadas por tabiques sagitales, las *láminas sacrorrectogenitopúbicas*.

e) Por arriba, la celda prostática comunica directamente con la celda vesical.

c) *Relaciones extrínsecas* — Se consideran en la próstata cuatro caras (anterior posterior y laterales) una base y un vértice. La cara anterior mira hacia la sínfisis, de la cual está separada por el plexo venoso de Santorini. La cara posterior (un pequeño surco medio) corresponde al recto, del cual la separa la aponeurosis prostatoperitoneal. Las caras laterales corresponden al elevador, del cual están separadas a derecha e izquierda, por la parte inferior de la aponeurosis de este último músculo (*aponeurosis lateral de la próstata, aponeurosis puborrectal y ligamento puborrectal*). La base de la próstata (que se halla dividida en tres zonas) está en relación: en su zona anterior, con el cuello de la vejiga; en su zona posterior, con las vesículas seminales, los conductos deferentes y los conductos eyaculadores; su zona media se eleva formando una eminencia media, que es el *lóbulo medio*. El vértice de la próstata está situado algo por encima de la aponeurosis perineal media; de este vértice se desprende la uretra membranosa.

3.º **Constitución anatómica.** La próstata se divide en dos lóbulos laterales y un lóbulo medio, siendo este último muy variable (unas veces muy poco pronunciado, otras muy voluminoso, formando en este último caso, en la entrada de la uretra, una eminencia más o menos marcada, llamada *úvula vesical*). Histológicamente, la próstata presenta los dos elementos siguientes: 1.º, una *estroma*, conjuntiva y muscular a la vez, que forma una especie de cáscara periférica, un

núcleo central y numerosos tabiques radiales, que van del uno al otro y constituyen de este modo los espacios o cavidades, 2.º *elementos glandulares*, que ocupan y llenan estas cavidades, formando una treintena de glándulas arracimadas, cuyos conductos excretorios van a abrirse en la uretra prostática (véase *Uretra*). A partir de los veinte a los veinticinco años se observan *concreciones prostáticas*.

4.º **Vasos y nervios.**—Las *arterias* proceden de las vesicales inferiores y de las hemorroidales medias. Las *venas* desembocan en los plexos vesicoprostáticos, situados a los lados de la próstata. Los *linfáticos* forman un plexo periprostático, del cual salen numerosos eferentes que van a los tres grupos de ganglios ilíacos externos, ganglios hipogástricos y ganglios presacros (algunos van a los ganglios prevesicales). Los *nervios* emanan de los plexos hipogástricos (*filetes sensitivos*, *filetes secretorios*, *filetes motores*).

2. GLÁNDULAS DE COWPER

Las glándulas de Cowper, llamadas también *glándulas de Méry* y *glándulas bulbouretrales*, están situadas detrás de la base del bulbo

1.º **Conformación exterior y relaciones.**—Son *dos*, una derecha y otra izquierda; tienen la forma de dos pequeñas ramas redondeadas, del tamaño de una lenteja, colocadas simétricamente a cada lado de la línea media, a 5 ó 6 milímetros una de otra. Están en relación: *por arriba*, con la hoja profunda de la aponeurosis perineal media; *por abajo*, con la hoja superficial de esta misma aponeurosis. Están, por decirlo así, engobladas en la parte posterior del músculo de Guthrie.

2.º **Constitución anatómica.**—Las glándulas de Cowper son glándulas arracimadas descomponibles en lóbulos y acinos. Su conducto excretorio, de 30 a 40 milímetros de largo, atraviesa la hoja inferior de la aponeurosis perineal media, se introduce en el espesor del bulbo, se desliza por debajo de la mucosa uretral y va a abrirse en la parte posterior de la uretra, a nivel de la parte anterior del fondo de saco del bulbo.

3.º **Vasos y nervios.**—Las *arterias* proceden de la bulbouretral, rama de la pudenda interna. Las *venas* van al plexo de Santorini

Los *linfáticos* van a los ganglios hipogástricos. Los *nervios* emanan del pudendo interno.

ARTÍCULO VI

MÚSCULOS Y APONEUROSIS DEL PERINEO

DEL HOMBRE

La *pelvis* está limitada o cerrada por abajo, a nivel de su estrecho inferior, por cierto número de músculos y aponeurosis, que se designan con el nombre de *músculos y aponeurosis del perineo*.

1. MÚSCULOS DEL PERINEO

Los músculos del perineo son, en el hombre, en número de *nueve*, transverso del perineo, isquiocavernoso, bulbo-cavernoso, músculo de Guthrie, músculo de Wilson, esfínter externo de la uretra, esfínter externo del ano, elevador de ano e isquiococcigeo. Son todos ellos *músculos estriados*.

1.º Transverso del perineo.— Se extiende transversalmente del isquion a la línea media. Se inserta: por un extremo, en la cara interna de la tuberosidad isquiática, por el otro, en el rafe prerrectal o anobulbar. Está comprendido entre las dos aponeurosis perineal superficial y media. Forma el borde posterior del triángulo isquiobulbar, cuyo borde interno está formado por el bulbo cavernoso y el borde externo por el isquiocavernoso. Los dos músculos transversos, obrando de consuno, tienen por acción poner tenso el rafe fibroso, en el cual se insertan.

2.º Isquiocavernoso.— Pequeño músculo de forma prolongada, recortado sobre las ramas isquiopúbicas. Se inserta por una parte, por medio de un manojito interno, en la rama interna del isquion, y por un manojito externo, en la rama isquiopúbica; por otra parte, en la raíz del cuerpo cavernoso y en el propio cuerpo cavernoso, en su parte posterior (algunas veces, un manojito, el *manojito de Houston*, viene a reunirse, en el dorso del pene, con el del lado opuesto). Igual situación que el precedente. Su cara profunda, excavada en forma de conducto, abraza la rama isquiopúbica y la raíz de los cuerpos cavernosos. Comprimiendo los cuerpos cavernosos en su origen y

comprimiendo igualmente, por medio del músculo de Houston, la vena dorsal, contribuye a la erección.

3.º **Bulbo cavernoso.** — Músculo yuxtamedio, confundido, por decirlo así, con el del lado opuesto y recortado sobre la porción esponjosa de la uretra. Se inserta: por un lado, en el rafe anobulbar; por otro lado, en parte en la cara superior del bulbo (*fascículo uretral*) y en parte en los cuerpos cavernosos (*fascículo peniano*). Este último fascículo forma algunas veces un fascículo en el músculo de Houston. El bulbo cavernoso, por su *cara interna*, excavada en conducto, abraza la mitad correspondiente del bulbo y de la porción inicial del cuerpo cavernoso. Obra en la micción y la eyaculación (*accelerator urinae et seminis*) y, al igual que el isquiocavernoso, contribuye a la erección.

4.º **Músculo de Guthrie.** — Es un pequeño músculo aplanado y triangular, situado entre las dos hojas de la aponeurosis perineal media. Se inserta: por una parte, en el labio posterior de las ramas isquiopúbicas; por otra parte, en la hoja anterior de la aponeurosis perineal media, como también en las caras laterales y la cara anterior de la uretra membranosa. Está en relación con las glándulas de Cowper, con los vasos pudendos internos y con un gran número de venas que lo atraviesan. Obra en la micción, la eyaculación y la erección (comprimiendo las venas); favorece de este modo la expulsión del producto de secreción de la glándula de Cowper.

5.º **Músculo de Wilson.** — Es un pequeño músculo impar y medio, de forma triangular, situado en el ángulo que forman las dos ramas isquiopúbicas. Se inserta: por una parte, por su base, en el ligamento subpubiano, y por otra parte, por su vértice, en las paredes laterales e inferiores de la uretra. Corresponde, por su *cara inferior*, a la aponeurosis perineal media, por su *cara superior*, al plexo de Santorini. Eleva la uretra hacia la sínfisis.

6.º **Esfínter externo de la uretra.** Llamado también *esfínter estriado*, ocupa, como el precedente, el interior del compartimiento prostático. Se extiende, en altura, desde el cuello de la vejiga hasta la aponeurosis perineal media; *por abajo* (sobre la uretra membranosa y también sobre el vértice de la próstata), forma un anillo completo o manguito, *por arriba* (a nivel de la porción superior de la próstata), está representado por dos semianillos, uno anterior y otro posterior. Está en relación, *por detrás*, con la aponeurosis prostato-

peritoneal; *por delante*, con el músculo de Wilson y el plexo de Santorini. Al contraerse, comprime la uretra; obra principalmente en el momento de la eyacuación, para expulsar la esperma.

7.º **Esfínter externo del ano.** — Está formado por diez o doce manojos concéntricos, dispuestos alrededor de la parte inferior del recto. Circular cuando el ano está abierto, es elíptico cuando está cerrado. Mide de 20 a 25 milímetros de alto. Se inserta: por una parte (detrás del ano), en el rafe anococcígeo; por otra parte (delante del ano), en los tegumentos y en el rafe anobulbar. Está en relación: 1.º, por su *cara externa*, con el tejido celuloadiposo de la fosa isquiorrectal; 2.º, por su *cara interna*, con el esfínter interno y la mucosa rectal; 3.º, por su *circunferencia superior*, con el elevador del ano; 4.º, por su *circunferencia inferior*, con la piel del perineo. Tiene por función cerrar el recto (*constrictor ani*).

8.º **Elevador del ano.** — Músculo delgado, aplanado, muy ancho, de forma triangular, que va de la pared anterolateral de la pelvis a la región del ano.

Se distinguen en él *dos porciones*, una interna y otra externa. La *porción externa* tiene su origen en la rama descendente y en la rama horizontal del pubis, en el *arcus tendineus* y en la espina ciática. Desde allí, todas sus fibras se dirigen por detrás del recto, en donde en su mayor parte se entrecruzan con las del lado opuesto. La *porción interna* (*levator ani proprius* de LESSHAFT) nace, algo por dentro y encima de la precedente, en las dos ramas del pubis. Después se dirige de delante atrás, cruza la cara lateral de la próstata y llega a la parte anterior del recto; una vez allí, los fascículos que la constituyen (unos después de entrecruzarse en la línea media, otros sin entrecruzarse) tuercen hacia abajo para venir a fijarse en la cara profunda de la piel del ano.

Comprendido de este modo, el elevador presenta dos caras: una *cara superior*, cóncava, en relación con el contenido de la excavación; una *cara inferior*, convexa, separada de la pared lateral de la excavación por la fosa isquiorrectal y su contenido. Reunidos, los dos elevadores forman, por su conjunto, el *diafragma pelviano*, que obra en el momento del esfuerzo.

Desde el punto de vista de su acción, la porción externa (obrando a modo de cincha) cierra el recto, como el esfínter externo; la porción interna conduce el ano hacia delante y arriba.

9.º **Isquiococcigeo.**—Es un pequeño músculo aplanado y triangular situado detrás del elevador. Se inserta por una parte (por su vértice), en la espina ciática y en el pequeño ligamento sacrociático; por otra parte (por su base), en el borde del cóccix y del sacro. Está constituido en parte por manojos musculares y en parte por manojos fibrosos (es una formación rudimentaria, homóloga del abductor de la cola de los animales)

2. APONEUROSIS DEL PERINEO

En número de tres, de fuera a dentro, son: la *aponeurosis perineal superficial*, la *aponeurosis perineal media* y la *aponeurosis perineal profunda*.

1.º **Aponeurosis perineal superficial.**—Situada inmediatamente debajo de los tegumentos, ocupa el espacio angular circunscrito por las ramas isquiopúbicas. De forma triangular, ofrece a nuestra consideración: 1.º, una *cara inferior*, en relación con la piel. 2.º, una *cara superior* en relación con el triángulo isquibulbar y los tres músculos que la circunscriben. 3.º, dos *bordes laterales*, que se adhieren, a derecha e izquierda, al labio anterior de las ramas isquiopúbicas; 4.º, el *vértice*, que se continúa, algo por delante de la sínfisis, con la cubierta fibrosa del pene; 5.º, la *base*, finalmente, que tuerce por detrás del músculo transverso, para fusionarse con la aponeurosis perineal media.

2.º **Aponeurosis perineal media.**—Tiene la forma de un triángulo y llena exactamente el espacio isquiopúbico. Al igual que la precedente, presenta: 1.º, una *cara inferior*, en relación con los músculos superficiales (isquiocavernosos, bulbocavernosos y transversos); 2.º, una *cara superior*, que está en relación con la pelvis; 3.º, dos *bordes laterales*, fijados a las ramas isquiopúbicas; 4.º, el *vértice*, que se continúa con el ligamento subpúbico; 5.º, la *base*, que va de uno a otro isquion.

La aponeurosis perineal media se compone en realidad de dos *hojas*, una inferior y otra superior, entre las cuales se coloca el músculo de Guthrie y la glándula de Cowper. A nivel de la base, la *hoja inferior*, torciendo por detrás del músculo transverso, se continúa, como acabamos de ver, con la aponeurosis superficial; la *hoja superior* (o por lo menos su parte media), enderezándose hacia arriba, sube

entre la próstata y el recto, para ir a terminar en el fondo de saco rectovesical: es la *aponeurosis prostatoperitoneal* o de *Denonvilliers*. Nótese que esta aponeurosis, muy diferente de las aponeurosis ordinarias, está constituida a la vez por tejido conjuntivo y fibras musculares lisas.

La aponeurosis perineal media es atravesada por numerosos órganos, principalmente por la uretra, el nervio dorsal del pene, las arterias dorsal y cavernosa, la vena dorsal del pene y las venas posteriores de los cuerpos cavernosos.

3.º Aponeurosis perineal profunda. — La aponeurosis perineal profunda, llamada también *aponeurosis perineal superior* o *aponeurosis pelviana* (*fascia pelvis*), puede ser considerada como el conjunto de las diversas hojas aponeuróticas que cubren por arriba los ocho músculos que constituyen el suelo de la pelvis (los dos elevadores, los dos isquiococcigeos, los dos obturadores internos y los dos piramidales). Considerada de este modo, tiene la forma de embudo, como la cavidad sobre la cual se extiende. Se la puede dividir en dos mitades laterales, cada una de las cuales presenta un borde externo, un borde interno, una cara superior y una cara inferior.

a) *Borde externo* — De forma semicircular, se confunde con la línea de inserción pelviana de la aponeurosis, cuya línea de inserción corresponde sucesivamente, 1.º, al cuerpo del pubis y a su rama horizontal; 2.º, a reborde inferior del agujero obturador; 3.º, a la línea innominada (hasta la sínfisis sacroilíaca), 4.º, a la cinta precática (que sigue el borde anterior de la escotadura mayor); 5.º, al borde superior del piramidal hasta el sacro.

b) *Borde interno* — Mira hacia la línea media. Es de notar que a nivel de su borde interno, las dos mitades de la aponeurosis pelviana no están en contacto más que en dos puntos, que son el *rafe anobulbar* y el *rafe anococcigeo*. Entre estos dos rafe, las dos aponeurosis están separadas una de otra por un orificio que da paso al recto. Delante del *rafe anobulbar* están separadas por un intervalo triangular que está en relación con la aponeurosis perineal media. Detrás del *rafe anococcigeo* existe un nuevo intervalo triangular que está en relación con el cóccix y el sacro.

c) *Cara inferior*. Es convexa y descansa directamente sobre los músculos adyacentes, a los cuales está unido por una tenue capa de tejido celular.

d) *Cara superior.* — Cóncava, está en relación con los órganos contenidos en la pelvis y con el peritoneo. Nótese, sin embargo, que el peritoneo no se aplica directamente sobre la aponeurosis pelviana. Entre la membrana fibrosa y la membrana serosa se interpone una capa de tejido celular laxo más o menos rico en grasa, esta capa no es más que una dependencia del tejido celular subperitoneal, y el espacio que la contiene constituye el *espacio pelvirectal inferior* o *fosa isquiorrectal*, que se halla debajo del elevador.

CAPITULO III

ORGANOS GENITALES DE LA MUJER

El aparato genital de la mujer, profundamente situado en la excavación pelviana, se compone esencialmente de dos partes: 1.º, de un cuerpo glandular, el *ovario*, en el cual se forman los óvulos; 2.º, de un largo conducto, que se extiende desde la vecindad del ovario hasta la superficie exterior del cuerpo y que toma sucesivamente los nombres de *trompa de Falopio*, *utero* y *vagina*. A estos órganos esenciales es preciso añadir: 1.º, los *órganos genitales externos o vulva*, 2.º, cierto número de *glandulas*, 3.º, los *músculos* y las *aponeurosis del perineo*.

ARTÍCULO PRIMERO

OVARIOS

Los ovarios o *glandulas genitales de la mujer* son cuerpos de apariencia glandular destinados a producir los óvulos.

1.º **Consideraciones generales.** — Los ovarios, como los testículos, están situados primitivamente en la región lumbar. Hacia el tercer mes abandonan esta región (*emigración del ovario*), para adoptar en la pelvis la posición que en adelante ocuparán ya de una manera definitiva.

a) **Situación y medios de fijación** — Una vez efectuada su emigración, los ovarios se hallan colocados en el cávum retrouterino, en las partes laterales de la excavación, delante del recto, detrás del ligamento ancho y de la trompa (a 10 ó 15 milímetros por delante de la sínfisis sacroilíaca, a 8 ó 10 milímetros por debajo del estrecho superior, a 1 ó 2 centímetros por encima y delante del borde superior del piramidal).

Están mantenidos en posición. 1.º, por la adherencia de su borde anterior al ligamento ancho; 2.º, por tres ligamentos propios (*ligamentos del ovario*), a saber: a) *Ligamen o uteroovárico*, cordón redondeado, de 3 centímetros de largo por 3 milímetros de diámetro, que se extiende transversalmente desde la extremidad interna del ovario al ángulo del útero b) *Ligamento tuboovárico*, que une la extremidad externa del ovario al orificio abdominal de la trompa y) *Ligamento lumboovárico o iloovárico*, que va desde la fascia subperitoneal de la región lumbar al borde adherente del ovario. Todos estos ligamentos están constituidos por fibras musculares lisas.

A pesar de estos medios de sostén o fijación, el ovario es un órgano muy móvil, que oscila en su sitio y aun puede cambiar de lugar.

b) *Número*. Los ovarios, como los testículos, son dos, uno derecho y otro izquierdo. (Nótese que puede haber ovarios *supernumerarios*, ovarios rudimentarios y aun falta de ovarios.)

c) *Volumen y peso*. — El ovario de la mujer adulta tiene, por término medio, 36 milímetros de largo por 17 milímetros de ancho y 12 de grueso. Estas dimensiones son mucho más pequeñas en la niña. Disminuyen después de la menopausia y aumentan durante la menstruación. El peso del ovario es, en la mujer adulta, de 6 a 8 gramos (peso específico = 1.051).

d) *Color y consistencia*. — De un blanco rosado en la niña el ovario es, en la mujer adulta, de un color rojo que se acentúa durante el periodo de la menstruación. Después de la menopausia toma un tinte gris o gris amarillento. Es de consistencia firme y resistente, que recuerda hasta cierto punto la del testículo, siendo, sin embargo, algo menor.

e) *Orientación*. — El ovario, en la mayor parte de casos (su situación es muy variable), está colocado en la parte superoexterna del cavum retrouterino, de tal modo que su eje mayor, si bien se aproxima mucho a la vertical, está dirigido oblicuamente de arriba abajo de fuera adentro y algo de atrás adelante.

2.º **Conformación exterior y relaciones.** El ovario tiene la forma de un elipsoide aplanado, o sea de una almendra. Se consideran en él *dos caras* (externa e interna) *dos bordes* (anterior y posterior) y *dos extremidades* (superior e inferior). La *cara interna*, convexa, está en relación con la aleta superior del ligamento ancho, que, muy a menudo, cae sobre ella de delante atrás. La *cara externa*, igualmente convexa, descansa sobre las paredes laterales de la excavación,

en la *fosita ovárica*. Está limitada *hacia atrás*, por los vasos hipogástricos y el ureter; *hacia delante*, por la inserción pelviana del ligamento ancho; *hacia arriba*, por los vasos ilíacos externos, que la separan del psoas, y *hacia abajo*, por el origen de las arterias umbilical y uterina. El *borde anterior*, casi rectilíneo, se continúa con la ala posterior del ligamento ancho. A este nivel es por donde pasan los nervios y vasos que llegan al ovario o que salen del mismo (*hilio del ovario*). El *borde posterior*, convexo, libre en toda su extensión, está en relación con las asas intestinales. La *extremidad superior* está más o menos cubierta por la trompa y da origen al ligamento tuboovárico. La *extremidad inferior* presta inserción al ligamento uteroovárico.

3.º Constitución anatómica. — El ovario, observado en un corte, presenta dos zonas bien distintas: 1.º, una zona central, de un color rojo vivo, que es la *substancia medular* o *bulbo del ovario*; esta substancia está esencialmente constituida por vasos sumergidos en una especie de ganga a la vez conjuntiva y muscular; 2.º, una zona periférica, que rodea a la primera por todas partes, excepto a nivel del hilio, que es la *substancia cortical*; ésta contiene, irregularmente diseminados en una estroma conjuntiva, los *folículos de De Graaf* u *ovisacos*, elementos esenciales del ovario.

El ovario en fin, está cubierto en toda su extensión por una capa de células epiteliales, cuyo conjunto constituye el *epitelio ovárico*.

En resumen, el ovario comprende: el epitelio ovárico, una estroma conjuntiva y los folículos de De Graaf. Por lo que se refiere a su estructura véanse los tratados de Histología.

4.º Vasos y nervios. — Las *arterias* proceden de la ovárica. Esta arteria, rama de la aorta abdominal, llega al ovario junto a su extremidad externa. Después, torciendo hacia dentro, sigue su borde anterior para ir a anastomosarse con una rama de la uterina. Del arco transversal así formado parten diez o doce arterias, llamadas *ováricas*, que se dirigen hacia el borde anterior de la glándula y desaparecen en su espesor (flexuosas, artolladas en espiral, apelotonadas sobre sí mismas, verdaderas *arterias helicinas*). Las *venas*, muy numerosas, muy irregulares, diversamente artolladas y apelotonadas, forman en la substancia medular una rica red. Se desprenden del ovario a nivel del hilio y allí se mezclan con cierto número de otras que proceden del útero, para remontar hacia el abdomen, formando el *plexo pampiniforme* (véase ANGIOLOGÍA). Termina, finalmente, en la vena renal, en

el lado izquierdo, y en la vena cava inferior, en el lado derecho. Los *linfáticos*, en número de cinco o seis troncos, salen del hilio (donde forman el *plexo subovárico*) y, mezclándose con el cordón vascular uteroovárico, remontan hacia el abdomen, para ir a parar a los ganglios pre y yuxtaaorticos, a nivel o bien algo por debajo de la extremidad inferior de los riñones. Los *nervios* proceden del plexo ovárico, que acompaña a la arteria del mismo nombre. Se dividen, en el espesor del ovario, en filetes *vasculares*, filetes *motores* y filetes *sensitivos*.

ARTÍCULO II

TROMPAS UTERINAS U OVIDUCTOS

Las trompas uterinas u oviductos son dos conductos, uno derecho y otro izquierdo, que se extienden desde la extremidad externa del ovario al ángulo superior del útero.

1° **Consideraciones generales.**— Encargadas de transportar los óvulos de la superficie del ovario a la cavidad uterina, las trompas vienen a ser los conductos excretores de la glándula ovárica.

a) *Situación y medios de fijación* — La trompa está situada en la aleta superior del ligamento ancho. Mientras que su extremidad interna se continúa con el útero, su extremidad externa se une al ovario por el ligamento tuboovárico. Retenida de este modo, no puede abandonar la posición que ocupa, sobre todo en su porción externa. Téngase presente que, durante la preñez, las trompas, como los ovarios, se elevan con el fondo del útero en la cavidad abdominal.

b) *Dirección* — Siguiendo la trompa desde el útero hacia el ovario, se ve que al principio se dirige de dentro afuera, hasta la parte media del ovario. Una vez allí, tuerce de delante atrás y después de fuera adentro. Su parte externa describe de este modo una especie de asa de concavidad interna.

c) *Dimensiones* — La longitud de la trompa es, por término medio, de 10 a 12 centímetros. Su diámetro aumenta gradualmente de dentro afuera, siendo de 2 a 4 milímetros junto a su extremidad externa.

2° **Conformación exterior y relaciones.** La trompa, que ha sido comparada a una trompeta (*tuba*), ofrece a nuestra considera-

ción *tres porciones*, que son, de dentro afuera, 1.ª, una porción interna o *intersticial*; 2.ª, una porción media, que constituye el *cuerpo*; 3.ª, una porción externa, que forma el *pabellón*.

a) *Porción intersticial*. — Está situada en el propio espesor de la pared del útero, entre el borde superior y el borde lateral.

b) *Cuerpo*. — El cuerpo se desprende del ángulo del útero, entre el ligamento redondo y el ligamento del ovario. Se subdivide en *dos partes*: una interna, de 3 a 4 centímetros de largo y ancha de 3 a 4 milímetros, llamada *istmo*; otra externa, que mide 7 u 8 centímetros de largo por 8 ó 9 milímetros de diámetro, llamada *ampolla*. El cuerpo de la trompa (comprendido entre el *cavum preuterino* y el *cavum retrouterino*, está en relación con las asas intestinales.

c) *Pabellón*. Tiene la forma de un ancho embudo, cuya abertura mira comúnmente hacia abajo, atrás y adentro. La *superficie exterior* es tersa y lisa blanquecina y cubierta por el peritoneo. La *superficie interior* es muy irregular, de color rosado y tapitada por la mucosa (continuación de la mucosa de la trompa). El *vértice* está representado por un orificio redondeado, de 2 a 3 milímetros de ancho, que nos conduce a la ampolla (*orificio abdominal* de la trompa). Su *base*, muy irregular, está profundamente recortada en una serie de lengüetas que a su vez, se presentan más o menos dentelladas en sus bordes; son las *frangas del pabellón*. Estas frangas son en número de diez a quince, cada una de las cuales mide de 10 a 15 milímetros de largo. Es de notar, entre estas frangas, la *franja ovárica*, que, de la parte interior de la ampolla tubárica, se dirige hacia la extremidad externa del ovario adosada al ligamento tuboovárico; su cara interna o libre presenta en su parte media un surco longitudinal, que termina hacia arriba en el orificio abdominal de la trompa.

3.º *Conformación interior*. — Las trompas están ahuecadas interiormente y en toda su extensión por una cavidad tubular, que aumenta, al igual que la de la trompa, desde el útero hacia el pabellón. Ninguna válvula se observa en este conducto; por el contrario, *pliegues longitudinales*, extremadamente numerosos, tanto más desarrollados cuanto más nos acercamos al pabellón, llenan por sí solos toda la cavidad uterina (la cual no está representada más que por *hendiduras* muy estrechas).

4.º *Constitución anatómica*. — La trompa se compone de *tres tunicas superpuestas*:

a) Una *túnica externa* o *serosa*, dependencia del peritoneo, que tapiza el cuerpo de la trompa en toda su extensión y en todo su circuito, a excepción del borde inferior (de donde parte la alca superior o *mesosalpinx*).

β) Una *túnica media* o *muscular*, que comprende dos planos de fibras musculares lisas, esto es, un plano *superficial*, formado por fibras longitudinales, y un plano *profundo*, formado por fibras circulares.

γ) Una *túnica interna* o *mucosa*, la *mucosa tubaria*, que se continúa, por una parte, con la mucosa del útero y por otra, con la mucosa del pabellón. Ninguna glándula.

5° **Vasos y nervios.** — Las *arterias* provienen de la *tubárica interna*, rama de la uterina, y de la *tubárica externa*, rama de la ovárica. Estas dos arterias, anastomosándose entre sí debajo de la trompa, forman el *arco subtubárico* del cual se desprenden numerosos ramos ascendentes destinados a las diferentes túnicas de la trompa. Las *venas* terminan en las venas uteroováricas. Los *linfáticos* se confunden igualmente con los linfáticos uteroováricos para alcanzar los ganglios preaórticos y yuxtaaórticos. Los *nervios* proceden de los plexos que rodean las dos arterias tubáricas.

ARTÍCULO III

UTERO

El útero o matriz es un órgano hueco, de paredes gruesas y contráctiles, destinado a servir de receptáculo al óvulo después de la fecundación. Es el órgano de la gestación y de la fecundación.

1° **Consideraciones generales.** — El útero está situado en la parte media de la excavación pélvica, por dentro de las trompas, por encima de la vagina y entre la vejiga y el recto.

a) *Forma y división.* — El útero tiene la forma de un cono apalanado de delante atrás, cuya base mira hacia arriba y cuyo vértice, fuertemente truncado, se insinúa más o menos en el orificio superior de la vagina. Un estrechamiento circular (situado algo por debajo de su parte media), llamado *istmo*, lo divide en dos partes: una superior o *cuerpo* y otra inferior o *cuello*.

b) *Numero.* — Es único, impar y medio. Anormalmente, puede faltar y también ser doble (uno derecho, otro izquierdo).

c) *Dimensiones y peso.* — El útero, por término medio, presenta. 1.º, en la nulípara, 6 ó 7 centímetros de *largo* por 4 de *ancho*; en la múltipara, 7 u 8 centímetros de *largo* por 4 centímetros de *ancho*. Su *peso* es también, por término medio, de 40 a 50 gramos en la nulípara y de 60 a 70 gramos en la múltipara.

d) *Consistencia* — Después de la muerte presenta una consistencia dura. Durante la vida, aquella es más débil y sus paredes son lo bastante blándas para que los intestinos dejen en ellas su huella.

1.º *Medios de fijación: ligamentos del útero.* — El útero está sostenido en su posición por *seis ligamentos*, tres a cada lado. *ligamentos anchos*, *ligamentos redondos* y *ligamentos uterosacros*.

a) *Ligamentos anchos.* — Están representados por dos tabiques membranosos, que van de los bordes laterales del útero a las paredes laterales de la pelvis. En el sentido de su anchura, se dirigen de dentro afuera y algo de delante atrás. En el sentido de su altura son oblicuos (al igual que el útero) de arriba abajo y de delante atrás.

De forma cuadrilátera, cada uno de ellos presenta dos caras y cuatro bordes, a saber: 1.º, *cara anterior*, en relación con la vejiga; 2.º, *cara posterior*, en relación con el recto; 3.º, *borde superior*, libre, que corresponde a la trompa; 4.º, *borde inferior*, muy ancho, que descansa sobre el suelo de la excavación; 5.º, *borde externo*, que, tenue, libre y flotante en su parte superior, está íntimamente adherido a la pared de la pelvis en su parte inferior; 6.º, *borde interno*, más grueso, que corresponde al borde lateral del útero, a la arteria uterina y al plexo venoso que la acompaña.

El ligamento ancho está formado por dos *hojas peritoneales* (las mismas que revisten las dos caras del útero) adosadas entre sí.

Estas hojas están *levantadas*, a trechos, por tres órganos contenidos en el espesor del ligamento. Las porciones de serosa así elevadas se denominan *aletas*. Hay que distinguir la *aleta superior*, determinada por la trompa; la *aleta anterior*, que corresponde al ligamento redondo, y la *aleta posterior*, que corresponde al ovario.

Las dos hojas peritoneales que constituyen los ligamentos anchos están tapizadas, en su cara profunda, por fibras musculares lisas, expansiones laterales del músculo uterino. Finalmente, entre las dos hojas se extiende una lámina celulosa, o mejor, celu ovascular (*lámina fibrovascular*), por cuyo seno corren los vasos y nervios (arterias uterina y ovárica, plexos venosos ováricos y uterinos, linfáticos tubáricos y uteroováricos). Esta capa celulosa se continua: *por abajo*, con el

tejido celular del suelo de la pelvis; *por arriba*, con el tejido celular de la fosa iliaca interna, y *por detrás*, con el tejido celular de la nalga (por la escotadura ciática mayor).

b) *Ligamentos redondos* — El ligamento redondo nace en la parte anterior y lateral del útero, algo por debajo de la trompa. Desde allí se dirige oblicuamente hacia delante y afuera, se introduce en el orificio interno del conducto inguinal, recorre este conducto en toda su extensión y, al llegar a la vulva, se divide o resuelve en numerosísimos filamentos conjuntivos que vienen a terminar, parte en la espina del pubis, parte en la capa celuloadiposa del monte de Venus y de los grandes labios. Mide de 12 a 14 centímetros de longitud por 5 ó 6 milímetros de diámetro. Se distinguen en él cuatro porciones: *porción pelviana*, *porción iliaca*, *porción inguinal* y *porción vulvar*. Su resistencia es considerable, se rompe (según BEURNIER) entre 600 y 900 gramos. Histológicamente considerado, se compone de fibras musculares lisas (dependencia del músculo uterino), a las cuales se añade, en la parte anterior del ligamento, un manejo estriado. Nótese que, en el feto (y anormalmente en el adulto), el peritoneo se prolonga en el conducto inguinal sobre el ligamento redondo, hasta la espina del pubis, constituyendo de este modo un prolongado divertículo de la cavidad peritoneal, el *conducto de Nuck*.

c) *Ligamentos uterosacros*. — Llamados también *ligamentos posteriores* o *repliegues de Douglas*, se extienden de la cara posterior del cuello a la primera o segunda vértebra sacra. Cada uno de ellos presenta el aspecto de un repliegue falciforme, con: 1.º, una cara superior; 2.º, una cara inferior; 3.º, un borde externo mal limitado, 4.º, un borde interno libre, cóncavo, que circunscribe con el del lado opuesto una abertura ovalada que abraza el recto y debajo de la cual se encuentra un fondo de saco de 4 ó 5 centímetros de profundidad, el *fondo de saco de Douglas*. Nótese que, con el repliegue uterosacro, puede coexistir un segundo repliegue más externo, que se remonta hasta la columna lumbar, el *repliegue uterolumbar*. Histológicamente, los repliegues uterosacros se componen, como los ligamentos anchos, de dos repliegues peritoneales que interceptan manojos de fibras musculares lisas.

Aparte estos ligamentos, los medios de fijación del útero están completados. 1.º, por su inserción vaginal y las paredes de la vagina, 2.º, por el tejido celular pelvisubperitoneal, o vaina hipogástrica, que se extiende desde el útero a las paredes de la pelvis; 3.º, por los

músculos del perineo, en particular por los elevadores del ano, que constituyen un buen aparato de sostén.

3° **Dirección.** — Si consideramos el útero como si estuviera aislado, observamos que el cuerpo se inclina ligeramente sobre el cuello, de modo que viene a formar, con este último, un ángulo abierto hacia delante (*anterocurvatura*). Pero si lo consideramos ocupando su sitio, en sus relaciones con las paredes de la pelvis, observaremos que es sumamente movable, oscilando muy fácilmente de delante atrás, y de atrás adelante (bajo la acción del recto, de la vejiga y de las asas intestinales). Es conveniente llamar *posición normal del útero* la posición que toma por sí o espontáneamente el útero cuando las asas intestinales no ejercen sobre él influencia alguna. En esta posición, el útero *corresponde al eje de la excavación pelviana*; su cara anterior, ligeramente cóncava, mira hacia la sínfisis púbica, mientras que su fondo se dirige hacia arriba y adelante, hacia el ombligo.

4° **Conformación exterior y relaciones.** — Conviene examinar separadamente el cuerpo y el cuello.

a) **Cuerpo** — Aplanado de delante atrás y de forma triangular, presenta dos caras y tres bordes. La *cara anterior*, ligeramente cóncava, está cubierta por el peritoneo en toda su extensión. Corresponde a la vejiga, de la cual está separada por el *fondo de saco vesicouterino* (presencia frecuente de asas intestinales en el fondo de saco). La *cara posterior*, más cóncava que la anterior (cresta roma en su parte media), corresponde al recto, del cual se halla separada por el *fondo de saco rectovaginal*. Los *bordes laterales*, oblicuos de arriba abajo y de fuera adentro, corresponden al ligamen o ancho, a la arteria uterina y al plexo venoso que la acompaña. La *extremidad inferior* se confunde con el cuello a nivel del istmo. La *extremidad superior o fondo*, cóncava en el feto, rectilínea en la nulípara, cóncava en la multipara, corresponde a las asas intestinales.

b) **Cuello.** — Tiene la forma de un cilindro ligeramente hinchado y abultado en su parte media (*barrilete de COURT*). La vagina, insertándose en su circunferencia, lo divide en tres porciones: *supravaginal*, *vaginal* e *intravaginal*. La *porción supravaginal*, que tiene de 15 a 20 milímetros de largo, está en relación: 1.º, por delante, con la vejiga; 2.º, por detrás, con el recto; 3.º, a los lados, con los ligamentos anchos y los plexos uterinos. La *porción vaginal*, de 6 a 8 milímetros de altura, corresponde a la inserción superior de la

vagina. Nótese que la vagina remonta en la cara posterior del cuello mucho más arriba que en su cara anterior. La *porción intravaginal u hocico de tenca*, que tiene de 8 a 10 milímetros de largo por 20 a 25 milímetros de ancho, presenta la forma de un cono, cuyo vértice, dirigido hacia abajo, fuese truncado y redondeado; en este vértice se ve un orificio de 4 a 6 milímetros de diámetro, el *orificio inferior del cuello*. El *hocico de tenca* está circunscrito, a nivel de su base, por un fondo de saco circular (véase *Vagina*). Son de notar las modificaciones que experimenta el cuello bajo la influencia de las relaciones sexuales y sobre todo de la preñez: se reblandece, se hace menos saliente, más irregular, se aplanan de delante atrás, al mismo tiempo que su orificio se agranda y ensancha transversalmente.

5.º Conformación interior, cavidad del útero. — El útero está excavado por una cavidad central, aplanada de delante atrás, que examinaremos separadamente en el cuerpo y en el cuello.

a) *Cavidad del cuerpo* — De forma triangular con dos caras, tres bordes y tres ángulos. Las dos caras (anterior y posterior) son planas, lisas, adosadas, por decirlo así, una con otra. Los tres bordes (uno superior y dos laterales) son convexos en la nulipara, rectilíneos y aun cóncavos en la multipara. Los tres ángulos (dos superiores y uno inferior) presenta cada uno un orificio: dos *orificios superiores*, que corresponden a la desembocadura de las trompas; un *orificio inferior*, que conduce a la cavidad del cuello.

b) *Cavidad del cuello* — Fusiforme, aplanada de delante atrás, con dos caras, dos bordes y dos orificios. Las dos caras (anterior y posterior), planas aplicadas una contra otra, presentan cada una de ellas, en su parte media, una eminencia longitudinal en la cual se implantan, a derecha e izquierda, eminencias secundarias, oblicuamente dirigidas de dentro afuera y de abajo arriba; son los *árboles de la vida*. Los dos bordes son curvos y se miran por su concavidad. Los dos orificios se dividen en: 1.º, *interno o superior*, que corresponde al istmo y mide 5 ó 6 milímetros de alto por 4 ó 5 milímetros de diámetro (se estrecha gradualmente después de la menopausia y aun a veces se oblitera); 2.º, *externo o inferior*, que no es otro que el descrito más arriba en el vértice del cuello.

c) *Dimensiones de la cavidad uterina* — El *diámetro vertical* es, por término medio, de 50 a 55 milímetros en la mujer nulipara (de los cuales corresponden la mitad a la cavidad del cuerpo y la otra mitad a la cavidad del cuello) de 45 a 50 milímetros en la mujer virgen,

de 55 a 65 milímetros en la múltipara. El *diámetro transversal*, tomado a nivel de la base, es la mitad del diámetro vertical. La *capacidad del útero*, fuera de la gestación, es de 3 a 4 centímetros cúbicos en la nulipara y de 5 a 6 centímetros cúbicos en la múltipara.

6.º **Constitución anatómica.**—El útero se compone de tres tónicas superpuestas, que son de fuera adentro. 1.º, una tónica *serosa*; 2.º, una tónica *muscular*; 3.º, una tónica *mucosa*.

A. **TÓNICA SEROSA.** El peritoneo al abandonar la cara posterior de la vejiga se dirige al útero (*fondo de saco vesicouterino*), al cual encuentra a nivel del istmo. Reviste entonces sucesivamente su cara anterior, su fondo y su cara posterior, descendiendo a la vagina (15 a 20 milímetros), y pasa al recto, formando el *fondo de saco rectovaginal*. A nivel de los bordes laterales del útero, las dos hojas peritoneales que revisten la cara anterior y la cara posterior del órgano se adosan para constituir los ligamentos anchos.

B. **TÓNICA MUSCULAR.**—Se compone de fibras musculares lisas, cuyo conjunto constituye el *músculo uterino*. Estas fibras forman tres capas: externa, media e interna.

a) *Capa externa.* Comprende fibras longitudinales y fibras transversales.

α) Las *fibras longitudinales* forman un manojito aplanado, de 10 a 25 milímetros de ancho, que está en relación con la zona media del útero y ocupa sucesivamente su cara anterior, su fondo y su cara posterior (*manojito en forma de asa de HELIE* y *fibras en Z*).

β) Las *fibras transversales*, situadas debajo de las precedentes, forman un plano continuo y regular en toda la altura del cuerpo del útero y en la mayor parte del cuello. A nivel de los bordes, cierto número de ellas pasan a los ligamentos anchos, los ligamentos utero-ováricos, como también a la tónica muscular de la trompa.

b) *Capa media*—La más gruesa de las tres, está constituida por un sistema de manojitos musculares, de anchura variable, que vienen a formar una especie de plexo, en cuyas mallas se entrecruzan gruesos conductos venosos, llamados *senos uterinos* (*capa plexiforme* o *stratum vasculosum*). Nótese que esta capa pertenece exclusivamente al cuerpo del útero.

c) *Capa interna*—Está en relación con dos planos de fibras, que de dentro afuera son: 1.º, *fibras longitudinales*, dispuestas en Z y formando un manojito medio mayor análogo al de la capa externa; 2.º, *fibras horizontales* o *circulares*, que forman el *esfínter del istmo*.

y están dispuestas alrededor del orificio de las trompas en una serie de anillos concéntricos. Estos dos órdenes de fibras se prolongan sobre el cuello.

C TÚNICA MUCOSA — La mucosa uterina reviste de un modo uniforme toda la superficie interior del órgano. Se continúa por arriba, con la mucosa de la trompa; por abajo, con la mucosa de la vagina. En el cuerpo del útero (grosor, 1 ó 2 milímetros) esta mucosa es de color blanco rosado, muy friable y se altera rápidamente. En el cuello es más pálida, menos gruesa, pero mucho más consistente. Histológicamente considerada, comprende: la cara epitelial, el corion y numerosas glándulas (véanse los tratados de Histología).

7.º Vasos y nervios.— a) *Arterias.*— Las arterias proceden de la *uterina*, rama de la hipogástrica, y siguen de abajo arriba el borde del útero, distribuyendo por sus dos caras numerosas ramas transversales, las cuales forman, en la capa media, una rica red. De esta red parten dos órdenes de ramos: *ramos externos*, para la capa externa y el peritoneo, y *ramos internos*, para la capa interna y la mucosa. Como arterias accesorias, la *ovárica* y la *arteria del ligamento redondo*.

b) *Venas.*— Las venas, procedentes de las tres túnicas, van inmediatamente a los *senos uterinos* de la capa muscular media. Estos senos se dirigen a su vez hacia los bordes del útero, en donde forman, a derecha e izquierda, los *plexos venosos uterinos*. De estos plexos se desprenden 1.º, por abajo, las *venas uterinas* (en número de dos), tributarias de las venas hipogástricas; 2.º, por arriba, venas que se mezclan con las procedentes del ovario (*plexo uteroovarico*); 3.º por arriba y adelante, las *venas del ligamento redondo*, que van, parte de ellas, a la vena epigástrica, y parte, a la vena femoral.

c) *Linfáticos* — Los linfáticos, procedentes, como las venas, de las tres túnicas del útero, van al tejido celular subperitoneal, para formar allí la *red periférica* o *subserosa*. De esta red parten numerosos troncos eferentes, que examinaremos separadamente: 1.º, sobre el cuerpo; 2.º, sobre el cuello.

a) *Sobre el cuerpo*, los eferentes convergen hacia los ángulos laterales y allí se dividen en tres grupos: 1.º, *superiores*, que van a los ganglios preaórticos y juxtaaórticos; 2.º, *anteriores*, que siguen el ligamento redondo y van a los ganglios inguinales superficiales; 3.º, *laterales*, que van a los ganglios ilíacos externos (grupo medio).

β) *Sobre el cuello*, los eferentes convergen hacia las partes posterolaterales del cuello y se separan en tres grupos, que terminan unos en los ganglios ilíacos externos, los otros en los ganglios hipogástricos y algunos en los del promontorio.

δ) *Nervios* — Los nervios proceden: 1.º de los dos plexos uterino y uteroovárico, 2.º, de los ganglios hipogástricos o ganglios de Franckenhäuser; 3.º, del tercero y cuarto nervios sacros, 4.º del propio tronco del simpático. La mayor parte de ellos convergen hacia las partes laterales del cuello. Unos penetran en el cuello y otros van a anastomosarse en el mesosalpinx con los nervios del plexo uteroovárico. Los nervios del útero terminan en el músculo (*filetes motores*), en los vasos (*filetes vasculares*) y en la mucosa (*filetes sensitivos*).

ARTÍCULO IV

VAGINA

Conducto musculomembranoso, que continúa el conducto uterino y se extiende del útero a la vulva. Es el órgano de la copulación en la mujer.

1.º *Consideraciones generales.* — Órgano impar y medio, está situado, en parte, en la excavación pélvica, y en parte, en el propio espesor de la vulva.

a) *Medios de fijación.* — Está mantenida en posición: 1.º, en primer lugar, por su continuidad con el cuello uterino, 2.º, después, por conexiones, más o menos íntimas, con las formaciones u órganos vecinos (perineo, vulva, vejiga y recto).

b) *Dirección.* — Se dirige oblicuamente hacia abajo y adelante, formando con la horizontal un ángulo de 65 a 75°. No es exactamente rectilínea, sino ligeramente curva, de concavidad posterior (la cuerda del arco correspondiente es sólo de 4 a 5 milímetros).

c) *Forma.* — Tiene la forma de un cilindro aplanado de delante atrás. En las condiciones fisiológicas ordinarias, sus paredes anterior y posterior están directamente aplicadas una contra otra; en un corte transversal, la cavidad vaginal se halla representada por una hendidura transversal, algo cóncava por el lado del recto y que termina a veces hacia los lados por una nueva hendidura de dirección anteroposterior (en forma de H). Nótese: 1.º, que, *por arriba*, el conducto

vaginal se hace cilíndrico, para amoldarse al cuello; 2.º, *por abajo* se aplana en sentido transversal.

c) *Dimensiones*. — La longitud de la vagina es, por término medio, de 6 a 7 centímetros. Hay *vaginas largas* (de 12 a 14 centímetros) y *vaginas cortas* (de 4 a 5 centímetros). Su anchura, relativamente pequeña a nivel de la vulva, aumenta de abajo arriba; en la parte media del conducto es de 24 a 26 milímetros. Hay que notar que las paredes vaginales son muy extensibles y además muy elásticas.

2.º **Conformación exterior e interior y relaciones.** La vagina ofrece a nuestra consideración: una *superficie exterior*, una *superficie posterior* y *dos extremidades* (superior e inferior)

A **SUPERFICIE EXTERIOR** — Ofrece una *cara anterior*, una *cara posterior* y *dos bordes laterales*.

a) *Cara anterior* — Mira hacia delante y algo abajo. Está en relación: 1.º, *en su mitad superior*, con la base de la vejiga (*tabique vesicovaginal*, de 8 a 10 milímetros de grueso), de la cual la separa una capa celulosa bastante laxa, por la que pasa oblicuamente el segmento terminal del uréter; 2.º, *en su mitad inferior*, con el conducto de la uretra (*tabique uretrovaginal*), al que adhiere íntimamente.

b) *Cara posterior* — Está en relación sucesivamente, de arriba abajo: 1.º, con el peritoneo, en una extensión de 15 a 20 milímetros; 2.º, con el fondo de saco de Douglas; 3.º, con la pared anterior del recto, a la cual está unida por un tejido celular más o menos denso (*tabique rectovaginal*). Es de notar que, por encima del suelo perineal, los dos conductos, apartándose uno de otro, quedan separados entre sí por un espacio triangular de base inferior.

c) *Bordes*. — Está en relación, sucesivamente, de arriba abajo: 1.º, con el ligamento ancho; 2.º, con el tejido celuloadiposo de la excavación pélvica; 3.º, con el elevador del ano (véase este músculo); 4.º, con el bulbo de la vagina. Son recorridos por un rico plexo venoso, el *plexo vaginal*.

B **CONFORMACIÓN INTERIOR**. — La superficie interior de la vagina presenta, en ambas paredes, un sistema de pliegues transversales, que constituyen las *arrugas de la vagina*. Estos pliegues son más gruesos en la parte media, y estos puntos engrosados, escalonándose de abajo arriba, forman en la línea media dos prominencias longitudinales, redondas y romas, conocidas con el nombre de *columnas de la vagina*; la que ocupa la pared anterior termina, del lado de la vulva, formando el llamado *tubérculo vaginal*. Nótese que las arrugas de la vagi-

na, como también las columnas, presentan su maximum de desarrollo por el lado de la vulva y van luego disminuyendo de abajo arriba. Es de notar también que las dos columnas no ocupan exactamente la línea media, sino que están situadas algo por fuera de esta línea, una a la derecha y otra a la izquierda, de tal manera que en estado de oclusión de la vagina las dos prominencias están yuxtapuestas y no superpuestas.

C. EXTREMIDAD SUPERIOR. — La extremidad superior de la vagina es un orificio circular que abraza el cuello uterino, en la unión de su tercio inferior con sus dos tercios superiores, y se adhiere a él íntimamente. Gracias a esta adherencia, existe en todo el contorno del hocico de tenca, entre éste y la vagina, un canalizo circular, que se designa con el nombre de *bóveda de la vagina* o *fondo de saco de la vagina*. Este conducto pericervical se divide topográficamente en cuatro partes: 1.ª, una parte anterior o *fondo de saco anterior*, poco profunda, que corresponde al fondo de la vejiga y a las arterias vesicovaginales; 2.ª, una parte posterior o *fondo de saco posterior*, que tiene de 10 a 25 milímetros de profundidad y corresponde al fondo de saco de Douglas y al recto; 3.ª, dos partes laterales o *fondos de saco laterales*, recorridos por el uréter, por el plexo vaginal y por tres o cuatro conductos linfáticos. (Es de notar que un espacio de 10 a 15 milímetros separa ordinariamente el fondo de saco lateral de la arteria uterina.)

D. EXTREMIDAD INFERIOR — Orificio elíptico, cuyo diámetro es anteroposterior, y por el cual la vagina se abre en la vulva (véase *Vulva*).

3.ª Constitución anatómica. — La pared vaginal, que tiene de 3 a 4 milímetros de grueso, se compone de *tres túnicas concéntricas*, que de fuera adentro son: una *túnica conjuntiva*, una *túnica muscular* y una *túnica mucosa*. La *túnica conjuntiva*, delgada, de color blanquecino, se confunde exteriormente con el tejido celular de las regiones próximas. La *túnica muscular* comprende dos planos de fibras musculares lisas: un plano superficial de fibras longitudinales y un plano profundo de fibras circulares (que forman, en su parte inferior, el *esfínter liso de la vagina*). La *túnica mucosa*, de un milímetro aproximadamente de grueso, grisácea o ligeramente rosada (roja durante la menstruación y el embarazo), muy resistente, muy extensible y muy elástica, se compone de un *corion* y un *epitelio pavimentoso estratificado*. Está desprovista de glándulas.

4.º Vasos y nervios. — Las *arterias* proceden en gran parte de la vaginal, rama de la hipogástrica (algunas de la uterina, de la vesical inferior, de la hemorroidal media y de la pudenda interna). Terminan en la túnica muscular y en la mucosa. Las *venas* vienen a condensarse en los bordes, para formar el *plexo vaginal*, que ocupa toda la altura de la vagina. Este plexo comunica: *por arriba*, con el plexo uterino; *por abajo*, con las venas del bulbo; *por delante*, con el plexo vesical, y *por atrás*, con las venas hemorroidales. Los *linfáticos* (dos redes, una en el corion mucoso, otra en la musculosa) se distinguen en: 1.º, *superiores*, que nacen en la región de los fondos de saco y se mezclan con los linfáticos del cuello (primer grupo), para llegar con ellos a los ganglios ilíacos externos. 2.º, *medios*, en número de dos o tres, que nacen del tercio medio de la vagina y van (siguiendo la arteria vaginal) a los ganglios hipogástricos. 3.º, *inferiores*, que van a los ganglios presacros y algunos llegan hasta los ganglios del promontorio. Los *nervios*, procedentes del plexo hipogástrico y del nervio pudendo interno, forman alrededor del órgano un *plexo perivaginal*, sobre cuyas mallas se ven pequeñísimos ganglios. Terminan parte en la muscular (*filetes motores*), parte en la mucosa (*filetes sensitivos*).

ARTÍCULO V

VULVA

La vulva, situada debajo de la vagina, representa los órganos genitales externos de la mujer; se compone: 1.º, de las *formaciones labiales*, o sea los *labios de la vulva*, 2.º, del *espacio interlabial*, 3.º, de un *aparato eréctil*.

1. FORMACIONES LABIALES O LABIOS DE LA VULVA

Son dos repliegues tegumentarios, que constituyen las partes laterales de la vulva. Son cuatro, dos a cada lado: los *labios mayores* y los *labios menores*. Hay que añadir también el *monte de Venus*.

1.º Monte de Venus. — Eminencia redondeada y más o menos prominente, situada en la parte externa anterior de la vulva, delante de la sínfisis del pubis, de una a otra ingle. Su espesor, que es, por lo común, de 2 ó 3 centímetros, puede llegar, en las mujeres obesas,

hasta 7 u 8 centímetros. Lampiña en el feto y en la niña, está en la mujer adulta completamente llena de pelos, largos y rígidos.

Se compone esencialmente de un revestimiento cutáneo, sobre un voluminoso paquete de tejido celular y de grasa, con numerosas hojas elásticas.

Las arterias proceden de las pudendas externas; las venas van a la safena interna o la femoral; los linfáticos terminan en los ganglios de la ingle, los nervios emanan de las ramas genitales del plexo lumbar.

2.º **Labios mayores.** — Repliegues cutáneos, que miden 7 u 8 centímetros de largo por 2 ó 3 centímetros de ancho y que ocupan la parte externa de la vulva. Gruesos, firmes y resistentes en las niñas y en las mujeres vírgenes, se hacen delgados y flácidos en las mujeres de alguna edad y enflaquecidas.

a) *Conformación exterior y relaciones.* — Prolongados de delante atrás y aplanados transversalmente, presentan dos caras (externa e interna), dos bordes (superior e inferior) y dos extremidades (anterior y posterior). La cara externa, convexa, de color obscuro, corresponde al muslo del cual está separada por el surco genitocrural. Está cubierta de pelos. La cara interna, de color obscuro, y con pelos en su parte inferior, de color rosado y sin pelos en su parte superior, corresponde al labio mayor, del cual está separada por el surco interlabial. El borde superior o adherente, grueso, corresponde a las ramas isquio-púbicas. El borde inferior o libre, más tenue o delgado, ligeramente convexo de delante atrás, corresponde, en la línea media, al borde de igual nombre del labio mayor del lado opuesto. Las dos extremidades, reuniéndose entre sí en la línea media, forman las comisuras de la vulva. 1.ª, *comisura anterior*, redondeada en forma de arco, que se continúa con el monte de Venus, 2.ª, *comisura posterior* u horquilla, delgada y muy aparente (delante de ella, la fosita navicular).

b) *Constitución anatómica* — Cada uno de los labios mayores comprende cinco capas, superpuestas del modo siguiente, de la periferia al centro: 1.º, un revestimiento cutáneo, 2.º, una capa de fibras musculares lisas, que constituyen el dartos de la mujer, 3.º, una capa de tejido celular, más o menos rico en grasa; 4.º, una capa de manojos elásticos que forman membrana y constituyen el saco elástico del labio mayor, 5.º, en el interior de este saco, una masa celulo-adiposa, a la cual viene en parte a terminar el abanico tendinoso del ligamento redondo.

c) *Vasos y nervios.* — Las arterias proceden de las pudendas externas (ramas de la femoral) y de la perineal inferior (rama de la pudenda interna). Las venas se dividen en: 1.ª, *venas superficiales*, que acompañan a las precitadas arterias y van, unas a la temporal, otras a la pudenda interna; 2.ª, *venas profundas*, que se mezclan con las venas del bulbo y terminan en el plexo vaginal. Los *linfáticos* van a los ganglios superficiales de la ingle. Los *nervios* emanan, en parte, de la rama perineal del pudendo interno, y en parte, de las ramas genitales del plexo lumbar.

5.º **Labios menores.** — Son otros repliegues cutáneos, situados por dentro de los precedentes, y que miden de 30 a 35 milímetros de largo por 10 a 15 de ancho.

a) *Conformación exterior y relaciones.* — De igual orientación que los labios mayores, presentan, como estos últimos, *dos caras, dos bordes y dos extremidades*. La *cara externa*, plana, corresponde al labio mayor. La *cara interna* igualmente plana, corresponde al del lado opuesto. El *borde superior* o *adherente* está adosado al bulbo de la vagina. El *borde inferior* o *libre*, convexo y delgado, flota en la hendidura vulvar. La *extremidad anterior* se divide en dos hojas: una posterior, muy corta, que va a la cara posterior del clitoris y forma, con la del lado opuesto, el *frenillo del clitoris*, y una hoja anterior, más larga, que, reuniéndose delante del clitoris con la del lado opuesto, forma el *capuchón* o *prepucio*. La *extremidad posterior*, más delgada que la precedente, se pierde insensiblemente en la cara interna del labio mayor correspondiente.

b) *Constitución anatómica.* — Los labios menores están formados por una doble hoja tegumentaria (membrana de transición entre la piel y la mucosa) que en el centro del repliegue aprisiona una delgada capa de tejido conjuntivo, rico en fibras elásticas, pero desprovisto de grasa.

c) *Vasos y nervios* — Las arterias proceden de los mismos orígenes que las de los labios mayores. Las venas se mezclan, en parte, con las de los labios mayores, y, en parte, con las de la vagina. Los linfáticos van a los ganglios de la ingle. Los nervios son los mismos que para los labios mayores.

2 ESPACIO INTERLABIAL

El espacio interlabial, situado entre los labios del lado derecho y los del izquierdo, tiene la forma de un embudo, cuyo fondo, prolongado de delante atrás, presenta en la misma dirección y sucesivamente: 1.º, el *vestíbulo*, 2.º, el *meato urinario*; 3.º, el *orificio inferior de la vagina*, estrechado o reducido en la mujer virgen por el himen.

1.º **Vestíbulo.** — Pequeña región triangular, lisa, de color rosado, limitada a *ambos lados* por los labios menores, *por delante* por el clitoris, *por detrás* por el meato urinario y el orificio inferior de la vagina. En la línea media, entre el clitoris y el meato, se ve muy a menudo una cinta longitudinal: es la *brida muscular de Pozzi* (*habenu-læ urethrales de Waldeyer*).

2.º **Meato urinario.** — Ha sido descrito debidamente al tratar de la uretra.

3.º **Orificio interior de la vagina.** Diferente según se trate de una mujer virgen o de una mujer *desflorada*. en ésta es un orificio ovalado de eje mayor anteroposterior, en cuyo contorno o circuito la mucosa vaginal se continúa con la del vestíbulo y la de los labios menores, en aquélla está en gran parte obliterada por una membrana: el *himen*.

4.º **Himen.** — Tabique membranoso (colocado horizontalmente cuando la mujer está en pie, y vertical cuando descansa en decúbito dorsal) que oblitera en parte el orificio inferior de la vagina.

a) **Conformación exterior.** — El himen presenta variedades muy numerosas, pero que pueden reducirse a los tres tipos siguientes: 1.º, *himen semilunar o falciforme*, que tiene la forma de media luna de concavidad anterior, 2.º, *himen anular o circular*, que tiene la forma de un diafragma atravesado por un agujero, el *orificio himenal*; 3.º, *himen labiado o bilabiado*, que se compone de dos partes laterales o labios separados por una hendidura media, la *hendidura himenal*.

b) **Relaciones** — Cualquiera que sea el tipo a que pertenezca el himen, ofrece a nuestra consideración: 1.º, una *cara inferior o externa*, convexa, que corresponde a los labios pequeños; 2.º, una *cara superior o interna* que mira hacia la cavidad vaginal; 3.º, un *borde*

libre, delgado, rara vez liso, por lo común más o menos festoneado o dentellado, que circunscribe el orificio himenal.; 4°, un *borde adherente* o *base*, implantado en la línea de unión vulvovaginal, separado de las formaciones labiales por un surco circular, el *surco vulvohimenal* (nótese que este surco está interrumpido en diversos sitios por pequeñas bridas que circunscriben entre sí una serie de pequeñas depresiones, las *fositas vulvohimenes*).

c) *Constitución anatómica*. — El himen está constituido por un repliegue mucoso, entre cuyas dos hojas se interpone una capa de tejido conjuntivo muy rico en fibras elásticas.

d) *Vasos y nervios*. — Se confunden con los de la vagina. En cuanto a los *linfáticos*, los de la cara superior van a los ganglios presacros, y los de la cara inferior a los ganglios superficiales de la ingle.

3. ORGANOS ERÉCTILES

Al aparato eréctil de la vulva corresponden: 1°, un *órgano medio*, el *clitoris*, 2° dos órganos laterales, los *bulbos de la vagina*.

1.° *Clitoris*. — El clitoris, homólogo del pene del hombre, es un órgano impar y medio, situado en la parte anterior y superior de la vulva.

a) *Disposición general*. — Toma su origen de las ramas isquio-púbicas por dos mitades laterales afiladas, que son sus *raíces*. Oblicuamente ascendentes, se unen entre sí en la línea media, para formar el *cuerpo del clitoris*. Al principio es ascendente, como sus raíces; después tuerce hacia delante (*ángulo clitorideo*) y termina por una extremidad ligeramente abultada, el *glándulo*. A nivel del citado ángulo está sujeto arriba, como el pene, por un *ligamento suspensorio*.

b) *Forma y dimensiones*. — Tiene una forma cilíndrica (en ciertos casos con un surco medio en su cara anterior). Mide de 60 a 70 milímetros de largo (de los cuales corresponden 30 milímetros a las raíces, 30 al cuerpo y 6 al glándulo) por 6 ó 7 milímetros de ancho. La *erección*, completamente rudimentaria, aumenta algo estas dimensiones.

c) *Relaciones*. — El clitoris tiene una porción oculta y una porción libre. La *porción oculta* está profundamente situada por encima de los labios mayores. La *porción libre* está cubierta por arriba por el *prepucio*; por abajo está unida a los labios menores por un repliegue mucoso, el *frenillo*.

d) *Constitución anatómica* — El cuerpo del clitoris se compone de dos cuerpos cavernosos adosados en la línea media y separados por un tabique incompleto (*tabique pectiniforme*). El glande está formado por un núcleo central de naturaleza conjuntiva, cubierto exteriormente por una mucosa dermopapilar. El prepucio está constituido por una hoja cutánea, reforzada en su cara profunda por una hoja mucosa.

e) *Vasos y nervios* — Las arterias (*arterias cavernosas y arterias dorsales del clitoris*) proceden de la pudenda interna. Las venas, análogas a las del pene, se dividen en: 1.º, *venas superiores* (*vena dorsal superficial*, que va a la femoral; *vena dorsal profunda* que va al plexo de Santorini); 2.º, *venas inferiores*, que van al plexo intermediario de ROBERT; 3.º, *venas inferiores*, que van a las venas dorsales; 4.º *venas posteriores*, que van al plexo de Santorini. Los linfáticos terminan en el grupo suprapúbico de los ganglios de la ingle. Los nervios (*nervios dorsales del clitoris*) emanan del pudendo interno.

2.º *Bulbos de la vagina*. — Son dos, uno derecho y otro izquierdo, y representan en la mujer el bulbo uretral del hombre.

a) *Dimensiones*. Cada uno de ellos mide, por término medio 30 milímetros de largo por 15 de ancho y 8 a 10 de grueso.

b) *Conformación exterior y relaciones* — Tienen la forma de ovoide de base posterior, aplanado de dentro afuera, con dos caras, dos bordes y dos extremidades. *Cara externa*, convexa, cubierta por el músculo constrictor de la vagina. *Cara interna*, cóncava que abraza a uretra, la vagina y la glándula vulvovaginal. *Borde inferior*, correspondiente a la base de los labios menores. *Borde superior*, en relación con la aponeurosis perineal media. *Extremidad posterior*, redondeada, que desciende hasta la proximidad de la fosa navicular. *Extremidad anterior*, delgada y algo afilada, que se une en la línea media con la del lado opuesto.

c) *Constitución anatómica* — El bulbo de la vagina es un órgano eréctil imperfecto, con una albugínea muy tenue, reducida a veces a una simple envoltura conjuntiva.

d) *Vasos y nervios* — Las arterias vienen de la bulbar, rama de la pudenda interna. Las venas (dispuestas en dos redes, red superficial y red profunda) van a la vena pudenda interna. Los linfáticos no se conocen. Los nervios siguen la arteria bulbar.

ARTÍCULO VI

GLÁNDULAS ANEXAS AL APARATO GENITAL
DE LA MUJER

Al aparato genital de la mujer van anexas: 1.º, las *glándulas uretrales y periuretrales*; 2.º las *glándulas vulvovaginales*

1. GLÁNDULAS URETRALES Y PERIURETRALES

En la superficie interior de la uretra, y con preferencia en su pared inferior y en sus paredes laterales, se abren numerosas glándulas, llamadas *glándulas uretrales*. Estas glándulas, no tan sólo ocupan toda la altura del conducto, sino que hacia abajo lo rebasan y se encuentra cierto número de ellas alrededor del meato (*glándulas periuretrales*). Las glándulas uretrales y periuretrales son las homólogas de la próstata, la *próstata hembra*.

GLÁNDULAS VULVOVAGINALES

En número de dos, una derecha y otra izquierda, las glándulas vulvovaginales o *glándulas de Bartholin* son glándulas arracimadas, situadas en las partes laterales y posteriores de la vagina, a un centímetro de su entrada. Pequeñas en la niña, se desarrollan rápidamente en la época de la pubertad. Miden, por término medio, 12 milímetros de largo por 8 milímetros de ancho.

Conformación exterior y relaciones.—Tienen la forma de un ovoide aplanado transversalmente, con *dos caras*, una *cara interna*, correspondiente a la vagina, y una *cara externa*, en relación con el bulbo de la vagina. El conducto excretorio, que tiene de 15 a 20 milímetros de largo, se abre, por un orificio redondeado, en un surco que separa los labios pequeños del himen o de sus restos carunculares. El producto de secreción es un líquido untuoso, filamentosos e incoloro que tiene por objeto lubricar las partes genitales.

4.º Vasos y nervios.—Las *arterias* emanan de la pudenda interna. Las *venas* van a las pudendas. Los *linfáticos* van a los ganglios de la ingle. Los *nervios* emanan de la rama perineal del pudendo interno.

ARTÍCULO VII

MÚSCULOS Y APONEUROSIS DEL PERINEO EN LA MUJER

El perineo de la mujer presenta la misma forma, los mismos límites y también aproximadamente la misma constitución fundamental que el del hombre.

1. MÚSCULOS DEL PERINEO

Los músculos del perineo en la mujer son en número de *nueve*, como en el hombre, con igual estructura y el mismo nombre.

1.º **Transverso del perineo.** — Nace en la cara interna de la tuberosidad isquiática. Desde allí se dirige hacia dentro y termina en el rafe. Al contraerse, pone tenso este rafe.

2.º **Isquiocavernoso.** — Nace en el isquion y en la rama isquio-pubiana. Desde allí se dirige hacia dentro, para terminar en el clítoris, a nivel de su ángulo o codo. Baja el clítoris y, en el momento del coito, aplica el glande clitorídeo contra el pene.

3.º **Bulbocavernoso.** Se desprende del rafe preanal. Desde allí se dirige hacia el codo o ángulo del clítoris, en donde termina a la vez en la cara dorsal del clítoris y en el ligamento suspensorio. Reuniéndose al del lado opuesto, forma en todo el circuito del orificio vulvar una especie de anillo, el *constrictor de la vagina*. Tiene por acción: 1.º, estrechar el orificio inferior de la vagina (*vaginismo inferior*); 2.º, bajar el clítoris; 3.º, comprimir la vena dorsal del clítoris, 4.º, comprimir lateralmente el bulbo y la glándula de Bartholin.

4.º **Músculo de Guthrie.** — Colocado, como en el hombre, entre las dos hojas de la aponeurosis perineal media. Sus fibras se dividen en *posteriores* que pasan por detrás de la vagina; *medias*, que pasan por delante de la vagina; *anteriores*, que pasan por delante de la uretra.

5.º **Músculo de Wilson.** — Pequeño músculo que tiene su origen en el ligamento subpubico; después, dirigiéndose hacia la uretra, se entrecruza, por debajo de este conducto, con el del lado opuesto.

6.º **Esfínter externo.** — El esfínter externo o esfínter estriado comienza por arriba en el cuello vesical y se extiende hasta el meato. En la parte más superior constituye un *anillo completo*, que rodea el esfínter liso a modo de manguito. *Abajo* sólo forma un *semanillo*, cuyos dos extremos se fijan a la pared anterior de la vagina. Recordemos que en el hombre sucede lo contrario.

7.º **Esfínter exterior del ano.** Exactamente como en el hombre.

8.º **Isquilococcígeo.** — Como en el hombre

9.º **Elevador del ano.** Como en el hombre, pero con la particularidad de que en los manojos anteriores o pubianos, en lugar de seguir la próstata, cruza perpendicularmente las partes laterales de la vagina (a 2 ó 3 centímetros por encima de la vulva), para ir a terminar en la línea media, detrás de este conducto. Nótese que, en los manojos del lado opuesto, forma una especie de cincha que comprime lateralmente la vagina, al mismo tiempo que la empuja o aplica contra la sínfisis (*vaginismo superior*).

2. APONEUROSIS DEL PERINEO

Se dividen, como en el hombre, en superficial, media y profunda:

a) La *aponeurosis perineal superficial* ocupa el espacio triangular circunscrito por las dos ramas isquiopubianas. Igual disposición general que en el hombre. Nótese, en la línea media, un ancho orificio para el conducto vulvovaginal

ß) La *aponeurosis perineal media* presenta también igual disposición que en el hombre. El orificio uretral del hombre es aquí mucho mayor: es el *orificio uretrovaginal*.

γ) La *aponeurosis perineal profunda o pelviana* tiene a su vez igual disposición que en el hombre, con la particularidad de que la próstata es reemplazada por la vagina.

CAPITULO IV

MAMAS

Las mamas, llamadas también *senos*, son órganos glandulares destinados a secretar la leche. Existen en el hombre y en la mujer, pero con dimensiones y una significación morfológica muy diferentes.

1 LA MAMA EN LA MUJER

La mujer, a quien incumbe el cuidado de alimentar al recién nacido, posee mamas en estado de perfecto desarrollo, muy diferentes de las del hombre, que son rudimentarias.

1.º Consideraciones generales.— Las mamas están situadas, en la mujer, en la parte anterior y superior del tórax, entre la tercera y la séptima costillas.

a) *Número.*— Son en número de dos, una derecha y otra izquierda. La reducción numérica de las mamas se llama *amastia*, la cual puede ser: *unilateral* o *bilateral*; *total* (cuando se refiere a la vez a la glándula y al pezón) o *parcial* (cuando sólo interesa uno de estos dos elementos). La ausencia solamente del pezón constituye la *aloelia*.

El aumento numérico de las mamas se llama *hipermastia*, *multimastia* o *polimastia*; cuando es solamente del pezón, la anomalía toma el nombre de *hipertelia* o *politelia*.

Hay que notar, a propósito de las mamas supernumerarias, que éstas se desarrollan, no en cualquier región, sino en puntos en que los animales presentan mamas normales (los siete pares de mamas del esquema de WILLIAMS); la polimastia, en la mujer, viene a ser de este modo la reproducción de un tipo constante en la serie zoológica, y por esta razón adquiere toda la significación de las anomalías llamadas *reversivas*. Nótese también el hecho interesante de que el hombre, como los animales, posee, en estado embrionario, una

línea mamaria que se extiende desde la axila hasta la ingüe, a lo largo de la cual aparecen una serie de crecimientos epiteliales que no son otra cosa más que esbozos de las glándulas mamarias. De estos diferentes esbozos, sólo los que están en relación con las dos mamas pectorales persisten y se desarrollan. Todos los demás, en las condiciones ordinarias, desaparecen sin dejar vestigio alguno. Pero han tenido una existencia real y se puede decir con verdad que el hombre es *primitivamente polimasto*.

b) *Forma* — La mama tiene la forma *hemisférica* y descansa sobre el tórax por su cara plana, presentando, en el punto medio de su cara convexa, una eminencia en forma de papila, llamada *pezón*. Esta forma fundamental ofrece numerosas variedades: mama cónica, mama piriforme, mama aplanada o discoide, mama cilíndrica, mama pediculada, etc.

c) *Volumen* — Pequeñísimas en el recién nacido y en la niña, se desarrollan bruscamente en la época de la pubertad y alcanzan luego muy pronto su *estado de perfecto desarrollo*. Miden entonces, por término medio, 10 u 11 centímetros de altura por 12 ó 13 de ancho y 5 ó 6 de grueso. Su volumen aumenta durante el embarazo y, sobre todo, durante la lactancia. La mama disminuye de volumen después de la menopausia. El *volumen* de las mamas presenta variaciones individuales muy notables. Nótese, con este motivo, que el volumen de las mamas no está siempre en relación con la aptitud para la lactancia, pues en la mama hay que considerar a la vez la glándula y la grasa que la rodea, dos elementos cuyo desarrollo no es en ningún modo paralelo (de ahí dos clases de mamas: *glandulares* y *grasosas*).

d) *Peso y consistencia*. — El peso de la mama es de 30 a 60 centigramos en el momento del nacimiento, de 150 a 200 gramos en la joven fuera de la lactancia y de 400 a 500 gramos en la mujer que cría. De consistencia dura en la mujer joven y virgen, son blandas, fofas y péndulas en las multíparas.

1.° *Conformación exterior y relaciones*. — Se consideran en la mama una *cara posterior*, una *cara anterior* y una *circunferencia*.

a) *Cara posterior* — Más o menos plana, descansa sobre el pectoral mayor y el serrato mayor, a los cuales está unida por la fascia superficialis, que tan pronto es muy apretada como floja y a gunas veces areolar (*bolsa serosa de la mama*).

b) *Cara anterior* — Fuertemente convexa, tersa y lisa en la mayor parte de su extensión, presenta en su parte más saliente la

aréola y el pezón. La *aréola* es una región circular, de 15 a 25 milímetros de diámetro, caracterizada, por una parte, por su color oscuro y por otra, por la presencia en su superficie de los *tubérculos de Morgagni* (*tubérculo de Montgomery* en la mujer embarazada): son glándulas sebáceas que levantan la piel a su nivel. El *pezón* es una eminencia cilíndrica o cónica que se levanta en el centro de la aréola. Mide, por término medio, de 10 a 11 milímetros de longitud por 8 ó 9 milímetros de anchura en su base (algunas veces el pezón está deprimido, *pezón invaginado*). Es irregular, rugoso, algunas veces agrietado o resquebrajado. En su vértice existen de doce a veinte orificios, terminaciones de los conductos galactóforos.

c) *Circunferencia* — Poco o nada marcada en su parte superior, está claramente indicada en la inferior por un surco, el *surco submamario*.

3.º **Constitución anatómica.** — Comprende las tres partes siguientes: 1.º la *glándula mamaria propiamente dicha*; 2.º, una *envoltura cutánea*; 3.º, una *cubierta celuloadiposa*.

A. **GLÁNDULA PROPIAMENTE DICHA** — La glándula mamaria, una vez desembarazada de las partes blandas que la cubren, tiene la forma de una masa gris amarillenta, aplanada de delante atrás, con: 1.º, una *cara posterior*, plana; 2.º, una *cara anterior*, muy accidentada, que presenta partes deprimidas y partes salientes en forma de crestas; 3.º una *circunferencia*, irregular, que envía prolongaciones más o menos notables (cinco órdenes de prolongaciones). Observadas en cortes, ya verticales, ya horizontales, que pasen por el pezón, la glándula es más gruesa en su parte media que en su periferia; más gruesa también en su parte inferior que en su parte superior.

Histológicamente considerada es una glándula atracimada, descomponible en diez o doce lóbulos, cada uno de los cuales puede descomponerse a su vez en lobulillos y ácinos (véanse los tratados de Histología).

Los conductos excretorios, primeramente *intralobulillares*, después *interlobulillares*, se condensan, para cada lóbulo, en un solo conducto, que se llama *conducto lobular* o *galactóforo*. Existen, de ordinario, de diez a doce galactóforos. Irregulares, flexuosos, acodados, todos ellos se dirigen hacia la base del pezón, y un poco antes de alcanzarla presenta cada uno de ellos una dilatación fusiforme, el *seno galactóforo*. Al salir del seno, los conductos galactóforos atraviesan el pezón, para abrirse en su vértice formando una especie de criba, el

área cribosa del pezón. Nótese que los galactóforos no se anastomosan entre sí y que por otra parte tampoco tienen válvulas.

B. CUBIERTA CUTÁNEA — Presenta tres zonas: zona periférica, zona areolar y zona mamilar.

a) *Zona periférica* — La piel no presenta en este punto nada de particular.

b) *Zona areolar*. — Más delgada y más pigmentada, reforzada en su cara profunda por un músculo de fibras lisas, el *músculo areolar*. Este músculo areolar forma una capa continua, que disminuye de grosor a medida que se aleja del pezón (1,5 a 2 milímetros de espesor). Sus fibras son, en su mayor parte, *circulares*; algunas *radiales*. El *músculo areolar* tiene por función o acción: 1.º, proyectar el pezón hacia delante (*tetotismo*); 2.º, expulsar el contenido de los conductos galactóforos hacia el área cribosa. Las *glándulas de la areola* son de tres órdenes: 1.º, *glándulas sudoríparas*, muy desarrolladas; 2.º, *glándulas sebáceas*, que constituyen los tubérculos de Morgagni y los tubérculos de Montgomery (véase más arriba); 3.º, *glándulas mamarias accesorias*, muy variables en número y volumen, pero casi constantes.

c) *Zona mamilar* — La piel que cubre el pezón es muy delgada y notable por la multiplicidad y el número de sus papilas. Debajo de la piel se observa, además, en este punto, un músculo especial, el *músculo mamilar*. Se compone de dos clases de fibras: 1.º, *fibras horizontales*, dispuestas perpendicularmente a los conductos galactóforos; 2.º, *fibras longitudinales*, que van de la base al vértice del pezón. Desde el punto de vista del papel o acción que desempeñan, las fibras horizontales encogen el pezón, lo ponen duro y contribuyen de este modo al tetotismo; las fibras longitudinales tiran del vértice del pezón hacia su base y tienden a encogerlo.

C. CUBIERTA CELULOADIPOSA — El pániculo adiposo subcutáneo, al llegar a la glándula mamaria, se divide en dos hojas: 1.º, una *hoja posterior*, más delgada que se insinúa entre la base de la glándula y la fascia superficial (*capa celulosa retromamaria*); 2.º, una *hoja anterior*, más gruesa, que se extiende sobre la cara anterior (desde la glándula hasta la areola), cara que, como ya hemos visto, presenta fositas y crestas (*capa celulosa premamaria*).

Las crestas envían hacia la cara profunda de la dermis tabiques conjuntivos, que tienen por efecto fijar la glándula y al propio tiempo limitar a su alrededor un sistema de espacios llamados *fosas adiposas*.

Nótese que estas fosas son independientes; algunas veces, sin embargo, la masa celuloadiposa que contienen se continúa, a través de la propia glándula, con la capa celulosa retromamaria.

4.º **Vasos y nervios.**—a) *Arterias.* Las arterias proceden de tres orígenes: 1.º, de la *mamaria interna* (dos o tres ramos que invaden la glándula por su lado superointerno); 2.º, de la *mamaria externa* (dos o tres ramos, más pequeños que los precedentes, que llegan a la glándula por su lado externo); 3.º, de las *intercostales* (pequeños ramos perforantes, muy cortos y delgados). Los citados ramos, anastomosándose entre sí, forman, en la superficie de la glándula, una *red perimamaria*, de la cual se desprenden dos órdenes de ramos: 1.º, *ramos externos*, para la piel; 2.º, *ramos internos*, para la glándula.

b) *Venas.*—Las venas se dirigen hacia la cara anterior de la glándula, en cuyo punto forman, debajo de la piel, una red de anchas mallas: la *red subcutánea* (debajo de la areola, el *circulo venoso de Haller*). Las venas que salen de esta red (siguiendo igual trayecto que las arterias) se dirigen: unas *hacia dentro*, hacia la *mamaria interna*; otras *hacia fuera*, hacia la axilar (únicamente algunas de las intercostales).

c) *Linfáticos.*—Los linfáticos, que salen de la piel, de la glándula y de los conductos galactóforos, van a parar todos a una *red subareolar*. Los troncos que parten de esta red se dividen en externos e internos: 1.º, los *linfáticos externos*, que son los más importantes (en número de dos a cuatro), rodean el borde inferior del pectoral mayor y van a terminar en la axila, en un grupo de ganglios situados en la parte inferior del ángulo diedro formado por el encuentro de los músculos pectoral mayor y gran serrato; 2.º, los *linfáticos internos*, que se dirigen hacia dentro y terminan (después de haber atravesado los espacios intercostales) en los ganglios mamarios internos.

d) *Nervios.*—Los nervios proceden: 1.º, del gran simpático por los plexos que acompañan a las arterias; 2.º, de los seis primeros nervios intercostales, excepto el primero; 3.º, de la rama supraclavicular del plexo cervical; 4.º, de las ramas torácicas del plexo braquial. Terminan en la piel (*filetes cutáneos*), en las fibras lisas del músculo areolar y del músculo mamilar (*filetes motores*), en los vasos (*filetes vasomotores*) y en la glándula (*filetes secretorios*).

2. LA MAMA EN EL HOMBRE

El hombre, al igual que la mujer, posee *dos mamas* pectorales. Pero estas mamas, si bien tienen igual origen embrionario que las de la mujer, no se han desarrollado, son *órganos atrofiados*, *órganos rudimentarios*.

Tal cual es, la mama en el hombre, aunque con dimensiones muy reducidas, presenta las mismas partes fundamentales que las de la mama de la mujer a saber: 1.º, un *pezón* de 2 a 3 milímetros de altura por 4 ó 5 milímetros de diámetro; 2.º, una *aréola*, circular o elíptica, más o menos provista de pelos, con tubérculos de Morgagni; 3.º, debajo de la piel, un *músculo areolar* y un *músculo mamilar*; 4.º, una capa celuloadiposa; 5.º, finalmente, una pequeña *glándula*, aplanada en forma de disco, de color grisáceo y de consistencia fibrosa.

Nótese que, en ciertos casos, se ha visto la mama del hombre elevarse en su organización y secretar leche como la de la mujer (caso citado por MURAT y PATISSIER, caso de HUMBOLDT etc.)

LIBRO X

GLANDULAS DE SECRECION INTERNA

Designanse con el nombre de *glándulas de secreción interna* o *endocrinas* (por oposición a las *glándulas de secreción externa* o *exocrinas*, que vierten sus productos afuera) unas formaciones glandulares que derraman los suyos en el medio interior, es decir, en las venas o linfáticos. Son: 1.º, el *cuerpo tiroides*; 2.º, las *paratiroides*; 3.º, el *tímo*, 4.º, las *hipófisis*, 5.º, el *bazo*, 6.º, las *cápsulas suprarrenales*; 7.º, los *órganos paraganglionares*, 8.º, las *glándulas hemolinfáticas*, 9.º, los *isotes de Langerhans*, 10. las glándulas de secreción interna incorporadas a las glándulas sexuales (*glándula intersticial del testículo*, *glándula intersticial del ovario*, *cuerpo amarillo*)

I CUERPO TIROIDES

El cuerpo tiroides llamado también *glándula tiroides* o simplemente *tiroides*, es un órgano impar, medio, simétrico, que se apoya en la parte anterior del conducto laringotraqueal

1.º **Consideraciones generales.**— Está situado en la cara anterior del cuello, en la unión de su tercio inferior con sus dos tercios superiores. Está mantenido en posición: 1.º, por una capa conjuntiva que lo rodea por todas partes, *cápsula del tiroides*, y que no es otra cosa que una dependencia de las aponeurosis cervicales; 2.º, por tres ligamentos: uno *medio*, que se extiende de la laringe a la parte media del tiroides, y otros dos *laterales* que van de los lóbulos laterales a la tráquea y al cartilago cricoides; 3.º, por los vasos tiroides y principalmente por sus vainas conjuntivas, que de la cápsula tiroidea van a la vaina de los vasos del cuello. La tiroides tiene una *coloración gris rosada*, tirando a amarillo; una *consistencia* intermedia entre la del

timo y la del bazo. Su volumen (6 ó 7 centímetros de ancho por 3 de alto y 15 a 20 milímetros de grueso) varía mucho según los individuos, la edad y el sexo. Su peso, en el adulto, es de 25 a 30 gramos.

2.º Conformación exterior y relaciones. La tiroides tiene la forma de un anillo, cuya concavidad, dirigida hacia atrás, abraza estrechamente los dos conductos alimentario y respiratorio. Se la ha comparado a una H mayúscula. Se consideran en ella: 1.º, una parte media, estrecha, el *istmo*, 2.º, dos partes laterales, mucho más voluminosas, los *lóbulos laterales*.

A. ISTMO. Tiene 1 centímetro de altura por 5 ó 6 milímetros de grueso. Sus dos *extremidades*, derecha e izquierda, se continúan con los *lóbulos*. Su *cara anterior*, plana o ligeramente convexa, corresponde a los músculos infrahioides, a la aponeurosis y a la piel. Su *cara posterior*, cóncava, abraza el cricoides y los dos primeros anillos de la tráquea. Su *borde inferior*, curvo, cóncavo hacia abajo, corresponde al segundo anillo de la tráquea. Su *borde superior*, cóncavo hacia arriba, corresponde al primer anillo de la tráquea. Deja escapar una prolongación conoide, la *pirámide de Lalouette*, la cual se dirige hacia arriba, costando uno de los lados del plano medio (con preferencia el izquierdo) y se extiende hasta el borde superior del cartilago tiroides, es muy variable en sus dimensiones y en su forma (triangular, cilíndrica, en forma de cinta, bifurcada en V o en Y invertida), falta en la cuarta parte de los casos, representa morfológicamente la parte inferior del *conducto tirogloso*, que, en el embrión, une la base de la lengua al vestigio tiroideo medio.

B. LÓBULOS LATERALES.—Cada uno de ellos toma la forma de una pirámide triangular de base inferior, y presenta, por consiguiente, *base*, *vértice*, *tres caras* y *tres bordes*.

a) *Base* — Convexa, corresponde al sexto anillo de la tráquea. Está situada a 2 centímetros por encima del esternón.

b) *Vértice* — Redondeado y romo, corresponde al borde posterior del cartilago tiroides (a su tercio inferior o a su tercio medio, según los casos).

c) *Caras* — Se dividen en interna, externa y posterior. La *cara interna*, cóncava, abraza las partes laterales de la tráquea, de la laringe, de la faringe y del esófago. La *cara externa*, convexa, está cubierta por tres planos musculares (esternotiroides, esternocleidohioides y omoplatohioides, y esternocleidomastoideo), por la aponeurosis cervical superficial, el cutáneo y la piel. La *cara posterior* está en relación

con el paquete vasculonervioso del cuello y especialmente con la carótida primitiva.

d) *Bordes* — Son: anterior, posteroexterno y posterointerno. El *borde anterior* se dirige oblicuamente del vértice del lóbulo hacia el istmo de la tiroides; va acompañado de la arteria cricotiroidea y del nervio laríngeo externo. El *borde posteroexterno* está en relación con la yugular interna. El *borde posterointerno* se insinúa entre la carótida primitiva y el conducto laringotraqueal, siendo de notar que está en relación con la arteria tiroidea inferior y con el nervio recurrente.

3.º **Constitución anatómica.**— La tiroides se compone:

a) De una *estroma conjuntiva*, que forma, prameramente, a la glándula tiroides, una envoltura delgada y continua, y después envía al interior del órgano una multitud de prolongaciones o tabiques.

β) De un *tejido propio*, representado por una multitud de pequeñas masas, morfológicamente equivalentes, los *folículos tiroideos*.

4.º **Vasos y nervios.**—a) Las *arterias* proceden: 1.º de las *dos arterias tiroideas superiores*, ramas de la carótida externa (cada una de ellas proporciona tres ramas al cuerpo tiroides: *interna, externa y posterior*), 2.º, de las *dos arterias tiroideas inferiores*, ramas de la subclavia (cada una de ellas proporciona tres ramas tiroideas: *inferior, posterior y profunda*), 3.º, a veces de una *tiroidea media* o *tiroidea de Neubauer*, que nace de la aorta o del tronco braquiocéfálico. Las ramificaciones de esas diferentes arterias caminan primero, irregularmente flexuosas, hacia la superficie exterior de la glándula, y después penetran en su espesor, dividiéndose sucesivamente en ramos cada vez más delgados.

β) Las *venas* forman alrededor de la glándula un rico plexo: el *plexo tiroideo*. Las venas que parten de este se dividen en tres grupos: 1.º, *venas tiroideas superiores*, que corresponden a las arterias del mismo nombre y van a abrirse en la yugular interna, ya sea directamente, ya desaguando previamente en un tronco que les es común con la facial y la lingual: el *tronco tirolinguofacial*, 2.º, *venas tiroideas inferiores*, que nacen del borde inferior de la tiroides y van a las yugulares internas y al tronco braquiocéfálico izquierdo; 3.º, *venas tiroideas medias*, situadas entre las superiores y las inferiores, las cuales van a desaguar en la yugular interna. Es de notar que todas las venas tiroideas son avaluulares.

γ) Los *linfáticos* forman alrededor de la glándula un *plexo peritiroideo*. Los troncos que parten de él se dividen en. 1.º, *linfáticos descendentes*, que van a terminar en ganglios situados delante de la tráquea y encima del timo, 2.º, *linfáticos ascendentes*, que terminan en parte (los medios) en uno o dos ganglios prelaríngeos, y en parte (los laterales) en los ganglios laterales del cuello.

δ) Los *nervios* proceden 1.º, del *simpático cervical* (ganglio cervical medio y segundo nervio cardíaco); 2.º, de los dos *nervios laríngeo superior y laríngeo recurrente*.

2. PARATIROIDES

Las paratiroides o *glándulas paratiroides* son pequeños corpúsculos redondeados anexos al cuerpo tiroides. Se las distingue en *superiores e inferiores*. De consistencia blanda las cuatro, las inferiores son más voluminosas que las superiores, sin embargo, no exceden de un centímetro de altura por medio de anchura.

1.º **Situación y relaciones.** - Por regla general las paratiroides son satélites del borde posterior de los lóbulos laterales del tiroides, dispuestos verticalmente a derecha e izquierda, contra el lóbulo tiroides correspondiente. Las *paratiroides inferiores* se encuentran siempre en la proximidad de una rama terminal de la arteria tiroides inferior, suspendidas a modo de fruto de uno de los ramúsculos de este vaso. El recurrente se encuentra por lo general a uno o dos centímetros por dentro de ellas.

Las *paratiroides superiores*, más difíciles de encontrar, están generalmente situadas en la unión del tercio superior con los dos tercios inferiores del borde posterior del tiroides.

Las paratiroides están situadas dentro de la vaina paratiroidea, pero siempre por fuera de la capsula propia del cuerpo tiroides.

Embriológicamente, la paratiroides superior deriva de la cuarta bolsa braquial; la paratiroides inferior, de la tercera bolsa, lo mismo que el timo.

2.º **Vascularización e innervación.** - Cada paratiroides está irrigada por una arteria especial, arteria siempre voluminosa en comparación con las pequeñas dimensiones de la glándula. La paratiroides inferior recibe siempre una rama de la tiroidea inferior. La para-

tiroides superior está casi siempre irrigada por la tiroidea inferior, sólo excepcionalmente por la tiroidea superior.

Las vénulas terminan en el plexo peritiroideo; los nervios proceden de los nervios vecinos (recurrente, nervios tiroideos).

3 TIMO

El timo es, como el cuerpo tiroides, una glándula de secreción interna, desarrollada delante del conducto aerífero.

1.º **Consideraciones generales.** — Está situado en el mediastino anterior, entre los dos pulmones, detrás del esternón, delante del corazón y de los grandes vasos. Su color es rosado en el feto y grisáceo en el niño. Su consistencia es más débil o blanda que la de la tiroides, es un órgano blando, fácilmente depresible. Su volumen aumenta hasta el segundo año, después se reduce gradualmente hasta la edad adulta; en el recién nacido mide 5 centímetros de lado por 15 milímetros de ancho y 14 de espesor. Pesa 5 gramos por término medio: su peso específico es de 1.071 en el recién nacido.

2.º **Conformación exterior y relaciones.** — El timo tiene la forma de un cuerpo prolongado de arriba abajo, con: 1.º, una *extremidad inferior* o *base*, que corresponde al surco auriculoventricular anterior del corazón; 2.º, una *extremidad superior* o *vértice*, generalmente bifurcada (*astas del timo*) y situada algo por debajo del cuerpo tiroides. El timo, que ocupa a la vez el tórax y la parte inferior del cuello, ofrece a nuestra consideración dos porciones: una *porción cervical* y una *porción torácica*.

a) **Porción cervical** — Está en relación: 1.º, *por delante* (*cara anterior*), con los músculos esternocleidohioideo y esternotiroides, revestidos por la aponeurosis cervical superficial y el tejido celular subcutáneo y la piel; 2.º, *por detrás* (*cara posterior*), con la tráquea y las dos carótidas primitivas; 3.º, *a los lados* (*bordes laterales*), también con las carótidas primitivas.

b) **Porción torácica.** — Está en relación: 1.º, *por delante* (*cara anterior*), con el esternón y las primeras articulaciones condroesternales; 2.º, *por detrás* (*cara posterior*), con el pericardio y los grandes vasos (aorta, arteria pulmonar, vena cava superior, tronco arterial braquiocefálico y tronco venoso braquiocefálico izquierdo), que coro-

nan el corazón, 3.º, a los lados (caras laterales y no bordes laterales), con el pulmón, la pleura y el nervio frénico.

3.º Constitución anatómica.—El timo se compone de dos lóbulos, uno derecho y otro izquierdo, íntimamente unidos entre sí en la línea media. El órgano entero, considerado desde el punto de vista de su estructura, comprende:

a) Una *estroma conjuntiva*, que forma primeramente al órgano una envoltura continua (*cápsula del timo*) y envía, además, numerosas prolongaciones a su interior.

β) Un *tejido propio*, representado (después de disecado y desplegado) por un número considerable de *lobulillos*, colgados de un *cordon central*, que se descomponen a su vez en cierto número de partes más pequeñas llamadas *fóliculos* (véanse los tratados de Histología).

Por su estructura, el timo ha de asimilarse a los órganos hemolinfáticos.

4.º Vasos y nervios.—Las *arterias* destinadas al timo se dividen en tres grupos: 1.º, *timicas superiores*, una derecha y otra izquierda, que proceden de las tiroides superiores, 2.º, *timicas laterales*, igualmente en número de dos, proceden de las mamas internas, 3.º, *timica posterior*, impar, proviene del tronco braquiocéfalo y se distribuye por los dos lóbulos. Las *venas*, en su mayor parte, se desprenden de la cara posterior del órgano, para terminar en el tronco venoso braquiocéfalo izquierdo (algunas, menos importantes, van a las mamas internas, a las pericárdicas y a las tiroides inferiores). Los *linfáticos* se reúnen en tres o cuatro troncos, que terminan en los ganglios retroesternales. Los *nervios* emanan del gran simpático y tal vez del neumogástrico.

4. HIPÓFISIS

Las hipófisis son en número de dos: una, la principal, está situada en la cavidad craneana: es la *hipófisis craneana* o *cerebral*; la otra, accesoria, ocupa la bóveda de la faringe, y es la *hipófisis faríngea*.

A. Hipófisis cerebral

También se llama *cuerpo pituitario* o *glandula pituitaria*. Es una pequeña masa elipsoidea, suspendida de la extremidad inferior del

tallo pituitario, del cual parece ser, a primera vista, un simple engrosamiento.

1.º **Dimensiones y peso.** Mide 8 milímetros en sentido anteroposterior, 14 milímetros en sentido transversal y 6 milímetros en sentido vertical. Su peso es de 55 centigramos.

2.º **Conformación exterior.** — La hipófisis cerebral está constituida por dos lóbulos, uno anterior y otro posterior. El lóbulo anterior, más voluminoso, es rojizo; el lóbulo posterior, de un color gris amarillento, es mucho más pequeño. El tallo pituitario se implanta exclusivamente en el lóbulo posterior.

El lóbulo anterior deriva de la faringe embrionaria, que envía una prolongación ascendente al interior del cráneo. El lóbulo posterior deriva de un esbozo cerebral que proviene del cerebro intermedio.

3.º **Celda hipofisaria.** — La hipófisis está alojada en una celda osteofibrosa. La parte ósea está formada por la silla turca; la pared posterior, arzón de la silla, está formada por la lámina cuadrilátera del esfenoides; a los lados no existe pared ósea bien clara. Los ángulos están marcados por las apófisis clinoides anteriores y posteriores. La celda ósea está completada por la duramadre, que la cierra por arriba, formando la *tienda de la hipófisis*; ésta es horizontal.

La duramadre completa también la celda hacia fuera, constituyendo la pared interna del seno cavernoso. Esta celda, inextensible, está rodeada de senos: seno coronario anterior, seno coronario posterior, seno lateral.

4.º **Relaciones de la hipófisis.** — La *cara posterior* corresponde a la fosa cerebelosa por intermediación de la lámina cuadrilátera; la *cara anterior* corresponde al seno esfenoidal y, por su intermediación, a las fosas nasales; la *cara superior* corresponde a la cara inferior del cerebro; hacia atrás, al túbulo cinéreo y los tubérculos mamilares; hacia delante, al quiasma óptico, que descansa sobre la tienda de la hipófisis; un poco más hacia fuera está en contacto con la tienda, la cintilla olfativa y el espacio perforado anterior. Finalmente además de estas relaciones nerviosas importantes, debemos recordar que la tienda de la hipófisis ocupa el centro del polígono arterial de Willis. Lateralmente, la celda de la hipófisis está bordeada por el seno cavernoso, que contiene la carótida interna. La *cara inferior* está en relación con el seno esfenoidal.

5.^a **Vasos y nervios.**—Las *arterias* proceden de la carótida interna, las *venas* vierten en el seno cavernoso. Los *nervios* están destinados exclusivamente al lóbulo anterior (nervio vascular y nervio secretorio).

6.^o **Constitución anatómica.**—Se le describen tres lóbulos: anterior, medio y posterior (Véanse los tratados de Histología.)

8 *Hipófisis faríngea*

Se halla colocada en el espesor de la mucosa que forma la bóveda de la faringe. Es constante. Impar y media, mide, de ordinario, de 2 a 5 milímetros de longitud por 1 a 3 milímetros de ancho. Está siempre colocada delante de la bolsa de Luschka y de la amígdala faríngea, inmediatamente detrás del pico del vómer. Morfológicamente, la hipófisis faríngea representa la parte más inferior del pedículo (*pedículo hipofisario*) que, en el embrión, enlaza la hipófisis cerebral con la bóveda de la faringe.

5. Bazo

El bazo es una glándula vascular sanguínea

1. **Consideraciones generales.**—El bazo se halla situado en la región supramesocólica del abdomen, en el espacio izquierdo, por detrás del estómago, y está cubierto por la porción lateral inferior del tórax. Es, pues, un órgano toracoabdominal. Su *dirección* es, aproximadamente, la de las costillas. Está *mantenido en posición* por cierto número de repliegues peritoneales, de suficiente movilidad para que pueda moverse más o menos de su sitio bajo la influencia de los movimientos respiratorios, de las actividades y de la repleción de los órganos vecinos (estómago, colon). Por lo general, existe *un solo bazo*; las observaciones del *bazo supernumerario* alrededor del principal son, sin embargo, muy numerosas. Sus *dimensiones* medias son las siguientes: longitud, 13 centímetros; ancho, 8 centímetros, grosor, 3 centímetros. Su *peso* varía desde 180 a 200 gramos, para alcanzar en ciertos casos una cifra mucho más elevada. El bazo presenta una *coloración* rojiza en e vivo y violácea en el cadáver. Su *consistencia* es débil; su *alterabilidad* considerable.

2.º Forma. — El bazo tiene la forma de un ovoide y nos ofrece tres caras: 1.ª, *externa*, convexa moldeada sobre el diafragma; *interna*, dividida por una cresta en dos partes, una antero-interna, amoldada sobre el estómago, y otra posterior; 2.ª, *postero-interna*, moldeada en hueco sobre el riñón. Asimismo nos ofrece tres bordes: 1.º, *anterior*, dentado, 2.º, *posterior*, 3.º, *interna*, que separa la cara renal de la gástrica. El extremo superior forma el vértice; el extremo inferior o basal forma una pequeña cara, la cara cólica.

Su dirección es oblicua; el eje mayor se inclina de arriba abajo, de atrás adelante y de dentro afuera.

3.º Relaciones. — **A CELDA ESPLÉNICA** — El bazo está alojado en un intersticio constituido en tres de sus lados por el diafragma, especie de nicho cóncavo hacia fuera, atrás y arriba. Hacia abajo, el intersticio comprende dos peldaños o resaltes: uno, posterior representado por la cápsula suprarrenal y la cara externa del riñón izquierdo; otro, anterior, representado por la parte superior del ángulo izquierdo del colon, fijada a la pared por el ligamento frenocólico izquierdo, sobre el cual descansa la cara basal del bazo (*sustentaculum lienis*). Hacia dentro, la celda frénica no está cerrada, corresponde a la cara posterior del estómago y a la cola del páncreas.

B. PERITONEO ESPLÉNICO. — El bazo está rodeado por el peritoneo, que al mismo tiempo lo fija a los órganos vecinos por cierto número de repliegues.

El *epiplón gastroesplénico* es una lámina vertical que va de la tuberosidad mayor del estómago a la parte interna del bazo (borde anterior del hilio). Está formado por dos hojas adosadas, por entre las cuales discurren la *arteria gastroepiploica izquierda* y los *vasos cortos*; estas hojas provienen, una de la cara anterior del estómago y otra de su cara posterior y se dirigen hacia el hilio del bazo.

El *epiplón pancreatocoesplénico* contiene el pedículo vascular del bazo y la cola del páncreas. Forma una lámina corta de dos hojas tendida sobre el labio posterior del hilio del bazo y el peritoneo parietal. A nivel del hilio del bazo existen, pues, cuatro hojas peritoneales, dos internas y dos externas. Por encima del bazo, las dos hojas reunidas forman el *ligamento suspensorio del bazo* o *frenoesplénico*. A veces existe otro ligamento que va de la extremidad inferior del bazo a la acodadura izquierda del colon (*ligamento esplenocólico*).

C. RELACIONES DE LAS CARAS. La *cara externa*, lisa y convexa, corresponde al diafragma y, por su intermediación, a la pleura y la

pared torácica. La 9.^a cost.lla puede considerarse como satélite de esta cara. La *cara anteroexterna* o *gástrica* mira hacia dentro y adelante; está en relación con la tuberosidad mayor del estómago. Ostenta el *hilio del bazo*, constituido por seis u ocho fositas escalonadas que franquean el paso a los vasos y nervios esplénicos. La *porción retro-hiliar* corresponde a la trascavidad de los epíplones, de la cual la separa el epiplón pancreaticoesplénico. La *cara posterointerna* o *renal*, la menor de las tres, corresponde al tercio externo de la mitad superior del riñón.

D. RELACIONES DE LOS BORDES. El *borde ventrado* se insinúa entre el diafragma y el estómago; el *borde posteroinferior* se insinúa entre el borde externo del riñón izquierdo y la pared abdominal; el *borde interno*, que separa la cara renal de la cara gástrica, se insinúa entre la cara anterior del riñón y la tuberosidad mayor del estómago.

E. RELACIONES DE LOS EXTREMOS — El *polo superior* se halla a la altura de la 10.^a vértebra dorsal y junto a la columna. El *polo inferior* se apoya en la cara superior del ligamento frenocólico izquierdo.

4.º Constitución anatómica. El bazo es una *glándula vascular* sanguínea rodeada de una cápsula fibrosa (Véanse los tratados de Histología);

5.º Vasos y nervios. — Las arterias proceden de la *arteria esplénica*. Después de haber dado la *polar superior* del bazo se bifurca a 2 ó 3 centímetros del hilio, rama superior y rama inferior, cada una de las cuales emite dos o tres ramitos secundarios que penetran en el interior del tejido esplénico.

La *vena esplénica*, formada por la reunión de cinco a siete gruesas venas que emergen del hilio, termina en el tronco porta después de haber recibido la arteria mesentérica inferior.

Los *linfáticos* desembocan en los ganglios que se encuentran en la proximidad de la cola del páncreas (extremidad izquierda de la cadena esplénica).

Los *nervios* se componen en su mayoría de fibras amielínicas que emanan del plexo solar y son conducidas por la arteria esplénica. Constituyen en el órgano una especie de red de la que parten dos órdenes de fibras: *fibras motoras* para las arterias, y *fibras sensitivas* para los corpúsculos y la pulpa esplénicos.

6. CÁPSULAS SUPRARRENALES

Organos glandulares y voluminosos, situados simétricamente en la parte superior del abdomen, encima de los riñones (de donde proviene su nombre).

1.º Consideraciones generales. — Son dos, una izquierda y otra derecha, y están situadas en la parte superointerna de los riñones (*cuadrilátero de la suprarrenal*). Tienen tres posiciones: posición alta, posición baja y posición media. Están sostenidas: 1.º, por una capa celulosa, que las une a los riñones; 2.º, por la cápsula del riñón, que rodea a la cápsula suprarrenal al mismo tiempo que el riñón; 3.º, por sus vasos y nervios (medios de fijación muy accesorios). Además, por los tres *ligamentos suprarrenales* (*cava, hepático, diafragmático*). Cada cápsula suprarrenal mide, por término medio, 30 milímetros de altura por 25 milímetros de ancho y 7 u 8 milímetros de grueso. Pesa de 5 a 6 gramos. Nótese que la derecha es algo menos voluminosa que la izquierda. Color moreno amarillento. Consistencia bastante blanda, algo menos que la del timo.

2.º Conformación exterior y relaciones. — La cápsula suprarrenal tiene la forma de una gruesa coma invertida ('), cuya cabeza hállase en el ángulo vertebrorrenal y la cola descansa sobre el riñón mismo. Se consideran en ella *dos caras, dos bordes, un vértice y una base*.

a) *Cara anterior.* — Plana, ligeramente cóncava o ligeramente convexa, presenta, algo por debajo de su parte media, un surco curvilíneo, que constituye el *hilio*. Está en relación: 1.º, a la izquierda (con perineo o sin él), con el borde posterior del bazo, la tuberosidad mayor del estómago y el páncreas (no siempre); 2.º, a la derecha (con peritoneo o sin él), con el hígado y (completamente dentro) con la vena cava inferior y el duodeno.

b) *Cava posterior.* — Algo menos alta que la precedente, está en relación con la porción lumbar del diafragma, y más allá de éste con el fondo de saco de la pleura y las décima y undécima costillas.

c) *Borde externo.* — Cóncavo, regular o más o menos sinuoso, descansa en el borde interno de la porción superior del riñón.

d) *Borde interno.* — Casi vertical, está en relación con el plexo solar y el ganglio semilunar. Está en relación, además: a la derecha,

con la vena cava y el duodeno; a la izquierda, con la aorta (5 ó 6 milímetros de distancia entre los dos).

c) *Vértice*. — Mira hacia arriba, adentro y algo adelante. Ora es agudo, y en este caso se halla muy acentuado, ora es romo, y entonces aparece más o menos marcado.

f) *Base*. — Descansa: 1.º, en *posición alta*, sobre la parte superior del riñón; 2.º, en *posición baja*, que es la más frecuente, en el pedículo del órgano.

3.º **Constitución anatómica**. — La cápsula suprarrenal se compone: 1.º, de una *envoltura o cubierta fibrosa*; 2.º, de un *tejido propio*.

a) *Envoltura fibrosa*. — Tenue, pero resistente, rodea por completo la cápsula suprarrenal. Por su superficie exterior envía numerosas prolongaciones conjuntivas a las paredes de la cavidad o espacio suprarrenal. Por su superficie interior envía al tejido propio una multitud de tabiques laminados, dirigidos en sentido radiado y que, uniéndose entre sí por sus bordes, forman un conducto de corte hexagonal.

b) *Tejido propio*. — Comprende dos sustancias muy distintas: una *periférica o cortical*, amarillenta, de consistencia dura, que representa aproximadamente los dos tercios de la cápsula; otra *central o medular*, incluida en la precedente, grisácea o morena, más blanda y friable y más vascular. Nótese que después de la muerte, esta sustancia medular se reblandece y aun frecuentemente se hace difluente.

4.º **Significación morfológica**. — Morfológicamente, la glándula suprarrenal está en realidad constituida por dos formaciones distintas: una periférica, que procede del epitelio del celoma primitivo; la otra central, que procede del esbozo del simpático, tomando electivamente los colores de las sales de cromo (*substancia cromafínica*).

Estas dos formaciones, que están separadas en el estado embrionario y que permanecen separadas durante toda la vida en muchos vertebrados inferiores (la primera constituye el *cuerpo interrenal*; la segunda forma el *cuerpo suprarrenal*), están unidas íntimamente en la glándula suprarrenal del hombre.

La formación periférica (homóloga del cuerpo interrenal) está representada por la *substancia cortical*. La formación central (homóloga del cuerpo suprarrenal) está representada por la *substancia medular*.

5.º Vasos y nervios. — Las arterias (*arterias capsulares*), en número de tres, se dividen en: 1.º, *arteria capsular superior*, rama de la diafragmática inferior, que desciende a lo largo del borde externo; 2.º, *arteria capsular media*, rama de la aorta, que se ramifica sobre las dos caras; 3.º, *arteria capsular inferior*, rama de la renal, que se distribuye por la base. Las venas terminan en su mayoría en un grueso conducto colector, la *vena central*, la cual, a nivel del hilio, desemboca, a la izquierda en la renal, a la derecha en la vena cava. Además de la vena central, algunas *venas accesorias* terminan en las venas más próximas. Los *linfáticos* forman una *red superficial* y una *red profunda*. Los troncos y tronquitos que de ellas emanan (los de la red profunda siguen de la vena central) terminan en uno o dos ganglios situados encima de la vena renal. Los *nervios*, de una riqueza incomparable, provienen de dos pedículos, uno posterior y otro interno. El *pedículo posterior* está constituido por numerosos filetes nerviosos que provienen de la porción terminal del esplácnico mayor; tienen el acceso a la glándula por su parte profunda, un poco por encima de su cara basal. El *pedículo interno* proviene del plexo solar. Termina en la parte inferior del borde interno de la glándula.

7. ORGANOS PARAGANGLIONARES

Dase este nombre, propuesto por KOHN, a unas pequeñas masas epiteliales de significación glandular, que derivan del esbozo del simpático. Tienen por característica colorearse de pardo amarillo, bajo la acción de las sales de cromo: son *órganos cromafínicos* y muy numerosos. He aquí los cinco principales:

1.º Paraganglio timpánico. — Llamado también *glándula timpánica*. Está situado alrededor del nervio de Jacobson, a su paso hacia el conducto timpánico.

2.º Paraganglio carotídeo. — Más conocido con el nombre de *glándula carotídea*. Pequeño corpúsculo de coloración gris rojiza, situado en el ángulo de bifurcación de la carótida primitiva. Oblongo, de gran diámetro vertical: 5 a 6 milímetros de altura por 2 ó 3 de anchura. Forma generalmente una masa única y compacta. Está disociado 7 veces en dos o tres nódulos distintos.

3.º **Paraganglio coccígeo.** — Es la *glándula coccígea* de LUSCHKA. Pequeña masa redondeada o lobulada, situada en la pelvis, aplicada directamente contra la cara anterior de la última pieza del cócix. Mide de 2 a 3 milímetros de diámetro. Recibe constantemente uno o varios ramos de la arteria sacra media.

4.º **Paraganglio abdominal.** — Descubiertos por ZUCKERKANDL (*órgano parasimpático* de ZUCKERKANDL), los paraganglios abdominales se presentan en forma de dos pequeños órganos, uno derecho y otro izquierdo, situados a cada lado de la aorta abdominal, en el plexo simpático que rodea a esta arteria, enfrente de la emergencia de la mesentérica. Dimensiones: 12 milímetros de altura por 8 milímetros de anchura.

5.º **Paraganglio suprarrenal.** — No es más que la *substancia medular* de la cápsula suprarrenal.

8. OTRAS GLÁNDULAS DE SECRECIÓN INTERNA

Las otras glándulas de secreción interna más arriba enumeradas (el grupo 8, *glándulas hemolinfáticas*; el grupo 9, *islotes de Langerhans*, y el grupo 10, *glándulas de secreción interna incorporadas a las glándulas sexuales*) pertenecen al dominio de la Histología y debemos limitarnos aquí a mencionarlas.